



11

2

40

BIBLIOTECA NAZIONALE  
CENTRALE • FIRENZE •







TRACTATUS  
DE  
MORBIS MULIERUM,

*In quo solida Theoria, praxi certiori & experientiis,  
comprobata complectitur.*

A C C E D I T

Catalogus Cronologicus Medicorum, quorum scripta  
de iis morbis extant.

A U G T O R E  
JOANNE ASTRUC

PROF. REG. MEDIC. ET REGIS A CONSIL. MED.

*In hoc gaudeo aliquid discere, ut doceam; nec me ulla res  
delectabit, licet eximia sit, & salutaris, quam mihi  
uni sciturus sim. Senec. lib. 1. Ep. 6.*

Gallico Sermone conscriptus nunc Latino Versus.



V E N E T I I S,

Typis, & impensis NICOLAI PEZZANÆ.  
C I D I D C C L X I I I.



# UNITED STATES

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C.

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY

LAND ACQUISITION

ALBUQUERQUE, N. M.

1911

NOV 10 1911

RECEIVED



UNITED STATES

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT



CELSISSIMO PRINCIPI  
 PRÆSULI AMPLISSIMO  
 JOANNI BAPTISTÆ REZZONICO  
 CLEMENTIS XIII P. M.  
 NEPOTI  
 PROTONOTARIO APOSTOLICO,  
 ac totius ditionis Ecclesie  
 ARMORUM PRÆFACTO.  
 D. D. D.



VI bono, CELSISSIME VIR, nos  
 summum honorum columnen attingisse,  
 aut dignitatibus decorari, vel eximius frui ingenii  
 facultatibus a DEO OPTIMO MAXIMO libe-  
 raliter concessis, cum ceteris hominibus (cisi impa-  
 ri for-

ri fortuna donatis ) prodesse nolemus : quid enim laudabilius ( modo postulantis modestia PATRONI decus , aut alitudinem non offendat ) quam scientiarum , & artium cultores fovere , eosque adversa sorte interdum defatigatos humaniter substinere.

Me itaque in clientelam jam acceptum , iterum suscipere ne renuas , quæso : verum quidquid laboris in hoc opere mihi tribui poterit , TUIS gloriosissimis auspiciis obtegi sinas , ac si otium dederit , publico usui utiliora admodum condere non despero TIBI grata futura , quæ nisi MÆGENATIS æquaverint amplitudinem , totidem saltem observantiae ergo TE meæ testimonia suppeditaverim.

TUÆ CELSITUDINIS

XVI. Kalendas Decembris.

Humillimus, Addictissimus, Obsequens.

L. T.

I A-

J A N O P L A N C O  
PATRITIO ARIMINENSI,  
ET IN EA CIVITATE  
MEDICO PRIMARIO  
LUDOVICUS TESSARI  
S. P. D.



Uam familiaribus litteris mecum consuetudinem inire non respuisti, nunc, dum *Astruci* Eximii Viri laudes colligo, publicis testimoniis prosequi non dedignaberis.

Speciales enim Medicinæ Tractatus quanti pendeant neminem latet, cum in iis singulos morbos fusius Auctores perpendere queant, ultimasque differentias tum quo ad theoreticos, cum ad practicos canones spectat, determinare valeant. Hujus generis prostat hujusmodi ægregium opus, omnes citra partus mulierum morbos complectens, quod ceteris usque adhuc excussis amplitudine, censu, tutiori praxi, atque nuperrimarum notionum numero facile præcellit, ut mendo ullo haud redargui possit.

Haud supervacaneum tamen censui nonnulla excerpere, quæ ne pro rei novitate dubium admitterent, aut aliquo modo operis existimationem offenderent, candide breviterque declarare conabor.

Fateor itaque primum etsi concinno ordine suos digerat labores, certa aliquali tamen prolixitudine pecare, quæ illos potius molestia afficere mihi suadeo, quibus libros molestè cursim pervolvere, quam iis qui pacato materies malunt animo perscrutari. Quidam vero addunt crebro nimis ipsum remedium series in medium proferre, at animadvertant hujusmodi censores id institutum fuisse non ut provectiores sæpius quam par esset illas perlegerent, sed ut tyrones unicuique speciei magis idonea aptarent auxilia, atque formulas rectius subjungere valerent: ea tamen parvi duco, quæ cum eximio opere comparata vix recenseri merentur; alterum enim superest majoris momenti dubium circa novum, quod ipse ostendit vasorum genus, quod mirifice difficiliora menstruationis phenomena explicat; id tamen minime lædit theoriam, aut praxim horum morborum qui una persistunt.

Si quis unquam *Astruci* sententiæ annuere contendat, duo priora Capitula demat, quæ ad uteri structuram tantum attinent, ceteraque amplectatur, quæ praxim potissimum respiciunt: nam sedulo perpendenti apparebit præter lactea vasa nihil prorsus asserre, quæ a celebrioribus anatomicis comprobata non sint.

Plexum itaque capillarium vasorum reticuli more ex pluribus anastomosibus conflatum uteri functiones satis declarant, tum horum vasorum extremitates ad venosam naturam accedere plerique recentiorum confirmant; appendices vero venarum, ut ipse ostendit, diverso nomine modo vilorum, modo foraminum, modo cruentium macularum plures indicant; vasa denique lactea ab Auctore detecta, quæ catameniorum periodum præsertim, & mammarum, cum utero affinitatem mirum in modum explanant, totidem glandulæ sunt speciali figura donatæ, ad illum lactinosum humorem secernendum a natura fabricatæ, quas negare nemo audebit, modo cadaverum sectionibus uterum non inquirat, eaque organa nunquam reperiri posse demonstret.

Quam ob rem cum id tentare adhuc nullus ausus sit, Auctori fidendum erit, eoque magis cum phenomenorum eorum explicationi nostra magnopere faveat sententia; de cetero vero quantum laudis in singulorum mulierum ægritudinum causis explanandis, signis enunciandis, efficacioribus remediis seligendis, omnibusque sedulo percontandis sibi promeritus sit, quæ praxim tutiorem, certioreque redunt, perlegenti facile innotabit, ut verborum lenociniis ipsum amplius extollere frustra-neum videatur.

Tu igitur, Vir Præstantissime, qui de Litteraria Republica tam bene meritus es, atque innumeris poles Scientiarum notionibus, ingenio, ac auctoritate dignum opus tui ne renuas deprecor, & quidquid hujus laboris mihi tribui poterit, qua soles humanitate libenter ferre, quod si mihi obtineri contingat, nihil optatius accidere posse arbitror, Vale.

*Datum Venetiis XVI. Kal. Decembris 1763.*

# P R Æ F A T I O .

**M**edicina in diem progreditur, at dum ipsa proficitur, ejusdem consecutio difficilior evadit. Olim ad artem cum laude exercendam sufficiebat præcipuos Hippocratis, & Galeni canones cognoscere; medicorum controversias conciliare; nomina, definitiones, atque causas morborum adparentes determinare; formulas nonnullas consuetudine vetustissima receptas, ab auctoribus depromptas memoria tenere; tandem audaciter occurrentibus difficultatibus, qualitatibus occultis adversari.

In præsentiarum ut medici nomen mereamur, uberiores, & difficiliore notions necessariæ evadunt; oportet enim humani corporis fabricam perscrutari; partium functiones, & mæcanicas leges quibus exequuntur addiscere; earum perscrutationes prospicere quæ morbos producant, tum minimas differentias, quæ morborum ultimas species faciunt; singularem sedem, indolem, & immediatam causam investigare, deinde prognosim atque indicationes sancire quibus mederi necessum erit; omnia indagare auxilia, quæ materia medica suppeditat simplicia, vel ex his composita, efficaciora seligere, quæ magis proposito scopo collineant, eaque, circumstantiis ratione habita, caute exhibere.

In earum notionum perquisitione caute incedendum erit, ne conjecturas aut hypoteses erroneas pro veritatibus admittamus, postquam enim veterum jugum exuimus nimis fortasse hanc methodum prosecuti sumus, ut medicina nunc fabulæ speciem referat, eamque nonnulli etiam contemnant: nihil enim proponere debemus, quod partium ægrotantium cognita structura non fulciatur, verum praxis obviis legibus communiter receptis, aut certis observationibus a celeberrimis medicis institutis non confirmetur, modo enim aliquam hypotesim amplecti conati sumus ad difficiliora problemata explicanda, quæ passim occurrunt animadvertendum erit eam conjecturæ more esse proponendam, quam sensim prosequemur, ut tandem rei veritas elucescat.

Si hujusmodi notions medicis omnibus potissimæ evadunt, qui laudabiliter medicam artem exercere cupiunt, eo magis ipsi indigent, qui artem docendi munere fungi sumunt, suosque labores publici juris facere malunt.

Huic duplici oneri satisfacere & ipse conor: pluribus enim ab hinc annis medicinæ scholas subsecutive Tolosæ, Montpelii, & Parisiis implevi, verum non pauca opera edidi, idcirco nemo negabit utrumque pensum persentire, quod absolvere usque adhuc sedulo fategi.

Mea

Mea itaque prima ætate anatomiz diligenter incubui, & necessarias tunc cognitiones adeptus sum, quæ ad medicinam tum addiscendam cum præcipiendam conducunt, diutina vero praxi plurâ didici, quæ passim in morborum pertractatione eveniunt, ( & sunt quotidiana occurrentis ) quæque potissimam medicinæ partem constituunt, tandem rariores historias sum perscrutatus quæ omnibus minime se offerunt ( non omnibus omnia ) pluresque medicos codices consului.

Vix credideritis quot pervolverim Auctores, quot inquisiverim observationes, quæ etiam si utiles evadant, nimis jam artem onerant, nonnullarum futilitatis ergo; etenim cum nihil sit recta observatione difficilior, nihil idcirco æquo censore rarius fuerit, nihilo tamen secius multi se jactant, at rudiores plerumque illas peragere conantur, ut animose erroneas audeant observationes publici juris facere.

Sane tot pervolvere libros me piguit, ut totidem Virgilium, Ennium perlegendo non tæduerit, at eo & ipse collineo utiliora in præsentiarum congerendo inter tot futilia, idque meam substitui patientiam.

Medicina ea cognitione deficit, qua magis eget, videlicet remedium indolem cognoscere, quæ pro singulis morbis proponuntur, si Scriptoribus materiæ medicæ fidendum esset, remedium quodque plures morbos compescere valent, verum dum experientias institui-mus, innotuit eorum pleraque nemini mederi.

Hujus medicinæ pars utilissima nunquam elucet nisi repetitæ observationes, & a doctis medicis ingenuisque institutæ, circa simplicia medicamenta, rem declaraverint; minime sperandum erit chli-nicos medicos id perficere posse: plerumque enim, qui praxi magis occupantur, vel minus idonei sunt, vel otio carent, nisi enim Regis auctoritate fulciamur, atque auspiciis incassum utiles observatio-nes digerere conabimur, celebrioribus medicis onus committendo, qui in nosocomiis sedulo effectus remedium perscrutentur.

Regis itaque nostri pro scientiarum augmento eximia sollicitudo ipsum excitavit, ut tum Zonam torridam cum glaciale versum Astro-nomos mitteret, qui latitudinis gradus dimetirentur, nuper duos alios designavit quorum alter ad Septentrionem, alter ad meridiem Veneris transitum eis discum solarem observarent, hujusmodi opera sane Regiæ munificentiz digna sunt, at perficiendæ medicinæ institutum virtutum remedium detegendarum subsectorum conservationi Augustæ Familiæ, & Sacræ ejusdem Personæ utilissimum, nondum ejusdem attentionem promeruit; sperare tamen licebit hujusmodi scrutinium cuidam jubere posse, modo ipsum excitemus.

Interim hac de causa, quod privati medici erat in præsentiarum vires omnes impendi remedia cuique morbo propria tutiora, & magis commendata attuli, tuta etiam, sed a Medicis nonnullis jactata indicavi, nonnulla etiam singularia, quæ Scriptores nonnullos proposuerunt non ad contemtionem, sed majorem rei claritatem censuravi.

Cum



Cum jamdiu perlegissem in Galliarum Collegio Tractatum quem hodie publici juris facio, operis ingenium quod mihi proposui plures exfugere potuerint. Neminem latet discipulorum volupias in edendis Præceptorum scriptis his etiam invitis, quod multiplici ratione in hoc Tractatu potissimum expertus sum.

Etenim anno 1740. D. Massentius hodie Doctor, & Præses Facultatis Parisiensis, olim medicinæ Tyro, mihi theses obtulit e meis Lectionibus excerptas ut de iis judicium proferrem, cui libenter annui. Hujusmodi theses in publicis Scholis defendit ineunte anno 1741. D. Aragonus, qui tunc Baccalaurus renuntiabatur, sub eo Titulo, *Utrum a mutuo sanguiferorum, lactiferorumque uteri vasorum nisu menstrua purgatio?* Postquam ostendit menstruationis leges, quales Lib. I. Cap. I. II. & III. reperiuntur, nostratem se præbet.

Paulo post medicus Anglus, quem nisi per litteras initiales I. R. -n recognovi, quibus insignitur initio sui libelli, iisdem lectionibus interfuit, multum ex his & condiscipulorum consuetudine lucratus est; in Angliam vero redux codicem horum morborum excussit anno 1743. Londini in 8. sub Titulo *A Treatise on all the diseases incident to Women*, quare ipso operis fastigio ipse satetur ea ex meis lectionibus decerpisse, quod amplius in Præfatione significat, ubi fat me laudibus extollit, quas utinam promeritus essem.

Hasce in medium protuli, ut pateret meas lectiones haud inutiles censerî. Remittite quæso hanc vanitatis speciem cum pro labore vix ultra adeptus sim; at hujusmodi aspersione blanditias, cum mihi proposuerim utilem tantum aliis evadere, eaque da causa studiis incubuerim ut ceteros instruere potissem, *aliquid discere ut docerem*, verum ut initio operis indicavi, quas acquisivi medicas notiones prorsus contemnerem nisi aliis communicarem, *quem nullares delectabit, licet eximia sit & salutaris, quam mihi uni sciturus sim.*

Hac ratione hoc pensum digessi publicæ utilitati consulens; nihil omisi nihilque simulavi, undique veritatem exposui, adversus singulos morbos tutiora, usitatorum remedia proposui, ea rejeci, quæ tutilia, aut superstitiosa mihi visa sunt, ac cum medicorum nonnullorum auctoritate fuffulta quædam reserere coactus sim, caute animadverti fallacias, quæ in iis reperiabantur.

Etsi innumeri circa muliebres morbos tractatus proflent; plerique tamen indigestam præferunt materiem, tum theoriæ, cum praxis ratione, nemo usque adhuc a priori uteri structura horum morborum theoriam desumpfit, vel a functionum hujus partis legibus. Ad praxim quod attinet sibi satis putant invicem sese exscribere, quare dum ab erronea praxi recedere tentarunt mentis imagines profectui maluerunt, in remediis præsertim seligendis nulla habita ratione indicationibus quas natura morbi præfert.

Hujusmodi errores cognovi iisque mederi satagi, quod theoriæ saltem respectu obtinuisse putavi, utinam ad praxim quod attinet idem

*Astruc de Morbis Mulier.*

\* \*

bene-

beneverisset, at ut alio enunciavi, materię medicę incertitudo, & specificorum remedium exiguitas, verum ambago circa ea, quę magis jactant, novas methodos curationis, tutioresque proponere impediunt; utinam si dum paupertatem, & incertitudinem hujus partis ostendo, ceteri medici circa id sentirent indigentias nostras, atque auxilium pro opere præstarent.

Nonnullas animadversiones pro coronide addam.

I. In præfatione *tractatus tumorum* usum contemno formularum, quę in medicis libris inferuntur; ideoque optimum consilium putavi eas ab hoc opere proscribere, ne ignari, aut pseudo-doctores illas citra ullam distinctionem ætatis, temperamenti, aut virium ægrotantium, perperam adhiherent.

II. Aquievi in simplicium remedium ostensione, quę varias impleant indicationes omnium morborum, & dosium enunciatione; dein methodos proposui componendi varias remedium formulas pro libitu, aut circumstantiarum ratione remedia seligendo.

III. Id patrandum admonui quam fieri possit ea simplicius subigere; interdum enim observavi medicos nonnullos plura remedia virtute opposita simul congerere, idcirco hujusmodi praxis præter ventriculi quę excitat incomoda, impedit quominus innotescat remedium effectus, quem prosequi debemus.

IV. Cum doses quas infra indicavi modicę sint, idcirco autumo eas tuto posse adultis mulieribus, modo delicatiores valde non sint, exhiberi, fortasse necessum fuerit illas augeri; at maluerim dosim intendere inefficacię remedii ergo, quam imminuere pro nimia ejusdem activitate.

V. Cupiditas, qua gaudeo utilitatem omnibus afferre, me cogit hujusmodi tractatum Patria lingua edere, ut undique receptus esset; id tamen me valde angebat, cum de obscenis rebus pertractare coactus essem, sed minus propudiosa verba adhibui, hoc tamen auxilium minime in *furoris uterini* sat erat; ubi turpibus verbis huic morbo propriis uti coactus fui, quare in hoc capitulo tantum latinam linguam admisi.

VI. Ad hujusmodi operis calcem tandem Catalogum Cronologicum Auctorum exposui qui de morbis mulierum scripserunt, primum ut edocerentur juvenes medici de hujusmodi artis vetustate, ac de celebrioribus viris, qui subsequente eam dilatarunt: secundum ut animadverterent hujusmodi scientiam quam nonnulli inconsistentem vocarunt eadem continenter fundamenta servasse, etsi vanitas, incontinentia, consuetudo &c eam deturpare tentaverint.

VII. Hujusmodi opus patet incompletum esse; deest enim postremus liber de gestatione, & qui eam consequuntur morbis, ad quem lectores pluries mitto, spero brevi ipsum publici juris facere, & postremam constituerit hujus operis partem, quę separatim prostabat.

# INDEX CAPITUM.

24

LIBER I. <span style="font-size: 1.5em; color: blue;">D</span> E Morbis Mulierum ex menstruatione.	Pag. x
Caput I. <i>De uteri structura, appendicibus venosis, &amp; vasis vermicularibus.</i>	ibid.
§. I. <i>Descriptio uteri generalior.</i>	ibid.
II. <i>Uteri specialis sanguineorum vasorum descriptio.</i>	3
III. <i>Descriptio vasorum lacteorum, seu vermicularium uteri.</i>	3
Caput II. <i>De mēstruorum profluvio, sive de Catamenis.</i>	5
§. I. <i>Descriptio.</i>	ibid.
II. <i>Causa.</i>	6
III. <i>Consecutiones.</i>	18
IV. <i>Explicatio eorum, quae catamenia respiciunt.</i>	12
V. <i>Symptomata explicantur mēstruis obvia.</i>	15
VI. <i>Ufus catameniorum.</i>	16
Caput III. <i>Prima catameniorum eruptio, &amp; antecedentium aut concomitantium symptomatum.</i>	18
§. I. <i>Descriptio.</i>	ibid.
<i>Eruptionis gradus primus.</i>	ibid.
<i>gradus secundus.</i>	19
<i>gradus tertius.</i>	ibid.
<i>gradus quartus.</i>	20
<i>gradus quintus.</i>	21
<i>gradus complicatus.</i>	ibid.
II. <i>Diagnos.</i>	22
III. <i>Prognosis.</i>	ibid.
IV. <i>Curatio.</i>	23
<i>Remedia astatica primam sanguinis eruptionem promoventia.</i>	26
Caput IV. <i>Catamenia suppressa, aut imminuta.</i>	ibid.
§. I. <i>Descriptio.</i>	ibid.
II. <i>Causa.</i>	27
III. <i>Differentiae.</i>	29
IV. <i>Symptomata.</i>	30
V. <i>Diagnos.</i>	31
VI. <i>Prognosis.</i>	34
VII. <i>Curatio.</i>	35
<i>De repentina suppressione mēstruis adhuc fluentibus.</i>	ibid.
<i>De suppressione, quae persistens mēstruis sensim eorum impl-</i> <i>cat regressum.</i>	36
<i>Cautela in suppressionibus medendis necessarissime.</i>	44
<i>Inocua medicamenta in suppressionibus valde commendata.</i>	45
<i>Remedia minus tuta in suppressionibus evocandis usitata.</i>	48
Caput V. <i>De mēstruis suppressis organi visio.</i>	50
§. I. <i>Descriptio.</i>	ibid.
II. <i>Causa.</i>	51
* * *	III. Dif-

III.	<i>Differentia.</i>	54
IV.	<i>Symptomata.</i>	55
V.	<i>Diagnofis.</i>	56
VI.	<i>Prognofis.</i>	57
VII.	<i>Curatio.</i>	ibid.
	<i>Circa eas operationes neceffaria cautella.</i>	59
Caput VI.	<i>De difficili menftruatione, &amp; laboriofa.</i>	61
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
II.	<i>Caufa.</i>	ibid.
III.	<i>Differentia.</i>	62
IV.	<i>Symptomata.</i>	62
V.	<i>Diagnofis.</i>	ibid.
VI.	<i>Prognofis.</i>	64
VII.	<i>Curatio.</i>	65
	<i>Cautella.</i>	ibid.
Caput VII.	<i>De menftris alio devolutis.</i>	66
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
II.	<i>Caufa.</i>	67
III.	<i>Symptomata.</i>	68
IV.	<i>Diagnofis.</i>	69
V.	<i>Prognofis.</i>	ibid.
VI.	<i>Curatio.</i>	70
Caput VIII.	<i>Chlorofis feu ( les Pales Couleurs ).</i>	71
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
II.	<i>Caufa.</i>	73
III.	<i>Symptomata.</i>	76
IV.	<i>Diagnofis.</i>	79
V.	<i>Prognofis.</i>	ibid.
VI.	<i>Curatio.</i>	80
Caput IX.	<i>De menfibus nimis, atque uteri hemorrhagia.</i>	85
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
II.	<i>Caufa, qua menfes nimios producant.</i>	87
III.	<i>Caufa, qua uteri hemorrhagiam inducant.</i>	88
IV.	<i>Differentia.</i>	90
V.	<i>Symptomata.</i>	91
VI.	<i>Diagnofis.</i>	91
VII.	<i>Prognofis.</i>	94
VIII.	<i>Curatio.</i>	95
	<i>Cafus primus de aberrimacruentis jaftura, feu uteri hemorrhagia.</i>	96
	<i>Cafus fecundus de modica fanguinis jaftura, feu cruento ftillidicio.</i>	100
	<i>Methodus praeveniendi hemorrhagia regressus.</i>	106
	<i>Cautella-neceffaria circa hujus morbi medellam.</i>	107
	<i>Remedia in uteri hemorrhagiis commendata: quibus utiliter, vel faltem innocue uti potefl.</i>	108
	<i>Remedia adverfus eundem morbum pariter commendata, funilia tamen, vel fufpecta.</i>	111

Caput X.	<i>Fluor Albus.</i>	113
§. I.	<i>Descriptio, &amp; Differentia.</i>	ibid.
II.	<i>Causa fluoris albi generaliores.</i>	114
	<i>Causa fluoris albi laticinosi.</i>	ibid.
	<i>Causa fluoris albi lymphatici.</i>	116
III.	<i>Explicatio differentiarum albi fluoris.</i>	117
IV.	<i>Symptomata.</i>	118
V.	<i>Diagnos.</i>	120
VI.	<i>Prognosis.</i>	124
VII.	<i>Curatio.</i>	125
	<i>Curatio fluoris albi lactei.</i>	ibid.
	<i>Curatio fluoris albi lymphatici.</i>	129
	<i>Curatio eorumdem palliativa.</i>	132
	<i>Cauteilla necessaria circa fluoris albi medellam.</i>	133
	<i>Remedia in hoc morbo commendata quibus sive in quibusdam saltem circumstantiis uti potest.</i>	134
	<i>Remedia adversus album fluorem proposita, nocua tamen, vel suspecta.</i>	135
Caput XI.	<i>De cessatione mēstruorum, &amp; fenomenis, quae ab ea procedunt.</i>	139
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
II.	<i>Causae, &amp; symptomata.</i>	140
	<i>Primus in hoc morbo uteri status.</i>	ibid.
	<i>Status alter.</i>	141
	<i>Tertius status.</i>	142
	<i>Status postremus.</i>	ibid.
	<i>Status uteri compositus.</i>	143
III.	<i>Diagnos.</i>	ibid.
IV.	<i>Prognosis.</i>	145
V.	<i>Curatio.</i>	146
	<i>Cauteilla necessaria in mulieribus pertractandis, quae menstruationem tandem amittunt.</i>	147
Caput XII.	<i>De Menopausa seu Futore uterino.</i>	148
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
II.	<i>Causa.</i>	150
III.	<i>Differentia.</i>	154
IV.	<i>Symptomata.</i>	155
V.	<i>Diagnos.</i>	156
VI.	<i>Prognosis.</i>	157
VII.	<i>Curatio.</i>	158
VIII.	<i>Remedia quaedam, quae adversus Futorem uterinum commendantur.</i>	163

LIBER II.	DE morbis, qui a diversa uteri conditione dependent.	167
Caput I.	De uteri inflammatione.	ibid.
§. I.	Descriptio, & Differentia.	ibid.
II.	Causæ.	168
III.	Differentiarum explicatio.	170
IV.	Symptomata.	171
V.	Diagnosis.	173
VI.	Prognosis.	174
VII.	Curatio.	176
	Cautellæ generales, quæ hujus inflammationis medellam respiciunt.	177
	Praxis a nonnullis Auctoribus proposita, infirma tamen, vel suspecta.	179
Caput II.	De Gangrena, seu uteri sphacelo.	181
§. I.	Descriptio, & Differentia.	ibid.
II.	Causæ.	182
III.	Differentiarum explicatio.	183
IV.	Symptomata.	184
V.	Diagnosis.	186
VI.	Prognosis.	187
VII.	Curatio.	ibid.
	Remedia proposita adversus uteri Gangrenam, quibus tute uti potest.	190
Caput III.	De Apoplemate, seu uteri abcessu.	192
§. I.	Descriptio, & Differentia.	ibid.
II.	Causæ.	193
III.	Symptomata.	196
IV.	Diagnosis.	197
V.	Prognosis.	ibid.
VI.	Curatio.	198
Caput IV.	De uteri Ulcere.	199
§. I.	Descriptio.	ibid.
II.	Causæ.	200
III.	Differentia.	ibid.
IV.	Symptomata.	201
V.	Diagnosis.	203
VI.	Prognosis.	204
VII.	Curatio.	205
	Medendi ratio, & remedia generaliora circa omnes uteri ulcerum species.	ibid.
	Methodus idonea instantibus ulceribus, quæ prænunciant continentes, aut crebri uteri dolores, vel anomalum cruoris, aut albi fluoris effluviū.	207
	Tutior methodus & efficacior adversus uteri ulcus confirmatum, sed simplex.	ibid.
	Methodus.	

	<i>Methodus curandi ulcera uteri Venerea.</i>	209
	<i>Curatio palliativa ulcerum uteri incurabilium.</i>	210
	<i>Remedia nonnulla proposita adversus uteri ulcera.</i>	211
Caput V.	<i>De uteri Syrrho.</i>	212
§. I.	<i>Descriptio, &amp; Differentia.</i>	ibid.
II.	<i>Causæ.</i>	212
III.	<i>Differentiarum explicatio.</i>	214
IV.	<i>Symptomata.</i>	215
V.	<i>Diagnos.</i>	216
VI.	<i>Prognosis.</i>	ibid.
VII.	<i>Curatio.</i>	217
	<i>Methodus curativa.</i>	ibid.
	<i>Methodus palliativa.</i>	220
	<i>Regimen, cui studere oportet, ne syrrhus in cancerum degeneret.</i>	221
	<i>Remedia specifica, adversus uteri syrrhum.</i>	ibid.
Caput VI.	<i>De pseudo-Syrrho, seu Steatmate, &amp; Sarcomate uteri.</i>	222
Art. I.	<i>De Steatmate, &amp; Tumoribus uteri membrana inclusis, seu cysticis.</i>	ibid.
§. I.	<i>Descriptio, &amp; Differentia.</i>	ibid.
II.	<i>Causæ.</i>	223
III.	<i>Symptomata.</i>	224
IV.	<i>Diagnos.</i>	ibid.
V.	<i>Prognosis.</i>	225
VI.	<i>Curatio.</i>	ibid.
Art. II.	<i>De uteri Sarcomate.</i>	226
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
II.	<i>Causæ.</i>	227
III.	<i>Symptomata.</i>	ibid.
IV.	<i>Diagnos.</i>	228
V.	<i>Prognosis.</i>	229
VI.	<i>Curatio.</i>	ibid.
Caput VII.	<i>De uteri Cancro.</i>	230
§. I.	<i>Descriptio.</i>	ibid.
II.	<i>Differentia.</i>	231
III.	<i>Causæ.</i>	ibid.
IV.	<i>Symptomata.</i>	232
V.	<i>Diagnos.</i>	233
VI.	<i>Prognosis.</i>	ibid.
VII.	<i>Curatio.</i>	234
	<i>Remedia proposita adversus uteri Cancrum.</i>	236
Caput VIII.	<i>De uteri Hydropæ.</i>	240
§. I.	<i>Descriptio, &amp; Differentia.</i>	ibid.
II.	<i>Causæ Hydropis cum ascite.</i>	ibid.
III.	<i>Causæ Hydropis cum hydatidibus.</i>	242
IV.	<i>Symptomata.</i>	244
V.	<i>Diagnos.</i>	ibid.
VI.	<i>Prognosis.</i>	245

VII.	<u>Curatio.</u>	ibid.
Caput IX.	<u>De uteri Tympanitide.</u>	249
§. I.	<u>Descriptio.</u>	ibid.
Art. I.	<u>De Tympanitide vera, seu continenti.</u>	250
§. I.	<u>Causa.</u>	ibid.
II.	<u>Symptomata.</u>	251
III.	<u>Diagnos.</u>	252
IV.	<u>Prognosis.</u>	ibid.
V.	<u>Curatio.</u>	253
Art. II.	<u>De Tympanitide vaga.</u>	254
§. I.	<u>Causa.</u>	ibid.
II.	<u>Diagnos, Prognosis, &amp; Curatio.</u>	ibid.
Art. III.	<u>De uteri expansione parietum augmenti.</u>	255
Caput X.	<u>De uteri descensu.</u>	256
§. I.	<u>Descriptio, &amp; Differentia.</u>	ibid.
II.	<u>Causa.</u>	ibid.
III.	<u>Symptomata.</u>	258
IV.	<u>Diagnos.</u>	259
V.	<u>Prognosis.</u>	ibid.
VI.	<u>Curatio.</u>	260
Caput XI.	<u>De morbis, qui uteri descensum respiciunt.</u>	262
Art. I.	<u>De Sarcomate, aut carnea vaginæ excrescentia, ac de productione, aut prolapsu partis alicujus intimæ vaginæ membranæ.</u>	ibid.
§. I.	<u>Descriptio descensus Vaginæ.</u>	264
II.	<u>Causa.</u>	ibid.
III.	<u>Symptomata.</u>	265
IV.	<u>Diagnos.</u>	ibid.
V.	<u>Prognosis.</u>	266
VI.	<u>Curatio.</u>	ibid.
Art. II.	<u>De uteri obversione in eo prolapsus flatus.</u>	268
Caput XII.	<u>De morbis Ovaria, &amp; Tubas afficientibus.</u>	ibid.
Art. I.	<u>De morbis qui ad Ovaria pertinent.</u>	ibid.
§. I.	<u>Describuntur Ovaria, eorumque morbi.</u>	ibid.
II.	<u>Causa.</u>	270
III.	<u>Symptomata.</u>	271
IV.	<u>Diagnos, &amp; Prognosis.</u>	272
V.	<u>Curatio.</u>	ibid.
Art. II.	<u>De morbis Tubas afficientibus.</u>	273
§. I.	<u>Describuntur Tuba earumque morbi.</u>	ibid.
II.	<u>Causa.</u>	274
III.	<u>Diagnos, &amp; Prognosis.</u>	275
IV.	<u>Curatio.</u>	ibid.
Caput XIII.	<u>De passione hysterica, seu uteri suffocatione.</u>	276
§. I.	<u>Descriptio.</u>	ibid.
II.	<u>Causa.</u>	277
III.	<u>Symptomata.</u>	282



# C A P I T U M.

<i>Quatuor Symptomata pathognomonica.</i>	xvii
<i>Symptomata, quæ abdomen respiciunt.</i>	ibid.
<i>quæ thoracem aggrediuntur.</i>	282
<i>quæ caput afficiunt.</i>	283
<i>quæ totum corpus.</i>	ibid.
<u>IV. <i>Diagnosis.</i></u>	285
<u>V. <i>Prognosis.</i></u>	288
<u>VI. <i>Curatio.</i></u>	ibid.
<i>Melendi ratio intra paroxysmum.</i>	289
<i>extra paroxysmum.</i>	292
<i>Remedia specifica, quæ adversus hystericos vapores à nonnullis commendantur.</i>	294



# C A T A L O G U S

## C H R O N O L O G I C U S

*Auctorum, qui de Morbis Mulierum scripserunt.*

### E P O C H A P R I M A.

			Ann. ant. C. N.	Pag.
	Hippocrates	Cous	412	300
	Aesclepiades	Bithynus	96	ibid.
			Ann. a C. N.	
<u>Aurelius Cornelius</u>	<u>Celsus</u>	<u>Romanus</u>	35	308
<u>Claudius</u>	<u>Galenus</u>	<u>Pergamenus</u>	209	ibid.
	<u>Soranus</u>	<u>Ephesus</u>	250	302
	<u>Ancreus</u>	<u>Cappadocus</u>	350	ibid.
	<u>Oribasius</u>	<u>Sardus</u>	363	303
	<u>Actius</u>	<u>Mesopotamus</u>	380	304
	<u>Paulus</u>	<u>Eginetta</u>	420	ibid.
	<u>Moschionus</u>		500	ibid.
	<u>Cleopatra</u>	<u>Egyptia Reg.</u>	800	305
<u>Theodorus</u>	<u>Priscianus</u>	<u>Latinus</u>	800	ibid.
	<u>Nonus</u>	<u>Grajus</u>	915	ibid.

### E P O C H A S E C U N D A.

	<u>Avicenna</u>	<u>Mabumetanus</u>	1000	310
<u>Johannes</u>	<u>Serapionus</u>	<u>Arabus</u>	1060	311
<u>Haly</u>	<u>Abbas</u>		1066	ibid.
<u>Abubeter</u>	<u>Rhazes</u>	<u>Arabus</u>	1070	ibid.
	<u>Constantinus</u>	<u>Cartagenus</u>	1070	ibid.
	<u>Albucaſis</u>	<u>Mabumetan.</u>	1085	312
	<u>Avenzoar</u>	<u>Vandal, natuſ</u>	1100	ibid.
	<u>Averroes</u>	<u>Mabumetan.</u>	1170	313
<u>Nicolaus</u>	<u>Bernartius</u>	<u>Bononiensis</u>	1250	ibid.
	<u>Trotula</u>	<u>Salernitana</u>	1250	ibid.
<u>Enricus</u>		<u>De Saxonia</u>	1290	314
<u>Bernardus</u>	<u>Gordonius</u>	<u>Montepellulan.</u>	1305	ibid.
<u>Johannes</u>	<u>Placcarius</u>	<u>Salernitan.</u>	1350	ibid.
<u>Valeſcius</u>	<u>de Taranta</u>	<u>Lufitanus</u>	1418	315
<u>Marcus</u>	<u>Gatinaria</u>	<u>Papiensis</u>	1440	ibid.
<u>Antonius</u>	<u>Guainerius</u>	<u>Papiensis</u>	1440	ibid.

Anto-

Antonius	Ceramefonus	<i>Patavinus</i>	Ann. C. N.	1456	316
Johannes Michaelis	Savannarola	<i>Patavinus</i>		1486	ibid.
Galleatius	de S. Sophia	<i>Patavinus</i>		1490	ibid.
Alexander	Benedictus	<i>Veronensis</i>		1500	ibid.

## EPOCHA TERTIA.

Leonellus	de Victoriis	<i>Faventinus</i>	1525	328
Jafon	Pratenfis	<i>Zelandus</i>	1530	ibid.
Ludovicus	Bonacciolus	<i>Florentinus</i>	1536	ibid.
Dionysius	Fontanonus	<i>Montepellulan.</i>	1540	322
Nicolaus	Rocheus	<i>Gallus</i>	1540	ibid.
Leonhardus	Fuchfius	<i>Rhacus</i>	1548	ibid.
Jacobus	Rueff	<i>Tigurinus</i>	1554	323
Jacobus	De la Boe	<i>Sylvius Ambianus</i>	1554	ibid.
Johannes	Fernelius	<i>Clarimontanus</i>	1554	ibid.
Baldwinus	Ronfius	<i>Gandervensis</i>	1555	324
Johannes Baptista	Montanus	<i>Veronensis</i>	1555	ibid.
Petrus	Bayro	<i>Taurinensis</i>	1558	ibid.
Victorinus	Trincavellius	<i>Venetus</i>	1560	ibid.
Gulielmus	Rondeletius	<i>Montepellulan.</i>	1560	325
Thadæus	Dunus	<i>Loquarnensis</i>	1565	ibid.
Johannes	V Vier	<i>Gravienfis</i>	1565	ibid.
Johannes	Guntherius	<i>Andernachus</i>	1570	326
Giovanni	Marinello	<i>Veneto</i>	1574	ibid.
Ambrosius	Parzus	<i>Leccallensis apud Canonanos</i>	1575	ibid.
Johannes	Le Bon	<i>Metropolitanus</i>	1577	ibid.
Ludovicus	Mercatus	<i>Vallisoletanus</i>	1580	327
Johannes	Liebaut	<i>Droihenfis in Sequana</i>	1582	ibid.
Hieronymus	Mercurialis	<i>Forolrovenfis</i>	1582	ibid.
Martinus	Akakia	<i>Parifienfis</i>	1583	ibid.
Felix	Platerus	<i>Rauracus</i>	1583	ibid.
Mauritius	Cordæus	<i>Remus</i>	1584	328
Albertus	Botonus	<i>Patavinus</i>	1585	ibid.
Gafpar	V Volphius	<i>Tigurinus</i>	1586	ibid.
Hieronymus	Capivacius	<i>Patavinus</i>	1586	329
Petrus	Foreftius	<i>Alchemarianus</i>	1590	330
Johannis Georgius	Schenckius	<i>Friburgenfis</i>	1590	ibid.
Alexander	Maffarias	<i>Viceminus</i>	1595	ibid.
Israel	Spachius	<i>Argentinus</i>	1597	331
Gulielmus	Baillonius	<i>Parifinus</i>	1600	ibid.
Rodricus	A Caftro	<i>Lufitanus</i>	1603	332
Hercules	Saxonia	<i>Patavinus</i>	1603	ibid.
Emilius	Campolongus	<i>Patavinus</i>	1604	ibid.
Johannes	Hucher	<i>Bellovacus</i>	1606	ibid.
Johannes	Varandus	<i>Nemaucienfis.</i>	1606	333
Johannes	Heurnius	<i>Ultrajectenfis</i>	1607	ibid.
Lazarus	Pé	<i>Gallus</i>	1609	ibid.
Hermanus	Corbeus	<i>Francfortinus</i>	1620	ibid.

Gre-

			Ann. & C. N.	Pag.
Gregorius	Horstius	<i>Tergovienſis</i>	1625	334
Melchior	Sebizius	<i>Argentinus</i>	1627	ibid.
Franciſcus	Ranchin	<i>Monſpeſſulan.</i>	1627	ibid.
Johannis	Prevostus	<i>Rauracus</i>	1629	335
Michael	Doringius	<i>Uraſilavienſis</i>	1630	ibid.
Claudius	Deodatus		1630	ibid.
Gulielmus	Fabritius	<i>Hildanus</i>	1630	ibid.
Daniel	Senertus	<i>Uraſilavienſ.</i>	1631	ibid.
Zacutus		<i>Luſtranus</i>	1640	336
Nicolaus	Fontanus	<i>Amſtedamenſis</i>	1640	ibid.
Lazarus	Riverius	<i>Monſpeſſulan.</i>	1640	ibid.

## EPOCH A Q U A R T A.

Jacobus	Primerofius	<i>Burdegalenſis</i>	1650	345
Petrus Michael	de Heredia	<i>Comſatumanus</i>	1660	ibid.
Antonius	Meniotus	<i>Parifeñſis</i>	1657	346
Franciſcus	de le Boe	<i>Sylvius Hanovenienſis</i>	1667	ibid.
Thomas	Villifiſus	<i>Anglus</i>	1667	ibid.
Nathanael	Highmorus	<i>Oxonienſis</i>	1670	347
Marius	Mcudrach.	<i>Alemanus</i>	1676	ibid.
Henricus	Celarius	<i>Helberſtandienſis</i>	1677	ibid.
Paulus	Sorbeus	<i>Hiſpano-Belga</i>	1678	ibid.
Philippus Georgius	Grulingius	<i>Germanus</i>	1680	348
Michael	Ettemulerus	<i>Lyſſienſis</i>	1682	ibid.
Thomas	Syndenhamius	<i>Anglus</i>	1682	ibid.
Johannes	Garmerus	<i>Hamburgienſis</i>	1684	349
Johannes	Doleus	<i>Haſſianus de Geiſmar</i>	1684	ibid.
Nathanael	Sprye		1685	ibid.
Gualtierus	Charleton	<i>Londinenſis</i>	1686	ibid.
Johannes Nicolaus	Pfiſer	<i>Germanus.</i>	1691	350
Johannes Georgius	Sommers	<i>Germus</i>	1691	ibid.
Franciſcus	Mauriceaus	<i>Parifeñſis</i>	1694	ibid.
Bernardus	Connor	<i>Anglus, vel Hibernus</i>	1695	ibid.
Philippus	Fravendorffer	<i>Auſtriacus</i>	1696	351
Chriſtophorus	Hellyvigs	<i>de Konigſvviſſen</i>	1700	ibid.
Chriſtianus Johannes	Langius	<i>Pegavienſis</i>	1700	ibid.
Johannes	Freind	<i>Londinenſis</i>	1703	ibid.
Johannes	Santorinus	<i>Venetus</i>	1705	ibid.
Hermanus	Boerhaavius	<i>Vianenſis</i>	1708	352
Joannis Gabriel	Rudolphus	<i>Battavus</i>	1708	ibid.
Petrus	Frefart	<i>Leodienſis</i>	1712	ibid.
	Anonymus		1715	ibid.
Johannes Antonius	Terenzoni	<i>Piſanus</i>	1715	353
Johannes	Goldhammers		1717	ibid.
Gaſpar	Schoters		1721	ibid.
Henricus	Von Sanden		1722	ibid.
Georgius Erneſtus	Stallius	<i>Hallenſis Battavus</i>	1724	ibid.
	Le Tellier	<i>ſilius Parifeñſis</i>	1730	354

Anto-

# INDEX CRONOLOGICUS.

xxi

			Ann. a C. N.	Pag.
Antonius Celestinus	Cocchius	<i>Romanus</i>	1730	ibid.
Johannes Augustus	Ochemens		1734	ibid.
Georgius Philippus	Nenterus *	<i>Argentinus</i>	1735	ibid.
Fridericus	Hofmanus	<i>Hallenfis Borruſſus</i>	1740	355
J.	R — n	<i>Londinenſis</i>	1743	356
Ricardus	Mead	<i>Londinenſis</i>	1751	ibid.
Jacobus	Lazeme	<i>Monſpeſſulan.</i>	1753	ibid.
Gerardus	Fitz-Gerald	<i>Monſpeſſulan. origine Hibernus.</i>	1758	357



# I C O N E S

Explicantur quæ internam uteri faciem ostendunt.

**I** Psa ex utero fuerunt efficta mulieris nono gestationis mense disiecta, quando vasa tam vermicularia cum lactea valde conspicua erant; verum ut sensibiliores fierent ipsas bis majores delineare curarunt quam in cadavere reperierunt.

Animadvertendum tamen est intimam uteri tunicam hic translucidam putari ut subtilius positis vermicularia videri queant ex ea parte qua musculari tunica adhaerent; alias Icones duplicari necessum esset.

## F I G U R A I.

Vasa nonnulla repræsentat arteriosa, & venosa per internam uteri faciem pereptantia quæ in menstruationis negotio maximam partem habent.

**A** Truncus arterie cum adnexis vasis capillaribus qua postquam ( cis lineam, G F ) miris circumvolutionibus per uteri substantiam pereptarunt, anastomosum ope pluribus lateralibus, & intermediis ramis cum venosis capillaribus intertexuntur ramificationibus ( trans lineam F G indicatis ) qua tandem in communem consueunt.

**B** Truncum venosum.

**C** Rotunda foraminula in concursu earum ramificationum locata ubi originem habent appendices venosa quas infra explicabimus.

**D** Appendices venosa, seu extremitates utriusque generis simul confluentium capillarum vasorum citra fluxum ex illa tantum parte reclusa qua parentem truncum respicit, ex opposita vero impervia; ea tamen producuntur, & ex utraque parte patula fiunt ut perfusa intimiori uteri tunica in ejusdem cavitatem catamenia effundant.

**E** Vasa lactea, seu vermicularia uteri ( infra explicanda ) qua genitores appendicum ramos amplectuntur ipsosque fluentem sanguine constringunt, ut fufius Lib. I. Cap. I. II. & III. ostendemus.

## F I G U R A II.

Vas illud ostendit lacteum ( glandulam dicerem fimbriatam ) ad lac uterinum secernendam a natura tabrefactam.

**A** Vesicula, seu melius pelvis, est exigua qua a novem, aut decem vermicularibus vasculis, ter, quaterve lineas oblongis lacteicosum humo-



NOI

Vas illud  
lac uterinum fecernendam a natura fabricatam.

*A Vesicula, seu melius pelvis, est exigua quæ a novem, aut decem vermicularibus vasculis, ter, quaterve lineas oblongis lactificosum humo-*



humorem recipit, quemque menstrui tempore exuberantem per excretorium ductum in uterum effundit.

**B** *Vasa vermicularia qua in pelvim nuperrime indicatam laticinosum ab ipsis liquorem secretum debebunt.*

**C** *Vasa capillaria lymphatica qua ab illa pelvi liquidiorum laticis partem hauriunt, eamque amplioribus afferunt lymphaticis.*

### FIGURA III.

Lacteum pariter vas repræsentat a præcedenti haud ablimile cujus vermicularia ut in statu naturali magis implexa conspiciuntur.

### FIGURA IV.

Portionem effingit intimioris uteri tunicæ quæ superius expositam vasorum compagem cooperit in qua patent.

**A** *Appendices venosæ quales circa finem gestationis apparent, quæ tamen catameniis fluentibus exiguiore sunt, & citra menses vix conspiciuntur, ut*

**B** *Minima foraminula amulentur.*



# NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova

**A** Vendo veduto per la fede di Revisione, ed Approvazione del P. Fr. Filippo Rosa Lanzi Inquisitor General del Santo Officio di Venezia, nel Libro intitolato manoscritto *Traſſatus de Morbis Mulierum*, in quo solida Theoria praxi certiori & experientiis comprobata compleſſitur: accedit Catalogus Cronologicus Medicorum, quorum &c. Autore Joanne Astruc, Prof. Reg. &c. Gallico Sermone conscriptus, nunc Latino versus, non v'esser cos' alcuna contra la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a Niccolò Pezzana, che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 30. Maggio 1763.

{ Sebastian Zuſtinian Refor.

{ Polo Renier Refor.

{ Alvise Valareſſo Refor.

Registrato in Libro a Carte 167. al Num. 890.

*Davidde Marchesini Segr.*

T R A -



T R A C T A T U S  
D E  
M O R B I S M U L I E R U M :  
L I B E R P R I M U S

*De morbis Mulierum, ex menstruatione*

C A P U T P R I M U M

De uteri structura, appendicibus venosis, & vasis vermicularibus.

§. I.

*Descriptio uteri generalior.*



Uteriorem, atque completam uteri descriptionem exhibendi, neque locus hic est, nec instituti postulat ratio. Hinc quæ de situ ejusdem; quæ de figura, mole, partibus, appendicibus, & aperturis; quæ de vasis sanguineis, aut lymphaticis; quæ de nervis tandem, & tunicis Anatomici detexerunt, satis lectoribus, siue cadaverum inspectione, siue librorum evolutione, perspecta ponimus. Neminem, itaque, latere censebimus.

1. Uterum vesica, & intestino recto interjacentem pelvi contineri, ima videlicet hypogastrici parte, quam ossa innominata, & sacrum componunt, cujus marginem, sextum genus, uterus tantum superat.

2. Figura pyrum referre apice obverso in virginibus non nihil introrsum depressum, in Mulieribus pene sphericum nondum utero gestantibus.

3. Uteri latitudinem a dextera ad sinistram partem duplici circiter pollice absolvi; crassitiem ab antica ad posticam uno; longitudinem a summa, ad imam tribus, in iis quæ nunquam, paulo magis in iis, quæ pepererunt.

4. Uterum virginæum, vel adultum vix amygdalum capere, citra gestationis tempus, quo unum vel duo sæpe foetus recipit.

5. Distingui utero partem supremam interne ad lumbos inclinatam, quæ latior est, & fundus appellatur; tum inferiorem, anterioremque pubi propinquam, quæ arctior collum audit.

*Astruc de Morbis Mulierum.*

A

6. Utc-

6. Uteri collum, quem tegit peritonæum ejus processu, vesicæ, & ossi pubis antèrius necti; intus recto intestito, & ossi sacro; ad latera cum ileis conjungi. 7. Funium utrinque firmare quatuor ligamenta, quorum bina, e peritonæi appendicibus producta, *ligamenta lata*, seu *aliformia* solent appellari; hæc a posteriori uteri parte originem habent, nectunt ovaria, sustinentque tubas; cætera bina *ligamenta rotunda*, seu *teretia* dicta ex uteri lateribus, circa originem tubarum oriuntur, & peritonæo obiecta per annulos musculorum abdominis transeunt, & ossibus pubis extrinsecus inferuntur.

8. Uteri collum in propinqua vaginæ cavitate proculdi, canis catelli rostrum effingens rima instructum, cum vagina communicanti, quam *uteri orificium* dicunt.

9. Fundum ex utraque parte tubarum extremis perfodi, quæ, in ejus cavitate patula, usibus infra enunciandis inserviunt.

10. Uteri diversis partibus arteriosas, & venosas ramificationes præbere, & recipere vasa spermatica, hyfogastrica, & hæmorrhoidalia.

11. Vasorum lymphaticorum magnam copiam egredi ex utero, quæ in conglobatis inferuntur glandulis ad aortæ descendens bifurcationem sitis, a quibus lymphæ in glandulas, meseraicas transducitur, ac tandem in Piquetianam cisternam evehitur, ut lymphæ mos est.

12. Nervos accipere plurimos ab intercostalibus, & paribus spinæ, circa lumbos, & foramina ossi sacri prodeuntibus.

13. Tandem uterum triplici tunica consilari, quarum externam producit peritonæum, quod fundum, & latera uteri foris operit, at in se reversum cum partibus vicinis ejusdem adhæssiones constituit; secunda carnea, & muscularis est fibris plurimis circularibus spirales, longitudinalibus, transversis, & obliquis invicem interfecantibus, quæ potissimum uteri crassitudinem faciunt; tertia omnium subtilissima, carnosa, sive potius tendinea scabra est, ex ea parte, quæ carne adhæret; altera vero facie æqualis est, & levigata, ea parte excepta, quæ orificium induit, ubi anfractus oblique transversi apparent, in quibus hydatides, seu vesiculas sphericas lymphæ saturas reperies, quas *Martinus Naboth* Medicus Lypsiensis pro ovulis fœtui fovendo perperam habuit.

## §. II.

### *Uteri specialis sanguineorum vasorum descriptio.*

**H**is explicitis reliqua sunt duo magni ponderis, adhuc ignota nunc specialiter perpendenda: *primum* ad conformationem attinet, & distributionem vasorum sanguineorum, quæ inter mediam, & intimam uteri tunicam repunt; *alterum* ad structuram pertinet vasorum quorundam peculiaris generis, quæ inter easdem tunicas reperiuntur, ibidemque ductuum funguntur officio, & naturam humoris secernendi ostendit.

Uteri vasa arteriosa illum pereptando in plures ramos divisa, & subdivisa tantum augentur numero, & minuuntur diametro, ut tandem capillarium indolem assument, quæ undique serpendo per varias uteri tunicas multiplici methodo flectunt, deflestantque viam, majori tamen copia, & implicatori con-textu per carnosam, & nerveam reptant tunicas.

Hujusmodi arteriosæ ramificationes multiplici subdivisione pene oculos effugiunt, at sedulo perspectis, injectionis præsertim ope, observaveris, quamvis in novos canaliculos desinere cavi, cylindraceos, quorum structura æqualis, nonnihil amplior tamen, & patentior est ad instar priorum vasorum seu uteri venarum capillarium divisionem.

Postiores hæc ramificationes, eo magis, atque magis implicantur postea quam sensum, sensumque simul coalitæ repetito nexu ramos efformant successive ampliores, qui tandem ad truncos venarum uteri confluunt; præter hanc directam venarum ramificationem, qua denique communem truncum aggrediuntur, laterales innumeros inter eas, & cum exilioribus arteriis anastomoses conspiciuntur, quæ injectione tumentes reticulum densissimum progignunt, per illos anfractus sanguis ab arteriis redux quaqua versus viam flectit, ut natura, multiplici hac communicatione affluenti sanguini multiplices videatur semitas parasse.

Usque adhuc in utero sanguineorum vasorum distributio, aut nihil distat ab ea ceterarum corporis partium, aut maxima vasorum, venarum præsertim, implicatione, & anastomosis frequentiori commercio tantum differt.

At quod summum discrimen parit in circulatione per uterum sanguinis, processus sunt, seu appendices quædam venarum perpendiculares, quæ cum venis unam crassitudinem retinentes intimam tunicam perfodiunt, & in interiori uteri superficie patefunt, hæc originem habent a concursu anastomosis, ubi vasa ad angulum coeunt, confluitque cruor, sæpe etiam a lateribus huiusmodi venarum, aut anastomosis erumpunt.

Huiusmodi appendices in gravidis tantum, postremis præsertim mensibus, sensibiles sunt, tunc per quatuor, vel quinque lineas prominent, quæ cum venis unam crassitudinem retinentes intimam tunicam perfodiunt, & in interiori uteri superficie patefunt, hæc originem habent a concursu anastomosis, ubi vasa ad angulum coeunt, confluitque cruor, sæpe etiam a lateribus huiusmodi venarum, aut anastomosis erumpunt.

Tunc appendices illæ (variā tamen crassitudinem præferrentes) ita conspiciuntur, ut non solum oculis facile perspici, verum specillo facili negotio per lumen earum usque ad venas a quibus oriuntur pervadi possint, at utero ad naturalem magnitudinem redacto, præter hoc gestationis tempus illas in cassum permeare tentabimus, nam cum venis simul coarctantur ita, ut exilitatis ergo oculos penitus effugiant.

Has placentam invadentes in eam sanguinem effundere, & in utero patulas catamenia producere iudicavimus; iis tamen circumstantiis exceptis ostium, earum uteri spectans, exacte claudunt, quod, quo mechanismo fiat cum ignoremus, cuique licuerit pro phænomeni explicatione, aut valvulas orificio extrinsecus applicatas, vel quod magis aridet, labiorum coeundi nixum, vel simplicem etiam fibrarum circularium constrictionem habere.

Verum enim quidquid eorum pro causa cognoveris patet sanguinem citra gestationis, aut menstruationis statum per eas appendices erumpere nequi; sanguis autem quovis alio tempore ibi affluens, aut stagnare, aut quod magis verisimile est, & legibus circulationis consonum, debet lentissime renovari, & per successivas circulationes directas, quæ in venis fit sensim, sensimque lateralibus appendicibus communicari; eodem pene modo, ac motus aquarum per fluminis alveum ripæ sinibus communicatus in iis contentum fluidum continenter removel, atque innovat.

### §. III.

*Descriptio vasorum lacinearum, seu vermicularium uteri.*

**A**lterum vasorum genus per intimam uteri tunicam repit, quod tamen posterioribus gestationis mensibus ut de appendicibus indicavimus, oculis etiam facile conspicuum est.

1. Si obverteris uterum mulieris gestationis fine, aut partu defunctæ leviter interiorem tunicam abstergendo, ubi placenta absuit, atque tunica magis compingitur ibi leni pressione guttulas erumpere observabis lacticinosi humoris per tubulos, sive foramina pene imperceptibilia, quos totidem ductus vasorum huiusmodi humoris secretioni paratorum esse videbis.

2. At si macerationis ope aceto peractæ uterum interiori tunica exueris, eam leviter scindendo, apparebit tunc carnea tunica undique innumeris interpersa vasculis exilibus, vermicularibus, albis, setæ crassitiem superantibus, tribus, quatuor, aut quinque lineis oblongis lacteo illo liquore repletis, quem vasa irritata, aut concisa stillant, eo similem ab utero superiori experimento fluenti.

Vascula hæc multiplici, ac varia implicatione cum ramificationibus venosis super allatis, anastomosibus, sive lateralibus communicationibus mirifice intertexuntur & modo parallelo repunt tramite, modo superius, modo inferius diriguntur ad rectos angulos, vel obtusos se se interfecando, modo amplectuntur, & huc illuc deestendo simul in spiras circumvehuntur. Verum quacumque incedant methodo ita venosis ramificationibus intime copulantur, ut simul pulposam substantiam constituent intra carneam uteri tunicam, & internam interjacentem.

Si cui haud molestum fuerit hæc vascula seccare, vel potius subtiliori cuspidē separare, facile patebunt glomi quidam e quaternis, vel quinis vasis: compositi, quæ undique in eodem puncto coeunt, ibique expansa, pelvis communis speciem referunt, tum ab hoc unionis centro porri, seu tubuli excretorii surgunt, qui obtegentem intimam uteri tunicam perforando, quem continent, lacteum humorem effundunt.

Alter huiusmodi vasorum limes prorsus impervius est, sed hoc nihil officit, quod ea vascula tum eorum extremis, cum lateribus non sint a subtilissimis pertusa ramificationibus vasorum lymphaticorum, quæ humorem in eorum cavitate detentum dum tenuior est per eorum officia effundere valeant, vel si spissior fuerit, ut abs re sit integrum penetrare, subtiliorem partem saltem abforberi sinant.

Nemo itaque anceps erit, quod hæc vermicularia vascula gestationis tempore secretioni interserviant humoris cuiusdam lacticinosi ab illo haud absimilis, quem vasa spermatica in testium virorum compage separant *sperma* dictum; clare pariter percipitur, dum ea magis turgent, illum in uteri cavitate erumpere pro alimento foetus, de quo plura infra dicenda.

Adhuc tamen in dubio hæremus, quibus usibus ea in mulieribus citra gestationem præsto sint, vel qualem humorem tunc secernant; at si conjecturis locus est, cognita economia animalis, & similis cum utero in mammis secretio iudicium satis validum suppeditat, huiusmodi humorem eadem indole polleere illius, quem vesiculæ mammaræ separant, easdemque subire alterationes, a quibus, similia phenomena producendo, a sympathica, hinc partium earum relatio oriri solet.

In puellis usque ad annum quartum, & decimum, tum uteri, cum mammarum liquor lymphæ est, vel saltem nonnullis chylois moleculis parum inquinata; quapropter hi humores cum fluidissimi sint vasa lymphatica e suis hydrophilaciis eos facile quanti eo pervenerint valent exantlare, tunc enim neque mammarum vesiculæ, neque uteri vasa vermicularia ullam distentionem patiuntur, & illæ exiguæ, ac compressæ remanent, is dñus compactus, ac contractus persistit.

At decimum, & quartum vitæ annum mulieribus attingentibus, corporis augmentum segnius fieri incipit, & sanguinis dispendium imminui, chyli præsertim, qui significationi materiam suppeditat, aucto enim tunc supra nutritionis opus chylo, qui redundat, cum uteri, & mammarum lymphæ sibi a-

nalo-

maloga remixtus, eam continenter lacteam magis reddit, ut hujusmodi humorum uterque pro acquisita densitate difficillime vasa lymphatica valeat permeare, huic abortioni dicata; illi humores vero in iis pelvibus morantes, eas successiva collectione semper magis distendunt, ac proinde sinum inflari, ac mammam amabili sua rotunditate sororari videbis, tum uterum extendi, & inflari, quod in puellis pubertatem constituit, easque viro maturas reddit.

Hujusmodi æconomiz animalis in mulieribus processus post conceptionem majorem alterationem patiuntur, tunc, rationibus infra enunciandis, uberrime chylus cum his humoribus permiscetur, & perfecte lacteos facit, impediens quominus vasa lymphatica quoad crassiorem saltem sui partem intrent, ideo coæservati magis, uteri, mammarumque substantiam augment, & copia suos reservatorios dilatando per excretiores ductus sibi pendunt viam in utero foetui nutriendo, in mammis infanti in lucem edito alendo.

Ex his facile patet vasa vermicularia in mulieribus nondum foetum gerentibus incassum inquiri, nam ubi exilitas visui non obesset, color, humorisque pelluciditas potis sunt, ut oculorum aciem effugiant; apparet enim tunc ea vascula mera lymphæ, parum lacticinosa, & translucida replegi, imo difficillimum, & impossibile perire erit tunc temporis ea a vasis lymphaticis, vel a simplicibus fibrarum filamentis distinguere, quæ utrasque tunicas simul nectunt.

Hæc omnia clariora apparebunt figuras æneas conspicientibus, quas initio operis posui perbelle adhuc expositam uteri structuram referentes.

## CAPUT II.

*De menstruum profusio, sive de Catamenis.*

## §. I.

*Descriptio.*

**M**ulieres per certum vitæ cursum periodicæ sanguinis evacuationi per uterum sibi propriæ sunt obnoxie. Hæc lex ita communis est, ut vix centesimam reperies catamenis deficientem, citra morbum, vel conceptum.

I. Hujus evacuationis indicia quarto, vel quinto decimo ætatis anno in puellis solent supervenire, non desunt tamen, quibus citiora, vel segniora appareant.

II. Catamenia semel incepta uno quoque mense semel revertunt, id saltem magis crebrum est, & in nonnullis procul a morbo bis in unico mense, vel ter in duplici mense interdum revehuntur.

III. Istiusmodi enim evacuationis reditum patet mensis circiter revolutione dissolvi, id tamen aliquam varietatem patitur, nam pluribus fluxus mensstruus vigesimo septimo, aut vigesimo octavo die, aliis quinta quaque hebdomada est recidivus.

IV. Eiusdem diuturnitas inconstans valde est, raro tertium diem non attingit, vel sextum superat, ut si intra hos limites fluxus non persistat pro morbo habeatur.

V. In eo tres gradus distinguuntur initium videlicet, & incrementum; status; decrementum, & finis, qui per æqualia intervalla diducuntur, integri cursus diuturnitati proportionalia, raro enim secundum naturæ leges repente erumpunt, vel fluere sinunt catamenia.

VI. Difficillimum est in unaquaque evacuatione determinare quantum sanguinis excernatur; hoc enim in singulis subjectis, & mensibus differre solet, plerumque intra octo, aut sexdecim uncias differentia consistit, non desunt tamen, quæ absque morbo plus, minusve sanguinis amittant.

VII. Certam sæpissime rationem sequuntur catamenia methodicam valde.

*Astruc de Morbis Mulierum.*

quæ initium, & finem eorum spectat, nihilo tamen minus in nonnullis ferò desinunt, quibus cito increbuerunt, & contra.

VIII. Plerumque duratio quantitati fluentis sanguinis rationem habet, animadvertitur enim unoquoque cursu, quibus uberrime etiam diutius menses fluere, & contra, sunt etiam, quibus post duplicem methodicam menstruationem, tertia superadditur diuturna magis, atque abundans.

IX. Quàmvis menses sine intermissione continenter excurrant, neque iterum appareant qui semel constiterunt, reperiuntur tamen nonnullæ, quibus postquam aliquantisper fluxere, repente sistunt, ac duobus, vel tribus diebus transactis remittuntur denuo, per aliquod temporis spatium.

X. Sanguis menstruus in sanis mulieribus optimæ crasis, & salubris est; quidquid enim de ejusdem deleteria indole, & acrimonia asserunt, ægrotis tantum refertur in quibus vel infectus est sanguis, vel ulcus uterum deturpat, vel eror in eo irrupens corrumpitur; alii præter hunc triplicem casum multum erit subducendum de morbofis effectibus qui menstruo sanguini tribuitur.

XI. Catamenia præcedit plerumque, & prosequitur lymphaticum effluviū, quod diutinum plus, minusve, atque uberrimum est in ratione uteri, ac temperamentis constitutionis; dantur tamen sanæ mulieres, quibus continenter rubens sanguis fluit.

XII. Utero graves posterioribus præsertim mensibus hujusmodi fluxu deficiunt, etiam si in nonnullis ad tertium usque mensem persistat, nutrices pleræque eo carent, tum laboriosæ mulieres, & rusticæ absque noxâ.

XIII. Menstrua prænunciant futura, rubis, inguinum, ac lumborum dolor; pudendorum inflatio, vel rubræ papulæ; vaginæ tensio, calor, sensusque auditus; hemorrhoidum tum externarum, cum internarum tumor; mictio dein crebra, & ardens; urinæ turbidæ ac mora facile corruptibiles; mictio denique duræ turgentes, & hystericæ suffocationes; capitis gravedo, atque vertigo; sopor, vel pervigilium; per subsultus, tandem somni solutio, aut molesta insomnia &c. Hæc omnia prima vel secunda die pati solent mulieres ante eruptionem; raro enim per quinos dies præcedunt.

XIV. Hæc denique eruptio eadem methodo constanter revertit ad quadragesimum usque, quadagesimum quintum, vel quinquagesimum ætatis annum, donec sponte desinat; incertusque finis est ut initium fuisse ostendimus in ratione temperamentis, vitæ gestæ, morborum indolis quos passæ sunt, aut climatis quo degere solebant.

## §. II.

### Causæ.

I. Quæ primum causarum indagini obijcitur difficultas locum spectat e quo sanguinem fluere soleat, alii enim ex uteri fundo, alii ex intima vaginæ tunica erumpere arbitrati sunt, utramque sententiam firmanæ auctoritas, & experientia; observationes tamen, quæ menstrua ex uteri cavo stilare defendunt, ita conspicua sunt, & a Claris viris instituta, ut nullum dubitationis locum superesse videatur.

1. (a) Vesalius, (b) Peyerus, (c) Mauriceus, (d) Littrius, atque (e) Schurigius animadvertisse affirmant sanguinem ab uteri orificio scaturire, quod perbelles conspexerunt in illis in quibus ipse ad pudenda usque erat prolapsus, postea-

(a) De humani corporis fabrica. Lib. V. cap. 15. (b) In Ephemerid. Germanicæ, Dec. II. ann. 1. Observ. 84. (c) Observations sur la grossesse, Observat. 96. (d) Histoire de l'Académie Royale des Sciences Année 1719. p. 16. (e) Pathologiae Sect. II. Cap. 2. §. 4.



posteriores duo addunt, neque guttulam e vulva oriri cujus interna superficies tunc facile inspicere potest.

2. (f) Spigelius ait in mulieribus catameniorum tempore discessu reperiri internam uteri tunicam undique perforatam foraminulis fundum versus praesertim, valde conspicuis citra menstruationem vix patentibus, quae tunc cruorem effundebant.

3. (g) Mauriceus asserit in sectione mulieris cujusdam delictorum causa, adhuc fluentibus menstruis, suspensae invenisse uteri fundum exiguis grumis insterspersum coagulati sanguinis, & foraminula illa patentiora ibi quam circa collum quorum ora obducebat grunnavit sanguis hic persistens, idque pluries animadvertit, atque suis scriptis (h) alibi defendit.

4. (i) Littrius mulieres comperit profluente sanguine obitas quarum uterus turgens & crassior erat, ibique vasa sanguifera humore quo uteri cavum irrigare debebant imbuta, tum ejusdem intimior pars undique tubulis instructa patenter sanguine repleta, quem levi pressione ipsi versabant.

5. Clarissimus Morgagnus (k) tandem repetitis observationibus ostendit in mulieribus in eo statu dissecis fundum uteri reperisse sanguineis undique maculis distinctum, e quibus vel mediocri expressione cruentas guttas elicere nihil prorsus negotii erat, quod cum in vagina pari expressionis vi tentaretur nihilominus proficeretur; idque alibi (l) confirmat Santorini auctoritate, & auditorum suorum testimonio.

Tot enim experimentis sententiam innixam nemo etiam alias praecoccupatus audebit contendere ex uteri nempe fundo non e vagina menstrua profluere id rationi non solum, verum cognitis matricis usibus valde consonum videtur: nam

1. Per uterum confertissima repunt, & maxima copia vasa sanguifera, ergo ex iis menstrua prodibunt.

2. Patet ut infra clarius explicabimus hujusmodi sanguinem scetini in utero nutritionem praebere, id ergo uterus suppeditabit.

3. Videtur Lochia post partum ex iisdem fontibus stillare, ac menses citra gestationem fluunt, quod cum uteri vasa peragant, eadem ergo catamenia simul producere verisimile est.

4. Tandem sanguinis jacturae quae utero gravi jure saepissime aborti metum inducunt ex utero prodeunt, tunc enim sanguis embryonem alere ineptus evadeat, si e vagina prodiret, quare circa menstrui sanguinis originem omnia confirmant, quod observationes supra docuerunt.

Nihilo tamen minus numquam negare statuimus eodemque tempore haud infrequenter tum uterum, cum vaginam menstrua suppeditare; similis enim harum partium textura, una fere in his sanguinis distributio, ac summa vaporum conferentia postulant, ut sanguis in plethoricis praesertim ex utraque parti sibi aperiat vias, autumo etiam sanguinem aliquoties e sola vagina invite fluere, dum aliqua de causa ex utero erumpere impeditur; ex hoc rationem facile invenies cur nonnullis observasse (m) affirmant in dissecis sub menstruatione emortuorum cadaveribus uterum maculis cruentis, aut effluviis indicibus prorsus carere, vaginam vero sanguine refertissimam esse; ex his simul constat cur in gravidis sanguis absque noxa, vel aborti metu per trinos menses, vel integram gestationem saepe erumpat; ea tamen nihil favent contrariae sententiae,

A 4

tiz,

(f) De humani corporis fabrica Lib. VIII. Cap. 30. (g) Des Maladies des Femmes grasses & accouchées Liv. I. Chapl. 30. (h) Observations sur la grossesse. Observat. 49. (i) Histoire de l'Académie Royale des Sciences Ann. 1730. p. 14. (k) Adversaria Anatomica. Advers. I. §. 31. (l) Advers. IV. §. 27. (m) Real Jus Columbus Anatom. Lib. VI. Severinus Pinzus. De notis virginis Lib. II. Cap. 1. Carolus Piso. De morbis a colluvie serosa Sect. II. Part. II. Cap. 7. Edit. Lugduni Batavae. Johannes Bohnius. Circul. Anatomic. Program. 16. Gulstredus Bergerus. Patholog. cap. 30.

tiz, cum fluat tunc sanguis e sola vagina, uteri ostii perfecte clauso, qui ex hoc minime læditur.

II. Cum duplex sit vasorum genus per illum reptantium, arteriarum nempe, & venarum in dubium adhuc versatur quod eorum menstrua producat. Autorum sententia circa hoc nondum composita sunt; plerique tamen hunc sanguinem venas subministrare autumarunt, & sane huiusmodi color subnigri suffusus, ac segnitie per quam guttatim stillat ut venoso sanguini mox est, valde suadent, idque maxime confirmat Lochia in l'uerperis ex venis procedere, ac proinde menstruationem etiam ex iisdem derivare, unamque sternere viam.

III. Veniet inquirendum e quibus venarum fontibus procedat; verum questio pauci momenti erit, patente enim uteri contextu, vasorumque allata distributione, facile apparebit venosas appendices id peragere; hæ enim sunt, quæ in uteri cavo magis protenduntur, quæque interioris tunica tellam perfodiunt, earumque patula ostiola, ut munus fungant a circulatione diversum, a natura fuisse constituta videntur; si spectemus etiam extremitates esse venarum, ut absque laceratione valeant sibi pandere vias, quare adhuc allata satis clare ostendunt per illas appendices sanguinem menstruationis tempore esse fluxurum.

At cur conjecturis fidendum dum certas habemus observationes I. (a) Hig-mori, qui refert secuisse femellam fluentibus adhuc catamenii emortuam, cujus interioreni uteri tunicam reperit undique orificiis venarum ibi patulis resectam.

2. (b) Vinslovii, qui uteri cavum animadvertit villis confertissimum exilibus rubro sanguine infectis.

3. (c) Spigellii, qui illos sub foraminum specie vidit valde patentium, quæ menstruo fluxui pertinere iudicavit.

4. (d) Mauricei, qui in muliere scelerum causa cruce multata uteri fundum intrus glommiis inductum cruentibus plurimumque vasa diffusa, imo ipsorum ostia coagulato sanguine turgentia ibi patula valde, comperit.

5. (e) Litrii, qui internam huiusmodi superficiem interspersam conspexit (\*) conspicuis foraminulis, quæ pressione facili negotio cruorem quo erant saturata effundebant.

6. (f) Morgagni tandem, qui intrinsecus uterum descripsit cruentibus maculis distinctum mediocri pressione sanguinem manantibus.

Procul dubio itaque constat orificia Highmori; villis sanguine intrisos Vinslovii; patula foraminula Spigellii, atque Litrii; ostiola Mauricei; ac stigmata sanguine madida Morgagni; appendices illas esse a nobis descriptas, quæ clarissimis illis Anatomicis plus, minusve crassis, oblongis, patulis, aut cruore saturis apparere pro diversa subjectorum conditione, quæ secuerunt.

Tribus hæc difficultatibus explicitis, totum menstruationis mechanismum se se expedit, extremæ enim appendices cæcæ venarum uteri naturaliter constrictæ, & obturatæ nequeunt catameniorum tempore in utero sanguinem versare.

nisi

(a) *Corporis humani Disquisition. Anatomie*. Lib. III. Part. IV. Cap. 4. (b) *Exposit. Anatom. du bas-ventre* pag. 754. Edit. in 4. (c) *De humani corporis fabrica* Lib. VIII. Cap. 2. (d) *Mela. ludis des femmes troises, & accouchées*. Liv. I. Chap. 1. *Observations sur la grossesse* Observ. 49. (e) *Histoire de l'Académie des Sciences* Ann. 1710. p. 16. (\*) Littrius addit quod a reconno ces memes trous de la surface interne de la matrice dans les femmes mortes pendant la grossesse, mais beaucoup plus petits & d'où il se sortoit au lieu de sang, qu'une liqueur blanche & laiteuse; peu de jours après l'événement rationne ostendire co-exist, que huiusmodi foraminula modo arctiora, modo ampliora videntur, aique liquor ab eis erumpens diversim naturam indat; miror enim quod celeberrimus anatomicus deceptus sit, neve conspiceret, eos trous pleins de sang, qui observavit dans la matrice des femmes mortes pendant leurs règles en gravidis ampliori quam maxime, ces trous — deux ut ipse delc. idit 1701. (f) *Histoire de l'Académie* 1701. pag. 293. & at ces trous, e quibus tantum erumpent une liqueur blanche, & laiteuse, & gravidarum uter. &c. Aliud fuisse foraminum genus ab eo procul diversum, quod frustra inquisivit tunc exillius ergo in mulieribus catamenio fluentibus discellit, conspicuum tamen gestationis tempore, quando portæ uteri omnes ampliores sunt. (i) *Adversaria Anatomica*. Alvi 9. 31. & IV. 4. 17.

nisi se se extricent, & patefaciant, plenitudo; seu cruoris redundantia potissimum valet eas referare, at hujusmodi plethora duplex esse potest vel integrę æconomiz animalis communis, vel uteri specialis, ideoque ut harum appendicium apertione explicemus alterutra repletudinis species erit amplectenda.

Sane universa vasorum repletudo ad menstruorum ubertatem non parum conducit, ratio itaque, & experientia id confirmant; ex eo tamen minime arbitramur universalem redundantiam solam sufficere ad hanc sanguinis effluxionem producendam: at si recte examinemus eam sapissime, constanter, & methodice persistere in mulieribus eronicis morbis emaciatas, aut tenui victu, vigiliis, doloribus, vel continuis cruciatibus defatigatis in quibus vix reliqua est in venis tertia sanguinis portio, qua in statu naturali turgere deberent, quo ergo nascisci hujusmodi plenitudinem, si eam pro mulierum fluxus causa haberemus.

Ad phænomeni igitur explicationem, localem, seu specialem uteri plethoram admitti conati erimus. Hęc magis consona legibus menstruationis, ac maxime ab his quę præcedunt, aut subsequuntur eruptionem comprobata apparebit. Patet enim pudendorum tumor, tensio, & calor vaginę; pubis, inguinum, atque lumborum dolor; hemorrhoides quę tunc superveniunt, specialis repletionis consecutiones esse, quę partibus communicantur propinquis.

Auctorum nonnulli autumant sine speciali exuberantia a peculiari in utero vasorum distributione penitus derivare. Docent enim sanguinem a corde per arterias recto tramite celerrime, ac uberrime descendere, minori vero copia, & serius, spectato perpendiculari vasorum positu, ad cor reflueri; verum descendens aortę diametrum ampliari magis in mulieribus, quam in hominibus, eoque in illis majorem copiam sanguinis ferre, quam in virili sexu. Animadvertunt simul arterias, venas distribui innumeras per uterum, quę multipliciter intersecantur, & implicantur invicem, quęque per confertissimas anastomoses inter se maxime conferunt, nullam vero reperiri valvulam, neque sanguinem in venis internam uteri faciem reptantibus sustineri, nisi ab latiori tunica, & pinguedine denudata, quę nihil obest venarum dilatationi. Hęc si admiseris erunt consequutura, sanguinem uberius ad uterum vehi atque ab eo difficiilius, & minori copia recedere, ibique morari, & congeri magis inter sanguinea vascula, quorum implicatus contextus sanguinis cursum magnopere retardat, ac proinde surgentes venas inflari ac magis magnisque dilatari tenaci tunica orbata, quę eas extrinsecus tucatur, & valvulis, quę intus sanguinem extollant; per illud tandem complexum hanc localem repletudinem oriri, quę menstrua producere potis erit.

Nihilo secius ab hac sententia, quę maximi momenti esse videtur multum erit subducendum, ac si sedulo ipsam perpendere lubeat; esto:

I. Amplificant nimis utilitates quas a vasorum speciali in utero distributione derivari sibi suadent; verticalis enim arteriarum, & venarum directio, atque aortę descendens in mulieribus amplitudo, si peculiarem uteri redundantiam generare valeret, similis arteriarum directio, quę ad pedes sanguinem devehunt, aut venarum, quę illum ad cor revehunt, amplitudinem diametrum pedes inflare deberent eo magis, quo celerior pro rectitudine esset cursus, refluxusque segnior pro longitudine tramitis, at experientia ostendit hujusmodi pedum turgentiam in mulieribus prorsus abesse, ideoque iis de causis, nec utero supervenire suadendum. Id tamen inæqualitatem producere motus affluentis, vel redeuntis sanguinis non negabimus, quę a natura sapienter multiplici cognita via rependi solet, hincque motus sanguinis uniformis, æquusque reddi.

II. Perperam magnificiunt numerum vasorum per uterum pereptantium, eorumque plexum, anastomoses, valvularum defectum, aut tunicarum lasum contextum: hęc utero gravi potius, quam foetu carenti convenire videntur, in puberibus

beribus præsertim nondum conubio vinctis in quibus matrix plerisque visceribus densa magis & compacta apparet, ejusque vasa exiliora, & contracta conspexeris.

III. Ast positâ structura, ac vasorum distributione, quam in puberibus, vel jugatis adversarii arbitrati sunt, neminem ex his specialem uteri plenitudinem oriri posse videbimus, citra universalem sanguinis plethoram; mentem etiam *D. Freind* assequentes, qui etsi contrariam sententiam defendat in hoc nostras videtur; consequens enim esset emaciatas mulieres catameniiis penitus deficere, quæ nulla peculiari afficerentur plenitudine, si ab universali esset derivanda, sed experientia aliud evincit.

IV. Verum ne hujusmodi etsi imparem renuamus hypothesein, sinamus, si lubeat, unoquoque in se hanc gigni universam plenitudinem in mulieribus menstruationi proximis; quid ex eo? in eadem ratione uterum tunc sanguine imbui? fortassis; verum id potius in utero, quam in ceteris corporis partibus vasa referre, vel periodicas excretiones promovere minime sufficeret. Oportet itaque ad hanc confirmandam sententiam ostendere ibi sanguinem copia, atque nixu contra parietes vasorum vi sua facilius ceterarum partium renitentiam superare, sed hoc ægre sustinebimus, cerebrum porro, pulmo, epas, lienque laxiora viscera sunt, & vasibus pollent amplioribus innumeris multo sanguine turgidis, quæ facilius tument, quam ipsas uteri in puberibus, ideo in illis visceribus specialis hujusmodi facile orta plethora vasa dilatare, ac sanguinem promptius quam in utero erumpere deberet.

V. His concessis simul evidens esset statim ac menstrua sinant, eam in utero renovari, ac augeri repletudinem quotidie, vasa dein post quintum & decimum diem dimidium inflari, & duplum post vigesimum, tuncque sensibilem fieri, eademque phenomena reproduci etiam si leviora, quæ paullo post catameniorum tempus solent apparere; observationes igitur id contendunt, nam mulieres, quæ gravidinem, tumorem, caloremque circa uterum, & vaginam prope fluxum patiuntur, nihil proflus sentiunt decimo, vel quinto decimo ante eruptionem, quod confirmat partialem hanc repletionem, neque celerime ita nasci sciri, neque alterius universalis plethoræ consequens esse.

VI. In hac tandem hypothese circa uteri statum nonnulla ommittunt, quæ ad menstruationem explanandam opportunissima sunt; porro decipiuntur valde, nisi animadvertant partes omnes organum quodvis microcosmi componentes ad integram organi ipsius functionem patranda simul necessario conferre; nec verbum faciam de appendicibus venosis, quæ contrariæ sententiæ in eo favere prospexi, quod absque laceratione per earum patula orificia sanguinis eruptio eveniat, sed in ea opinione nullum locum habere conspexi in menstruationis negotio vasa vermicularia, quæ tamen innumera sunt, quæque per confertissima foraminula internam uteri faciem perforando sui generis humorem effundunt a summo naturæ auctore paratum, qui hujusmodi partis actionem aliquo modo foveat.

Ex his animadversionibus consequitur:

*Primo* localem uteri plethoram, quæ periodice illum inflat, & catamenia producit, a nulla universali repletudine derivare.

*Secundo*, quod ea oriri nequeat, nisi sanguifera vasa speciali modo comprimantur, ita ut sanguinis cursus plurimum intercipiatur.

*Denique*, sola vasa vermicularia potissima esse ad hanc compressionem exercendam; ea enim unoquoque mense turgida fiunt, venarumque extremitates amplectuntur, easque maxime comprimunt.

Reliquum ergo erit rationem ostendere, qua hujusmodi vasa periodice intumescant; id vero naturaliter subsequitur usus illorum in superiori capite indicatis.

In his

In iis itaque, quæ pubertatem jam attigerunt lympham lacticinofam vulgari spissiore vasa vermicularia separant, cujus subtiliorem partem venæ lymphaticæ attrahunt, verum segnior portio in illorum cavitate reliqua sensim, sensimque mensis circiter circuitu aucta, vermicularia vascula inflat, ac propinquos venarum processus ex hoc constringunt, impeditoque directo cursu invite laterales appendices intrat sanguis, easque extendit atque explicat, ut cruorem in utero versare cogat.

Verum cum actioni semper æqua sit reactio, venæ a vermicularibus constrictæ illa parvi comprimi conantur; hinc contentus liquor tum pressionis cum densitatis causa, dum lymphatica penetrare impeditur, per excretorios ductus sibi pandit vias eodem tempore, quo venosæ appendices sanguinem madent, & duplici hoc fluxu lacticinofi humoris, & cruoris ex appendicibus prodeuntis catamenia originem ducunt.

Hoc effluvium, donec vasa vermicularia lacteo succo, & venosi processus sanguine inaniantur, solet perdurare, tunc utrumque vasorum genus obturatur, & hac methodo lactifera illa organa sensim humorem lacticinofum e crassiori lymphâ restitutum servant, quem ipsi secernunt; eodemque circiter intervallo, simili modo fluxum reproducent.

Ecce palam vobis simplicissima phænomeni explicatio uteri texture consona, & observationibus confirmata menstruorum tempore institutis, quæ unicuique uteri parti munus sibi proprium præbet fungendum: constabit porro hanc sententiam tum sani, cum infirmi uteri mutationes omnes facillime extricare, ita ut ab omnibus ratione præditis mereatur amplecti.

### §. III.

#### *Consequutiones.*

**E**X antea dictis igitur statuere licebit:

1. Sanguinem menstruum necdum stillare ex vasis uteri per tunicarum poros, vel per sudoris, aut diaphoresis vias erumpere; huic simul obest spissitudo ejusdem, & copia.

2. Cruorem minime per vasa in glandulas, aut vermicularia organa irrumpere, ac per ipsorum ostiola in uteri cavitate effundi; hujusmodi opinio demonstrationibus caret, neque explicationem inveniremus periodici ad glandulas affluxus, quinnimo unoquoque mense intima uteri tunica phlogosi corriperetur, si glandulæ lymphaticæ sanguine imbuerentur, quare hypotheseos ratio non solum, sed experientia etiam contendunt.

3. Sanguinem nunquam arterias, venas solummodo suppeditare; uteri etiam textura adhuc latente innotebit, tamen ex sola crassitudine, & robore arteriarum, quæ dilatari renuunt, verum lassitudine venarum, ceteris paribus, per istarum lumen cruorem facile transibire.

4. Non ex venarum extremis discissis menstrua fluere, sed ex dilatatis illarum appendicibus absque nixu stillare; naturæ enim fuerit consilium per vasa satis lata citra lacerationem id patrari, quoniam in utero innumeris referto vasculis singulis mensibus per quadraginta circiter annos scissuras innumeras renovare conspexeris, si pulmones breviori latione paucis simul transcissis vasculis citissime exulcerentur.

5. Cruentum hunc fluorem nullum in utero fermentum, aut in vasibus fermentationem fovere, hujusmodi tamen sententia antea dicto saculo valde recepta erat, eaque tunc veritatis speciem facile obtinisset; nuperrime fermenti hyrothesim ægre ferunt Medici, & ad menstrua præsertim relatum prorsus contemnunt, dum simplicius phænomenon cognita sola uteri textura possit explicari.

6. Tan-

6. Tandem faſes Lunares nihilum in catamenia influere; ſuperiori ſane infirmior opinio, fuit quæ ignorantia olim, & ſuperſtitionis ævo, late vigebar, quam Cartheſiani amplexi erant, quando Phificam ad ſummum attigſſe culmen arbitrabantur.

#### §. IV.

*Explicatio eorum, quæ catamenia reſpiciunt.*

**I**N his perpendendis eandem methodum erimus proſequuturi qua propoſita ſunt, eo tamen ordine, ut unusquiſque numerus, numeris articulo præcedenti exaratis reſpondeat.

I. Liquor quem in impuberibus exigua copia vermicularia ſecernunt mera lymphæ eſt, ut ſupra \* enunciamus, adeo ut omnem abſorbeant venæ lymphaticæ, nihil reliqua quæ illa organa tumefaciat, ac proinde venas comprimendo menſtrua producat. At decimo quarto ætatis anno puberibus factis mulieribus res alio ſe vertit, tunc uberius, & lactiſinoſus magis liquor ſecernitur, hincque venæ lymphaticæ impares ſunt numero, quem colligunt totidem haurire, tum pro aucta denſitate niſi tenuiorem partem ipſæ hauriunt; reſiduum in vermicularibus retentum illa expandunt ita, ut circumpoſitis venis iterum compreſſis primus oriatur eruptionis gradus.

Huiusmodi epocha pro ſubjectorum diverſitate varia eſt, decimo enim quarto ætatis anno menſtrua incipiunt in iis, quæ cito corporis dimenſione augeri deſiunt, & plethorica ſunt, vel quæ vitam ſedentariam, inertemque agere ſolent, in quibus fibra, præſertim uteri, laxa eſt, aut lubricæ cogitationes, corporis diſpoſitio, fabularum lectura, venuſtuloꝝ conſuetudo, exempla in amoris negotio animum vexant; contra vero poſt decimumquartum apparent in illis, quæ ſerotinum habent augmentum, minus ſanguineæ ſunt, deſatigatæ magis, tenuique cibo veſcuntur, tum fibris compaſtioribus donantur, quæque indole modeſtæ, & educatione ſunt pudicæ.

II. & III. Incaſſum catamenia expectabimus niſi vaſa vermicularia lactiſinoſa turgeant lymphæ, ut propinquas ea vi comprimant venas, quæ laterales appendices valeat aperire; patet enim id certo temporis ſpatio indigere, ut vaſa ad eam plenitudinis gradum pertingant, quod experientia docuit menſe perſolvi, adeo ut menſtrua conſtanti methodo ſemel in menſe debeant renovari.

Ea citius tamen, & crebro ſuperveniunt in iis quæ copioſe veſcuntur, minus deſatigantur, latiori ſunt donatæ fibra, & vaſa imbecillia habent, quarum uterus calet facile, & ſtimulum patitur &, raro vero ſeriusque eveniunt in laborioſis, & ſobriis mulieribus utero minus compaſto præditis, exiliioribus reſer-to vaſculis, minusque irritationi obnoxio.

IV. Eſſuvium hocce perſiſtit donec vermicularia lacteo ſucco, & appendices, venæque propinque ſanguine penitus exhauriantur; periodorum itaque varietates faciunt, humoris iſtius inopia, oriſiciorum latitudo per totum uterum madentium, quæ menſtruorum brevitatem producit; diuturnitatem contra gignit humoris coacervati copia, qui anguſtis oſtiolis per vices conſecutivas a nonnullis uteri partibus tantum erumpit; experientia nihilo tamen conſtat in ſanis mulieribus ſanguinis fluxum plerumque neque citra tertium, vel trans ſextum complecti diem.

V. Ut de hac re ſane judicemus, vaſa uteri tum ſingillatim, cum complexim examinare oportebit, ſi ſingula perpendamus innotuerit unumquodque ſenſim ſenſimque pateſcieri, dein oſtia eorum ſucceſſive ampliari, donec ſummum aperitionis

ritionis gradum attingant, iterumque coarctari usque dum perfecte ocludantur: si vasorum complexum spectaveris, eorum quoddam patet primum, inde patentium maxime augetur numerus, donec simili ratione sensum obturantur omnia; idque ostendit.

1. Tres status catamenia complecti *augmentum* nempe, *statum*, & *decrementum*.

2. Verum uniuscujusque status tempus respondere integri fluxus persistentia.

VI. Quantitatem pariter fluentis sanguinis unoquoque cursu determinare difficultissimum erit, differentias faciunt inopia, vel copia sanguinis, venarum uteri maxime amplitudo, aut turgentia, quæ plus, minusve patulæ sunt; tum amplia appendicum orificia, quorum multa, vel pauca referantur, & diu, citoque in eo remanent statu; tandem sanguinis fluentis motus qui segnior, aut velocior existat; experientia tamen ostendit hujus plerumque quantitatis limites in sanis mulieribus intra octo, & sexdecim uncias contineri, idque absque maximi erroris indicio asserere posse.

Me non latet (a) Hippocratem statuissè hanc quantitatem ad duas heminas attacas, quæ viginti circiter uncias pendent, at comparatio vel incompleta est cum uncis nostris, vel infirma illius observatio, aut olim mulieres ab Hippocrate examinatæ nostrarum fluenti sanguine uberiore erant.

VII. In feminis sanitate præditis, quarum vasorum robur prementi sanguini modice resistit, certa vi renunt appendices sese aperiri, eademque celerius arctantur, atque obturantur, adeo ut in iis constanti methodo menstrua percurrerent; inversa tamen ratione inter augmenti, & decrementi progressus, quod vulgarem fluxum constituit.

Hoc dupliciter in suis extremis circumstantiis variare solet dum laxior fibra est, tunc citius crescit, seriusque fluxus evanescit, contra si fortior sit fibrarum uteri contextus, serotinum apparet augmentum, citissimusque finis.

VIII. Hujusmodi effluvi tum copia, cum perduratio singulis mensibus plerumque aequales sunt, quoniam ceteris paribus, unum remanet per totam uteri superficie appendicum robur, compactio, atque expansio &c., eodemque tempore eadem fuit sanguinis portio, sed hæc aliquoties discrimen pariunt dum densitate, & resistentia appendices nonnullæ inter se differunt; latioribus enim, ut se referent, unius mensis in vermicularibus lactei humoris collectio sufficeret, compactioribus vero necesse erit, ut vermicularia illis propinqua de secundo mense eo duplum turgescant, ut appendices illæ pateant; quam ob rem in his mulieribus vicissim catamenia nunc breviora, & pauciora apparebunt ob aperitionis defectum, nunc diuturniora magis, & uberrima duplicis appendicum aperitionis ergo, eorum scilicet, quæ singulis, & secundis quoque mensibus referantur.

Non desunt in quibus contractæ valde appendices nisi de tertia mensis in vermicularibus congerie sinant aperiri; hinc in illis post duplicem cursum (b) tertius supervenit ex maximo venarum patularum numero diuturnus magis, & consentimus, id pariter confirmant mulieres de secundo vel tertio mense uberius catameniis præditæ, quæ necdum bene se habent, nisi assatim illud a patulis appendicibus copiosum revertat effluviū, eo enim deficiente lumborum gravēdinem persentiant, quæ aliqualem plethoram indicat esse reliquam.

#### IX. Cum

(a) Μέση δ' ἐστὶν πάλαι γυναικὶ χυσιὰς ἑς ὅλιγην, καὶ ἐπιπλεῖν ἐν θέρῃ τῶν καυδῶν δύο Ἀττάλαις, ἢ ὀλίγῃ πλείονι, ἢ ὀλίγοις.

Quasi mulieri, si sana sit, præcedentes menses moderati sunt, qui ad ducuntur Atticarum heminarum mensuram, aut paullo plures, aut pauciores. Hippoc. Lib. I. De morb. Mulier. Cap. 15.

(b) Καὶ πάλαι πάλαι γυναικὶ καὶ ἑκατὸν ὀλίγους καὶ κατὰ μὲν τὴν πρώτην τὴν τρίτην μὲν ὀλίγους.

Raro singulis mensibus menstrua confertim fluunt: mense vero tertio pluribus. Aristoteles. Lib. VII. De Hist. Animal. Cap. 1.

Hoc malum (menstruatio) tricenis diebus in mulieribus existit, & trimestri spatio largus. Plinius in Hist. natural. Lib. VII. Cap. 15.

IX. Cum appendices caecales in sanis subjectis per totum uteri ambitum æque constrictæ, ac elasticæ sint hæc vel simul, vel brevi confectione patere debent, constantem, & æqualem fluxum ab initio usque ad finem producendo; aliquando tamen discrimen oriri poterit ob variam appendicum compactionem per diversas uteri portiones reptantium; nonnulla enim vermicularium defectu referantur, dum alie occluduntur, tunc menstrua per duas vices unico mense erumpunt, quorum intervalla plus minusve diutina erunt pro diversa ratione elaterii appendicum venosarum; nam si copia compactiores numero non præexcellent carum, quæ laxiores sunt, & facile patulæ, primus periodus ubertosis & diuturnus apparebit, contra vero si compactæ appendices constrictiores sint.

X. Menstruus sanguis nihil ab illo differt, qui venas replet; nisi forte paucio inficiatur succo lacteo, qui citra morbum optimæ crasis est, nullumque inquinamentum affert puro sanguini, cui est remixtus. (c) Hypocrates asserit huiusmodi sanguinem maculatæ victimæ fluenti haud absumilem esse; miremur solummodo tot Medicos, & Naturalis Historiæ (d) Cultores ridiculas deleterias proprietates ei perperam tribuisse, neminem discrimen animadvertentes inter naturalem & morbosum sanguinem in utero mora aliæ de causa corruptum.

XI. Admonuimus jam menstrua tum ex venoso sanguine, cum ex lacteo vermicularium succo componi, qui humores ita remixti cum fluere incipiant simul æque desinant, lymphæ cuore continenter infecta in sanis mulieribus minime distingui potest; at si fortuito vermicularium nonnullorum expansio appendicum aperitionem precedat vel constrictio earum illorum coarctationi succedat, vel denique vermicularia citius, quam appendices illæ aperiantur, seriusque obducantur, erunt superventura, in primo casu lymphaticum humorem sanguinem præcedere, verum prosequi, tertio denique fluente lymphæ menstrua incipere, æque desinere huiusce rei exempla frequentissima sunt.

XII. Utero adhuc graves mulieres posterioribus sex mensibus præsertim, sæturi alendo dicatis, omnem lacteum humorem menstruumque sanguinem impendunt, quare nil mirum si illo deficient.

XIII. Altricibus in quibus potissimum multo lacte turgent mammæ omnis lactinosa lymphæ ad eas evehitur, nulla, vel paucissima utero supersitite pro catageniis producendis.

In laboriosis, & rusticis mulieribus, quæ viliori cibo vescuntur parum chyli secernitur, eumque laboris ergo cito absorbitur; in iis uteri lymphæ inops, vel diluta nimis, impar evadit ad menstrua excitanda, arbitror enim hanc causam sufficere ut huiusmodi mulieres sanguineo fluxu careant omnino, ut in plerisque observamus, nisi tamen specialis uteri densitas oriatur, quæ periodico fluxui non parum officiat.

XIV. Catameniorum tandem effluvium quod triginta, & quinque circiter annos persistit quadagesimo quinto, aut quinquagesimo anno sponte sistit, idque duplex simul causa producit, atque ætatis consequens necessarium videtur: primum humor lymphaticus infirma jam, aut imbecilli ventriculi actione, & tenui hinc chyli secreti copia uberius minus, minusque lactinosus secernitur, ut vermicularia dilatare impar sit, quantum opus requirit, ne sanguinis cursus in uteri venas intercipiatur; alterum, venarum fibræ & appendicum præcipue,

(c) *Κυρίως δὲ αἷμα, ὅμοιον αὐτῷ ἰσχυρῶς, καὶ κατὰ ἀνάγκην, ὡς ὕμνησις ὁ γὰρ.*  
 Prodit autem sanguis qualis e videmus, & cito coarctat, si mulier sana sit. Hipp. Lib. I. De mulier. Cap. 15.  
 (d) Columella, De re rustica lib. XI. Cap. 3.  
 Palladius, De re rustica. Lib. I. tit. 35.  
 Plinius, Hister. Naturalis. Lib. VIII. Cap. 15.  
 Aelianus, de animalibus. Lib. XI. Cap. 3.  
 Solinus, in polyhistoria. Cap. 4.  
 Vernelius, Phytologia. Lib. VII. Cap. 7.



cipue, ut tendineis fibris mos est, inflexibilitatem, & duritiem non levem acquirunt, quæ senio continenter increfcit ut appendices sese expandi, explicari, aut aperiri pœnitius renuant; quare vi menstruationem producente in die imminuta, ac simili ratione aucta resistentia debent catamenia sensim sensimque imminui, frequenter cunctari, deficere aliquoties, prorsus tandem abire.

Cum diversus sit in diversis subjectis fluentis sanguinis adventus, incertus pariter erit recessus; plerumque hujusmodi varietates a diversa dependent fibrarum uteri conditione, plus, minusve resistentium, quas a natura mulieres fortiuntur, vela ciborum qualitate, aut quantitate quibus vescuntur, ab vitæ gerendæ methodo, mollis, aut defatigatæ, ab infirmiori, vel constanti sanitate, quam expertæ sunt, a gestationum frequentia, aut raritate cui obnoxia fuere, a climatis temperie plus, minusve callida in qua degerunt &c., evidens erim est diversarum hujusmodi causarum gradum multiplicem aut comparationem admodum retardare, aut promovere senectutis irreparabilia damna.

## §. V.

*Symptomata explicantur in mensuris obvia.*

**H**Æc diversa symptomata, quorum præcipua articulo XIII. §. I. indicavimus, ita legibus menstruationis super allatis colineant, ut eo magis nostræ Theoriæ veritatem confirmari videatur.

1. Dum uterina vasa prope fluxum turgida evadunt, necesse erit novam sanguinis undam per arterias eo evertam, spermaticas, hypogastricas, & hæmorrhoidales &c., per laterales tandem truncos revehi, qui ovaria, tum lata & terretia ligamenta aggrediuntur, tum per tendineas, & musculares hypogastri partes, vaginam, animumque, pudenda undique repunt. Ita sanguinis in his partibus redundantia illic dolorosam tensionem excitando hujusmodi in utero exuberantiæ proportionalem, pubis, inguinum, ac lumborum dolorem parit; vel ossis sacri stuporem, pudendorum tumorem, aut papulas, vaginæ tensionem, calorem, sensumque auctum facit; denique externas, vel internas hæmorrhoides producit, &c.

2. Uterus dum menstrua appropinquantur tumet, atque calet magnopere sanguinis ergo, qui in vasis congeritur, & vesica cui subitus adheret comprimi debet, ac calefieri, ut simul urina ibi stagnans, ex hoc enim urinæ ardor prodit, quo inter mingendum afficiuntur cuique tribuatur vel calori lotio communicato, vel sensui aucto vesicæ collo a proximo calente utero, vel duplici etiam huic causæ, quæ ad hunc effectum gignendum simul concurrat; ex eo pariter procedit frequens mingendi pruritus, vel id contractiones producant vesicæ, quæ ab utero compressa amplius dilatari renuat, vel urinæ ardor collum irritans, vel adaucta sensibilitas, quæ vesicam urinæ stimulis magis obnoxiam redat, vel triplex hujusmodi id præstet causa.

3. Haud raro prope menses urina turbida spissiorque reditur, præsertim cum lymphaticum effusivum sanguineum præcedat, mistumque proinde inquinat; aliquando tamen clara excernitur, quæ paulo post refrigerata, infecta, & crassior apparet. Hoc lymphæ laticinosa producit, quæ a turgidis vermicularibus separari nequit, hinc per vias sanguinis in renibus devecta vesicam intrat, quod nihil officit limpidæ adhuc calenti urinæ; at ubi calor subtilissimas lymphæ moléculas divisas conservat, frigore vero eorum cohesionem fovente, fundum facile petunt, ac urina interea crassa turbida evadit; idem eluones experiuntur in quibus exuberans chylus per renes secretus in vesicam transducitur.

4. Posita maxima e lymphâ lactea vermicularium repletudine, menstruis pro-  
pinqvis constabit facile vasa illa lymphâ repleri penitus renui, ac exuberanti  
lacticinofo humore sanguinem infici, tum continua collectione cetera plerâ-  
que serofos humores eo salutari ut urinam perspeximus, & potissimum mam-  
marum lympham illi analogam, adeo ut illarum vesiculæ ubi hujusmodi fe-  
cernitur liquor eo maxime turgent, ipsamque tensionem, atque tumorem in-  
ducant, quæ in juvenibus mulieribus prope menstrua in mammis apparent.

5. Tunc in plethoricis mulieribus debent partes omnes sanguine infarciri la-  
tiores præsertim, uti pulmo, cerebrum &c., vel quod ibi vasa facilius dilatari  
sinant, vel quod ab uteri infartu retardato in circumpositis partibus sanguinis  
cursus superius crior celerrime se transferat, ab hac porro speciali pulmonum  
compressione suffocationes illæ creberime originem habent quæ menstruantibus  
mulieribus superveniunt.

6. In cerebro vero iisdem de causis sanguinis effluxus nimius pro subjecto-  
rum diversitate dissimiles præbet effectus; in quibus humores densi, & serosi,  
arteriarum pulsus rari, & debiles sunt, cerebri fibras graves, laxasque reperies,  
sopor facile oriri solet; contra vero ubi fluida, tenuia, ferventia ac sitiora  
conspiciuntur, tum cordis, & arteriarum pulsus celeres, crebri reperiuntur, fi-  
bræ ardeunt, & insomnia producuntur.

7. Utroque casu in cerebro redundans sanguis capitis dolorem affert, hoc  
tamen discrimine, quod primum capitis gravedinem faciat, alterum vero di-  
stentionem potius, ac divulsionem pariat, nonnullæ enim mulierum capi-  
tis infertum patiuntur, aliæ de vibrationibus quibusdam, aut ictibus con-  
queruntur.

8. Uterus in nonnullis catameniorum tempore distenditur, & inflatur ita ut  
dolorem inducat cujus impressiones spiritus cerebrum versus depellentes mulie-  
res delicatiori sensu peditæ dormientes, protinus spectris e somno excitentur,  
præsertim si, menstruo fluente, uteri colicis insulubilibus sint obnoxie.

9. Varia sænomena quæ catamenia præcedunt ab infartu sanguineorum vaso-  
rum omnino dependent, nam vermicularium repletio, quæ, pro eorum exi-  
litate, sensim fit, & exigua copia, necdum sensibiles effectus producere va-  
leret, nisi sanguinea vascula diebus eruptioni proximis maxime turgent,  
quando vermicularia summum jam plenitudinis gradum attigerunt, neque sym-  
ptomata illa patrant, quæ a sanguineo affluxu oriri experientia docuit; pri-  
mo igitur, aut secundo ante effusionem die in iis in quibus appendices ver-  
micularium pressioni facile cedunt; ter, quaterve in illis, quarum appendices  
serius difficillime referantur, hæc omnia videbis.

## §. VI.

### *Ufus catameniorum.*

**H**Astenus exposita ostendunt fluxum menstruum unoquoque mense  
I. Dilatare, inflare, ac rarefacere uterum, ut conceptioni magis idoneum  
evadat, in posterum enim apparebit, ipsum rarum, porosum esse oportere, ut se-  
minales moleculæ illius contextum facilius subeant.

II. Verum extendere, producere, atque aptare venosas appendices ut placen-  
tæ villi in ipsas inferantur, & sætus proinde cum utero nectatur, infra poro  
constabit illas productas, ac placentam pervadentes sætui præcipuum nexum cum  
utero suppeditare.

III. Denique explicare, & referare vermicularium ostia, venosofque proces-  
sus pro sætu alendo, nam per eorum orificia patebit infantem, sanguinem,  
chyleumque nutritium accipere.

IV. Fovere tandem, atque augere fibrarum robur, ac flexibilitatem, ut paratus bene se vertat; evidens itaque erit tunc interesse colli fibras flecti, & relaxari, fundi vero contrahi, atque arctari magis.

Clare enim patet menstruationem generationi non modo proficere, imo necessarissimam esse; naturæ porro beneficentissimus Auctor huic molestiæ feminas subjecit, ut facilius concipere, foetum alere, altumque parere valerent.

In hoc experientia rationi collineat: raro tamen, ac pene impossibile est mulieres quibus continenter desinunt, aut aliquoties catamenia suprimuntur, concipere, fructum incolumem servare, vel absque periculo parere; id commune confirmat adagium, *qui floribus caret, fructus desiderant*, quod significat feminas menstruis orbis foetum frustra expectare.

Quidam opponunt brutorum plerumque femellas menstruo deficere, hoc tamen defendere potius, quam contendere videtur catameniorum necessitatem; neque magnifacio exemplum Simiarum, aliorumque animalium, quæ huiusmodi fluxu donantur; mæ enim sententiæ maxime favet brutorum femellas omnes coïctu proximas stillicidio præditas esse lymphatico cruento, qui muliebrem menstrum ferbelle æmulat, etiam si in illis femel, vel bis in anno ipse tantum revertat, parum vel nihil sanguine infectus, qui vera catamenia constituit, unicuique animali idonea, & similes utilitates præstat, ac uberrima in mulieribus menstrua suppledat.

Hæc explicationem præbent cur catameniis prorsus orbatæ mulieres pluries tamen filios pepererunt; suspicari enim licebit auctores nonnullos, qui id observasse asserunt, parum admodum sedulos fuisse: cruenti porro fluxus defectu decepti, mulieres illas menstruis penitus carere statuerunt, ac indagare neglexerunt ipsas lacticinofo, sanguineo vix, donari fluxu, qui in ratione temperamenti, uteri constitutionis, vitæ gestæ, catameniorum munere fungebatur, & brutorum more mulieres satis secundas reddere potis erat.

Sed si intimius rem perscrutabimur, apparebit, rusticas, & laboriosas mulieres, easque omnes quibus continenter, & absque sanitatis noxa cruentum deest effluvium, quæque *viragines* dicuntur, suis tamen menstruis pollere. Id ostendit in rebus Medicis, aut Phisicis dum sedulo inquiramus continuo imminui mirabilium numerum; ac proinde constantem, & universalem menstruationis legem a natura institutam jugiter confirmari.

Nihilo tamen minus putarem fluoris ubertatem quam in plerisque observamus, a natura non parum aberrare; constat enim rusticas victu sobrias mulierum respectu in civitate degentium, uberrimis minus catamenis gaudere; verum qui per silvestres peragravit nationes referunt, mulieres nullas, vel paucissimas illuc menstruis donari: id asserit Lærius (a) in *Topinamborum* regione observasse, Carletonus (b) apud *Tapijas* in Brasilia, Peclinius (c) in Groelandia; quod argumentum præstat id mulieribus naturaliter commune esse, quare illæ, quæ prima vivendi simplicitate persistenter, iis beneficiis frui valuerunt, quæ natura ipsis largita erat; at si mulieres nostrates, quas cultas appellant, catameniis copiosis, & molestis sunt obnoxie, mollis vitæ gerendæ methodo erit tribuendum, quæ naturæ constitutiones pervertit, atque earum calamitates multiplici ratione augeat.

## C A P U T III.

*Prima catameniorum eruptio, & antecedentium, aut concomitantium symptomatum.*

## §. I.

*Descriptio.*

**I**N juvenibus mulieribus, quæ pubertati proximæ fiunt, & naturæ conatus jam persentiunt eruptionem promoventes, quinque dantur circumstantiarum gradus tum uterum ipsum cum reptantia vasa respicientes; unusquisque gradus vel simplex considerari potest, dum unicus in utero apparet; vel compositus dum plures gradus intensione, & extensione diversâ simul copulantur, ut novas mutationes ibi valeant procreare, quæ novas etiam symptomatum, aut morborum species producant.

Priores hic simplices eruptionis gradus enunciare sætegitus; compositos vero innumeros sufficit indicare, quorum explicatio, & curandi methodus a simplicium explanatione, & indicationibus infra proponendis facile deduci possunt.

*Eruptionis gradus primus.*

Tunc omnia primo sanguinis scaturientis fluxui maxime favent, tum ex parte vermicularium jam patentium, cum venosarum appendicum, quarum appendices facile, citoque lacteorum vasorum comprimentium auxilio explicantur, referantur, aut obducuntur quantum opus requirit: ex iis consequitur;

1. Menstruum fluxum procul omnem dolorem, aut molesta sænomena incipere, vermicularium, & appendicum facili aperiitione, atque occlusione, ut menstruationis negotium placide, leniterque se vertat.

2. Catamenia ortu suo minus uberrima apparere, vel quod appendices nondum dilatentur, vel quod extremitates earum, quam par est, nondum patulæ fiant.

3. Illa serius scaturire, brevi desinere lactinosi humoris inopia, qui segniter, minusque replet vermicularia vasa, vel appendicum rigiditate, quæ spæsas explicari, aut patefieri nonnihil impedit.

4. Hæc omnia tamen, nullo obstante sænomeno, sexto ad summum mense ad libellam se ponere, & menstrua ubertatis periodorum, & durationis ratione æqua constanter permanere.

Hoc felici eruptionis gradu puberes juvenes tantum fruuntur.

1. Præsertim quæ proceræ fuere, & optimo donatæ corporis habitu, neque prima juventute strumis, aut chronicis morbis fuerunt obnoxie.

2. Quæ hilares sunt, & sanguineo præditæ temperamento tum salubri, sed simplici vescabantur cibo, neque obstrutionibus umquam uteri, aliorumque viscerum laborarunt, in quibus a firmo ventriculo optima perfecta est digestio.

3. Quæ nisi prope decimum quintum ætatis annum fluxus indicia conspexerunt, quando uterus conditionibus omnibus pollebat eruptioni necessariis, absque quo calidis remediis, frixonibus, aut lubricis cogitationibus immature excitaretur effusio.

4. Tandem dum mammæ sorores factæ indicabant uterum pari conditione gaudere, quæ potissima erat, ut facilis, & naturalis catameniorum eruptio superveniret.

*Eru-*

*Eruptionis gradus secundus.*

In hoc statu vermicularia rigida, & exilia nimis remuunt lacteo succo repleri, tum uteri venæ, earumque processus compacto matricis contextu compressæ sanguinem respuunt, quo inflari deberent. Hæc cum uteri actione comparata ostendunt,

1. Naturæ conatus in iis mulieribus quandoque inutiles evadere, tum vermicularium exiguo numero, cum appendicum duritie renitentibus.

2. Hujusmodi nîsus in illis neque pondere, neque tumore, aut collico uteri dolore manifestari, vel ea ita lenissima evenire, ut parum, vel nihil uteri vasculis inflatis vix sensibilis distensio appareat.

3. Plura tamen symptomata oriri, quæ vel ab exuberanti lacticiniosa lymphæ, qua tunc sanguis saturatur, vel a cuoris redundantia in vasis ab utero reductis dependent.

4. Lympham lacteam a vermicularibus refluxam cum mammarum lymphæ haud diversâ copulatam, quam maxime sinum inflare, atque tendere.

5. Illam salivæ remixtam ipsius actionem perturbare ita, ut vulgarem ciborum gustum pervertat, ac ventriculus vilissima poscat alimenta, quod *Picam*, aut *Malaciam Medici* vocant.

6. Eandem lympham gastricis succis copulatam eorum virtutem obtundere, multiplicem indigestionis speciem inducere.

7. Sanguinem supra diametrum in vasis coacervatum latiora viscera, minusque resistentia tumefacere.

8. Hujusmodi infartus pulmones aggredientes, deliquia, hystericas suffocationes, ac sanguineos excreatus quandoquidem generare.

9. Seri, aut sanguinis in cerebrum redundantis copiam in ratione tenuitatis, aut spissitudinis hujusmodi humorum plus, minusve cerebri substantiam, ejusdemque membranas infestare, ut capitis gravedo, aut divulsio, sopor, insomniæ, motus convulsivi, & epileptici facile oriantur.

10. Similem tandem intra tunicas, muscularene substantiam, aut adiposam telam humorum exuberantiam spontaneas lassitudines atque die pedum, noctu faciei tumorem excitare.

His rebus sunt obnoxia mulieres,

1. Quæ citiori corporis habitu, fibris rigidis, atque uteri compacto, exilique contextu donatæ sunt.

2. Quæ uteri, aut viscerum hypogastricorum obstructions passæ sunt, quæque strumoso fomite sanguinem habent deturpatum, aut infantia, vel pubertate morbos plurimos substituerunt.

3. Quæ catamenis non a spontaneis naturæ conatibus excitatis, sed remediorum potius violentia perperam applicitis lubricis titilamentis, lecturis obscenis, venustulorum consuetudine, atque impuris cogitationibus concitatis donantur.

4. Quæ tandem viliori altæ cibo, sordibus vescuntur, & melancolia corripiuntur molestissima, ab animi patematibus veris, vel futilibus confirmata.

*Eruptionis gradus tertius.*

In hoc statu vasa vermicularia explicantur, sinuntque ingressum lacticiniosæ lymphæ, eorum tamen orificia aperiri renuunt, ut periodicus fluxus exoritur, appendices venosæ pariter, a vermicularibus compressæ, satis sanguine turgent at earum extremitates compactæ minime referantur, ut sanguis methodice erumpat.

Evidens enim est

1. Tunc temporis puberes scœnomenis omnibus vexari, quæ præcedunt catamenia, aut illa comitantur, nam vasa tum lactea, cum uteri sanguinea simili reperiuntur constituta ratione, ac prope menstrua; quinimo illa symptomata diuturniora, atque infesta magis apparebunt, effluvii deficientia, quæ vasorum plenitudinem confirmat.

2. Vaporibus, & hysteriis insulibus juvenes perturbari, & partium mirifico consensu utero jam dissentio, distratoque motus convulsivos excitari, ut infra de hysterismo loquuturi explicabimus.

3. Superaddi symptomata omnia, quæ in secundo eruptionis gradu sunt obvia, vel id exuberans in sanguine lymphæ producat, vel sanguinis in vasis repletudo, dum hi humores crumpi impediuntur.

4. Hujusce eruptionis gradus proprium esse venosas appendices dilatare, atque varicosas reddere diutina distensionis ergo, tum longa lymphæ lacticino sæ mora in vermicularibus ispissata firrhosos in iis tumores procreare.

Hiscæ plerumque affectibus laborant illæ, quæ

1. Sæpæ natura orificiis pollent appendicum, ac vermicularium compactis magis, rigidis, atque obstructis, quæ expandi nimis renuunt.

2. Intimam uteri telam densam, spissamque habent, quæ orificia illa circumvestientem magnopere arctat.

3. Scœnomenis secundo gradu obviis per aliquod temporis spatium fuerunt obnoxie, tunc enim vermicularia, & venosæ appendices sanguinis, aut lymphæ affluxu extenduntur, dum orificia minime dilatationi cedunt.

#### *Eruptionis gradus quartus.*

Tunc vermicularia vascula lacteo humore, & venosæ appendices sanguine repleantur, ut in postremo casu accidere compertum est; hoc tamen discrimen oritur, quod sanguis ex appendicibus in utero copiose erumpat dum vermicularium ostiola penitus obturata, neque minimam humoris lactei guttulam effundunt. His, adductis facile apparebit,

1. Tunc uberrima valde menstrua experiri mulieres quia turgentia vermicularia continenter venas comprimunt, coguntque sanguinem affatim per venosos processus sibi pandere viam.

2. Simili ratione diuturniora menstrua esse debere e vermicularium continua pressione in venis sanguinem retinente ut ipsarum orificia patula ductus persistant.

3. Catameniorum regressus crebriorem apparere, cum vermicularia nedum exinaniantur, ac propinquas venas constanter circumcingant, ut nuperrimo sanguinis affluxui, eruptionique facile occasionem præbeant.

4. Haud infrequenter catamenia morboſi fluxus speciem tunc referre, quod prænuñciabimus quoties ea uberrima, diuturniora, & creberrima valde confixerimus.

5. His de causis mulieres plerumque laxas, graciles, ac emaciatas evadere, & constanti sæpe sanguinis inanitione laborare.

6. Lympham vero lacteam in vermicularibus retentam, cum separari impediatur in sanguinem reducem, ea omnia necessario suppeditare scœnomena secundo gradu n. 4. & 5. superallata.

7. Ibi lympham illam stagnantem continua mora ispissatam sæpe firrhos producere, quas n. 4. gradus tertii indicavimus.

8. Tandem, eorum symptomatum complexu persistente, mulieres laxitudine, ac pallore corripì, tum gustu inordinato, viscerum hypogastri, obstructionibus,

bus, hydropse laborare, atque in ea infirmitate labi quam *Cacherxiam* Medici dicunt.

Experientia didicimus id illis supervenire, quæ

1. Perperam violentioribus emenagogis usæ sunt, dum tertio laborabant eruptionis gradu, tunc enim sanguis iis concitatus remediis cogit venosas appendices aperiri, absque quo vermicularia referentur, quæ a lymphâ nullam ipsorum medicamentorum vim persentienti minime excitantur.

2. Tertio existentes gradu a vehementiori corporis exercitio laceffitæ, aut feбри correptæ fuere, ut sanguis celerius per vasa percurrens, appendices aperuisset vermicularibus adhuc obiectis.

3. Sanguine donantur acri minusque fibroso, ut tenuitatis ergo facile pervenarum extremitates effugiat, aut illas corrodendo brevem sibi aperiat viam.

#### *Eruptionis gradus quintus.*

Hujusce status effectus eorum quarti gradus inverso ordine eveniunt, videlicet maximus vermicularium numerus in utero patefcunt, & absque mora ibi confluentem lympham effundunt, appendices vero nullam a vermicularibus pressionem patientes parum vel nihil expanduntur, quare ex iis facile statui licebit;

1. Tunc mulieres venosis oculis appendicibus rubris minime donari catamenis, aut dilucentiori tantum colore infectis patentium appendicum paucitatis ergo.

2. Diutius retardari rubri sanguinis refluxum lactinosi humoris defectu, qui per varios anfractus peragrando difficiliter ea congeritur copia, ut appendices valeat comprimere, & rubrum superveniat effluvium.

3. Nullam hanc menstrui inopiam inferre uteri gravedinem, tensionem, aut colicum dolorem, cum nullam supponat vel lacteorum, vel sanguineorum vasorum repletudinem, quæ id parere possit.

4. Hunc gradum jugiter albo fluore comitari ea lymphâ composito, quæ ex laxis vermicularium ostiolis erumpit: persistit ille donec orificia patula existant, intercipitur si ea per vices obducantur, ac ubertatosus plus, minusve fluor appareat in ratione facillioris aperitionis necne, vel numeri patentium vermicularium.

5. Pertinax hujusmodi humoris dispendium, præsertim si uberrimum sit, patientes emaciare, appetitum lædere; viresque debilitare ita, ut tandem cacherxiam, & quæ eam consequuntur noxiam symptomata facile inducat. Hæc experiuntur quæ

1. Phlegmatico temperamento præditæ sunt aut cronicorum morborum calamitate, vel attenuantium remediorum abusu sanguine dilucentiori donantur.

2. Fibris sponte laxis, & membranæ ex iis contextis imbecilibus gaudent, quare intima etiam uteri tunica impar evadat quantum necesse est vermicularium orificia firmare, ne per ea sanguis elabatur.

3. Postremis ante eruptionem annis titilamentis pudendorum spontaneis, vermicularium orificia tentarunt, donec sensim sensimque laxiora facta sint.

#### *Eruptionis gradus complicatus.*

Hic potissimum dependet a duorum, trium, vel quatuor simplicium graduum complexu, at cum eorum comparatio multiplex valde esse possit, difficillimum erit singulas determinare, præsertim cum ex componentium explanatione compositorum uterque facile deducatur, sufficiat enim hic animadvertere:

1. Unumquemque compositorum gradum in duo tresve &c. simplices gradus

*Astruch de Morbis Mulierum.*

B 2

recol-

resolvi, quod magnopere faret symptomorum explicationi, aut morbi medellæ.

2. Sufficere etiam gradum pendere tantum qui ceteris in compositione præcellit; nam hunc modificando præcipuum uteri defectum, summa quam habent inter se ratione, ceteros facile, tum morbos, cum matricis læsiones subjeceris,

### §. II.

#### Diagnosis.

**P**rimum itaque Diagnosis objectum eo collineant, ut quinos uteri status, qui prope menstruorum effusionem in mulieribus reperiuntur sedulo, agnoscamus; alterum detegere nostrum erit causas omnes, quæ hæc varietates producant, ac persistere faciant.

1. *Prioris indaginis respectu natura eorum, quæ præcedunt catamenia, aut iis copulantur satis intimam uteri constitutionem ostendit, modo paulisper examine cunctemur.*

1. *Primus tunc præsens erit eruptionis gradus quando puberes procul dolorem, colicos affectus, aut graviora symptomata catameniis gaudere incipiunt.*

2. *Quando sinus in illis jam tumescit, ac sensim ipsæ menstruis orbatæ pallidæ fiunt, tum uteri tensionem, pondus, aut dolorem perferant, evidens est secundum oriri eruptionis gradum.*

3. *Dum mulieres nuper descriptæ menstruis deficiunt, pallescunt, atque adeo tensionem, tumorem aut colicum uteri dolorem periodice revertentem crebre patiuntur, vel levi quandoque albo parum cruento donantur effluvio illas tertium experiri gradum fateberis.*

4. *Si puberes copioso nimis, diutino, ac frequenti sint fluxui obnoxii usque dum sanguinis amissio morbosa videatur, ac pallidæ valde, & choroticæ fiant, tunc quartus apparebit eruptionis gradus.*

5. *Cum tandem mulieres pro copioso, & cruento methodico fluxu, album continenter effundant, vel per intervalla interceptum, aut continuum, modo tamen æque & periodice incrementem, modo non, tunc quintum nascisci eruptionis gradum suspicari licebit.*

II. *Secundo loco venit inquirendum causas diversas uteri gradus producentes, quare indago admodum incerta est, nisi ægotantium sedula narratione deducantur, ac frequenter aut ignorantur, aut obliviscuntur, aut illa abdunt, quæ circa hanc rem lumen suppeditarent; plerumque tamen ab innata uteri textura diversi hujus ægritudinis gradus solent derivare, etiamsi in hac diagnosi parte conjecturis potius fidere coacti simus; id tamen pauci faciendum, neque multum influat in remediorum selectum, quem patentia uteri symptomena clare postulabunt.*

### §. III.

#### Prognosis.

I. **N**aturæ valde consentaneum erit menses decimoquarto, aut subsequenti ætatis anno facile absque molestia erumpere; id optimam prænunciat fibrarum, tunicarum, atque uteri constitutionem, verum felicissimos promittit fecunditatis eventus.

II. *Contra vero infantum erit, si mulieres primo hoc eruptionis gradu aliqua deficiant necessaria conditione, si menstrua citius, vel ferius, quam par est, superveniant, si plura tunc noxia symptomata appareant, hoc non solum infirmæ uteri constitutionis certissimum indicium præbet, verum experientia constat*



constat hujusmodi mulieres toto suæ vitæ curriculo pertinacioribus plerumque esse obnoxias morbis, laboriosis catameniiis pollere, ac paucos, vel imbecilles foetus gerere.

III. Ex iis facile prognosis institui potest, quæ in puberibus specialem uteri conditionem spectat; prior convenientissimus est eruptionis gradus, qui omni procul fastidio sponte apparet; ceteri quatuor qui aliqua orbantur sanitatis nota, plus minusve morborum sunt.

1. Secundus menstruorum gradus ubi tum lactifera cum sanguinea vascula humore sunt exhausta, ac patientes pallidæ fiunt, nullamque tumorem, tensionem, aut uteri dolorem sentiunt, ceteris minus molestus, aut periculosus evadit, ab aliquali enim uteri densitate dependet, cui ætatis incremento facile medetur, neque ullam lacteorum vasorum obstructionem, aut sanguineorum expansionem inducit.

2. Tertius fluoris gradus binis subsequenter minus incomodum erit, nam quamvis utriusque generis vasa maxime turgant, ac puberes uteri dolorosificationibus, aut corporis pallore corripiantur, nihilo tamen minus sponte, si paululum cunctaberis, menstrua feliciter supervenient, naturæ conatibus excitata, neque ullam ab iis fœnomenis noxam suspicaberis, quia facile remediis obstructiones hinc ortas poteris præcavere.

3. Quartus, & quintus uteri gradus laboriosi magis ambo, & difficiles apparebunt, diversa tamen ratione de iis singillatim pronuntiabimus; ille enim, dum menses uberrimi nimis diuturni persistunt, periculosus magis est; postremus, in quo continenter albus humor effunditur, recidivus magis, & periculosus videtur.

#### §. IV.

##### *Medendi ratio.*

**P**rimus effusionis gradus nullum postulat remedium, omnis naturæ committitur; secundus, & tertius ad menses suppressos pertinent, quartus parum, vel nihil distat ab inordinato catameniorum fluxu, aut morbo ex utero sanguinis jactura; postremus cum fluore albo maxime convenit, quare ne crambæ repetamus, singulorum medellam subsequenter capitibus exponemus; secundum tamen, & tertium excipiemus magis obvios, circa quos cautelas potius enuntiabimus, quæ primam mensium eruptionem fovent, illas præsertim, quæ remedium exhibitionem respiciunt.

1. Cum præcipua hujus morbi causa sit nimia uteri compactio, ac vasorum potissimum utriusque generis, quæ relaxari renuunt, ideoque primum oportebit humectantibus, laxantibus, & emollientibus remediis firmum uteri contextum relaxare aliquantulum.

Si tunc cutis rigiditas, ac pulsuum elasticitas postulaverint, tum ventriculi conditio permiserit, præscribi possunt

1. Jura ex pullo gallinaceo, aut virulo confecta, in quibus ebulliant radicum Althææ, Fragaræ, aut Cichoræ silvestris singularum unica, tum foliorum Boraginis, Buglossi, Lactucæ, ac Dentis Leonis singulorum manipulus, quibus addi potest salis Prunellæ, aut Crystalli mineralis drachma una.

2. Verum decoctiones ex similibus plantis peractæ, quibus adjungi potest uncia una vel semis syrupi violarum, portulacæ aut nymphææ.

3. Emulsionem dilutiorem filtratæ, vel etiam coctæ ex semis uncia seminum Melonum mundatorum cum aqua graminis, aut hordei peractæ, addito aliquo ex syrupis superallatis.

Contra vero si pulsi imbecilles, & inæuales apparuerint, aut ventriculus refrigerantia respuerit, substitui poterit serum lactis repurgatum simplex vel plantis amaris corroborantibus remixtum, quale sunt Chamædrys, Chamæpitys, Absynthium &c. aut ferri extinctione chalybeatum; verum si opus requirat solo lactis sero per B. M. destillatio uti poterit absque plantarum additione, vel saltem refrigerantibus additis, aut leviter vulnerariis, pulsum, & sanguinis conditioni ratione habita.

In utroque porro casu tepente aquæ fluviatilis balneo, aut semibalneo mane, & vespere, mane tamen utilius, agram laxare oportebit, tum ex lavacro exeunti apozemata vel emulsiones magis congrue poterunt exhiberi.

II. Cum altera menstruum segnitiei causa a sanguine densitate, aut lentore dependeat, ut ejusdem nifus contra renitentes venarum parietes impar sit per eas appendices sibi pandere vias, necesse itaque erit postquam solidorum laxantia adhibita sunt, solventia, & aperientia amplecti remedia, quæ Emmenagoga dixerunt Medici; verum a mitioribus erit incipiendum sensim sensimque ad efficaciora gradum faciendo usque dum morbi pertinacia absque noxæ metu postulaverit. Hic usitatiora gradatim proponam, & singulis dosim magis idoneam apponam.

Aqua ex rubigine chalybeata,  
Vinum chalybeatum

Tartarum martiale solubile

Crocus martis aperiens

Limatura chalybis porphyrifata

Ethiops, vel crocus martis aqua paratus

Tinctura martis

Terra foliata tartari

Ethiops minerale igne paratum

Galbanum

Sagapenum

Gummi ammon.

pro potu ordinario  
ad 3 IV jejuno stomacho

a gr. XXIII ad gr. XX

dos. antecedentis

a gr. XV ad gr. XX

dos. antecedentis

a guttis XXV ad gutt. XXX

a gran. XXX ad 3 5.

dos. antecedentis

a gr. VIII ad XXX

Ex iis pharmacis diversimode inter se copulatis Opiata, Bolos, Pillulas, atque Rotulas parant ægrotantium gustui accommodatas, at circa hanc rem subsequens capitulum consulere poteris ubi de catameniiis suppressis, aut imminutis loquutari, de iis singillatim pertractabimus.

III. Frequenter accidit, quod non modo vicissim humectantia, & laxantia, nunc aperientia, & solventia, sed simul copulata exhibeantur ut validius agant, ex. gr.

1. Decoctiones ut supra paratæ in quibus infundantur nodulo inclusa limaturæ Chalybis aut Croci martis aperientis 3 i. vel similis dosi Arcani duplicati, aut salis mirabilis Glauberi, vel tartari martis aperientis gr. XX. vel tinctura martis gutt. XX. aut XXV.

2. Apozemata ex iisdem plantis parata quibus adduntur simili quantitate sal mirabile Glauberi, vel arcanum duplicatum, aut tartarum solubile martis, verum etiam terra foliata tartari, aut globus chalybeus infunditur, donec nigro colore inficiantur.

3. Serum etiam optime depuratum in quo solvantur tartari martis solubilis gr. XX., aut tincturæ chalybis gutt. XX. vel XXV.

4. Optimum sane erit consilium dummodo anni tempestas idonea sit aquas minerales ferrugineas exhibere in Gallia obvias, vel nostrates, si Italici hoc libet.

bellum pervolvere contigerit. Gallia selediores sunt illa quæ prope *Valis*, *Campaniae*, *Camareti*, *Ferges* &c. verum solutivæ addi possunt thermarum *Viebi*, *Bourbon*, *Balaruc* &c.

IV. Hæc tamen medicamenta ut efficaciora experiantur, sedulum vitæ regimen ipsis conjungi debet.

1. Quare agris nisi optimis cibis ac facilis digestionis uti permiseris, quos ventriculus subigere valeat; depravata alimenta omnia interdices, quæ appetitus inordinatus poscit, hac methodo chylus ubertus magis secretus tum lymphæ lactæ copiam augebit, cum sanguinis densitatem corrigit.

2. Agravas admonere ut jejuno stomacho spatentur, tum rhedis, aquis, choreis vel ludis corpus exerceant, quibus motus sanguinis fit velocior, atque spissitudo imminuitur, tum validiori nisu cruor in uterum irrumpit.

V. In hac tandem medendi ratione caute incedendum erit, neque sequentes oblivisceris animadversiones, tibi mensum eruptioni consulenti maxime necessarias.

1. Nedum hyeme vel autumno menstrua provocabis, tunc enim solida nimis rigida, fluida spissiora reperies, quare ver, aut æstatem deliges.

2. Naturæ conatibus potius erit fidendum quæ morborum medicatrix est potissima, quam remediis efficacioribus noxis plerumque, aut incertis.

3. Itaque sufficiet naturam segnem mitioribus sollicitare remediis, ac ab illa, cunctando, salutares effectus attendere, secus si vasa referari invite cogeris, molesta erunt superventura sanomena.

4. Lenientia tantum purgantia exhiberi intererit; etiam si serotina videatur valetudo; nam cito convalescent si integre, at si emetica, aut drastica fortiora adhibere opus erit, ea nisi ad rem erunt exhibenda, circa quæ caput subsequens consuleris.

5. Emenagogis addi possunt remedia antistruosa dum struosum in sanguine fermentum suspicaberis, quod humorum densitatem intendat.

6. Dum in menstruis medendis cunctamur, nihil erit negligendum ut ventriculus roboretur, digestio promoveatur, ac chlorosis symptomata impinuantur, ea de causa præscribi possunt modicus in prandio vini usus, in posterum aqua chalybeata, infusum rhabarbari sine igne patratum, tum decoctio vinosa absinthii, aut aquosa baccarum juniperi; exhiberi simul possunt jejuno stomacho extractum juniperi, aut cortici percuriani, vel guttur aliquot quintæ essentia absinthii aut elixiris proprietatis sine acido parati coclear unum; denique etiam elixiris proprietatis destillati *Garut* vulgo, vini tantillo aut aquæ torius citri remixti similis dosis.

7. Prout atas, & ægrotorum opus requirant diversæ, flebothomix species conveniunt: pedum venæ sectio sapissime magni momenti est, quando omnia ex parte uteri ita disposita sint, ut motum sanguinis ibi affluentis tantummodo accelerari intersit; hunc morbi gradum indicabit modica uteritensio cum pulsum lentore, & exiguitate conjuncta; noxiam vero hanc venæ sectionem experimur dum repentina in utero vasorum sanguineorum repletudine ea comprimuntur, ita ut invicem dilatari impediuntur; tum brachium coclear oportebit ut (a) Riverius admonet, quod indicabit pulsum plenitudo, & frequentia, cum uteri dolorosa tensione consociata. His circumstantiis exceptis, nisi qua urgens postulaverit causa, caute erit incedendum circa hujusmodi venæ sectionem in catamenii segnioribus.

8. Connubium tandem juvenibus mulieribus commendare fas est menstruis oribus, quibus certissima erit medella: id plerumque illa promovet, atque confirmat,

(a) Observe-Cons. 2. Observa. 2.

mat; vel saltem prima gestationis occasio, aut partus rem expediunt, si primæ naptiæ impares fuissent.

*Remedia usitiora primam sanguinis eruptionem promoventia.*

I. sequentes rotulæ frequenter usuveniunt

R. Sachar. comm. ℥ IV; ebull. 5. acq. quant. ad dimidiam syrupi spissitudinem add.

Cinamom. f: p: ℥ III

Linat. chalyb: ℥ 5.

Coquantur omnia ad conservæ consistentiam, quæ supra marmor extensa in tabellas sexdecim scindantur.

Hujusmodi unam assument patientes mane jejuno stomacho; vel si morbus poscat alteram post meridiem, & tertiam edant quarta a prandio hora, quibus theæ infusi aut pthisanæ poculum superbibant.

Earum usus quantum lubet produci potest lenitatis ergo, & cum parum alvum ciat agras aliquoties purgare oportebit.

II. Ut drastica omittas, sequentes rotulas cathartica virtute donatas exhibere poteris.

R. Foliorum, aut folliculorum fennæ ℥ II.

Ebull. cum aquæ Oenephero, ac decoctione percolata add. sacch. comm. ℥ IV

Cinamom. f: p: ℥ 5.

Martis aper. ℥ I

Coquantur omnia ad conservæ consistentiam quæ supra marmor cinamomeo pulveri, aut saccharo confersa in sexdecim partes scindantur.

Hæ tabellæ superallata exhibeantur methodo; excipiatur tamen pomeridianum tempus, ne alvus noctu ciatur.

Hoc medicamentum modice purgare constat; quare si ipsius eccopropticam vim intendere lubeat, brevi intervallo dosim duplicare, vel fennæ quantitatem in nova preparatione augetote.

## C A P U T I V.

### *Catamenia suppressa, aut imminuta.*

#### §. I.

#### *Descriptio.*

**M**enstrua suppressa dicuntur, dum pubertatis tempore penitus absunt; imminuta vero quum uberrima minus, breviora, aut rara apparent.

Consuetudini igitur consulentes mensium suppressionem *naturalem*, non *naturalem*, aut *præternaturalem* dicimus. *Naturalis* appellatur si fluxus quadragesimo quinto, aut quinquagesimo ætatis anno secundum naturæ leges sponte desistat; *Non naturalis* dicitur gravidarum, aut altricum in quibus naturæ provisione suspensa

*spenditur. Præternaturalis* in iis reperitur suppressio, in quibus citra gestationem, lactationem, aut ætatem consistentem menses desinunt; hujusmodi suppressionis species morbosa est, de qua tantum hic sermonem instituemus; nihilo fecius dum ejusdem causas proponemus, eas obiter indicabimus, quæ ceteras suppressionis species producere valent.

Catameniorum imminutio tripliciter considerari potest, in ratione videlicet ubertatis, persistentiæ, aut frequentię, quibus invicem menses diversimode comparabuntur, &c.

1. Dum fluxus inops, aut brevis, aut rarus in diversis subjectis apparet.
2. Quando triplici duplicata ratione revertit, cum nempe effluvium uberrimum minus citius desinat, vel minus copiosum rarius apparet, vel rarius revertens citius desistat.
3. Multiplici vero ratione, dum uno eodemque subjecto simul rara, breviora, minusque uberrima, erumpunt catamenia.

## §. I I.

*Causæ.*

**M**enses *suppressi*. Ex naturæ legibus superiori capite enunciatis consequuntur; omnes eorum causas referri tribus classibus, quarum prior vasa vermicularia respicit, quæ cum repleti renuant, propinquas venas comprimere imparia evadunt; *altera* venas uteri spectat, quæ etiamsi comprimantur a circumpositis vermicularibus, nequeunt tamen satis inflari, ut a seipsis valeant referari; *postrema* ad sanguinem pertinet, qui debili nisu in venas ac appendices præsertim irumpit, neque per earum extremitates erumpere potis est: singulas nunc speciatim examinabimus.

1. Plures adsunt causæ quibus vermicularia lactea lymphæ repleti impediuntur, ut proximas venosæ appendices pro mensum effusione dilatentur.

1. Si hujusmodi vasa suapte natura exigua nimis, densa, aut compacta sint, ut lymphæ ingressum respuant, possunt sane illa vel originaria hac dispositione primam implicare, aut retardare eruptionem, vel ipsam in consistentibus mulieribus penitus intercipere, quando ætatis ergo vasa maxime coarctantur, æque cum hæc vasorum dispositio nequeat per intervalla renovari, nullum locum habere potest in illis, quæ semel mensuris donatæ fuere, in quibus hæc reverti debent.

2. Si ea vasa omnia, aut ipsorum maximus numerus sit obstructionibus implicatus a lymphæ syrthorum more inspissata, aut a vasorum sanguineorum infartu compressus, ut in earum partium inflammatione evenit, aut erosus supuratione ulcerum more; hujusmodi triplex est potissima suppressionis causa.

3. Si lymphæ lacticinosa vel illa non intret vasa, vel pro inopia ipsa non repleat, quod accidit:

1. Dum sanguis in male-affectedis aut a morbo recentibus lacteo deficit humore, qui citra molestiam tunc suppressionem pariet.

2. Dum ea lymphæ labore, venæ sectionibus, aut crebris purgationibus dissipata incompletam gignit suppressionem.

3. Dum mammas in nutricibus aggreditur, quam non naturalem suppressionem vocavimus.

4. Quando denique alio, aut continuis diarrhæis, aut hemorrhagiis disperditur, innoxiam, aut imperfectam suppressionem producendo.

4. Si lymphæ lactæ quantum in vermicularibus colligitur, tantum in utero. per eorum expansa nimis orificia stillet, vel albus persistat hujusce humoris fluor, quem vera suppressio erit subsequutura.

II. Similis extat caularum complexus venas, & venosas appendices implicans; quarum expansionem, autque productionem impedit, ut compressæ nequeant tamen referari.

1. Tunicarum resistentia densitatis ergo potissimum dilatationi officit, at id ætatis, aut conformationis consequens est, quod in puberibus tantum primæ eruptioni obnoxiiis, aut in consistentibus mulieribus jam catameniis defecturis locum habet, at nisi levissimam in iis, quæ constanti donantur fluxu, suppressionem parere valuerit.

2. Ovariorum præsentia germine gravium, quæ uteri cavitatem occupant appendicum productionem, aut aperitionem impediunt, vel id tantum sinu, ubi placenta matri adhæret, quod non naturalem suppressionem gignit, gestationis propriam.

3. Uteri, tunicæ ipsius internæ præsertim, durities quæ venosas appendices amplexentes earum dilatationem implicant, ut in amplioribus uteri scirrhus accidere solet.

4. Convulsiva uteri constrictio, quæ repente venosos processus vincit, quam producant

1. Frigus subitaneum, pedes præsertim, aut crura aggrediens.

2. Iræ impetus, aut gravis dolor.

3. Summi metus, atque inopinati valida impressio; huiusmodi plerumque est triplex causa suppressionum fluentis sanguine, statim supervenientium, de quibus infra fusius, id a mechanismo motuum convulsivorum procedit ab animi patematibus, aut sympathicis affectibus, ut de hysterica passione loquuturi explicabimus.

III. Causarum respectu, quæ sanguinem ad venas uteri transvehii impediunt, ea vi, quæ earum extrema sese valeant referari, deduci debent.

1. A segnioris sanguinis motu, ab debilioribus cordis viribus ei communicato, ut in ægrotis languidis, aut gracilioribus subjectis observamus, vel a sanguinis spissitudine, quæ cordis impulsibus, ut mos est, resistit.

2. Ab exigua cruoris copia ad uterum transducta morbo, inanitione, aut macie in corpore deficientis, vel brachii inopportuna venæ sectione, aut crebriorum hemorrhagia alio defectentis.

3. A duplici huiusmodi caularum complexu, tum a sanguinis segnitie cum exigua copia, qui ipsius officiat affluxui.

IV. Tres ipse sunt suppressionis caularum classes, in quibus simpliciter venicularia vasa, venosæ appendices, aut sanguis peccare solet; at frequenter evenit remotarum caularum ergo plures ipsarum conjungi, quod connubium laboriosas magis, & pertinaciores suppressiones producit.

*Catamenia imminuta.* Ea triplici ratione imminui possunt, inopia, brevitate, vel periodorum raritate.

I. Minus uberrima apparent.

1. Si vasa lactea dimidiatim repleantur, ac proinde leniter venas compri- mant, quare parum impeditus sanguis recto pergat tramite minime per laterales appendices deflectens *v. clas. 1. caular. &c.*

2. Dum appendicum venosarum dimidium, aut minima pars tantum refertur, ut, ceteris paribus, paucissimis earum patulis cruor directum cursum prosequatur, *v. clas. II.*

3. Si minori copia atque celeritate sanguis ad uterum transferatur, ceteris paribus, fluxus tunc minus uberrimus apparebit, *v. clas. III.*

II. Catamenia minus perdurant.

1. Si lactea vasa citius exhauriantur, & a venarum compressionem desistant, qua de causa sanguis directum cursum innovat, *v. clas. I.*

2. Si

2. Si venarum appendices jamputula follicite se referent, id vel angustia orificiorum, vel laxitatis ergo eveniat; *v. clas. 11.*

3. Quando sanguis ibi exigua copia accunulatur, vel quod in corpore deficiat, vel alio defectat; *v. clas. 111.*

III. Diuturnioribus interceptiuntur menstrua intervallis.

1. Quando vermicularia sero se replent mensibus instantibus; *v. clas. 1.*

2. Quando appendices diu renitentes difficillime referantur; *v. clas. 11.*

3. Cum tandem sanguis deficiat, vel leniter impellatur, ut venosas appendices explicare impar evadat; *v. clas. 111.*

IV. His explicitis evidens est diversas causas binas, vel trinas simul comparando facile graduum compositorum explicationem innoscere, quando menstrua inopie, aut brevitate causa imminuuntur, vel raritatis, & inopie simul ratione, vel brevitate simul, & raritatis ergo; quando menstrua tandem triplici hac de causa imminuuntur; quia uno, eodemque tempore minus uberissima appareant, minus perdurent, seriusque revertant.

### §. 111.

#### *Differentie.*

**O**bservatio perbelle expositis menstruum legibus consona confirmat,  
1. Duplicem dari suppressionis speciem, quæ vel fluente adhuc sanguine menses sistit, vel sensum sensumque agens eorum regressum tantum implicat.

Sabita suppressio, quæ fluentia intercepta menstrua a convulsiua uteri constrictione dependet in iis mulieribus, quæ mensibus affectæ frigori, acris intemperiei, aut ventorum afflatibus se exposuerunt, tum frigidis sunt usæ pediluviiis, aut denudatis pedibus marmoreo deambularunt pavimento, vel timore, formidine, aut latitia inopinata aggressæ sunt, quæ tandem vehementiori ira, aut gravi dolore sunt lacesitæ, *v. clas. 11. n. 4.*, huiusmodi causæ frigoris videlicet, & animi pathematum intensiores producunt effectus, quando mulieres iis minus assuetæ, & sensibiliores sint.

Suppressio, quæ gradatim sit absque quo menses persuere desinant, quæque tantum eorum regressum impedit, pluribus de causis producitur infra enumerandis, quæ tamen facile distinguuntur segnitiei ergo qua agunt.

II. Altera datur suppressionis species, quæ vel album fluorem comitem habet, qui cruoris defectum implere videtur, vel penitus eo destituitur.

Prior ea species est, in qua vasa vermicularia nimis distensa lactæ lymphæ per ipsorum ostiola tantum effundunt, quantum fecerunt; *v. clas. 1. n. 4.*; altera vero suppressio lacteo effluvio deficiens ceteras complectitur suppressionis species, ubi vasa vermicularia nihil lacticinosa lymphæ separant, ipsa turgant nec ne.

III. Tertia adest suppressionis differentia, vel quando menstrua silent procul uteri tensione, aut dolore, vel dum utroque, aliisque pluribus molestiis copulatur.

Ea doloris, & tensionis experta est, dum vermicularia, & venosæ appendices prorsus exinaniantur; *v. clas. 1. tum clas. 11. n. 1-3. verum clas. 111. n. 2.*

Ea contra dolorem, & tensionem habet comitem, quando huiusmodi vasa venæ præsertim maxime turgent universalem plenitudinem, & dolorosam tensionem procreando; *v. clas. 11. n. 4. clas. 111. n. 1.*

IV. Postrema tandem differentia est cum non modo dolor, atque tensio absint, verum quovis aliæ molestiæ genere mulieres libere evadant, vel cum paucissimis etiam corripantur incomodis, nonnullis tamen chlorosis laborent symptomatibus.

Suppres-

Suppressio quæ dolore, ceterisque molestiis est orba, a lymphæ producitur in sanguine defectu, aut mutato gressu; *v. clas. 1. n. 4.*

Altera dolore, & tensione carens, verum aliquo chlorosis phænomeno affecta a præcedenti in hoc differt, quod dum vermicularia lymphæ defectu vacua persistant, hic lymphæ etiamsi uberrima constrictionis maximæ ergo vermicularia nequeat penetrare; *v. clas. 1. n. 1. 2.*

### §. I V.

#### *Symptomata.*

**C**um variz sint suppressionum species, simili ratione varia erunt phænomena superventura, quorum præcipua exponam.

1. Si suppressio ab eo originem ducat, quod sanguis lymphæ lactea orbatus ejusdem nullam partem ad vermicularia evehat, quæ idoneam secretionem subeat, vel ipsa lymphæ alio sibi sternat viam; *v. clas. 1. n. 3.*

1. Tunc mulieres de doloris, neque tensionis sensu conquerebuntur, nulla in utero turgentia superventura.

2. Nullum apparebit effluvium vacuis jam vermicularibus, & appendicibus obstrictis, nullus proinde mulieribus erit superventurus labor catameniorum defectui saltem tribuendus, cum nihil in sanguinem tunc redundet, quod evacuationem postulet.

11. Si vero suppressio non a lymphæ absentia originem agnoscat, sed ab ejusdem in vermicularibus difficili secretionem, quæ ob densissimum contextum lympham recipere respuant; *v. clas. 1. n. 1. 2.*

1. Hujusmodi liquor sanguinis plethoram augebit, quia continenter in corpore increfcens nullam exitui reperiet semitam.

2. Continua collectione idem cum lymphæ mammaria permixtus sinum inflabit.

3. Ipse lactinosus humor saliva, aut gastrico succo remixtus ab eo haud ab- similibus gustus, ac digestionis læsiones pariet, tum *Pice*, aut *Malacie* diversas species gignet in ratione acrimoniæ, qua lymphæ saturatur.

4. Ex pravis cibis, aut incompleta optimorum, etiam alimentorum subactione ventriculi gravitas facile superveniet, quæ nauseas, cordis anxietates, aut vomendi conatus provocabit.

III. Si a nimio suppressio procedat lymphæ lactinosæ effluvio; cum ea a vermicularibus effugiat statim ac recepta sit; *v. clas. 1. n. 4.*

1. Nullum apparebit, ut supra enuntiavimus, neque doloris, neque tensionis indicium, quia in utroque vasorum genere humorum redundancia aberit.

2. Aderit tamen lymphæ lactæ, aut fluoris albi perfluvium plus minusve uber- rimum, continens, aut intermittens in ratione gradus aperiitionis lacteorum vasorum.

3. Hujusmodi effluviū circa pudenda simul stimulum, atque calorem exci- tabit pro humoris fluentis majori, vel minori acrimonia.

IV. Si sanguis inflet, repleatque venas, & venosas appendices, verum sup- pressio ab eo procedat, quod earum orificia obducta persistant; *v. clas. 11. §. III.*

1. In hoc casu ægræ tensionem, dolorem, atque uteri calorem persentient va- sorum plenitudini proportionalem.

2. Hujusmodi dolor intensior ita fiet quandoque ut *colice uterine* nomen me- reatur, quod vel totam matricem, vel ipsius partem aliquam occupabit in ra- tione sanguinis diffusionis.

3. Tensio vero, & tumor dum teretibus, latisque ligamentis, atque pudendis per- similia vasa hinc, illinc reptantia communicantur symptomata omnia parient intensiora immo, quæ catamena solent prænunciare.



4. Paucis deinde transactis diebus absque sensibili humorum iactura omnia evanescent, quia lactiginosa lymphæ, per lymphaticas venas, viæ sibi strata, vacua vermicularia relinquet, nec amplius venas comprimens, sanguini liberam circulationem reintegrabit.

5. Id tamen minime erit expectandum, nisi lymphæ lactea liquidior sit, ut omnis lymphaticas venas intrare valeat; quotiescumque enim spissior existat, multa in vermicularibus erit superstes, quæ venas adhuc comprimendo in ratione lymphæ retentæ, symptomata omnia superallata plus minusve excitabit.

6. Diu suppressio perdurans universalem plethoram inducere potis erit, quæ thoracem aggreffiens hystericas suffocationes, spirandi difficultatem, tussim, atque cordis palpitationem provocabit; cerebrum vero ut Cap. II. §. V. ostendimus, capitis gravedinem, atque divulsionem, soporem, insomnia, vel per subfultus repentinam et somno concitationem inducere valebit.

7. Si tunc sanguinis circulus in aliqua parte intercludatur, ubi vasa nonnulla reperiuntur imbecillia valde, aut labefactata, sanguis sibi viam sternere potis erit, & hæmorrhagiam periodicam producere, ut menstruis, alio devolutis, facere mos est.

V. In omnibus suppressionibus ubi uterum induratum, tensum, calentem, aut dolentem reperies vasorum per ipsum serpentium repletudinis ergo; v. clas. I. & II. integras.

1. Patientes phenomenis omnibus vexabuntur hysterica passione obviis causis sequenti capite enunciandis ubi speciatim de hoc morbo pertractabimus.

2. Hæc symptomata magna, longa, & frequentia plus, minusve apparebunt in ratione impressionum, quæ in utero suscitabuntur plus, minusve validè, constantes, aut crebræ.

3. Huiusmodi impressiones sympathiæ lege infra citato loco perpendenda convulsivos motus excitabunt in gustus organo, ut anima impar evaserit ejus sensus percipere salivæ nedum infirma, quod confirmat similis effectus in hoc sensorio a gravi dolore ortus.

4. Hæ impressiones pariter convulsivas excitabunt constrictiones fibrarum ventriculi, diaphragmatis, atque muscutorum abdominis, quæ etiam vacuo ventriculo vomitum suscitabunt, id experitur in renuum dolore, qui colicam nephriticam producit.

VI. Si catamenia supprimantur repente ab uteri vehementioribus motibus convulsivis. v. clas. II. n. 4.

1. Supervenient tunc validi hysterice passionis insultus, diutini, & frequentes magis, quam in ceteris suppressionum speciebus, atque tunc nervorum impressiones fortiores, ac pertinaciores erunt, tum sanguinis in vasibus subito intercepti ratione, cum muscularium fibrarum violentis contractionis ergo.

2. His plerumque superadduntur alia plurima noxia valde phenomena a partium divulsarum diversitate oriunda, huiusmodi sunt sopor, lethargus, loquelæ quandoque abolitio, cordis palpitatio, atque hysterice suffocationes.

3. Eorum symptomatum persistencia, aut magnitudo variare solet, prout fluxus abundaverit, nec ne, aggressu suppressionis, tum in ratione temporis, atque sollicitudinis, quibus menses susterunt, verum in ratione uteri sensibilitatis, ægrotantium ætatis, aut temperamenti sanguinei, vel plethorici differre poterit.

#### §. V.

##### Diagnos.

**N**ihil est facilius quam mensum repentinam suppressionem cognoscere, de qua statim ægrotantes admonent, at cum ea sensum sensumque absque sen-

sensibili causa superveniat, difficilimum est distinguere an illam conceptio producat, quæ nullam modellam possit, vel morbus, qui medicina indiget.

Cum id conjugatis acciderit difficultas minus implicat, facile enim concepisse sibi suadet: ipsorum iudicio tamen non erit fidendum; nam satæ adsunt ac stultæ mulieres, quæ minime suspicantur de foetu, quem gerunt.

Maxima vero oritur difficultas cum virgines aut juvenes viduas pertrahere convenerit; eorum porro conditio, quæ omnem suspicionem removere deberet, mehercule tamen, experientia docente, frequentem nimis venustulorum consuetudinem intra diversos sexus obviam extremos sæpe inducere vidi amicitia effectus; quandoque possunt conceptionem ignorare, dum emenagoga possunt; cibiæ tamen hæc petunt remedia, ut abortus promoveatur, & se trices eximant.

Si medico turpe est inanibus fidere conjugatis, quæ levitatis causa fructum maturare negligunt; infame nimis, ac dolosum esset si insciant virgines, aut viduæ sceleris particeps fieret, quæ conceptum necare conantur; unica patet via, quæ omnes eludit difficultates, quam didiceris; subsequentes circa gestationis indicia, & prudentem morbi inquisitionem animadversiones perpendendo.

1. Gravidæ mulieres plerumque naturalem colorem, atque calorem conservant; at suppressione coreptæ, pallidæ, laxæ, decoloresque sunt, hujusmodi tamen signa nisi debile præbent indicium, nam plures dantur seminæ, quæ primo gestationis mense, eadem experiuntur suppressioni obvia.

2. In gravidis uteri orificium exacte clauditur non vero in morbofis suppressionibus, in quibus særum, vel nihil obturatur; id sane certissimum est indicium; verum sæpe examen negligimus, aut tentare veremur, neque observatoribus tactu facile erit ultimas hujus clausuri differentias detegere, nisi summa ipsi possint in obstetriciis rebus experientia.

3. Utero onusto tertium, aut quartum post mensem symptomata omnia desinent suppressionis molestiis æmula; tunc enim pro sætu alendo omnis affluens lactificinosus humor, utque sanguis consummitur, nihil in vasis exuberans. Contra vero in suppressione phenomena illa omnia augeri videbis, quæ validissimum conceptionis necne signum præbebunt, si ægrotantium historiis esset fidendum; at cum virginis suspectæ, vel callidæ mulieres valide medicis imponant, ipsos facile deceptos fuisse expertus sum.

4. Uterus tandem quarto, aut quinto mensibus transactis umbilicum versus acuminatus apparet, & levi manus pressione satis circumscribitur, sextusque inæqualis resistentia sentitur; verum leviter abdomen concutendo, calore, motuque concitatus infans de sua existentia certiore observatorem facit, quibus rebus detectis nullum superest conceptionis dubium nubilus sit mulier necne; iis deficientibus signis a quarto, vel quinto suppressionis mense catameniorum interceptio pro morbo erit habenda, quæ porro modellam postulat.

Cum hoc præcipuum sit veritatis indicium, quod prudens Medicus amplecti debet; ideo nisi validissimas rationes suppeditaverint ægræ, quibus suum tueatur decus, in emenagogis exhibendis, cunctari oportebit, donec idoneum tempus transactum sit, quo abdominis examine de gestatione necne certiores fieri possint, hæc medendi methodus conjugatis mulieribus communicari facile potest, quæ prudentem inquisitionem non contemnit; iis interdum si grave aliquod supervenerit incommodum, diæta aut stomachicorum, vel leniter aperientium, auxilio erit occurrendum.

Nubiles vero, aut viduas, quibus turpe suspectum nefas erit manifestare, certos facere oportebit continenter menstruum redditui consulere, interdum innoxia stomachica remedia absorbentia, & amarotica exhibendo; quo magis de remedium frustraneis affectibus querebuntur, efficaciora cupientes, doli aggebunt indicium, quare jugiter nova validiora medicamenta promittendo eadem metho-

metho-

methodo erit persistendum, donec quarto, aut quinto mense veritas penitus conspicua fiat; tunc vero caute opportuna erunt suppeditanda remedia, eandem semper medendi rationem simulando.

II. Nova exurgit difficultas illarum causa, quæ quadragesimo quinto, aut quinquagesimo ætatis anno spontanea naturæ lege menstrui carere incipiunt; tunc perperam novos fluxus promoveri tentaremus, ægras potius naturæ conati- bus preparare oportebit, ut totalem hanc suppressionem valeant sine morbo perferre; attamen amentes reperies feminas, quæ nondum ætate consistere sibi suadent, ut catameniis orbari debeant, & seipsas, suosque medicos sæpe decipiunt; nonnullæ etiam, quamvis omni carere menstruo cognoscant, veritatem celare, atque callidissime adstantes eludere student.

Propriæ futilitatis, atque dementiæ plerumque victimæ sunt, quoniam dum menses irritò revocant, haud infrequenter morbosam sanguinis iacturam, aut album fluorem advocant, vel, quod magis teterrimum est, uteri inflammatione, ulcere, aut cancro corripuntur: contemptus tamen, quem sibi promeritiæ erunt huiusmodi mulieres, nihil incautum excusat Medicum, qui ipsis operam præstitit. Artis politici canones has præcavere satis docent fraudes; mulierum enim adpectu, venustarum etiam si lubet, consilium petentium, de earum ætate, lævi erroris dubio, judicare poterimus; si itaque illas quadragesimum quintum circiter annum attingisse certiores facti simus, absque quo lacrimis, aut querelis commoveamus, sola stomachica diluentia, aut absorbentia erunt exhibenda, quæ tunc naturalis suppressionis phenomena imminuent, vel saltem mitiora aperientia, solventia, aut emenagoga erunt suppeditanda, quæ extremis naturæ conaminibus subveniant, si forte nondum menstrua silere debeant, vel parum agant si ea penitus sint discessura.

Tandem nonnullos post menses innotescet, si suppressio a morbo dependeat, cui emenagogis in hoc capite enunciatis occurremus, contra vero si suppressionem naturalem esse judicemus caute erit incedendum, ut consequentis medeamur, quibus tunc pleræque sunt obnoxie; id tamen non est hic specialiter perpendendum, postremum hujus libri caput consulere poteris, ubi fusius de mensibus ætatis ergo desinentibus, deque eorum symptomatibus disseremus.

III. Cum de suppressionis natura certiores facti simus, species tantum singillatim, earumque causæ producentes dignoscendæ supersunt.

1. Omnis suppressio, vel adhuc fluente sanguine repente, vel sensim, sensimque aggreditur.

Observavimus jam subitum mensium silentium convulsivas uteri contractiones facere externo frigore, tristi, vel lato animi pathemate, aut timore concitatas.

2. Ea suppressionis species, quæ sensim fit, albo fluore erit subsequutura vel ipso deficiet.

Vidimus huiusmodi suppressionem, quæ periodicum, vel continuum album fluorem comitem habet, ab laxitudine vermicularium oriri, quæ secretam lympham omnem excernunt.

3. Altera suppressionis species, quæ albo fluore destituitur, vel dolore, atque uteri tensione afficitur, vel ab eo libera evadit.

Offendimus superius priorem albo fluxu orbatam, in qua uteri dolor, tensio, atque colica perferuntur, vitia producere uteri, cujus intima tunica, & venosæ appendices dilatari, atque aperiri renuunt, tum sanguinis vitium, qui pro spissitudine, aut inopia impar evadit, venarum orificia reserare.

4. Quæque suppressio albo fluore, uteri dolore, ac tensione carens, vel nullam affert molestiam, vel sensim chlorosum producit.

Diximus jam suppressionem superallatis incomodis proflus orbatam, a lym-

*Astruch de Morbis Mulierum.*

C

phæ

phæ defectu pendere, ac emaciatas, languidas, & defatigatas mulieres, aut altrices agredi.

5. Omnis tandem hujus morbi species in qua neque albus fluxus, neque uteri dolor, aut tensio apparet, verum plurima chlorosis producuntur scenomena, ex eo procedit, quod exuberantem lympham, nequeant densa vermicularia separare, quare eadem lymphæ in sanguinem redux saliva, & gastrico succo remixta necessarios eorum humorum effectus perturbare valebit.

IV. Causæ vero remotæ, quæ proximas inducunt suppressionum omnium causas, nisi ab accurata temperamenti regiminis, aut ægrarum vitæ gestæ narratione innotebunt; quas assidue percontari oportebit, non modo ut remedia magis idonea seligere valeamus, verum ut necessarias diætæ, aut medendi methodi modificationes animadvertamus.

## §. VI.

### *Prognosis.*

**G**enericam suppressionum prognosim arduum est proponere, singularum specierum itaque prænuntiationes exponemus.

I. Suppressio, quæ nullum conjunctum habet uteri dolorem, aut tensionem, nullamque functionum læsionem prorsus innocua experitur.

II. Quæ chlorosis phenomena, atque damna tantum ostendit plus, minusve periculosa evadit pro eorum pertinacia.

III. Suppressio, quæ albo fluore pollet pertinax erit, curatuque difficillima, & noxia plerumque; ea lentam febrem, maciem, leucophlegmatiam, hydropem, ulcus denique, & uteri cancerum inducere valet, præsertim si albus fluxus uberimus, continens, aut acris nimis evadat.

IV. Ubi uterus tumet, aut crebre dolet periculum adest ne eorum persistencia uteri inflammatio, abcessus, ulcus, aut syrrhus, vel cancer superveniat, quæ plus minusque suspicaberis consequutura, quo dolor plus minusve intensior, atque continens apparebit.

V. Diutina suppressio, quam universalis plenitudo gignit, lethargum, apoplexiam, asthma, cordis palpitationem, abdominis infartus, hydropem, atque sanguinis vomitionem producere solet, quæ magis erant timenda si iis rebus regimen, & temperamentum plethoricum occasionem præbeant.

VI. Repentina suppressio subita, vehementiora, atque teterrima magis scenomena excitabit, tunc enim patientes improvise appoplexia, aut lethargo, hysterice suffocationibus, cordis palpitationibus, sanguinis sputu, aut vomitu facile corripientur, vel phreneticæ, aut maniacæ fient, vel a violentioribus convulsionibus, atque hysterico morbo cruciabuntur, ut non raro symptomatum vehementia intereat; quare hujusmodi speciei ergo revera asserere possumus, uterum (a) esse in mulieribus sexcentorum morborum causam.

VII. Genericè loquendo suppressiones, quæ intensiores sunt, medella etiam difficiliores evadunt, nam distinctitas earum ostendit causas producentes remedia prorsus eludere, nihilo secius Hippocrates asserit mulieres observasse suppressione laborantes, quæ non modo a sexto morbi mense, quod animadvertit etiam auctor libelli de morbis mulierum (b), verum a quarto (c), vel septimo (d) infir-

(a) Ea de causâ Auctores voluerunt Democritum asseruisse in littera quadam Hippocrati scripta quam inter ejusdem opera reperies. Tâs ès yvwnai mêxwv mwlwv napwris mwpa. Uterum sexcentarum ærummarum causam esse in mulieribus. (b) Lib. I. Cap. 3.

(c) *Epidem.* V. circa initium.

(d) *Epidem.* IV. p.

infirmittatis anno convalescerunt, raro tamen id accidere autumno, neque legem in menstruationis negotio suppeditare posse censeo.

VIII. Suppressiones enim quo pertinaciores apparebunt, etiam perniciosiores erunt, difficile enim erit luctuosas eludere infirmitates, quæ a morbi persistentia oriri solent.

IX. Verum suppressione perdurante sterilitati ratio habenda est; me non latet enim plures feminas menstruis orbatas concepisse, etiamsi pauca extent exempla, eaque in iis animadvertantur mulieribus, in quibus etiamsi menstrua abessent, uterus saltem bene constitutus reperiebatur, quod minime prædicabimus de iis, quæ morbi causa mensibus carent.

X. Tandem si huiusmodi conceperint mulieres, decipientur valde si crediderint integro gestationis spatio sortum ipsas gerere, vel sanum servare posse, nam vasa tum lactea, cum sanguinea, quæ imparia pro catameniiis erant, neque nutritionem sortui suppeditabunt idoneam, ut ipse completus evadat.

## §. VII.

### *Curatio.*

**D**uplicem dari observavimus suppressionis speciem, altera quæ repente fluentes menses sistit, altera quæ sensim sensumque temporis progressu menstrua imminuit, eorumque regressum impedit, diversarum causarum, atque effectuum ergo diversam hæc suppressionum species poscunt medellam, quare materia duplici articulo distingui oportebit.

### *De repentina suppressione menstruis adhuc fluentibus.*

I. Si ægrotantes violentioribus animi pathematibus lassæcitæ, aut formidine commotæ fuissent, quietem spiritui restituere, ac morbosas removere impressiones sollicitè curabis, quod si a frigore passio procederet, ægras promptè calefacere necesse erit.

II. In utroque casu fas erit aliquid spirituosum subito exhibere, ut vinum cyprum, aquam melissæ simplicem, vel compositam, aquam carminum, aut florum aurantium, vel garum &c., naribus etiam aliquid empireuma redolens apponere, huiusmodi sunt sal anglicus volatile, oleum volatile aromaticum, vel spiritus urinæ, aut salis amoniaci &c., opportuna pariter erunt suffumigia, ex plumis, pillis, corio, ungulis equinis, aut violaceis taniis combustis parata, femora tandem calidis fricabis linteis.

III. Pedes luere saluberrimum erit, lavacro permiscendo decoctiones ex ruta, matricaria, vel artemisia aliisque plantis anthystericis confectas.

IV. Iis pro menstruis revocandis incassum adhibitis, pedes statim uberrime secare, idque quarta hora transacta renovare oportebit, præsertim si suffocationes, cordis palitationes, capitis dolor, sopor, convulsio, aut hystericus morbus vehementer persisterint.

V. Singulis horis exhiberi potissimum erit unum, vel duo cyathi infusionis artemisias, melissæ, matricariæ, salvis, vulnerariæ elvetiorum, aut the simplicis.

VI. Per vices ægrotantes assumere poterunt cocleatim potionem athystericam, cui idonea addatur dosis tincturæ annodynæ, quæ obtundere valeat convulsivas constrictiones, potissimas eorum symptomatum causas; ipsa potio, ut opus requirat, plus minusve erit reiteranda. Subsequens vero formula indicationem implere videtur.

C 2

R. Aquar.

R. *Aquar. Artemisæ & Melissæ ana.* ℥ ij. quibus dissolv. *Baracis Venetæ* ℥ β. *Theriacæ veteris*, ℥ j.

Add. *aq. Cinnamom. boracæ* ℥. i.

*Tinct. anodyn. gut.* xxx.

M. F. Haustus, sumendus ex cocleari.

VII. At si morbi violentia aliquid efficacioris postulaverit, sequentes pillulæ ad rem facient.

R. *Assæ frigidæ & Castorei ana.* gr. ix.

*Salis volatilis viperarum* gr. xii.

*Laudani opiat* gr. xii.

M. F. Massa, dividenda in pillulas æquales probe deaurandas.

Hujusmodi duo, vel tres singulis horis ingurgitare poterunt ægræ, donec novæ sensim subigantur sænomena, quibus etiam superbibere saluberrimum erit infusio n. v. descripta.

VIII. Si ægrotans frustra reiteratis pedum venæ sectionibus diu sopore, aut violentiori convulsionis labore, quatuor, vel quinque grana tartari emetici præscribi poterunt in superallata infusione soluta; præcipua ista videtur methodus, qua cerebrum laxando, & venosas appendices reiterando suppressioni facilius mederi possit.

IX. Si menstrua iis auxiliis se restituerint, ægra jam valetudinem recuperaverit, quam confirmare tantum opus erit; at si illa, vel minime, vel imperfecte renovarentur, statim ipsa erunt idoneis revocanda remediis: circa quæ futurum articulum consulere oportebit; tamen nisi symptomata urgeant per integrum mensem cunctari posse censeo, donec statum revertatur tempus, quo magis solida medendi ratio institui conveniat.

X. Dum ægræ vehementioribus adhuc cruciantur molestiis nullum erit alimentum exhibendum, quod ventriculum gravare possit; si vero morbus diuturnus evaserit cum subministrare necesse erit, at morbo deservente addi poterunt gelatina animalis, orizorum cremor, aut recens ovorum vitellus, ita gradum faciendo ad nutrientia magis alimentia.

*De suppressione, quæ persistentibus menstruis sensim eorum implicat regressum.*

Hujusmodi suppressio quatuor complectitur species; prior quæ rubro destituta, albo tantum fluore pollet; altera quæ nullam vel ex parte uteri, vel ex alia quavis læsa functione molestiam conjunctam habet; tertia quæ utero indolente chlorosim tamen inducit; postrema tandem in qua patientes uteri tensione, dolore, colica, aliisque noxiis laborant symptomatibus.

Prior remedia postulat, quæ albo fluori medentur, circa quod caput infra pervolvere oportebit, ubi speciatim de albo fluore pertractabimus.

Secunda molestiis experta medelam minus implicat, attamen cum sterilitatem producat, ac diuturnitate sua uteri substantiam compingat nimis, prudentis Medici erit ipsam curare.

Vidimus jam hanc gignere lymphæ lactæ defectum, ut de emaciatis, infirmis, aut valetudinariis mulieribus constat, vel tunc oriri cum lymphæ diuturnæ diarrhoeæ, crebræ hemorrhagiæ, phlebotomiæ, aut reiteratæ purgationis ergo alio erumpat, e quibus indicabuntur.

i. Sanguinis chylicque augmentum per analepticam dictam ægras nutriendo, facilis.

facilis digestionis alimenta, & optimæ indolis ter, quæterve renovando prandium, si id ventriculus sinat; tum cocolatam, aut crustulum vino lbero imbutum, ovum recens, aut lac exhibendo.

2. Proscribere necesse erit remedia omnia, quæ laxitudinem faciunt, uti venæ sectio, purgationes, clysteria etiam nisi majores molestiæ ipsa exposcant.

3. Evacuaciones omnes interdiciere a quibus sanguis vel lymphæ depauperantur, hujusmodi sunt ventris fluxus, sudor, aut ex naribus cruoris jactura.

4. Agrav per aliquod temporis spatium cogeris sedentariam vitam gerere diu se lectulo detinendo; uno verbo spiritus, ac corporis inactione cunctari, ne humorum dispendium augeatur, ut per transpirationem fieri solet.

Tertia vero, & quarta suppressionis species, quæ veros morbos consiliunt, efficaciora etiam postulant auxilia ad tres præcipuas classes redigenda; triplicem enim ex antea dictis patet dari indicationem, quam implere conveniet.

I. Densum compactumque uteri contextum relaxando ejusque vasa, aut tunicas dilatando.

II. Sanguinis affluentis nisum augendo ita, ut resistentia uteri vascula ipse valeat referare.

III. Hanc aperitionem provocando crebris, successivis succussionibus, aut lenioribus convulsionibus in utero concitatis.

I. Priorem multiplex implet medendi methodus, quæ omnino tamen eodem collineat fine, eisdemque gignit effectus, at ut clare procedamus a simplicibus, & familiaribus remediis incipiemus; hujusmodi sunt:

1. Jura ex pullo gallinaceo, aut vitulo confecta, herbis remixta refrigerantibus, & emollientibus, quales sunt radices Althææ, Cichorrhææ silvestris, Euglossi, Fragariæ, aut Oxalidis, tum Folia Boraginis, Buglossi, Petroselinii, Lactucæ, Scolopendræ, & Caterach &c. quatuor etiam semina frigidiora usveniunt, in quibus solvatur drachma salis Prunellæ aut Cristalli Mineralis.

Apozematata refrigerantia ex decoctionibus earundem stirpium parata, quibus addi poterit semidrachma Nitri purificati, aut Cristalli mineralis cum uncia simul syrupi Capillarium, Violarum, Cichorrhææ, aut Bismalvæ.

Serum lactis probe depuratum ad uncias octo, vel decem, in quo grana viginti, aut vigintique solvantur Salis mirabilis Glauberri, vel ipsam ferri extinctione chalybeatum, cui addi potest uncia syrupi appropriati.

Aquæ minerales ferrugineæ, & vitriolicæ, quales sunt illæ quæ in Gallia reperiuntur prope Caranac, Spa, Forges, Camaret, Passy, quas haurire poterunt ægræ idonea tempestate, & præmissis vulgaribus cautelis per quinque, & decem dies, tres hebdomadas, aut integrum mensem in earum usu persistendo.

2. Opportunissima erunt clysteria refrigerantia, & emollientia ex tepenti aqua fluviatili; tum ex fursuris decoctione, sero clarificato, decoctione soliorum Malvæ, Althææ, Brancæ Ursinæ, Parietariz, Mercurialis, Porri, aut Verbasci &c. tum seminibus Lini, aut frigidis quatuor, in quibus solvatur salis Prunellæ drachma, additis aceti cocleare, vel uncia una Mellis Violati, Olei Liliorum, aut Pulvæ Cassiæ.

3. Balnea, aut semibalnea tepida aquæ dulcis, aut fluviatilis quibus mane horæ, & dimidii spatium uti debet, ea duodecim, aut quindecim dies continuando, pluriesque reiterando, donec opus requiratur, quibus adjungi possunt decoctiones ex superallatis plantis peractæ, vel manipuli nonnulli seminum Lini, vel frigidorum.

4. Fomenta ex duplici linteolo similibus decoctionibus imbuta & accurate expresso parata, quæ calida hippogastricæ regioni applicabis donec refrigerata per horam, & amplius pluries reiterabis.

5. Vapor quem calida effundunt similes decoctiones sellæ familiaris ope per Astruch de Morbis Mulierum

horam, aut dimidium intra pudenda receptus, verum ut ille intimas penetrare valeat sellæ tubulus nectitur; animadvertendum tamen est ne hic vas immediate tangat, quo fervens continetur decoctio, nam calor ipsi communicatus facile vulvam, & vicinia læderet.

6. Brachii modica venæ sectio reiterata potissima est vasa uteri extricare, ac extendere, dum sanguinis redundantia nimium turgescunt, quod in plethoricis mulieribus sæpe sæpius evenit, ut ex uteri tensione, & dolore persistenti manifestatur, instante etiam menstruo; nunc in propatulo est (a) Riverii observatio, quæ ostendit unicum esse uteri statum in quo brachium secare fas erit: ceteris vero suppressionum speciebus venæ sectio ex eo loco nocua erit, quod in hac re pro lege habeto.

7. Narcotica qualia sunt syrupus diacodii, aut Karabis, laudanum utrumque, tinctura anodyna, pillulæ cinoglossæ congrua dosi exhibita, pene specifica experiuntur auxilia in uteri convulsionibus & erethismo. Opportunissima pariter evadunt si compactio solidorum prævaleat, nam nil magis laxat fibrarum rigiditatem, quam si spirituum affluxus intercipiatur, qui tensionem magnopere augeat; verum hujusmodi remedia sanguinis molleculas segregando, atque attenuando menstrua promovere valent, procul eorum sententiam, qui ea potius suppressimè defendebant.

8. Emollientes uteri injectiones vulgo *Metrenchytes* conficiuntur ex decoctionibus emollientibus plus minusque saturatis per sifonem injiciendæ, cujus tubulus inflexus in globulum desinit plurimis undique foraminulis pertusus; animadvertendum porro est injectiones tepentes a naturali calore parum diversas adhibere, ne uterum ipsæ lædant cum matricis cavum debeant intrare, & ægræ positu suo horæ saltem spatio illas perferre: earum tamen usus pene obsolevit, tum quia indecens, cum difficilis evadat, aut damnum inferat, item frustraneus videtur, cum ad uterum raro pertingat.

9. Idem de pessariis emollientibus judicabimus, quæ ex plantis laxantibus coctis, & confusis patrabantur, ac in pulmentum redactis subtiliori tella involutis usuevebant, gossipium etiam, vel aliud quidpiam cylindraceum tella indutum, & decoctione, aut succo earum similibus plantarum imbutum, eidem usui cedebat, ab hoc tamen remedio hodie prudentis Medici abstinere erit.

II. Ut alteri vero indicationi satisfaciamus, solventibus, attenuantibus, ac aperientibus medicamentis uti necesse erit iis præsertim, quæ *Emenagoga* appellantur; menstrua videlicet promoventia etiam forte hoc nondum pro inefficacia nomen sibi promerita sunt; ex triplici hæc regno desumuntur, vegetabilium nempe, animalium, & mineralium, alia simplicia sunt, composita alia, ea methodice ostendam, a mitioribus incipiens, & usitatoribus, quæ \* asterisco signabo, tum dosim singulorum pro unica vice, & sumendi modum indicabo.

### Vegetabilia.

#### Radices

\* *Aristolochia* rotunda  
longa

\* *Rubia* Tinctorum  
*Pulegium*

Apium

(a) *Observat. Centur. I. Observat. 2.*



Apium	
* Bruscus	
Angelica	
* Asparagus	} a 3 S. ad 3 i pro decoct.
Imperatoria	
Petro-felinum	
* Eryngium	
* Ononis	
Cyperus	
Iris	
Valeriana	} a 3 ii ad iv pro decoct.
Gentiana	
Bryonia	} a 3 S. ad 3 i. in subst.
Cyclamen	
Elleborus niger	} ad 3 S. pro decoct.
Anum	
	} a 3 i ad 3 ii in subst.

## Folia

* Marubium album	
* Pulegium	
Dictamnus Creticus	
Ruta	
Majorana	
* Matricaria	} a m. S. ad i. pro decoct.
* Abrotanum	
* Artemisia	
Nepeta	
* Calamintha	
Origanum	
* Tanacetum	
Melissa	
Salvia	
Ros Marinus	
Mercurialis	
* Chamædrys	
Thuyas Theophrasti	

## Flores

* Chamæmelum romanum	
* Matricaria	
* Melilotus	} a 3 i ad 3 iii pro decoct.
Anthos	
Lavendula	
* Crocus orientalis S. p. a gr. x. ad gr. xx., vel ad p. i. pro infus.	

## Semina

Nigella  
Ruta  
Anisus

# TRACTATUS DE MORBIS MULIERUM.

Sexeli Maffilia  
Daucus Creticus  
Feniculus  
Sifarum  
Levisticum  
Nasturtium  
Apium  
Cuminum

} a 3 i ad 3 ii pro decoct.  
a 3 S. ad 3 i. in subft.

## Bacce

\* Labrus  
\* Juniperus

} a 3 i ab 3 ii pro decoct.  
a 3 S. ad 3 i. in subft.  
a 3 ii ad 3 iv pro decoct.

## Aromata

\* Macis  
Nux miristica  
\* Cynammomum

} a gr. x ad xv  
a gr. xv ad xx  
a 3 S. ad 3 i.

} in subft.

## Cortices

\* Tamariscus  
\* Cappariz  
Kina kina a 3 i in subft. ad 3. ii. in decoct.

} a 3 i ad 3 iii pro infuf.  
a 3 S. ad 3. i. in subft.

## Gummi, & Refine

\* Myrrha  
\* Aloes  
Opopanax  
\* Affa foetida  
\* Ammoniacum  
Sagapenum  
\* Galbanum

} a gr. vi ad 3 S. in subft.  
a gr. vi ad 3 S. in subft.

## Animalia

\* Castoreum  
\* Millepedes  
Testes Equini preparati

} a gr. vi ad 3 S. in subft.

## Mineralia

\* Succinum flayum  
\* Borax  
\* Sal Ammoniacum

} a 3 S. ad 3 S. in subft.

Reme-

## Remedia composita.

## Galenica

* Aqua Menthae	}	ad 3 i ad 3 ii
--- Pulegi		
* --- Matricariae		
* --- Artemisiae		
--- Abrotani		
* --- Absinthii		
* --- Rutae		
--- Salviae		
--- Marubi		
--- Rubiae tinctorum		
--- Tanacetii	}	a 3 i ad 3 i cum dimid.
* Acetum Scilliticum		
* Oxymel Scillitic.	}	a 3 i ad 3 i cum dimid.
* Syrupus Marrubi		
--- Calaminthae		
* --- V. Radicum aperientium		
* --- Artemisiae	}	
* --- Hyssopi		

## Chymica

## Tincturae

* --- Croci Orientalis	}	a gutt. vi ad gutt. xv.
* --- Mirrhæ		
* --- Castorei		

## Salia

* - - - Tartarus Martialis	}	a 3 i ad 3 i
* - - - Sal admirabile Glauberii		
* - - - Arcanum duplicatum		
* - - - Terra foliata Tartari		
* Preparaciones Martis aperientes.		
* Crocus aperiens rore paratus	}	a gr. xv ad 3 S.
* - - - idem Sulfure paratus		
* - - - idem Aqua simplici		

## Preparationes Mercurii parum, vel nihil catbartice

* Ethiops mineralis igne paratus	}	a gr. x. ad xviii
* --- idem trituratione confectus		
Panacea mercurialis	}	a gr. vi ad gr. x.
Cinabaris factitia		

Hujusmodi sunt remedia in suppressionis negotio magis commendata: adhibendi modum tamen variare facile est pro morbi indole, aut ægrotantium genio;

mio; patrari enim ex liquidis poterunt decoctiones, apozemata, poriones, julapia syrupi, vel ex solidis componi, pulveres, opiata, bolli, aut rotulae &c.

1. *Jura* ex pullo conficiuntur exanterato, & excorticato, vel ex libræ semisse pulmonis vitulorum, aut verricis, vel agni jugulo sufficienti aquæ quantitate coctis; prope ebullitionis vero finem radices nonnullæ ad uncia dimidium, vel plantarum folia ad manipulum adduntur, radices tamen diutius quam folia sunt ebulliendæ, inde percolato brodio in eo sal quoddam, aut aliqua ex chalybis aperientis præparationibus solvi potest quindecim, aut viginti dies in eorum usu persistendo.

2. Simili modo parantur *decoctiones*, seu apozemata, carnibus exceptis, quæ ipsis non permiscuntur, syrupi alicujus unciam addendo, eaque per idem tempus exhibebuntur, nisi identidem bis in die hauriantur.

3. In *potionum* compositione duo, vel tres aquæ distillatæ seliguntur ad uncia unius & semis, vel duarum unciarum dosim sumptæ, vel earum defectu plantarum quarundam decoctio sumitur ad quinque unciarum circiter dosim in quibus solvantur sal quoddam idoneum, vel martis aperientis aliqua præparatio, aut pulvis ex plantis emenagogis descripta, tum addi possunt theriaca, & confectiones hyacinthina, aut alchermes, vel tincturæ nonnullæ quales sunt Castorei, Mirrhæ, Assæ Fetidæ &c., quæ præscribi possunt cocteam singulo horæ dimidio ut opus indigerit.

4. *Julapia* a potionibus nihil differunt nisi quod minus salis, aut pulveris contineant, verum syrupus aliquis superaddatur, & uno, vel duplici haustu assumantur.

5. Nisi obvii satisfaciant *syrupi* secundum artem quot lubent patrari possunt, alii plures ex saturatissimis radicibus, vel foliorum decoctionibus, ex plantis emenagogis selectioribus confectis, quæ sachari additione ad syrupi consistentiam reducuntur, ii syrupi julapiis, apozematibus, aut opiatis adjungi possunt, quæ sibi præscribi lubeant.

6. *Pulveres* simpliciores sunt Galenicæ præparationes ex duabus, vel tribus simul radicibus, foliis, seminibus, corticibus, aut gummis emenagogiis electis, simul contusis peractæ, quæ pro unaquaque vice ad scrupulos duos, vel drachmam circiter juris, apozematis, aut vini coctear exhibentur.

7. *Opiata* in hoc a præcedentibus differunt, quod mellis, syrupi, aut conservæ auxilio massam constituent electuarius referentem, quam panis plagula involutam præscribunt, juris, vel apozematis coctear superbibendo.

8. *Bolli* ab opiatis majori duritie distant, maxima vero *pillule* quæ resinis, gummisque magis coagmentatæ illis firmitate præcellunt, eaque auro obvolutæ superiori methodo sumuntur.

9. *Rotule* tandem conficiuntur, sufficientem sachari quantitatem pulveribus remixtam idonea aqua distillata, aut decoctione coquendo ad syrupi consistentiam, quæ super marmoream levigatam superficiem extensa in plures diversimode configuratas scinditur tabellæ.

III. Multiplici via *tertiam* poteris indicationem implere, aperitionem videlicet venosarum apendicum promovere, vel sanguinis nisum augendo, vel uterum emenagogis succutiendo.

1. Pedum venæ sectio, quæ velocitatem sanguinis intendit per aortam descendentis dum ipse uterus proficiscitur, certior est, promptior, minusque suspecta cæcæmæniæ ciendi methodus, ea tamen reverentibus mensuris si adhibeatur, proxima jam eruptione efficacior: evadet gradum impulsio sanguini addendo, quæ tantum deficit ut completa oriatur effusio.

Olum sustituebantur, vel cucurbitulæ scemori applicitæ, vel cauterium poplizi, et infirmæ virtutis causa hæc pene exolverunt remedia, pediluvia etiam ex plantis.

plantis emenagogis parata aliquam solent utilitatem asserre, venæ sectioni tamen debiliora.

2. Clysteria pariter conferunt ex similibus stirpibus confecta, *Matricaria* videlicet, *Artemisia*, *Pulejo*, *Salvia* &c., vel ex floribus *Chamameli*, *Meliloti*, *Lavendula* &c., quibus addi possunt *Mellis Mercurialis*, vel *Catholici* duplicati uncia una, aut hieræ picæ *Galenii* drachmæ sex, quibus uterus commoveatur.

3. Purgantia conveniunt, nonnihil stimulantia quæ intestina convellendo uterum excitent, conflantur ex *Aloe*, *Jalapæ*, *Diagridii*, pulveris *comachini* congrua dosi, aut *Hieræ Picæ* drachmis tribus circiter in bolos redactis.

4. Emetica, quæ diaphragma, & musculos abdominis convellunt ac uterum proinde secutiuntur tres, vel quatuor grana (*b*) tartari emetici, aut grana vinctinquæ pulveris *ipecacuanhæ* jure, vel theiformi solvendo erunt exhibenda.

5. *Errhina*, seu *sternotatoria* *Scheiderianam* vellicando, emeticorum more uterum pariter irritant, hujusmodi sunt folia *Nicotianæ*, *Betonicæ*, *Salviæ*, tum radices *iridis*, *hellebori* &c.; quæ si leniter agant addi poterit *euphorbi* nonnihil, *pyretri*, aut *macropiperis*.

6. Balnea, & semibalnea plantarum, fomenta regioni hypogastricæ applicata, injectiones per vaginam ad uterum erectæ, ex similibus plantis paratæ opportunissima sunt, circa quæ pervolveris quæ superius n. III. IV. & VIII. indicavimus, at parum efficacia hæc nunc experiuntur medicamenta jam obsoleta.

7. Suffumigia n. v. descripta vel humida, vel sicca esse possunt, humida resciscuntur ex vaporibus plantarum fellæ familiaris ope pudendis receptis, sicca vero ex summo parantur, qui ex pharmacis, aut pulveribus emenagogis uftis sublimatur pari modo receptus; olim sicca hujusmodi suffumigia crebre usuebantur ex acrioribus etiam substantiis composita, hodie pene contemnuntur detrimendi ergo, quod afferebant: humida iis substituuntur, & quidem acria, & nocua minus, quorum formulæ visitatores sunt:

R. *Aqua communis*, vel *Decocti cujuslibet emenagogis bullientis* q. ʒ.

Adde *Spiritus salis ammoniaci* pauculas guttulas

Vapor excipietur utero. Vel

R. *Scoriarum Reguli antimonii* q. ʒ.

Coque in *lixivio cinerum*, donec *lixivium* rubicundum fiat.

Vapor excipietur utero.

Si ea incassum adhibita sint, sequentibus uti poteris, dummodo ægræ laxum servent uterum, & dolore sint expertes.

R. *Lixivii Scoriarum Reguli antimonii*, de quo modo, part. IV.

Vini *Malvatici* part. II.

M. ☞ affunde super filices ardentes, vel ferrum candens

Vapor utero excipietur. Vel

R. *Scorias Martis ignitas*, aut ferrum candens, affunde urinam antiquam, ☞ fetidam.

Vapor utero excipietur.

8. Pessaria usitaciora erant remedia pro mensibus revocandis, immo ex acrioribus coagmentabantur substantiis, raro nunc usuveniunt, vel mistiora tantum ex linteis mercurialis succo imbutis, aut ex pulveribus *nigellæ*, *mirrhæ*, *mercurialis*

(b) Dosis Tartari sublati pro adjuvare infusionis variare solet; quare Regionis consuetudini, & præparationi utatori consuleretur oportebit.

carialis succo, & melle coctis conflata adhibentur, interea hæc intra vaginam introducuntur, virginibus vero vulvæ tantum applicantur, & configurationis ergo *nafcalia* vocantur.

9. Iis remediis omnibus tandem addi poterit motus muscularis valde proficiuus qualis est deambulatio, æquitatio, rhedæ, corhæ, atque matrimonii usus, hæc omnia tamen inutilia evadere censemus, nisi idoneo adhibeantur tempore, cum nempe eruptio instare videatur.

*Cautele in suppressionibus medendis necessarissimæ.*

I. Antequam emmenagoga exhibeantur remedia primas vias catharticis expiare, sanguinem alterantibus corrigere oportebit.

II. Verum idonea tempestate vere nempe, & autumno menses excitabis, quando humores fluidiores, solida laxiora sunt.

III. Æstivo tempore solventium, & aperientium usum interdicendum esse tibi suadebis, ne patientes nimis ferveant; tunc temporis diluentia, & humectantia erunt adhibenda, qualia sunt balnea aquæ minerales, vel forte mitiora emenagoga.

IV. Hyeme nullis, aut debilioribus uteris medicamentis, frigus enim, quod humores inspissat, atque vasa arctat, eorum impedit effectus.

V. A lenioribus incipiens, ad validiora gradum feceris, prout illorum inefficacia cogat.

VI. Inter efficaciora menses impellentia martis præparationes magni feceris, & mercuriales superenunciatas, verum gumm. amoniac., galbanum &c., dummodo congrua dosi ad rem exhibeantur.

VII. Diluentia, & emollientia vicissim solventibus erunt substituenda, ut illis uteri vasa relaxentur, dum his sanguinis nifus intenditur, ut appendices valeat referare.

VIII. Sæpe solventia, & emenagoga diluentibus, & laxantibus conjungi poteris, tum ipsis addi narcotica, modica tamen dosi, ne soporem inducant.

IX. Modificare, aut interdicere oportebit emenagogorum usum, si uterus doleat, aut ægræ serveant, quod constabit insomniis, siti, aut lotii calore.

X. Hæc præsertim animadvertere necesse erit in iis mulieribus, quæ bilioso donantur temperamento, & sanguine acri, ac sicco, fibrisque tensis, rigidis polent irritabilibus; in hujusmodi circumstantiis validiora remedia calorem facile, & ipsam febrem concitabunt.

XI. Similia cavebis in iis, in quibus pulmo debilis, atque gracilis apparet angustię, & compactionis ergo, tum respiratio crebra difficilis, vel tussis adest, vel in quibus parentes iisdem morbis fuerunt obnoxii.

XII. In hoc postremo casu non solum bechica, & humectantia exhibeto, verum lac asinum, aut caprinum, etiamsi istiusmodi in suppressione sit suspectus usus.

XIII. Persuadebis contrariam medendi methodum uteri, aut pulmonum inflammationem, vel ulcus facile inducere, aut vas aliquod lacerare, a quo periculosa sanguinis jactura erit consequutura.

XIV. A validioribus abstinere, & arduioribus emenagogis quidquid de iis auctores prædicent.

XV. Majora nocumenta inferre experientia docuit pessaria, injectiones, & acia suffumigia, quæ uterum immediate aggrediuntur, hæc ex scoris antimonii pulverisatis, & combustis, vel ex miscella calcis vivæ & urinæ conficiuntur, quæ posterior sal volatile ammoniacale præbet.

XVI. Sapienter enim circa catameniorum regressum potius cunctaberis, quam ea suspecta ratione revocare, ut omne ægras ledendi periculum absit.

XVII.

XVII. Dum in menſtruis futuris prudenter cunctamur, ſuppreſſionis ſymptomatum imminutioni erit conſulendum idonea venæ ſectiōe, repetita purgatione, & regimine potiſſimum adhibitis.

XVIII. Si tunc menſtrua alio ſibi pandant viam, cum id præſertim per pulmones, aut aliud nobile viſcus fiat, emenagoga omnia erunt proſcribenda.

XIX. Remedia in hoc caſu amplecti oportebit, quæ hæmorrhagias ſiſtere valeant, de quibus infra capite ſeptimo ubi de catameniiſ revolutis erimus loquuturi.

XX. Tandem fruſtra remediis omnibus adhibitis, ut cum levamine menſes revertant paliativa medela erit inſtituenda, identidem venam ſecundo, agras purgando, atque dietam modificando, tum ciborum quantitatis, cum qualitatis ratione, verum idoneis apoſematibus, aut aquis mineralibus ſanguinem edulcorare fas erit, uſque dum natura aliam ſubſtituat menſibus ſemitam, uſ. per urinas, catharſim, ſudorem, aut inſenſibilem tranſpirationem ſæpiſſime accidit.

*Innocua medicamenta in ſuppreſſionibus valde commendata.*

Apud celeberrimos præxiſ ſcriptores plura huiusmodi referuntur remedia, quarum multitudo ipſa inſirmam oſtendit virtutem; incaſum enim tot proponerentur, ſi pauca eſſent certiſſima: nonnulla hic enunciabimus, quæ porro ſuperallatis collineant indicationibus, & a nobis ſuperius quandoque jam deſcripta, in iis tamen enumerandis diſtingui debent inocua a minus tutis; quare duplicem articulum inſtituemus.

I. *Chamæmelum Romanum* ejuſdem decoctio ex florum manipulo conſecta mane jeſuno ſtomacho exhibetur, per plures dies, innocuum ſed inſirmum eſt remedium, quidquid de eo prædicaverint.

II. *Rubia Tindorum* ex illa æquali ſacchari quantitate remixta pulvis fit in iis morbis commendatiſſimus, qui mane per quinque vices vino calido hauritur, verum tum utilitate, cum damno expers evadit.

III. *Artemiſia vulgaris* uſitatiffima eſt, extollunt præſertim conſervam quamdam ex tenellis ejuſdem foliis contuſis, & duplo ſacchari remixtis conſectam, jeſuno ſtomaco ad drachmam exhibendam per plures dies eruptione inſtanti. (a) Zacutus aſſerit, hoc remedium proficuum magis evadere ſi uncia duæ ſuperbibantur aquæ Sabinae, quibus per integram noctem rhabbarbari drachma ſemis inſuſa fit, at Sabina perniciouſa, eſt ut ſequenti articulo oſtendam.

IV. *Lavendula* ubi hæc paſſim creſcit; ruſticæ mane ejuſdem manipulos aliquos comedunt jeſuno ſtomaco tritos, & melle remixtos juſ ſuperbibendo ciceris, aut marubi albi per plures dies.

V. Ex *Caltheæ*, vel *Calendule* floribus quædam paratur conſerva cujuſ drachmas duas ſimili methodo mane ſolent exhibere.

VI. *Ros marinus* ex florum manipulo, & *Cheiri* tribus ſimul vel quatuor pugilis fit decoctio mane ſumenda.

VII. *Ariſtolochia* cujuſ duplex ſpecies eſt longa, & rotunda præter decoctiones quas ſuppeditat, ex ea proſtrant pillulæ ſic dictæ de *Ariſtolochia* (b) *Fernelii* magnopere commendatæ.

R. R.

(a) Præx. *almirond.* Lib. II. Obſerv. 99. (b) *Fernelius Morb. medendi*, Lib. VIII.

R. *Radicum Aristolochie rotundæ* ʒ i.

*Radicis Gentiane, Myrrhe electæ ana.* ʒ iii.

*Aloes & Cinnamomi ana.* ʒ S.

*Zinziberis* ʒ i.

*Omnia exquisitissime trita excipiantur oleo Amygdalarum dulcium recenti.*

F. Massa Pillularum.

Ipsæ per plures dies continuari possunt ad drachmam unam cum semisse etiam per superbibendo plantarum edulcorantium leniterque emenagogarum.

Si Rubiam tinctorum Aristolochiæ copulaveris, alias habebis pillulas potissimas illis nihil infirmiores

R. *Radic. Aristolochie rotundæ & Rubiæ Tinctorum ana.* ʒ S.

*Agarici, & Cinnamomi ana.* ʒ i.

*Croci orient. pulverat.* ʒ i.

*Cum succo Artemisæ.* F. Massa Pillularum, cujus dosi a ʒ i ad ʒ ii & simplicius.

R. *Radicum Aristolochie rotundæ, & Rubiæ Tinctorum ana.* ʒ i. vel ʒ S.

*Agarici trochiscati gr. XV. M. cum syrupo de Artemisæ.* F. Bolus pro una dosi.

VIII. Sanguis hirci silvestris præter alias utiles proprietates etiam menses cie-re valet a scrupulo uno ad drachmam semis sumptus sub forma pulveris aut boli aliqua decoctione solutus, substitui potest ille hirci cicurati, at efficax minus experitur, ideoque dosi erit duplicanda.

IX. Fermentum panificum vetus sumitur mane ad nucis juglandis volumen prope eruptionis tempus sacchari anatina quantitate commixtum, & apozemate, vel aqua emenagoga solutum; hoc magnificiunt remedium; id tamen (c) Galeni auctoritate invaluisse suspicor, qui discutiendi, & resolvendi ei perpe-ram tribuit facultatem, quod de externo usu non de interno erit intelligen-dum; verum nisi utile intus sumptum innocuum saltem evadet.

X. Aloes cujus succus aqua rosarum lotus basim constituit pillularum de A-loe tota vulgo, quæ cathartica, & solventi donantur virtute. Medici nonnulli ipsas in suppressionibus revocandis valde commendant ad scrupulum unum exhi-bitas, quidam illis scrupulum etiam addunt pulveris fabinæ, quos imitari contendo.

Succus Aloes basi cedit *Hieræ picræ* electuari species obvia, quam hujus in-gredientis ratione ad menses ciendos (d) Galenus maxime laudat, exhibetur ipsa unius, vel duplicis drachmæ dosi simplex, vel dimidio scrupuli Castorei remixta in bolum reducta, ne amaritudine gustum offendant, ei superbibere ne-cesse erit jus pingue, aut decoctionem idoneam, quæ illam ventriculo solvat.

Aloes succus mirrha simul, & croco compositionem intrat pillularum pesti-lentialium Rufi, quare & ipsæ in suppressionibus commendantur per plures dies sumptæ ad scrupuli semis, vel duorum scrupulorum dosim.

Tandem cum elyxir proprietatis Paracelsi ex tinctura spirituosa earundem pillularum eliciatur, atque Garrus idem sit B. M. distillatus, ideoque utiliter in-

men-

(c) De Simples. Medicament. Facult. Lib. VIII. Cap. 26. n. 42.

(d) De compos. Medicam. Lib. VIII. Cap. III. de de Curand. ratione per veng. sect. Cap. 12.



menstruis medendis ipsa usuveniunt, primum ad guttas XV. aut XX: alterum coctatim per plures dies idoneo sumuntur vehiculo.

XI. *Perrum*. Hippocrates, seu auctor libelli *de natura muliebri*, commendat succo braciæ copulatum, verum timeo ne effectus spem eludat.

XII. *Crocus Sativus*. Eiusdemque flores emenagogi sunt stomachici, & amodynii ac multiplici ratione usum habent, intrant pillulas pestilenciales elyxir proprietatis, adduntur plerisque præparationibus in hoc morbo usitatoribus, ac modica dosi infunduntur appozematibus, & theiformibus, tandem ovorum vitello per dies nonnullos a duodecim usque ad viginti drachmas exhiberi solet.

XIII. *Mercurialis* quam inter plantas emenagogas recensuimus, & pessariis fabrefaciendis cedere vidimus a (e) D. Arnaud de Villeneuve plurimum existimabatur ut sequentis compositionis basim constitueret, quam in suppressionibus medendis magni faciebat.

R. *Succi Mercurialis*, & *Mellis despumati*, ana. ʒ i.

*Farinæ Nigellæ quart. S. vel q. S. ut possint confici pillule*

Dosis a ʒ i. ad ʒ ii. per aliquot dies cum instat Catameniorum periodus.

XIV. *Mirra* inter excellentiora, & validiora recensetur remedia menstruis evocandis idonea, quare omnis pene bolis, aut opiatis permiscetur magis obvis.

Plures extant præparationes quarum mirra basim constituit, hujusmodi sunt trochisci mirræ a drachma semis ad unam, cum hastulo plantarum sumptum pillulæ Montagnanæ adhuc celebratæ.

R. *Trochiscor. de Mirra*. ʒ i. S.

*Semin. Apii, Castorei & Corticis Cassiæ*, ana. ʒ i.

*Moschi gr. x. Cum succo Apii formantur pillule n. x. i. Capiat duas mane per aliquot dies.*

Si pharmacopeas pervolveris, innotebit illas diversimode reformatas fuisse, ut auctoris nomen, & vires easdem retinuisse.

XV. *Ferrum sive Chalybs* præter diversas ipsius præparationes in hac re usitatissimas reliquæ sunt duo simplicissimæ, & validissimæ quidem non contemnendæ, altera conflatur ex anatina parte limaturæ chalybis subtiliter pulverisatæ, & foliorum calamintæ cum sufficienti syrupi artimisiæ quantitate subacta; altera paratur ex croco martis aperientis sulphure patrato duplo cinnamomi acuti, & triplo sacchari, quibus simul commixtis pulvis conficitur; aut rotulæ mane exhibendæ per plures dies a drachmæ semis, ad drachmam unam.

XVI. *Circæ nigrum*, vel *rubrum* cum radice simul apii diu ebullitum, addito sub fine ebullitionis paucis croco, & cinnamomo, tum etiam butyri nonnihil similibus usibus cedit.

XVII. *Marrubium album sive Præssum*, hoc infunditur, vel ebullitur parum in sufficienti vini albi copia & loco calidè hauritur, remedium optimum evadit, dubito tamen de laudibus eximii quas medicus (f) quidam ipsi tribuit.

XVIII. *Splen bovis castrati* duplici methodo pro catameniis præparatur. Prior decoctione perficitur; splen enim recipitur integer sanus qui in frustula scinditur,

(e) Lib. de Mulier. Affectibus. Cap. 8.

(f) Borellus Comarb. IV. Observ. 14.

ditur, ex quibus cucurbita ad medietatem repletur, hinc adduntur cinnamomi ruditer confusi uncia una, cariophyllorum uncia semis, & croci sativi drachmæ duo cum sufficienti vini albi quantitate; iis omnibus dispositis operculum bene lutatum concubitu nequitur, tunc per B. M. horarum viginti quatuor spatio omnia erunt ebullitura donec splen in pulvem abeat; verum refrigeratione completa jus percolatur, & ad uncias quatuor per quinque consequutivos dies instantibus menstruis agris mane propinatur.

Alter methodus est (g) tincturam quamdam eliciendo, quam nunc ostendemus.

R. Splen Bovis in minutissimas contritum portiunculas, per aliquot dies spiritiosa niirrhæ tinctura maceretur, ea vero frustula folia umbræ dein exsicato, & ex iis spiritu vini vulgari methodo tinctura eliciatur, & additis si lubeat paucis guttulis olei Angelicæ ut grata magis, & proficua evadat ad scrupulum unum idoneo soluta vehiculo per aliquot ante eruptionem dies exhibeatur.

Hæc postrema remedia a (b) Paracelfo originem ducunt, qui primus ut ego autumno de Splene Bovino in menstruis utili loquutus est; tamen neque auctoritas, neque experientia illa fovet, verum si qua esset in iis remediis efficacia pharmaci potius iis admixtis, quam leni tribueremus.

XIX. *Castoreum* liquor est pinguedinosus empireuma redolens, qui billoculari duplici animalis folliculo congeritur: utilissimum præstat auxilium tum hystericiis insultibus, cum in mensibus provocandis, cum in subtilissimum pollinem redactum a granis decem ad scrupulum unum, vel in tincturam a guttis quindecim ad triginta propinatur.

#### *Remedia minus tuta in suppressionibus evocandis usitata.*

Quæ nunc enumerabimus remedia, tot sunt auctoritatibus suffulta, ut nefas videatur ea contemnere; non contendo interdum, cum id magninominis viri asserant, utilia evasisse cum ad rem exhibita fuerint, & a doctis Medicis, qui idoneas circumstantias detegere, & cautelas animadvertere conati fuerint, at, oh calamitas! indocti sunt, qui illa præscribunt haud infrequenter tum agyrtæ, & empirici omnes; quare nil mirum si in iis in quibus audacia ignorantiam æquat, tot producant perniciosos effectus.

1. *Sabinam vulgarem* primum ostendam, quæ ab auctoribus celeberrimis magnopere commendatur: hujusmodi præparationes sunt;

1. Decoctio foliorum aqua communi perfecta, simplex, vel ceteris plantis emenagogis conjuncta, hujus dosis pro una-que ebullitione erit manipulus semis.

2. Aqua destillata, quæ ceterarum emenagogarum stirpium usibus cedit ad unciam circiter dosim.

3. Oleum venit Sabinæ destillatum, quod opiatis, bolis, & pillulis permisceatur in suppressione usitatoribus, pro singulis vicibus tres, quatuorve guttæ dosim præstant.

4. Eadem remedia intrat plerumque Sabinæ extractum a scrupulo semis, ad scrupulum unum.

5. Syrupus Sabinæ hic describendus, quem Medicus quidam (i) Alemanus *Secretum singulare* appellat, quem utilissimum in seiori morbi statu pluries expertum esse affirmat.

R. Pn-

(g) Vid. *Oberwaldus Crollus in Basilica Chimica*, pag. 305.

(h) *Archidæum Lib. VII. in flor.*

(i) Hieronymus Rufus, *Observ. 194. In Sylloge Observ. & Curation. Medicinæ a P.Petris editæ.*

R. *Pulegi* m. ii. S.

*Artemisæ* m. i. S.

*Betonice*. & *Calaminthæ* ana. m. S.

*Sabin.* m. iii.

*Satureiæ*, *Meliss.* *Menth.* *Abrot.* ana. m. S.

*Centaur.* Minor. m. i.

*Semin.* *Anisi*, *Fenicul.* ana. ʒ iii

*Radic.* *Petroselin.*, *Asparagi*, *Asari* ana. ʒ vii.

*Helinici* ʒ i. S.

*Polypod.* ʒ i. S.

*Zedoariæ* ʒ i. S.

*Dillam.* ʒ i.

*Macis*, & *Nucis Moschat.* ana. ʒ i.

*Caryophyllor* ʒ S.

*Rhabarb. elect.* ʒ vi.

*Aquar.* *Betonicæ*, *Pulegii*, *Artemisæ* ana. lib. ii.

*Saturejæ* lib. i. S. Coq. S. a. in colatura infund.

Stent per noctem, mane f. fortis expressio, & cum sacchar. S. q. coque ad Syrupi consistentiam Dosis ab ʒ S. ad ʒ i.

¶ Suspicor tamen sepe sæpius hujusmodi remedia perniciose evadere, nam acres, & phlogisticæ Sabine proprietates sanguinis jacturam, vomitum, & convulsionem inducunt; syrupus nihilominus nuperrime descriptus minus damni inferre posse arbitror pro ejusdem stirpis exigua dosi; at ille compositus nimis existit.

II. *Cucumis sylvestris*, seu *aspinus*, hic acris est, solvit, & alvum ciet violenter, quidam ipsum multiplici ratione in suppressionibus adhibent, quare prescribere solent, vel

1. Decoctionem ex radicis contusæ drachmis tribus confectam, vel

2. Succum ex foliis expressum, & depuratum ad drachmam unicam, vel cum dimidio, aut

3. Idem inspissatum ad extracti consistentiam, *Elatarium* vulgo, cujus dosis duo, vel tria grana non superat.

Ea decoctionibus, syrupis, bolis &c. emenagogis solent copulari, verum cum frequenter nocua experiantur, vel raro caute, vel numquam usuveniunt.

III. *Bryonia*, seu *Vitis alba*, pro catameniis revocandis ejusdem radicis ad drachmas duas ebullitæ decoctionem proponunt, vel *Feculum* bryoniæ sedimentum videlicet a succo expresso reliquum decem, aut duodecim granis exhibitum.

Pernicie ea nihil Sabine, aut Cucumeri inferiores sunt, ideoque sapientis erit, vel eorum cavere usum, vel minima uti dosi.

IV. *Dracontium majus* vel *Dracunculus*, & *Dracontium minus*, sive *Arum*; hæ plantæ acres, causticæ, urentes sunt intus proinde sumptæ damnum inferunt, neque auctores imitari suadeo, qui in hoc morbo baccas ex iis plantis decerpas, aut baccarum succum inspissatum commendant.

V. *Heleborus niger*, hujus radix mensibus medendis haud inutiliter cedit, dummodo caute adhibeatur, ejusdem frustulum sumitur drachmam æquans, & in taleolas divisum, quæ malo inferuntur igne coquendo, eo cocto radix excipitur, pomumque comeditur, mane jejuno stomacho, tertio quoque die per aliquod tempus in hoc remedio persistendo, præcedentibus minus nocuum expectitur, nihilo secius caute erit propinandum.

VI. *Cantharides* ab Hypocrate, vel auctore libelli de Natura Muliebri magnopere commendantur, intusque sumi quinas, postquam pedes, alæ, & caput se-

*Astruc de Morbis Mulierum.*

D

paratæ

paratz fuerint, suadet; ipsius tamen auctoritas non valebit, earumdem insensibilium confirmare usum.

*Lumbrici terrestres* cantharidibus substitui poterunt, periculosi minus, & efficaces magis, a drachma semis, ad scrupulos duos.

*Cicindelle* etiam usum habent inter emenagoga remedia & lumbricis aciores sunt, iisque cautius, & minori dosi uti tantum fas erit.

VII. *Sanguis ex menstruata muliere*, in quibusdam Alemanorum Provinciiis lin-teolum hoc sanguine intritum aqua luere solent, quam menstrua desiderantibus propinant; (\*) Medici etiam non desunt, qui hanc praxim non contemnunt, ipsosque optimos effectus expertos esse testantur; ego, tum observationem, cum ab ea derivatas consecutiones contendo; nihilo tamen minus remedium, etsi futile, atque indecens appareat, nullum tamen damnum asserere posse video, nisi ex agra, aut ulcere correpta muliere sanguis ille fuisset desumptus.

## C A P U T V.

### *De mensuris suppressis organi vitio.*

#### §. I.

##### *Descriptio.*

Interdum catameniorum regressus obviis periodice indicatur scenomenis, ut si ille revera esset consecutus; ideoque regulariter ibi affluere sanguinem constat, nulla apparente eruptione organi vitio impedita.

Triplici de causa id oriri poterit. 1. Vel membrana septi modo intra vaginam locata fluxum intercipit. 2. Vel carnea ibi nata protuberantia, quæ occludit, repletque vaginam. 3. Vel cicatrix, quæ tunica, aut parietes vaginæ, aut pudendorum labia conglutinat, eorumque cavitatem intercludit.

I. Ea superius descripta membrana, observatione docente, positum variat; modo vaginæ orificium obducit, modo intimius penetrans uteri ostium obtegit, plerumque levis est membranacea, raro densa, compacta, & callosa reperitur.

II. Variat pariter protuberantiæ adhesio; intra vaginam plerumque a pudendis non multum distat, interdum prope uterum crescit, ea carnea adiposa, glandulosa, aut steatomatosa apparet plus minusve extensa.

III. Cicatrix vero modo hic totum vaginæ ambitum peragrat, nunc laxa & superficialis, nunc firma, & constipata videtur, modo oppositos parietes per exiguum nectit spatium, modo ampliorem gignit cohesionem; observatione quandoque etiam didicimus labia ita coire, ut angustissimum tantummodo urinæ exitui foramen relinquant.

Diversitates hæc omnes observatione sunt susculæ, causas vero sequenti articulo indicare potissimas conabimur; in præsentiarum sufficet animadvertere nullam ab iis nondum menstruantibus mulieres molestiam pati; postea vero, cum jam menstruationis tempus attigerint, vel alias menstruatæ fuerint, si ipsæ retentio supervenerit, donec initio morbi exiguus erit ad uterum sanguinis affluxus, parum erunt detrimenti passuræ, aucta tamen infarciens cruoris copia, abdomen inflari, tendi, atque cruciari, vaginam, ac pudenda tumesceri, artus

(\*) Daniel Ludovicus in Ephemerid. Natur. Carol. Germ. Decur. I. Ann. 9. & 10. Observ. 35. Andreas Myrthen. Ibid. Decur. III. Ann. 9. & 10. Observ. 215.

artus inferiores cedematosi evadere incipient, ægræ denique corporis gravedine, tumoribus, gustus abolitione, & digestionis læsione vexari, febris tandem erratica apparebit pluribus aliis copulata cruciatibus, quæ frustra remediis efficacioribus adhibitis, hydropem, gangrenam, atque lethalem consumptionem inducere potis erit.

## §. II.

## Causæ.

I. **M**embrana, quæ vaginæ ingressui proxima conspicitur, ea est, quæ hymen appellatur in virginibus a natura fabrefacta, ut præcipuam, et si incertam, earum integritatis notam præferat; a statu naturali in nostro casu distat, cum enim perforata naturaliter appareat, prorsus impervia nunc sistat.

Me non latet hujusce membranae existentiam plures negasse (a) iisque illuxisse, qui hanc prædicarunt, credulos nimis anatomicos fuisse suadendo, cum plures defendisse numquam, vel morbi tantum causa in dissectis cadaveribus ipsam reperiisse.

At quidquid animose affirmant, qui contrariam amplectuntur sententiam, nedum imponere valebunt si iis magni nominis viris fidem facere velimus, qui hymenem detexerunt, illustraruntque, inter eos recensentur (b) Berengarius Carpus, (c) Vesalius, (d) Fallopius, (e) Coiterus, (f) Varolius, (g) Riolanus, (h) Veslingius, (i) Bartholinus, (k) pluresque alii infra enunciati celeberrimos decimi sexti, vel decimi septimi ævi anatomici; minus vero eorum imponere debet opinio cum nostris temporibus, a clarissimis anatomicis (l) Laurentio Heistero, (m) Friderico Ruyschio, celebratissimo (n) Morgagni nostra secunda fortuna adhuc vivente, & (o) Jacopo VVihslövio confirmata videatur, hæc omnes simul consentiunt, virginibus omnibus illam reperiisse ea de causa dissectis; meum visus addo testimonium, etiam si supervacaneum censeam post tot illustres auctores, qui meam foveant sententiam.

Reliquum enim erit judicare illos, qui membranam numquam vidisse testantur, vel depudicatas tantum mulieres observasse, vel perperam præoccupatos vaginam ea prorsus obduci debere, hymenem non conspexisse, dum ipsam in

D 2

pro-

(a) Ludovicus Vassius. Tabul. anatomicæ. Rædus Columbus. De re anatomicæ. Lib. XI. Cap. 16. Joh. Fernellius. *Physiolog.* Lib. I. Cap. 7. Ambroise Paré. *Oeuvre, de Chirurgie.* Liv. III. Chap. 34. & Liv. XXIV. Chap. 49. Franciscus Vallesius *Lib. de sacra Philosophia* Cap. 25. Horatius Augustus Tom. II. *Epist. & Consult. Medicin.* Lib. I. Severinus Pinzus. *De morbo virginis* Lib. I. Cap. 9. Andreas Laurentius. *Hist. anaton. Corpor. human.* Lib. VII. Cap. 12. & qu. 13. Marc. Anton. Ulmus. *De uero.* S. 8. I. Cap. 7. Hercules Saxonia. *Prælex. Medica* Lib. IV. Cap. 4. Franciscus Ranchinus. *De morb. Virg.* Sect. I. Cap. 4. Nathaniel Highmurus. *Corpor. humani disquisit. anaton.* Lib. I. Part. IV. Cap. 4. *Reperitur de Grav. De mulier. organis.* 6. De Hymene; Pierre Dionis. *Opérat. de Chirurgie.* Demonst. 3. Jean Palka. *Déscrip. des parties des Femmes, qui servent à la generation.*

(b) Jacobus Berengarius Carpus, *la langue anatomica* (c) Andreas Vesalius, *de corp. hum. fabrica.* Lib. V. Cap. 15. & in Epist. ad Joschium Roelintz, *de radice Chyan n. n.*

(d) Gabriel Fallopius, in *Observat. Anatomicis.* (e) Volcherus Coiterus, in *lib. anatomicis.*

(f) Gualterius Vrolianus, *Anatom.* Lib. I. Cap. 16. (g) Johannes Riolanus, *Anthropogr.* Lib. I. Cap. 16. (h) Johannes Veslingius, *Synagm. anatomicis.* Cap. 7. (i) Thomas Bartholinus, *Anatom.* Lib. I. Cap. 15. (k) Johannes VVierus *Observat.* Lib. I. Et de Lamiis Lib. III. Cap. 20. Archangelus Pieciolinus, *Prælectio. anatomicis.* Lib. III. Cap. 5. Scip. Mercurius, *dele. Comar.* Lib. I. Cap. 2. Franciscus Hæzonus *de partib. generat.* Lib. II. Cap. 5. Adrianus Spigelius, *de hum. corp. fabrica.* Lib. VIII. Cap. 18. Melch. S. biazus, *Exercit. Medicæ.* XLVII. Dominicus Panat. *lus. Pentecost. V.*

*Observ. ultim. isbrandus de Diemerbroeck, Anatom.* Lib. I. Cap. 14. Johannes Svammerdamius, *de utriusque fabrica in tabulis;* Gerardus Blasius, in *Observat. anatomicis.* Johan. Gasparus VVestphalus, *Ephebor.* Cur. Germ. Dec. II. Ann. 8. *Observat.* Hermannus Fridericus Theichemeyerus, *Inst. Medicæ.* legationis, & forensis. Cap. 4. (l) Lucretius Heisterus, in *compend. anaton.* Et *Ephebor. Nat. Curios.* Cent. VIII. *Obiect.* 49. (m) Fridericus Ruyschius, *Theat. anatomicis.* III. n. 15. VI. n. 1. VII. n. 60.

(n) Johan. Baptista Morgagni, *Adversaria Anatomica.* I. 29. IV. 23. (o) Jacquet Benigne VVinf.

lovv.

propatulo habebant; quam ob rem illam frequenter sine nomine descripserunt, quod magis verisimile est, & ab illorum observationibus deduci posse videtur.

Idcirco ne imposterum dubitationi locus relinquatur hymenem naturali statu describere satagam, prout auctores, & cadaverum inspectio me docuerunt.

Hymen ex intigna conflatur vaginæ tunica, quæ circa ejusdem orificium inflectitur, ejus duplicatio circum adhærens limbum refert anularem, qui latior prope anum apparet, ad latera angustior, angustissimus superius urethram versus. Cum anulum efformet tunica, quæ internam vaginæ superficiem induit, ideoque utraque facie rugosus apparebit, anularis hæc membrana, ubi ea vaginæ orificio cohæret, crassior est, cellularis ergo illic inter duplicem tunicam jacentis, quæ in margine abit, exiliorque sit hymen, ipsam componentibus laminis coalitis, ac paucis exiguis vasculis sanguineis tantum refertur. (\*) In statu naturali in medio finditur circulari plerumque foramine ovali, oblongo, & irregulari quandoque, cujus amplitudo pro subjectis, eorumque ætate variare solet: celeberrimus Morgagnus fatetur semel hoc invenisse ostium a perpendiculari membrana divisum, idem testatur Valsalva, quod non raro accidere posse autumant, quare auctores hymem *Columnam virginittatis* appellari conveniunt.

Ex hac descriptione concludi potest. 1. Interdum hymenis foramen (p) unicum reperiri quale esse debet sed angustum valde. 2. Quandoque a perpendiculari columna in duas (q) divisum se. nitas exiguas modicæ aperiitionis loco. 3. Quandoque præter priorem divisionem a perpendiculari natam caruncula, pluribus intertexti (r) horizontalibus, obliquis columnis, ut hymen cribrum referat. 4. Tandem hymenem aliquando prorsus (s) imperviam esse, ut perfectæ vaginam occludat.

In Tribus prioribus casibus communicatio uteri cum vagina etiamsi difficillime peragatur, aliqua tamen ratione fieri potest; postremo vero casu frequentioribus exemplis constat eam prorsus communicationem intercepti; puberesque hoc deformantur vicio a Græcis *Αἰσπρά* appellantur; a Latinis vero Medicis *Imperforatæ*, *Clause*, aut *Velate*, ab Italis *Coperchiate* ipsæ vocantur; Romani proprio deficiebant vocabulo, & circumlocutione illas indicabant; quare (t) Cicero somniando vidisse mulierem affirmat, *que obfiguratam habebat naturam*, (u) Plinius vero narrat quod Cornelia Graccorum mater concreto genitali nata fuerat.

Ea porro, quæ adhuc dicta sunt solam membranarum originem explicant, quæ ad vaginæ orificium locantur ubi hymen sedem habet, ibi pariter oriuntur hæ omnes vitiatæ tunice, de quibus nuper loquuti sumus, nam si qui ultra vaginæ marginem trans hymenem hujusmodi observarunt membranas, ut (x)

Ruy-

I. vv. *Exposit. Anatomique* n. 655. (\*) Limbus hujus membranz defloratione disrupta cernunculus mirilis, rines signum. (†) Ambroise Paré, *Ouvrages de Chirurgie*, Lib. XXIV. Chap. 49. Petrus Forestus *Observat.* Lib. XXVIII. *Observat.* 55. Johannes Schenckius, *Observat. Medicarum*, Lib. IV. Obs. 97. ex Adversarij Deyandi, Daniel Sennert, & *De Morbis Mulierum*, Part. I. sed. I. Cap. 3. Gerardus Blasius in *Observat. Medicis variis*, (q) J. hannes Schmidius, *Musculi*, Cur. German. Decur. I. anno 7. *Observat.* 24. Et annis 4. & 5. *Observat.* 157. (s) Guillelmus Fabricius Hildanus, Cent. III. *Observat.* 60. (r) Antonius Benivenius, *De additis morbis, & sanatis causis*, Cap. 28. Casparus VV. Iphius, in *Observat.* apud Schenckium. Johannes VVierus, *De præstigiis damonum*, Lib. II. Cap. 38. Rembertus Diodoratus, *Medicinal. Observat.* Cap. 34. Bartholomæus Amulius, *Observat. Medicar.* 23. Casparus Bauhînus, *Theatre anatom.* Lib. I. Cap. 39. Hieronymus Fabricius ab Aquapendente *Operat. Chirurgicæ* Cap. 81. G. illelmus Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 60. exempl. 1. & 2. Jobus à Meerkeren, *Observat. Medicæ Chirurgicæ*, Cap. 55. Acta Fruditerum Lipsiensia. Anno 1. Sexmensis. Oct. 6. J. hannes de Moraleo M. N. Cur. Germ. Decur. II. ann. 3. Obs. 151. Cornelius Söllingen, *De arte oblectat.* Daniel Meeno Marthius, *Observat.* 6. Franciscus Mauræus, *Observat. sur la grossesse*, *Observat.* 216. (t) Cicero, *De Divina*, Lib. II. (u) Plinius, *Histor. natur.* Lib. 7. Cap. 16. (x) F. idericus Ruy- schius, *Observat. Chirurgicæ*, 22. & 33. Simon Scultrius *Musei, Nov. Curios.* German. Dec. I. Ann. 1. Obs. 3.

Ruyfchius, & medicus quidam Romanus asseruer; ac prope utri ostium, ut observatio (y) Accademiz Parisiensis affirmat, id difficultatem augere videtur, nam præter naturam, & monstruose accidere necesse erit, quod raro tamen eveniet; illud tamen minus implicat, si animadverterimus omnem corporis cavitatem similibus læsionibus esse obnoxiam; constat enim pluries invenisse rectum intestinum septo carneo ad anum obductum, quod præternaturale videtur.

II. Carnes excreſcentiæ quæ replent, occluduntque vaginam triplicis speciei sunt.

Quandoque hujusmodi protuberantia (z) *Fungus*, seu *Champhignons* appellatur, ex neglectis creſcit ulceribus, hac de causa ulcera celtica, aut benigna vulvæ carnes excreſcentiæ locum præbent, quæ spongioſæ, molles, duræ, vel syrrhoſæ fiunt; ampliores sunt, vel exiguæ; latæ vel oblongæ plus minus apparent pro ratione lymphæ retentæ, morbi pertinaciæ, aut quod occupant spatii.

Interdum hæc excreſcentias (aa) producant carunculæ mirtiformes, aut vaginæ rugæ oblongatæ, vel tumor glandularum, aut cellularum (bb) adiposarum hujus organi; harum partium vero augmentum ab obſtructionibus, aut callositatibus originem habet, quæ lympham morboſam retinent, in hoc caſu excreſcentia plerumque nervoſa, glanduloſa, aut pinguidinoſa eſt, modo lata, modo anguſta, modo mollis, modo dura ſilit in ratione partis affectæ, aut lymphæ ſpiſſitudinis.

Tandem protuberantiæ quædam veniunt pendendæ quæ *Lupias* reſerunt, ſeu tumores duros, ſteatomatoſos per internum vaginæ ambitum late reptantes; continenter eæ molles ſunt, earumque volumen a morbi perſiſtentia, aut lymphæ congeſtæ copia determinatur.

Ipſæ vero cujuſve ſint generis frequentius trans pudenda creſcunt, quia illa magis ulcerationibus, & carunculis ſunt obnoxia, ac facile intumeſcunt; id tamen minime impedit vaginæ intimam ſuperficiem ſimilibus vitiis, aut tumoribus affici poſſe.

III. Cicatrices poſtremum quæ vulvæ parietes ſimul conjungunt ejuſdemque lumen obſtrunt: ab ulceribus, aut ſciſſuris proveniunt, quæ neque ſatis deterſe, neque mundatæ fuere, idem (cc) pariter parere valent cancer ex luc veneræ ortum, (dd) excoriationes ex urina acri infantum inter incunabula retentam, varioloſæ puſtulæ ſupuratæ, (ee) combuſtiones, ſciſſuræ a vulneribus natæ, (ff) aut laborioſi partus, (gg) omnia indicatis obſervationibus confirmata.

Cum pudendorum labia, & vaginæ oſtium magis pateſcant ea ulceribus etiam, ex-

*Aſtruch de Morbis Mulierum.*

D 3

co-

(y) Memoires de l'Académie des Sciences Ann. 1705. Hiſtoir. pag. 32.  
 (z) Nicolaus Tulpius. *Obſervat.* Lib. III. Cap. 31. Chriſtophorus Valerius. *Schol. obſervat.* Part. II. Cap. 39. Acta Berolinenſia Dec. II. Vol. F. pag. 35. Acta Brundiorum Lipſienſia Ann. 1726. *Obſervat.* pag. 46.  
 (aa) Antonius Benivenius. *De abditis morb. & ſinet. cauſis* Cap. 79. Johannes VVierus. *Obſervat. Lib. I.* Acta Curioſorum Naturæ Decur. III. An. I. *Obſerv.* 144. Nicolaus Tulpius. *Obſervat. Lib. III.* Cap. 34. Diſſequi in mulieri quadraginta annorum tumorem ſteatomorum ſphæricum altero pазиетum vaginæ lato pedunculo adhaerentem, qui duplicem pendebat libræ.  
 (bb) Anatomici qui hymenis exiſtentiam conſiderunt carunculæ mirtiformes putant a primitiva conformatione originem habere. At cum in ea ſententiæ parte ita in hæc decipiuntur, nam ſi hymenem reperiatis nunquam carunculas videbis, & ſi carunculas nunquam hymenem, id confirmat carunculas marginem tantum eſſe concife hymenis, quæ diverſimode inſeræ in parvulas appendices, illum producit.  
 (cc) Antonius Benivenius. *De abditis morb. & ſinet. cauſis*, Cap. 31. (dd) Iſbrandus de Diemerbroeck. *Anatom.* Lib. I. Cap. 26. Johannes Nicolaus Peclinus. *Obſerv. Medico-phyſicæ*. Lib. I. Cap. 25.  
 (ee) Paulus de Sorbait. *Ephem. Curioſ Natur. Decur. I.* Ann. 3. Obſ. 173. (ff) Gregorius Horſtius *Opera Tom. II.* Lib. IF. *Obſerv.* 55. (gg) Marcellus Donatus. *De media hiſtoria mirab.* Lib. F. I. Cap. 2. Johannes Riolanus, pater, Art. bene medendi Sect. IV. Traçt. 2. Cap. 3. Caſparus Baſchius. *Theatr. Anatom.* Lib. I. Cap. 59. Et *De Hermaproditis*. Lib. I. Cap. 38. Felix Viaterus. *Obſervat.* Lib. I. pag. 258. 259. Guillelmus Fabricius. Hiſdanus. *Obſervat.* Cent. VI. Obſ. 67. Johannes Riolanus, filius. *Enchirid.* *Anatom.* Lib. II. Cap. 37. Et *Antropograph.* Lib. II. Cap. 35. pag. m. 107. Thomas Bartolinius. *Hiſtoriz. Anatom.* Cent. II. Hiſtoir. 31. Rudolphus Jacobus Camerarius. *Miſc. Na. Curioſ. Herman.* Cent. IX. & X. Obſerv. 71. Johannes Conradus Beckerus. *De inculpatâ natiuitate* s. XVIII. & ſeqq.

coriationibus &c. sunt magis obnoxia, ibique facilius coalescunt vaginæ parietes, quamvis prope matricis idem evenire possit; siquod eorum fenomenorum illuc nanciscatur.

De cetero hujusmodi cohesio ubivis iis de causis fiat compacta, vel laxa; externa, vel profunda, plus minusve, aut extensa apparebit prout ulcera, scissuræ, aut excoriationes diversimode locatæ fuerint, quod maximam concomitantium varietatem inducere potis erit.

### §. III.

#### *Differentiæ.*

I. **P**rima differentia inter conformationis vitia, quæ vulvam, aut vaginam respiciunt, ab ipsorum desumitur natura, quæ triplicem agnoscit vitii speciem; aut membrana quæ vaginam intercludit, aut natam excrecentiam, quæ illam obluxit, aut parietum cohesionem, quæ ipsam pariter ocludit.

II. Secunda differentia a vitiorum eorum origine nanciscitur; nonnulla enim ad primam nativitatæ conformationem pertinent, hujusmodi sunt membrana vaginam obstruentes, alia a nativitate consuecunt fieri, ut carne protuberantiæ, quæ cavitatem obturant, aut cicatrices pudenda, vulvamque jungentes.

III. Tertia ducitur differentia ex natura, & numero functionum læsarum; quapropter ut recte judicemus, quinque præcipuas uteri functiones perferuari oportebit; menstruationem videlicet, coëulam, conceptionem, partum, atque urinæ exitum.

1. *Menstrua* quandoque iis etiam obstantibus idoneo relicto spatio libere currunt, interdum lente, aut difficillime perfluunt, meatus angustia causa, alias profusus desunt vagina penitus obturata.

2. *Matrimonii usus* ea obacula implicant, quando vaginæ orificium invadunt, minime vero si intus vel prope uterum sint locata.

3. *Conceptioni* ea aliquo modo officiant, possibilis tamen videtur, modo uteri, cum vagina communicatio penitus non intercipiatur, aut matrimonii non impediatur usus, non desunt tamen observationes, quæ in iis casibus concepisse mulieres affirmant.

4. *Partus* difficilis, diutinus, ac laboriosus redditur, quando organi vitia meatum coarctant; impossibilis vero si illum ocludant, nisi intumescencia, (quod aliqua observatio docet) a gestatione orta, cicatrices illas ante (a) partum frangat, quæ vaginam conglutinant, atque confringunt.

5. *Urinæ exitum* minime impediri posse arbitror a vitiis intra vaginam, aut circa ejusdem orificium adnatis; citra hoc enim urethræ foramen patet, ac ob ea, quæ intra vulvam adsunt incommoda rarissime sufficiens saltem implicabitur urinæ (b) transitus, unicam observationem porro didici, quæ hanc videtur ostendere sententiam.

6. Plures alii dari possunt casus ex simplicibus compositi, quorum singularem indaginem supervacaneam cenfeo, cum ex simplicium notione adhuc animadverti facile innoteant.

### §. IV.

(a) Gulielmus Harvey. *De partu*. Thomas Bartholinus. *Historiar. anatom.* Cent. V. Hist. 43. Franciscus Paullinus. *Ephem. Curios. Natur.* Dec. 21. ann. 7. in *appendic. Obiciv.* g. Dec. 7. *Mémoires de l'Académie des Sciences*, Année 1713. Hist. pag. 37.

(b) Apud Gregor. Horstium, *Opera* Tom. II. Lib. 10. *Observ.* 55.



## §. IV.

*Symptomata.*

1. **C**onformationis vitia nondum menstruatis mulieribus nullum ipsis damnum inferunt, nullamque functionem lædunt.
2. Supervenientibus etiam catameniis nullo conqueruntur incommodo, eaque libere stillant, dummodo effusio penitus non intercipiatur, vel nova uterus munera non subeat, aut puberes in virginitatis, statu persistant.
3. At ipsis jugatis, ea vitia facile poterunt copulam, conceptionem, aut partum implicare, duas nempe, vel tres simul earum functionum pro loco, & vitii indole ledere.
4. Si hujusmodi vitia omnino vaginam repleant, fluxumque impedian, symptomata consequutura esse credideris primæ eruptionis propria; tunc maximam difficultatem egras pati videbis, nam phenomena omnia periodice evenient, quæ illa indicare solent, absque quo unquam erumpant.
5. Hujusce rei suspicio augetur, cum affluens sanguis uterum inflet, distendit, atque dolentem reddat, ut hujusmodi symptomata pro uteri obstructionibus haberi videantur.
6. Abdomen tandem tumet magnopere, & sanguis utero retentus vaginam premendo intercludit ita cruoris e vulva regressum, ut oedemati speciem inducat, quæ novas suspiciones præbet.
7. Cum imi ventris tumor uteri positui respondeat, & cum eo una circumscibatur, nil mirum si frequenter egræ fetum gerere sibi suadeant.
8. In diem matricis inflatio crescens venas iliacas continenter premit quæ refluxum sanguinis retardando pedum, crurum, aut femorum oedemata necessario erunt superventura.
9. Matrice amplius dilatari impedita, ut ipsa nequeat sanguinem recipere, qui singulis mensibus uterum petit, in similibus circumstantiis ægræ versari debent, ac menses revera suppressi fuissent, ac, sicut *cap. IV.* indicavimus gustus læsione *Pica* videlicet *Malacia*, tum digestionis detrimento, nausea, atque vomitu cruciabantur.
10. Facile porro videtur sanguinem uteri cavitate detentum circumposito calore corrumpi, cujus putrescentiæ gradus plus, minusve intensus fiat pro diversa sanguinis conditione, aut deleteria indole; quare sanguis, quem incisionum auxilio tunc uterus effundit, fetidus, corruptus, ac putrefactus pene reperitur.
11. Dolores itaque imi ventris, deturpata digestionem, atque corruptus sanguis, qui lymphæ permiscetur per vœnas uteri lymphaticas circulanti, febrilem excitat commotionem persistentem, levem tamen, & anomalis exacerbationibus obnoxiam diversarum causarum ergo, quæ intensitatem, reditumque variant, ut lentam hereticam febrem perbelle designent.
12. In iis mulieribus, aut puberibus, quæ jam mensuris gaudent, quibus per accidens conformationis vitia superveniunt, quæ nisi secundæ aut tertiæ speciei esse poterunt, ea phenomena omnia inducere valebunt in iis obvia suppressionibus, quæ a vaginæ, aut vulvæ completa occlusionem originem habent; illa autem celerius, intensiusque evenient, nam menses diu confirmati, & uberrimi, qui citius uterum replerunt, citissime etiam ad summum gradum superallata perducunt symptomata.

## §. V.

*Diagnosi.*

I. **V**itia conformationis, quæ a natalibus sortita sunt, ut membranz quæ vaginam interceptiunt in infantibus minime conspiciuntur modo vulvam non aggrediantur, quod nullo confirmatur exemplo; plerumque vaginæ defectus nisi adultis, aut jugatis mulieribus observari licuerit, quando initio menstruationis fluxus impeditur, vel quando jugatis, persistentibus menstruis matrimonii usus implicatur.

Haud infrequenter nos latent hujusmodi incomoda etiam suppressis menstruis vel sero percipiuntur, postquam diu suspicati erimus agram conceptu (a) laborasse, de quo innocentes erant, vel hydropem passas fuisse, de qua nunquam conquerbantur, cum vero sint connubio junctæ interdum accidit sponso minus expertos nisi post longum tempus consummationis impedimenta agnoscere, qui verentur cuique dubitationem communicare.

Itaque quotiescumque mulieres menstruis deficiunt etiam si periodice singulis mensibus symptomatibus vexentur menstruis obviis, & abdomen in diem sine causa manifesta increseat, tunc suspicari licebit vitium conformationis adesse, quam ob rem si parum cunctaberis circa exteriorem imi ventris indaginem, omnis difficultas evanesceat; nam uterus conceptu carens tumidus tamen apparebit, sphericus, æqualis, atque mollis; verum compressus nulla commotio perfentietur, quod nullum fætum existere designat, & sola aqua, aut sanguine infarciri uterum confirmat, quare vaginæ meatum examinando omne gestationis dubium aufertur.

II. Inter vitia conformationis accidentalia excrecentiæ carnez, quæ sensum per congestionem sunt diu latere possunt, tum in puberibus, cum in conjugatis, si intimius vaginæ adhareant, verum cum raro amplitudinis ergo menses interceptare valeant, vel nisi post longum tempus id accidat; itaque sapissime plures feminz tuberculis, lupiis, aut hujusmodi protuberantiis laborantes, in hoc statu diu persistunt citra ullam hujusmodi suspensionem.

III. Res aliter se habet, si cicatrices vaginæ, aut vulvæ parietes jungant, illæ enim, a cognitis causis, scissuris videlicet, combustionibus, aut ulceribus neglectis, derivant, ut omnium hujus partis lesionum hæc facilius innotescat.

IV. Cujusve sint generis vitia illa, vel ubivis locata nihil est facilius, quam eorum existentiam, positum, aut naturam detegere, satis erit vaginam digito oblinito penetrare, aut speculo uteri, aliove instrumento uti, quibus interior vaginæ oculis subsiciatur, lætitanzia hinc fœnomena ostendens, quæ tactus impar fuerat investigare.

V. Causarum vero indago frustranea videtur, nam earum cognitio parum influit in morbi prognosi, aut curatione, idcirco si cui libuerit rem intimius perscrutari hanc theoriam cum cognita morbi indole, & specie comparet, & notiones perpendat, quæ egræ valebunt suppeditare.

## §. VI.

(a) Johannes Wierus *De præstigiis Dæmonum* lib. II. Cap. 38. *Casus secundus*. Bartholinus *Casus* *Observ. Medic.* 23. Guilielmus Fabricius Hildanus. *Centur.* III. *Observ.* 60. *Exempl.* 3. Johannes de Muraltis. *Ephem. Cur. Natur. Duc.* II. ann. 3. *Observ.* 151.

## §. VI.

*Prognosis.*

**P**ROGNOSIS versatur vel circa detrimenta, quæ organi vitia agris afferunt, vel circa difficilem medendi rationem.

I. Ea damna in mulieribus citra gestationem existentibus menstruorum suppressionem facere, atque in gravidis difficiliorem partum inducere valebunt.

1. Retensionis respectu, vidimus jam superius damna hinc derivata qualia, & quanta esse possint pro diversa suppressionis pertinacia.

Subsequuntur ex iis infensas magis evadere membranas, quæ exacte vaginam claudunt, quam eas, quæ vel aliquo sunt pertusa foramine, vel quam etiam si exiguum pandunt exeunti sanguini viam.

Verum easdem membranas vaginam penitus obtegentes majorem noxam afferre quam cætera harum partium vitia, excrescentiæ videlicet, & cicatries, quæ absolute numquam menstrua supprimunt.

Cicatrices tandem, quæ fudenda coeunt carneis protuberantiis magis molestas esse, quia fluxuro sanguini arctiorem transitum relinquunt.

2. Circa partus expulsionem ea vitia sunt magis pertimescenda, quæ remediis subijci nequeunt.

Ideoque ceteris paribus membranæ densæ, compactæ, & callosæ, subtilioribus laxis, gracilibus, magis perniciosæ experiuntur.

Ita protuberantiæ carneæ exiles, superficiales, adiposæ, atque molles, minus detrimenti inferunt, quam crassæ, duræ, & syrrhosæ.

Tandem cicatrices laxæ, arctæ, patentes, minus lædunt, quam latæ, & compactæ.

II. Valetudini recuperandæ obijcitur præsertim membranas secandi difficultas.

Idecirco membranæ tenuiores, quæ facile inciduntur ad vaginæ ostium succrescentes, cito etiam convalescunt, at quæ intimius penetrant difficillime evelluntur.

Excrescentiæ vero carneæ segnius sanantur, cum haud facile ferro, aut caustico possint eradicari, præsertim si latæ, profundæ, syrrhosæ, aut ampliori basi adherent.

Cicatrices arduum pariter erit secare, cum membranas vaginæ simul coalitas difficillimum sit separare, præsertim cum per longum, latumque vaginæ ambitum arctissime coeant.

III. Prætereundum autumo obstaculum, quod vitia conformationis urinæ exitui præbere possint; nam raro id accidere admonuimus, vel quod matrimonii usui officiant, nam præter sterilitatem, quæ apud jugatas tantum magni facienda est, cæteris nullum damnum ex iis erit superventurum.

IV. Reliqua sunt duo ab organi vitio magni ponderis consecutura, quorum primum ad excrescentias carneas pertinet, quæ sæpe dolorosæ, lancinantes, &c. raro tamen carcinomatosæ fiunt; alterum ad sanguinem attinet utero, & vaginæ detentum, qui eas partes comprimit ita, ut gangrenam inducat, quæ haud infrequenter evenit, modo sanguinis infarcentis exitum promoveamus.

## §. VII.

*Curatio.*

**E**TIAMSI hujusmodi cruciatus summam inter se affinitatem habeant diversa tamen singuli medella indigent, quæ specialem explicationem postulat.

## I. Hi-

I. Hipocratis (a) praxim profecuturi efcharoticis tantum, etiam efficacioribus uti deberemus, ut membranae corrodantur, quæ vaginam investiant, at longa experientia docuit hujusmodi methodum diutinam, laboriosam, vel periculosam evadere, ac nostris temporibus omnes conveniunt Medici ipsis tutius, prometiisque sectione mederi.

Ægra itaque lætuli, aut sedis margine locata, manibus etiam si opus requirat, pedibusque lithotomorum more vinctis, tum vulvæ labiis apertis patens hinc membrana sculpello perpendiculariter scinditur, si membrana laxa fuerit, longam incisionem sufficiet, nam latera sponte evanescent, at si ea compacta, dura nimis callosa apparuerit, oblique ea conscindere necesse erit, ut vaginæ meatus duplici hac sectione profus pateat.

Raro hæc incisio sanguinis jacturam inducit, vasculorum exilitatis ergo, quæ exiguo numero hæc membranas replant; sapientis tamen erit adstringentia nonnulla ad manus habere, qualia sunt sanguis Draconis, bullus, aut aluminis coagulum, quibus tenues imbibuntur lennifici vulneri superimponendi, si ulla superveniret hæmorrhagia, quod raro evenit; de cetero digerenti annodyno satis erit partem oblinire ex ovorum vitello, terebinthina, e melle rosato composito, qua methodo persistendum suadeo, donec cita appareat valetudo.

In iis mulieribus, quæ diu suppressione elaborarunt, hujusmodi adnatæ membranae extrinsecus a confluenti sanguine expulsa prominent valde, ut scindi facile permittant, sanguis vero post inceptam sectionem erumpens incisorem sæpe impingat, eare in his casibus opportunum censeo fluxum finire, donec sponte desinat, vel agram pedibus erigere, ut vagina facilius mundata totum opus bene se vertat; his rebus peractis injectionibus vulnerarii pauco mele rosato remixtis, vaginam, utrumque detergere conveniens erit, substitui poterunt etiam magis detergentes injectiones, ex Acrimonia videlicet, Marubio, aut Aristolochia, paucove mele rosato patrata.

Quo intimius morbozæ hæc membranae penetraverint, eo difficilior earum evulsio videbitur, tunc utri speculo, dilatata vagina, cultro linteolo circuminducto, ut acies denudata tantum relinquatur, diligentissime operationem inire tentabimus, eoque cautius, quo intimior, & angustior erit conscindenda membrana, de cetero ut supra indicavimus erit procedendum.

II. Escharotica, quæ ad membranas evellendas parum conveniebant, minus ad excrescentias carneas eradicandas opportuna videntur cum pro crassitudine nimis resistant, neque poliporum more extirpabuntur, ne lacerationes superveniant lethales, at optimam praxim profecuturi, illas ferro tantum separabimus.

Quando illæ prominentiæ vaginæ tantum ingressum occupaverint, facile erit eas sinistra manu compressas forfice, aut cultro extirpare, sedulo tamen instrumenti gressum animadvertendo, ne sanæ lædantur partes; etenim si intimius locatæ fuerint, minus tutæ illas scindere licebit, quia neque manibus recipi, neque speculo vaginam satis distendere poterimus, ut ob loci angustiam volcellæ, aut fibulæ auxilio non indigamus.

Scindi facile poterunt carnea portuberantia, absque quo earum basis vinciatur cum procul sit gravis hæmorrhagiæ metus, tamen adstringentia nonnulla, aut vitrioli frustulum quandoque ad manus habere opportunum erit, ad cohibendum sanguinem, quem interdum vas aliquod amplior effunderet, verum si colorem rubicundum, aut lividum illæ referat prominentiæ, atque suspicio adsit ab incisione uberinam supervenire posse hæmorrhagiam, duplo vinculo ad basim arcte illas circumcingere opus erit.

Post incisionem primum sicca filamenta usuveniunt, verum nimia copia perfluente

(a) Lib. de Sterilitate. Et Lib. II. De Morbis Mulierum.

fluente sanguine erunt torundæ superimponendæ superius enunciatis adstringentibus imbutæ; postea ulcere vulgari digerenti illinito, donec supuratio immineatur balsamo Arcæi, & paucò balsamo viridi valetudinem obtinebis; si ulcus ichorofus apparebit unguentum brunum *vulgo* erit adhibendum, quod leniter abstergat, ac si initio uberrima nimis supuratio videatur iniectionibus superiori articulo indicatis uti poteris, parum addendo aquæ vulnerariæ, ac tincturæ mirrhæ.

III. Cicatrices superficiales, quæ vulvæ labia conjungunt, externam plerumque cohesionem gignere solent, ut specillo canaliculato per eam partem intro-misso, quæ superius, vel inferius fatula relinquitur, & sinistra manu illud firmiter comprehenso prope coactionis lineam facile erit altera manu cultro tuto labia separare, quibus imposterum superius indicato digerentium usu, mederi sufficiet.

Quando cicatrices profundius penetraverint, aliquem identidem tramitem relinquunt, alias nullum, 1. in primo casu enim dilatare oportebit hujusmodi meatum, at plerumque tentamen longum, ac inutile evaserit, etiam si innocuum experiatur, dum hanc incedendi rationem amplectimur, primo cicatrices laxare opus erit reiterato fomento ex plantis emollientibus, Malyæ videlicet, Althææ, aut feminum Lini &c. confecto, verum linteo, aut spongia iis decoctionibus imbuta vaginæ margini applicabitur; quando partes satis laxate fuerint, introrittere poteris radicem Gentianæ, aut spongiæ frustulum præparatum, numquam intermissis emollientibus fomentis, ac prout cicatrices magis laxabuntur amplioribus frustulis, spongiæ, aut Gentianæ uti opus erit, donec idonea fiat parietum aperitio.

2. Frustranea prorsus hujusmodi methodus videtur quando nullam cicatrices patulam relinquant viam, tunc ad chirurgica auxilia erit deveniendum, ut etiam in superrime allatis circumstantiis incassum tentata dilatatione, ægram enim vinctulis lectulo firmare debebis, ut articulo primo demonstravimus.

Quibus cautionibus adhibitis, scalpello membranæ simul coarctæ separabuntur, quod difficilius erit peragere, quo magis intra vaginam erunt protensæ; nullum specillum requiri videbitur, si prominentiæ vaginæ marginem tantum occupaverint, necessarissimum tamen evaserit, si intimius penetraverint; apparatus, & consecutiva medella haud absimilis erunt iis, quæ possunt dissecare membranæ.

IV. Quando tandem membranæ, prominentiæ, seu cicatrices prope uteri ostium locatæ reperiantur, nulla adest medendi tuta ratio, neque Chirurgorum ullus audebit, in iis profundis latebris operationem inire, ubi nefas esset sanas membranas, uterumque vulnerare, a quibus teterrima scœnomena, & mors ipsa esset consecuturæ, quapropter naturæ morbi curationem, optatumque levamen relinqui censemus, & observatione edocti, si uterus sanguine, vel raro sætu gravis sit, continua eorum pressione, dilatationem sperare poterimus, quæ obstacula illa evellere valeat, a quibus miserrime uterus (b) obtegitur.

*Circa eas operationes necessaria cautele.*

I. Nulla est instituenda chirurgica medella, nisi præmissa venæ sectione, primisque viis expiatis, imo diu ægras præparare oportebit, si excrescentiæ evellendæ, aut cicatrices scindendæ fuerint; præsertim cum patientes male se habeant,

(b) Johannes Riolaus *Anthropograph.* Lib. II. Cap. 35. Stephanus Blancardus. *Collectan. Medic. Physic.* Centur. III. Obs. 36. Mémoires de l'Académie des Sciences Ann. 1755. Histoire pag. 52.

biant, aut a diutina suppressione emaciatae sint, vel noxiis (c) laborent symptomatibus.

II. Si qua adfit levis vaginae coarctatio ab aliqua ibi nata cicatrice operationem cunctari oportebit praesertim si mulier fetum gerat, animadvertendum enim est an gestationis progressu, uteri rarefcentia, atque tumor valeat ipse vaginam referare, quod auctorum observationes sperare suadent.

III. Hoc naturae auxilio frustra optato postremo etiam gestationis mense absque noxa sectionem, vel amputationem inire poterimus, nam ea sero nimis instituta, vaginae inflammatio facile supervenerit, quae cavitatem arctando partum implicabit, nefas pariter erit jam propinqua fetus expulsiōe operationem protrahere, ne infans incautum laboret in superando obstaculo, ac mater, & ipse laedatur.

IV. In his rebus peragendis cavendum est ne vaginae tunicae vulnerentur, si membrana enim sit incidenda, ut superior vaginae pars tueatur cui veslica adheret, tunc incurva novacula cuspidē obverso incisio erit instituenda, neve ad oppositam usque inferiorem partem sectionem perducendam, ne vaginam rectumque intestinum ipsa offendant.

V. In prominentiis evellendis pauci faciendum erit, si ipsarum basis non omnino scindatur, nam supuratio sponte absolveret, vel caustica assument, quod esse reliquum.

VI. Quando de supuratione agitur parietum vaginae, cicatricis ergo, simul cohaerentium, per eandem semitam ipsas secare oportebit, per quam coalescunt, satis enim apparet, quale detrimentum asserre possemus si latera vulneremus, vel abraderemus ita, ut impares evaderent partus nifum absque laceratione sustinere.

VII. Ex his operationibus postremis duabus potissimum consequitur, ipsas diligentia, temporis, & experientiae multum postulare, neque eas sollicite simul, & feliciter ad perfectam valetudinem perducere posse videtur.

VIII. Tandem haud difficile est, quod interim parietes coalescant antequam vulnus convalescant; id in simplici membranarum incisione minus timendum erit, verum in prominentium extirpatione, aut cicatricum divulsionē facile eveniet; multiplici methodo huic obesse poterimus, alii spongiam oblongam intromittunt unguento Diapalmæ, aut Tusciæ, oleo amygdalarum dulcino soluto oblitam, alii pessarium adhibent ex lino confectum similibus imbutum medicamentis, quidam tandem laminam plumbeam aptant pluribus pertusam foraminibus, iisdem linimentis madidam; Hæc medendi rationes eque omnes valent parietum cohesionem impedire, superest tantum ea crebre reiterare, atque idonea firmare tenia, vel tutius egras lectulo detinere usque dum perfecta sit valetudo, ut pessaria necessarium locum serrent.

C A-

(c) Aristoteles. *De Generatione animalium*. Lib. IV. Cap. 4. Franciscus Paullinus *Miscellanea Curiosior. Naturæ*. Decur. II. Anno 9. in *Append.* Decad. II. Obierv. 9. Michael Pauli, *Miscell. Curiosior. Naturæ*. Decur. III. Ann. 7. & 8. Obierv. 81. Thomas Bartholinus, *Hist. Anat.* Centur. V. Hist. 43. Guillelmus Harveyus. *Exercit. de partu* pag. 518. Mémoires de l'Académie des Sciences. Ann. 1712. pag. 37. de l'Histoire.

## CAPUT VI.

## De difficili menstruatione, &amp; laboriosa.

## §. I.

## Descriptio.

**S**anitatís statu menses absque ulla vel saltem gravi molestia apparere, persistere, atque desinere debent; morbum porro adesse dicimus, quando difficiles sunt, aut laboriosi experiuntur, si videlicet nocua nonnulla symptomata, quæ medellam possant, eruptionem præcedant, aut ipsam comitentur.

Ea scenomena sunt plerumque lumborum, scemorum, atque inguinum dolor, vulvæ, vaginæ, aut hemorrhoidum tumor, uteri tensio, atque colici cruciatus, digestionis dein, gustusque lésiones, corporis horror, & subsultus, motus tandem convulsivi, & hysterici quandoque.

Illa tamen neque omnes mulieres eque aggrediuntur, neque omnia completim in omni subiecto eveniunt.

I. Interdum naturali, & periodico fluxu superveniente desinunt, alias sanguinis jacturam, vel incompletam eruptionem faciunt, neque uberrimam scilicet, neque persistentem.

II. Modo dolor molestiæ ante eruptionis initium apparent, quæ semel statuta deficiunt, modo inter fluendum sanguinem ea scenomena fastidiunt egré & fluxu absoluto absunt, modo jam eruptione peracta, per aliquod tempus supersunt.

III. In nonnullis subiectis menstrua subsequitur albus fluor, in pluribus aliis deest nullo relicto incomodo.

## §. II.

## Causæ.

**U**teri tumor, atque tensio in laboriosis mensibus, cruciatusque, quos ægre patiuntur, duo confirmant effata, *primum* quod vasa uteri sanguinea cruore valde turgcant, *alterum* quod sanguis, qui ea vasa replet segniter per appendices venosas in utero manet, quare vel sero, vel imperfecte erumpat.

*Prior* casus naturæ valde consonus est; vasa vermicularia enim debent mensis spatio lactea turgere lymphæ, eaque semel turgida propinquas venas comprimere, qua pressione ibi detentus sanguis localem plenitudinem producat mensibus necessariam.

In *secundo* casu alias res se vertit, menstruorum enim lex postulat, quod sanguis in vasibus congestus certa quadam facilitate in utero profluat; perniciosum porro esset, & citra naturam, si ille moleste, segniter, aut imperfecte profili-ret, hoc est, quod diutinam nimis & uberrimam plethoram producendo menses difficiles, & laboriosos redit.

Quærantur igitur causæ, quæ implicare valebunt ne congestum in utero sanguinem per venosas appendicum extremitates mensis periodo ipse sollicite erumpat; hæ tamen ad tres præcipuas classes reduci possunt.

I. *Prior* ad appendicum vitia pertinet, quæ renunt diu referari, aut imperfecte aperiantur, ut sanguis etiamsi ad fluxum dispositus nequeat necessaria copia, aut sollicitudine stillare.

## II. Al-

II. Altera vitia respicit fluxuri sanguinis, qui impar evadit uberrime fluere, patulis etiam venosis appendicibus.

III. Tandem ad amborum vitiorum copulam attinet cum neque appendices aperiantur, neque ille manare valeat.

1. Pluribus de causis appendices aperitioni resistunt vel imperfecte referantur.

1. Quia illæ compactæ nimis, densæ, aut rigidæ existunt, quod locum habet in juvenibus, vel adultis nondum completis catameniis donatis.

2. Quia interior uteri tunica, quæ extrema appendicum cingit, nervosa nimis est densa, & compacta.

3. Quia obstructions, tubercula, & syrri uterum deturpant, quæ appendices comprimendo ipsarum idoneam dilatationem impediunt.

4. Quia uterus interdum heretismo, aut convulsivis contractionibus laborans appendices coarctat ita, ut nullum, vel difficillime sanguinem effundat, hæc postrema causa, etiam si minus diutina, validior tamen experitur.

II. Sanguis intra venosas appendices cumulatus segniter, aut exigua copia triplici de causa perfluit.

1. Densitatis ergo, quæ ejusdem effusioni officit etiam si appendices sint bene constitutæ.

2. Quia lente sanguis in uterum irruit, debili cordis, & arteriarum impulsu, ut æquali tempore minima quantitate per appendicum orificia exeat.

3. Quia uno, eodemque tempore, & minus densus existit sanguis, & segniter irrumpit, quod duplici ratione effusionem imminuit.

III. Tandem tum appendices fero, vel pauce possunt referari, cum sanguis exigua copia, & lente fluere diversarum causarum complexus ergo, quas singillatim enuntiavimus, neque hujusmodi congeries infrequens est ut Capite IV. enuntiavimus.

Huic capiti mittimus pro singulari causarum explanatione, cum ex communibus sint, tum mensibus suppressis, cum laboriosis; ac gradu, & intensione tantum differant.

### §. III.

#### *Differentiæ.*

1. **C**um labor suppressionem non gignat, sanguis tamen in laboriosis mensibus ibi congestus, etiam si difficulter, debet tandem appendices referare; id tamen triplici ratione fieri poterit, vel prout natura postulaverit, vel altiori gradu, ut aperitio, scissura videatur, vel infimo gradu ut vix pateant.

In primo casu mensium conatus naturalem fluxum inducent, dummodo nullo sanguis inquinetur vitio.

Altero casu sanguinis jactura plus minusve uberrima apparebit in iis præsertim multis, quæ uteri vasa a copioso detento sanguine varicosa facta sunt.

Tertio tamen casu fluxus vel copia, vel persistentia, vel ambo simul inopidebitur, præsertim si sanguis spissus nimis sit, segnisque.

II. Quotiescumque in hoc menstruorum genere, vel naturalis effusio vel sanguinis jactura apparebit fluxus incommoda illico desinent, nam tunc vasa penitus exhauriuntur; at imminuuntur tantum ea scenomena, cum fluor incompletus videatur, ut in postremo casu evenit, in quo sanguinis infarctus, quamvis imminutus persistat, ut exigua copia fluor erumpens post effusionem plethoram relinquat, tum symptomata omnia confirmet, vel saltem eorum maximam partem, quæ sensum, sensumque evanescent, quando sanguis circulum perfecte recuperaverit.



III. In mensibus laboriosis, aut vasa lactea apperiantur exhaurianturque fluctante sanguine, vel nunquam exinaniuntur, ut lymphaticus humor cogatur, vel ibi congeri, vel per lymphaticas venas sibi pandere viam.

In primo casu menses laboriosos neque albus fluor erit consecuturus, quia lacteus humor cum cruore simul fluxerit, neque uteri tensio supererit iis vasibus tum sanguineis, cum lacteis exhaustis.

In secundo casu fluor albus post rubrum superveniet ad totalem lacteorum inanitionem perdurans, quæ modo citius, modo serius eveniet, uteri hinc tumor, atque dolor evanescent, & exinanitis vermicularibus nihil sanguinis circulus implicabitur.

In postremo tandem casu nullus præter cruoris effluvium apparebit albus fluor, quia vasa lactea non exhauriuntur, ideoque tensio diu persistet, neque desistit usque dum perfecte exinanita non sint vermicularia, quod lactei humoris resolutione post diutinum tempus fieri poterit.

## §. IV.

*Symptomata.*

I. **F**œnomena in laboriosis menstruis obvia, ab aliqua subsequenti causa dependet.

*Prima* est vasorum uteri turgentia nimia, quæ vicinis partibus communicatur per lateralia ex uno nata trunca vascula, latis, terretibus ligamentis, pelvi contentis visceribus, & muscibus vaginæ, vulvæ aut recti sphincteris similem plenitudinem affert; ex his procedunt matricis dolor, atque tensio, tum foetorum, lumborum, ac renum cruciatus, vaginæ denique vulvæ, & venarum hemorrhoidalium tumor.

*Secunda* oritur a reduci lymphæ lactea, quæ saliva, & gastrico succo remixta eorum humorum puritatem deturpat, & virtutem infirmat, id *Pice*, *Malaicie*, & gustui depravato locum præbet, tum pravas digestionem, nausæas, vomitus, & ventris fluxum inducit, omnia a lactei fluoris suppressione producta.

*Tertia* tandem causa adest, quando dolorosa sit in utero compressio, quæ per subsequentes sympathicas commotiones infra enuntiandas nascitur, & leviora hysterica passionis scenomena adsunt, quæ interdum graviora fiunt.

II. Generice puberes his sunt magis obnoxie molestiis, quam ex, quæ semel menstruarunt, nam tum appendices venosæ, exiguæ magis, & compactæ existunt, cum uteri interior tunica dura magis, atque densa reperitur.

III. Virgines plerumque, etiam menstruis donatæ plus ipsis laborant, quam mulieres viro subiectæ, quia in illis uteri contextus constipatus nimis apparet.

IV. Simili ratione, quæ nondum gestarunt, majorem inter menstruandum incommodum sentiunt, quam ex, quæ pluries pepererunt, nam tum conceptu, cum partu vasa uteri omnia relaxantur, ut facile ab affluenti sanguine explicari, atque distendi sinant.

## §. V.

*Diagnos.*

I. **A**grotantium querelæ satis docent numerum, naturam, & scenomenorum violentiam, quæ menstrua antecedunt, vel illa consequuntur, tum qualis sit menstruorum labor ostendunt.

II. *Ægræ* ipsæ animadvertunt si mensium fastidium, naturalis fluxus, sanguinis

nis jactura, vel incompleta effusio expediverit; si semel statuto fluxu sit destitutus labor nec ne; si menses sit subsecuturus albus fluo; tandem hoc deficientes perferunt, si dolor, aut tensio fuerint superstites, ut qua corripiantur laboris specie nos ipsæ admoneant.

III. Innotescunt pariter, & distinguuntur diversæ menstruum hujusmodi causæ.

1. Linteoli inspectione si illud vix sanguine inficiatur, quod catameniorum laborem a cruoris spissitudine procedere confirmat, contra vero suspicari licebit appendices venosas non humorum crasum peccare, quando linteola sanguine intrisa valde reperiuntur, atque madida.

2. Temperamenti notione si pulsi debiles, lenti, ac rari appareant, & ægra emaciata gravis existat, tunc plerumque sanguinis densitati morbus tribuitur, contra vero ab appendicum visio solet derivare, si pulsi arietantes, frequentes, & celeres sint, patiens vero hilaris, vivida se monstret.

3. A natura, & qualitate fluentis sanguinis diagnosi desumitur; minime enim poterimus causam morbi cruoris crassitudini referre, quando fluxus celer, & uberrimus sit, facile vero ei tribuitur, si vitra vulgarem ubertatem, vel copia, vel persistencia deficiat.

## §. VI.

### *Prognosis.*

1. Laboriosi menses suppressis mensibus minus nocuæ evadunt, nunquam tamen sunt perniciæ expertes, experientia porro docuit multiplici ratione id accidere.

I. Pernicies desumitur a diversâ præcedentium, aut concomitantium symptomatum indole, plus minusve deleteria.

2. Ab ægotantium ætate ut in juvenibus facilius, quam in adultis mulieribus laboriosa menstrua convalescant, in iis enim sperare licebit, vasa uteri sensum sensumque dilatari posse, donec illa confirmantur, at frustra id expectabimus in adultis.

3. Pro diversâ ægræ conditione, nam jugatæ magis laborant, quam nubiles, magis vero quæ semel pepererunt, quem cæ, quæ nunquam, in illis enim vitium suspicatur a statu naturali valde distitum, ac proinde difficilioris medelæ.

4. In ratione indolis causarum diversæ; menses autem laboriosi quos vasa labefactata gignunt, pertinaciores iis sunt, quos sanguinis peccata faciunt, quia difficilior est uteri vasa ad naturalem statum reducere, quam sanguinem repurgare.

5. Morbi vetustas quintam prognosis differentiam præbet, nam quo longeva fuerit mensium suppressio, eo mederi difficilior, diutinum porro tempus valeitudini plurimum officit.

II. In genere tum laboriosa catamenia, cum incompletum effluvium absolutam plerumque suppressionem faciunt, eique propria signomina omnia producant.

III. Menstrua laboriosa, quæ consequuntur sanguinis jacturæ, persistentem inducunt rubrum fluorem, qui pro diversâ intensitate, plus minusve periculosus existimatur.

IV. Hujusmodi morbus dum fluorem album gignit interdum diu persistens noxas sibi proprias omnes producit.

V. Menses laboriosi albo fluore deficientes, qui tamen vel tensionem uteri, & tumorem comitem habent, vel diutini nimis sunt, syrrhum, aut matricis inflammationem designabunt, atque præcedentibus perniciosiores videbuntur.

VI. Quando tandem menses laboriosos naturalis consequitur fluxus, eoque con-

confirmato uteri dolor, atque tensio, tum fluor albus absunt, minus periculosi experiuntur plerumque, & facilius medentur.

## §. VII.

*Curatio.*

Indicationes quas in menstribus laboriosis implere debemus, illas sequi videntur, quæ in suppressis catamenii enunciatae fuere, eo itaque collineant:

1. Ad corrigendum appendicum vitium, ut molles extensibiles fiant, quæ dilatari, atque aperiri sinant.

2. Ad augendum eas versus sanguinis impulsus, cruorem solvendo comovendoque.

3. Ad liberam faciliæque eruptionem promovendam uterum levioribus contractionibus, atque modicis suctionibus excitando, ut appendices facilius referantur.

Simili ratione remedia, quæ nuper in menstruum promovendum tamen est ipsa cautius ac minori sollicitudine cunctari effectus minoris morbi perniciosi, inquit necessarium spatium renovandi me-

*Cautela.*

Laboriosis fluxus similes mutant cautiones, ac suppressos menses capite quarto vidimus postulare, tantum enim hic adere censeo.

I. Menses difficiles triplici ratione terminare, seu melius triplicem morbum producere, quod prospicere oportebit, ut sedulo remediis subveniamus.

II. Si enim suspiciatur, ab imminuto unoquoque mense rubro fluxu menstrua penitus esse desitura constanter, acriterque emenagoga remedia suppeditare faserit.

III. Si contra fluoris augmentum designet veram constantem cruoris jacturam esse tandem superventuram ab emenagogis saltem validioribus erit desistendum, eaque potius adhibere medicamenta, quæ modice fluxum promovent, vel saltem ipsa emenagogis addere, ut infra capite nono docebimus.

IV. Si denique hujusmodi menses consequatur albus fluor indiem increfcens, qui tandem persistere videatur, remediis uti necesse erit, in albo fluore utilibus, vel saltem ea emenagogis permiscere, quæ fusius capite decimo exponemus, ubi de fluxu albo erimus locuturi.

V. Quod si morbi pertinacia in cassum iis exhibitis auxiliis localem uteri vitium indicaverit, quod citra maximum ægræ periculum auferre nefas sit, palliativa methodo cunctari tantum oportebit, quæ symptomata imminuat, donec natura menstruorum defectui se assuecat.

VI. Eandem pariter diligentiam impendere conveniet, quo menstruum signum incommoda magis, & perniciose evaserint, etiam si efficaciori medicina speraremus illa subicere, & tunc radicalem curationem expectando ubi opus requirat, non erit palliativa prætereunda methodus.

VII. In utroque vero hujusmodi casu ea remedia impendere opus erit, 1. quæ valeant uteri plethoram imminuere, 2. quæ alio lacteam lympham evellant, qua vermicularia nimis turgent, 3. quæ matricis sensibilitatem obduant, & dolorosas impressiones molliant, quas plenitudo produxerat.

Talia sunt:

1. Dietæ regimen quo ægræ minorem chyli copiam generent cumque tenuio-

*Astruch de Morbis Mulierum*

E

rem

rem fecerant, ut aptior evadat lymphaticas venas subire; eadem de causa saluberrimum erit, quod hæ mulieres musculari motu se exercent, qui tum menses promovere, cum molestia accidentia compescere potis erit.

2. Reiterata identidem ex brachio venæ sectio ad copiam cruoris imminuendam, eumque ab utero revocandum.

3. Catharsis haud infrequenter erit promovenda ut humorum redundantia subducatur, mitioribus tamen purgantibus id patris ne intestinorum spasmodicæ contractiones incitentur.

4. Lavacra, & crytheria emollientia, annodyna, cathartica, aut anthysterica locum habent, prout uterum laxare, intestina expiare, aut hystericum morbum subjugare opus erit.

5. Decoctiones, seu apozemata diluentia diurhæctica, aperientia &c. opportuna sunt, ut lymphæ lactea tenuior facta facilius intret vermicularia vascula, ibique ortas lymphaticas venas subeat, vel ut eorum remedium auxilio, lymphæ exuberantis pars maxima per diurhæsim excernatur simili ratione, ac puerperæ lac separant.

6. Tandem narcotica anthystericis remixta usuveniunt in colicis doloribus, qui præcedunt, aut comitantur laboriosos menses, tum ad uteri dolorem compescendum, cum ad hystericos effectus præoccupandos, quos dolor inducere valeret.

## C A P U T VII.

### *De mēstruis alio devolutis.*

#### §. I.

##### *Descriptio.*

**C**um mēstruorum eruptio in adultis mulieribus serotina sit vel intercepta, aut conformationis vitio labefactata menses lenti, laboriosi, difficiles, ac inopes apparebunt, uno verbo, parum vel nihil perfluent, sanguis enim ibi retentus, atque in his vasibus congestus, quamdam sibi pandit viam per quamdeflectit, sive ut ajunt, *se devolvit*.

Nares plerumque, pulmo, œsophagus, & venæ hæmorrhoidales sanguini alio defestenti semitam parare solent, quare hæmorrhagia sanguineus excreatus, aut vomitus, fluxusque hæmorrhoidalis, haud infrequenter superveniunt, at nulla pene est corporis pars, quæ sanguinis exitum non sinat, ut plures observationes docuerunt.

Quandoque hujusmodi pseudo-mēstrua ubertate, atque periodicam naturalem florem emulantur, raro tamen; nam plerumque, aut manca, aut anomala sunt, vel utraque afficiuntur ratione, interdum nullum fastidium consequens habent, cum nares, vel anus sanguinem effundant, periculosa tamen & molesta evadunt catamenia quando per pulmones exspuntur, aut ventriculū egurgitantur.

Modo nullum doloris, aut tensionis defectu in utero effluviū indicium perferitur, modo dolore, & tumore aliisque obviis symptomatibus futuros menses uterus designat, modo omnia adfunt antecedentia, & concomitantia mēstruationis signa, imo aliquis apparet fluxus, qui mēstrua refert, eorum tamen utilitate expers.

#### §. II.

## §. II.

*Causæ.*

Cum catamenia ex sanguinis in corpore defectu absint, quavis de causa ipse deficiat, nedum vasis tunc exhaustis menses alio defecti posse persuadere, at ii devolvuntur quando alia procul diversa causa imminuti, aut suppressi appareant; cum enim unoquoque mense sanguis copiose in corpore congeratur, ideo utero impervio alio conatur per capillarium extremitates impetum facere, forasque exire.

Ea igitur est plenitudo, quæ menses alio vertit, at hæc generalior causa est, quæ undique æque agit, neque unam partem versus potius quam alteram actionem dirigit, quare ut specialem sibi sternat viam peculiaris partis diffusi hujusmodi universalis causæ vim intendat; causas obvias magis, & observationibus

utero in quibus menses devolvuntur, & si utrinque communicatio, facit ut facile transferantur, hæc de causa imperviis hæmorrhoidales venas, aut pudendo-

rumque per eam reptantium exilitas facilius ad actionem haud raro per nares, aut pulmones excreatus specie menses peridice erumpunt.

III. Vitium aliquod conformationis quandoque latitans, quod vasa in aliqua parte debilitat, aut liberam impedit circulationem, sanguinem ibi speciatim evocat, citra ullam externam causam, aut nocua symptomata quæ cruorem eo dirigat.

IV. Ulcera quandoque scissuræ, excoriationes alicujus partis in causa sunt, quod redundans sanguis per latiore hanc partem novam sibi aperiat viam, veteri menstruorum impervia, ab hoc procedit quod per cutem ipsam interdum scabie deturpatam, vel excoriatione abrasam sanguis facile erumpat.

V. Percussiones enim vel contusiones capillaria nonnulla vascula lacerando tumorem alicujus partis inducunt, ubi menstruus sanguis alias impeditus affluit, quapropter procul omnem externam læsionem per simplicem contusionem pergit sanguis, quam parvi faciebamus.

VI. Sucutiones, contractiones, atque partium convulsione repentinis morbis ortæ turgida proxima vascula comprimendo, aut convellendo, ea plerumque concidunt exitumque ita catameniis parant: per nares quandoque menstruus sanguis erumpit si capitis reuma sternutationem excitaverit; per pulmones stillat quando tussis vehementia ipsi convelluntur; per œsophagum expulit, si incompleta ciborum subactio vomitum promoveat; per hæmorrhoidalia exit tandem vasa quando ventris fluxus aut, tenesmus frequentes per alvum conarus excitat.

Ex his consequitur menses devolutos a duobus potissimum causis derivare generalis una, quæ plethora nimia est a mensium suppressione orta, altera specialis, quæ ab aliqua locali dispositione originem ducit; dum hæc duo simul concurrunt causæ, porro sanguinem citra vulgarem semitam novam sibi querere viam videbimus, frustra vero ea expectabimus scenomena, cum ipsa simul minime copulentur, aut infirmiter agant.

De cetero mensium effusionem alio devolutam hic statuendo a sola universalis plethora pendere, non ab ulla partium conformatione, nihil caput secundum offendimus

sendimus ubi specialem admittimus uteri structuram ad explicandum periodicum catameniorum fluxum cum huiusmodi effluuii species inter se maxime differant.

1. *Menses* alio devoluti nunquam supervenient nisi prævia uberrima plethora, hæc enim sufficere abque ulla peculiari partis textura vasa disgregare, contra vero *menstrua* sæpe vidimus placide revertere a nulla sensibili excitata plenitudine, ut specialem uteri conformationem admittere opus sit, quæ ad hanc partem sanguinem evocet.

2. *Pseudo-menses* nulla methodo procedunt, neque reditus temporis, aut durationi, neque progressui, aut decremento effluuii rationem habent: nil mirum ergo si sola plethora ipsos producat, eorum enim anomalia cum causæ productæ natura perfecte confert, quæ continenter inæqualis est, atque inconstans; at periodica catamenia tum in suo regressu cum persistentia, tum incipiendi, increscendi, aut decrescendi modo uniformia magis, & methodica referiuntur, difficile enim est solæ plethoræ methodicum effluviū tribuere, neque peculiarem uteri conformationem omittere fas erit, præsertim cum anatomicorum observationes ipsam confirmant.

3. Devoluti menses tandem partium ulcera inducunt, quod annunciat a scissuris vasorum plethoræ ergo natis ipsos originem ducere, contra vero catamenia nunquam uterum exulcerant, quod ostendit nullo modo vasa uteri cogi, aut scindi ab effluenti sanguine, sed appendices venosæ naturali suâ ratione sponte aperiri.

### §. III.

#### *Symptomata.*

I. Quando *menstrua* desunt citra uteri plenitudinem, quod in primo casu suppressionis accidit, devolvuntur tunc menses absque quo tumor, tensio, aut uteri dolor, vel ullum suppressionis indicium superveniat.

II. Vasa quandoque uterina sanguine replentur, ut in secundo, aut tertio suppressionis casu, & tunc alio se vertit *menstrua* eruptio, eaque ab uteri dolorosa tensione, aliisque vulgaribus menstruationis symptomatibus indicatur.

III. Tandem si sanguis non solum insarciat, verum supra opus distendat uteri vasa, laboriosa catamenia supervenient, & eruptionem alio deficiente antecederet, vel comitabitur vulgare effluviū, inops tamen valde, & impar menstruorum devolutionem impedire.

IV. Eruptionem plerumque a sanguine devoluto ortam illa sœnomena antecedent, quæ suppressa *menstrua* solent comitari: varia tamen pro causæ productæ diversitate esse solent.

V. Cum ea varia symptomata, quæ suppressionem comitantur aut pseudo-menstrua præcedunt, a sola plethora dependant; patet enim aliqua eruptione peracta in ratione ejusdem ubertatis genitricem plenitudinem imminui.

VI. Sane huiusmodi symptomata ad menses suppressos potius pertinent, ut interpres ipse autumat, quam ad devolutos menses: nonnulla tamen existant sœnomena, quæ hos speciatim respiciunt a peculiari plethora eruptionem præcedenti nata, quæ pro loci varietate variam indolem præferent.

VII. Si enim huiusmodi effusio per nares fiat, ægræ erunt tunc inflationi, calori, & capitis reumaticis affectibus continenter obnoxia.

VIII. Si per pulmones fiat, ægrotantes gravabuntur, moleste lectulo detinebuntur, continua tussis, thoracis calore laborabunt; tum circa alterutrum latus aut omoplatam de dolore punctorio conquerebuntur.

### IX. Si

IX. Si hæmorrhoides fluxum patriverint, patientes neque sedere, neque ambulare libere poterunt, circa anum cruciabuntur dolore, & stimulo efficaciori, neque citra molestiam feces excernere valebunt.

X. Si per œsophagum sanguis stillet, appetitum lædi, animumque deficere videbis; ægræ vero corripiebuntur cardialgia, nausæ, & sanguineo vomitu, alvum autem viscosas, & nigerrimas saburas pici haud absimiles excernet, quæ sanguis erit pene putrescens.

XI. Facile de ceteris judicabis scœnomenis superventurisdum eruptio per alias flectit vias, cognitis functionibus, quæ his partibus sunt assignatæ, & impressionibus perpenfis, quas tensio vasorumque turgentia excitare valebunt, vel sanguinis affluents acrimonia, copia, aut calore investigatis.

XII. Generice quamvis partem aggrediatur frequenter evenit, 1. quod eruptio modica interdum appareat, quando pauca, & exiliora vasa labefactentur; interdum effusio quam uberrima sit ut sanguis jacturam æmuletur, quando multa vasa, & ampliora conscindantur; 2. quandoque vero brevis persistat effusio, quando vasorum scissuræ exiguæ sint, & modicæ plethoræ ergo cito desinat, tum lymphæ viscosæ, & coarctationes conglutinet, contra vero diutina videtur, quando ulcerationes à nimia plethora ortæ, neque acris consolidare.

## §. IV.

*Diagnosis.*

I. **P**rospicere facile est menstruum sanguinem alio se vertere, quando a pluribus mensibus fluxus sit interceptus in juvenibus subjectis, quæ copiose vescuntur cibo, parum agunt, aut alterutra, vel pluribus simul subsequentium circumstantiarum solent laborare.

1. Si earum corporis pars aliqua labefactata sit, cui sanguinem recipere mos sit.
2. Si corporis peripheriam sedet, ulcus, scissura aut vetus fistula.
3. Si pars aliqua male constituta haud infrequenter suctionibus, contractionibus, aut præternaturali nifui obnoxia sit.
4. Tandem si qua hujusmodi male affecta pars diu calore, aut stimulo laboret, vel in ea tumor, & rubor conspiciantur.

II. Quando catameniorum eruptio jam sibi incongruam paravit semitam, ac periodice menstruorum more revertit, minime circa morbi indolem halucinari poterimus, nihil enim facilius erit, quam locum, speciem, gradum, violentiam, atque hujus eruptionis cetera characteristica signa detegere.

## §. V.

*Prognosis.*

I. **M**enses devoluti agram levant, imminuuntque sæva suppressionis symptomata plethoram subducendo, qua de causa minus nocui evadunt suppressis mensibus.

II. Nihilo tamen minus spurii menses eandem comitem habent noxam, ac suppressi, si producentem causam spectemus, quæ una est.

III. Plerumque hujusmodi genitrix causa difficiliter subjicitur in devolutis, quam in suppressis mensibus, nam in illis deficit, quæ in his adest plethora, obstacula superare potissima, quæ uteri tramitem implicant.

IV. Nunquam arduum magis fuerit, menses per naturalem uteri viam reducere.

*Alfruch de Morbis Mulierum.*

B 3

ccre.

tere, nisi cum uterus nulla tensione, tumore, aut periodico dolore afficiatur; quia nulli tunc extant naturæ conatus, qui saluberrimam hanc effusionem foveant.

V. At citra huiusmodi damna a suppressione, aut suppressionum causis derivata, alia dantur mensibus devolutis propria, quæ diversa sunt pro impressionibus diversis, quæ in variis corporis partibus a plethora excitantur.

1. Pro gracilitate enim, aut nobilitate partis affectæ, nam si per pulmones, aut œsophagum menses deficiant, plus detrimenti afferent, quam si per nares, aut venas hæmorrhoidales erumpant; at hi magis nocui evadunt, quam si per cutis læsionem proficiant.

2. Pro diverso infarctus gradu, qui eruptionem præcedit: itaque ceteris paribus devoluti menses, qui procul tumore, calore, dolore, ac uno verbo partis inflammatione superveniunt, minus pertimescendi videntur, quam si iis copularentur scenomenis.

3. Pro eorum pertinacia, aut regressus diturnitate, nam qui a longo tempore defecerunt menses, & diuturniores facti sunt, iis magis perniciosi experientur, qui nuper accidunt, parumque persistunt.

4. Pro ægræ conditione, atque temperamento; etenim ceteris paribus eas magis lædunt, quæ chachochimia, aut inquinato sanguine correptæ sunt, quam sanas mulieres, sanisque donatas visceribus.

5. Pro diversis consequentiis, quæ in labefactata parte relinquunt devoluti menses, plus minusve eruptio periculosa experitur, salubrius enim est nullum stillicidium, vel lymphaticum tantum consequi, quam sanguinolentum, aut purulentum effluvium.

## §. V L

### Curatio.

**M**enses devoluti quatuor postulant indicationes; *prior* est tollere causam, atque devolutionis detrimentum; *altera* præoccupare, vel saltem moderare hanc eruptionem, donec efficaciter medendi locus relinquatur; *tertia* sanguinis acrimoniam corrigere, ac a noxiis impressionibus partes tueri, quas ipse infarct, earumque exulcerationes sistere, *postrema* tandem est sanguinis iacturam compescere, si nimis minetur, intendi.

I. Priorem implet indicationem restitutus naturalis fluxus cui satisfaciendæ remedia capite quarto proposita, modo mitiora adhibeantur, præsertim si pulmones, aut ventriculus sint labefactati, ne validioribus pharmacis attenuando, aut commovendo nimis sanguinem, hæmorrhagiæ superveniant grandiores, pertinaçiores, aut lethales quandoque.

Nubilibus obvenienti morbo connubio medetur, si id circumstantiæ, & valedudinis status permiserint, nihil enim magis idoneum, atque saluberrimum erit, absque quo sanguinem remediis commoveamus ad naturalem fluxum revocandum.

II. Reiteratæ venæ sectiones secundam implent indicationem, imminuunt enim, tum quantitatem, quam nîsum sanguinis eam partem versus per quam effugere consueverat; porro etiam uterum versus cruoris impulsum tolli videntur, qui menstruum redditui favet, at cum ceteris paribus, tum ex una parte maiorem vim impendat sanguis in superandis ceterarum partium obstaculis, cum uterus ad sanguinem recipiendam textura sua magis dispositus videatur, ideoque ægotantibus a venæ sectionibus plus utilitatis, quam detrimenti expectare licebit.

Reliquum erit ut pedes plerumque secemus, quod facilius ad uterum cruorem evocabis, ut vulgaris etiam praxis docet; tum quando ad superiora evehitur



tur sanguis, cum sic ventriculum, aut hemorrhoides infarciat, nisi tamen revocandi menstrua debilis spes, aut suspicio majoris detrimenti ad partem affectam contrarium suadeat, quæ oppositæ indicationes in plethoricis præsertim subjectis interdum postulaverint ut prius brachium scindamus.

Verum cum eruptionis, atque reditus causa sola plethora necdum sit, ac acris etiam, & falsa sanguinis crasis, quæ completam implicat disruptorum vasorum cohesionem, ideoque humores edulcorare necesse erit ut valide impediatur spuris effusionis regressus, & solidorum foveatur cohesio, de his tamen rebus ad tertiam indicationem pertinentibus, quamprimum locuturi erimus.

III. Hæc tertia indicatio porro magni facienda est, nam maxima mensium devolutorum nocumenta ab acrimonia potissimum dependent, quæ vasorum exulcerationes in his partibus inducunt sanguinem dessectentem recipientibus iis scænomenis humores edulcorando, ne solida abradant, mederi poterit.

Ea de causa non solum suspendere emenagoga omnia opus erit ad primam indicationem propo- & verum humectantia, diluentia, & edulcorantia erunt adhibenda, hujusmodi sunt

1. Jura ex pullis, & vi confecta, cum radicibus ebullita Consolida, Althea &c. aut cum foliis Boraginis Buglossi, Scolymus &c. quibus dum opus sit Ranz exenteratæ, aut Testu-

2. Jura ex lactis chara, in quibus si libuerit plantæ emollientes, aut Lactuca sint.

3. Jura ex lactis chara, in quo infunduntur plantæ amaræ ut Chærophyl- lum, Fumaria, Centaurea, Chamedrys &c. aliquo earundem plantarum depu- rati succi cocleare additi.

4. Aquæ minerales feræ, quales sunt ex de Forges, Camaretz, Spa, Ca- rancac &c. modo thoracis morbo sit expertus.

5. Lac asinum, aut asinum necessariis cautelis semel, vel bis in die sum- ptum, postquam ferro ignito chalibeatum fuerit, atque duo, vel tres aquæ se- cundæ caloris uncie additæ fuerint.

6. Dulcificantia remedia affectæ parti applicata, ut bechica, & stomachica oleosa, aut mucilaginea, si pulmo, aut ventriculus periclitentur, lotiones, & injectiones annodynæ, aut detergentes, si hæmorrhoides ægrotent, erithina li- quida similibus donata virtutibus, si nares his corripiantur scænomenis.

IV. Postremæ tandem indicationi nostrum erit satisfacere quando menses alio versi completam sanguinis jacturam æmulabuntur, quæ remedia poscat; ad hoc morborum effluviu compescendum magis idonea tunc ea auxilia impendere fas erit, quæ pro mensibus nimis sistendis infra capite nono indicabimus.

## C A P U T V I I I.

### *Chlorosis.*

#### §. I.

#### *Descriptio.*

Juvenes puberes in quibus deest prima mensium eruptio, vel segnis, molesta, aut inops evadit; tum illæ, quæ ætate consistere incipiunt, vel imminutis, suppressis, aut laboriosis sunt obnoxie menstruis; gravidæ tandem a tertio, vel quarto gestationis mense certo quodam corripiuntur langore, quem facilius est describere, quam definire.

Vulgarium ciborum gustum amittunt, imo abhorrent, mox sordes appetunt; qui morbus (a) *Pica*, aut (b) *Malacia* vocatur; incompleta fit digestio, quam comitantur ventriculi gravado, atque cardiagia, hasque consequuntur haud infrequenter intestinum borborisimata, vomitus, diarrheae, aut hyppocondriorum tensio; Quædam vero lumborum, inguinum, atque hyppogastri dolorem perferunt plus, minusve intensum per intervalla recurrentem.

Pulsus plerumque celer apparet, frequens, febrilis, atque exiguus; respiratio vero brevis, difficilis, & laboriosa observatur, imo spirandi difficultas, interdum ad oppressionem usque augetur; cordis motus intenditur, ac acceleratur ita, ut palpitationem gignat, dum ægræ præsertim muscularum actione se exercent; si clivum enim ascendant, aut cito iter properent, tunc vilebis carotidum, ac temporalium arteriarum contractiones, tum habituales corporis gravedines duplicari.

Ægrotantes vero semine invite somnum capiunt, desides fiunt, laxitudine corripuntur spontanea, nulla etiam ei suppeditata causa melanconicis affectibus laborant, quibus magnopere tristantur, atque societatem effugiunt.

Pedibus instantur, atque cruribus quæ vespere cedematosa fiunt, noctu vero ad naturalium statum reducuntur, mox tumor, caput, faciem, aut palpebras aggreditur, ut circa oculos circulus lividus appareat.

Vultus tandem pallescit, vividumque colorem amittit; ægræ albidæ, ac plumbeæ fiunt; verum ceræ, sebi, aut foliorum exicatorum flavum, aut viride nigerrimum colorem referunt.

Hujusmodi morbus est *le pale couleur* seu ut Medicis mos est *Chloresis*. Cam ille hodie fusc, lateque totam Europam, & Provincias meridionales peragat, neque Græciam, vel Italiam ab eo unquam liberas evasisse credendum erit; tamen (c) Hippocrates, (d) Galenus, & ceteri veteres (e) Medici obiter tantum de illo mentionem fecerunt, neque speciali nomine ipsum insigniverunt; solummodo inter (f) Hippocratis scripta ipsum *Chloresim* appellari reperies; etenim nisi duplici ævo Medici (g) consueverunt peculiarem morbum constituere, at varia nomenclatura confirmat olim constanti proprio nomine caruisse, quidam enim ipsum morbum *Virgineum* appellaverunt, quia virgines prima eruptionis intermissione aggredi solebat; alii *Febrem albam*, aut *pallidam* dixerunt pulsum frequentiam ergo a febre lenta haud absimilis; nonnulli *Febrem amatoriam* vocarunt, quia illis obveniebat, quæ viro maturas jam esse pervertebant, aut facilius amore capiebantur; at Gallia (\*) saltem communiter receptum est morbum *le pale couleur*, *pallidum* nempe, seu *sedum colorem* appellari, cum vultus pallor præcipuum sit, & essentielle symptoma, eadem de causa omnes pene recentiores Medici, qui de eo latine scripserunt, illum (h) *Chloresim* nuncuparunt,

(a) Hanc appellationem morbum ipsa adepta est ob *Pica* animalis varietatem, aut quod etiam illa saepe hac affectione corripitur. *Paulus Ægineta*, De Re Medica, Lib. I. Cap. 1. Alio quodam prægnatibus accidit, quæ a *pica* aviculæ nomen accepit. Alii tamen ob hedere simili ulorem, quæ *avicia* Græci vocatur, hanc affectionem *avicia*, hoc est, *pica* appellam esse sentiunt; nam sicut illa variis plantis, prout occurrunt, se implicare solet, ita mulieres ex *pica* laborantes variis edulis appetunt, atque ex contraria, quæ cum volupetate, tum insatiabilitate gullanti exhibent. *Actius*, Med. Contrah. Terrab. 4. Ser. 4. Cap. 10. (b) Plinius qui latine scripsit certo quoddam loco appellat gullus depravationem *Gravidarum Malaciam*, Hist. natur. Lib. XXIII. Cap. 6. & alio loco *Malaciam Stomachi*. Hist. natur. Lib. XXVIII. Cap. 7. (c) Lib. de Morbis Virginum.

(d) De causis symptom. Lib. I. Cap. 7. (e) *Paulus Ægineta*, De Re Medica, Lib. I. Cap. 1. *Aetius*, Contrah. Med. Terrab. III. Ser. 1. Cap. 22. Et Terrab. IV. Ser. 4. Cap. 10.

(f) Hujusmodi error inter Varandæ scripta reperitur Lib. I. de Morb. Mulierum, Cap. 1. & ita Seneca, De Morb. Mulier. Pars II. sect. 3. cap. 2. atque Riverius, Præcox Med. Lib. XII. cap. 2.

(g) *Johannes Laurentius* inter cunctas magis sedulo huic morbum descripsit. Ann. 1559. *Voxæ Ipsil. Medit. Lib. I. Epistol. 21.* (h) Itali tamen ipsum communiter *Chloresim* appellant.

(i) Græcum vocabulum *Χλωρεσις*, color viridis simili ratione coarctatur perperamque, transductio autem, & perperamque, transformatio, ut cum hujusmodi verbi compo-  
sitio, modificata sit, ut  
cetera.

runt, quæ vox a Gracis derivata, *morbum* significat *ubi faciei pallor in viridem vergit*; nomen tamen hujusmodi veteres prorsus latebant, neque a Græcæ linguæ legibus unquam recte desumptum videtur.

## §. I I.

## Causæ.

**P**arum perpenfis cutis textura, vasorumque per eam reptantium distributione, patet a tribus potissimum causis rubrum, vividumque colorem oriri.

1. Ab exilitate, & diaphanitate epidermidis tum supus-positi reticuli Malpighiani.

2. A tenuitate, & numero capillarium vasorum per corporis ambi tum distributorum.

3. A sanguinis tandem copia, & coccineo colore, qui illa replet vascula.

Ex converso itaque coloris viridi amissio, vultusque pallor, ab oppositis causis originem habent.

1. In Chloritici epidermis densa, atque carnea apparet, ut in combustionibus, vel ceteris aliis circumstantiis, quibus cutis arefcit.

2. Reticulum quandoque heterogeneo imbuatur colore, qui ejusdem diaphanitate perturbat, ut in variis iteri speciebus observamus.

3. Vasa superficiiei nonnulla, ut in senectû, lesa, vel obliterata sunt.

4. Deest interdum in vasis sanguis innationis, aut maciei ergo, aut cruoris jacturæ, vel chronicorum morborum causa.

5. Cruor tandem, qui vasa replet, naturali plerumque rubore caret.

Evidens enim est nullam ex quatuor prioribus causis in juvenibus præsertim mulieribus locum habere, quæ nisi suppressionis, aut seigniorum mensium causa pallidæ sunt, nulla enim in ipsis adest epidermidis densitas, aut opacitas, nulla vitiosa in reticulo infectio, nulla mutatio tum numero, cum exilitate vasorum, nulla denique sanguinis inopia, sed a postrema earum causa pallor deduci debet a languido videlicet cruoris colore, qui ceteris paribus ecutim deturpat.

Ut plane nobis causæ innotescant, quæ naturalem sanguinis colorem pervertunt, ejusdem elementa perscrutari oportebit, illa præsertim, quæ coccineum præbent colorem, ut vitia specialia hujus partis investigare queamus; nos itaque circa hoc facilius & certior sanguinis analysis edocet.

1. Sanguinem ex vena recenter extractum & frigesactum in duas diversas substantias separari, quarum altera in globum coit compactum rubro colore infectum, altera liquida remanet, flavamque serum repræsentat, quod rubram portionem circumcingit, ac sublevat.

2. Globulum illum in talleolos concisum, & limpida tepentia aqua lotum coccineum colorem amittere & gelatinæ more translucentum fieri, rubram vero cruoris partem sub pulveris speciem fundum petere.

3. Tandem serum hujusmodi igni expositum, qui ovi albumen condensare potis sit, similem referre spissitudinem, reliquum fluidum persistens, flavum paulo magis & sanguinosum ab urina haud ab simile.

Ea itaque analysis confirmat quatuor potissimum esse admittenda sanguinis elementa:

## I. Sub-

cetera duo necesse erit Græco idiomate dari verbum *χρῆμα*, *α'*, *viridem reddo*, ex quo *χρῆμα* originem ducat ut apud Græcos reperitur cum *μεταχρῆμα*, *α'*, *animam reddo* *μεταχρῆμα*, *α'* *et* *αἰσθησιμα* unde *producentem*, *μεταχρῆμα* & *μεταχρῆμα*.



flatus apparet a coccineis hand abfimilibus, amplioribus tamen, & fphericis minus, minusque compactis, quorum superficies diverfimode levigata omnes coloratos lucis radios reflectens alba non rubicunda refecit, majorem semper tunc perfectionem acquirit, globuli enim uberiores, exiliores, atque fphærici magis evadunt, etiamfi nondum coccineis copia, tenuitate, aut rotunditate præcellant, quæ totidem qualitates adpiscuntur cum intimius sanguini permixta, coccineis prorsus fimiles fiunt, ex quo naturæ opus perficitur, quod *sanguificationem* appellant.

Ea plane ostendunt numerum, & tenuitatem coccineorum globulorum a tribus potissimum causis derivare, a conditione chyli in quo concreverunt, & sanguinis, qui illos perficit, verum a chyli una, & cruoris indole, a materia videlicet componente, plus minusve apta, & a causa simul efficiente, quæ complexum eorum perfectam subactionem foveant.

1. Si alimentorum subactio in ventriculo perficiatur ita, ut chylus necessariis conditionibus poleat, confertiores erunt, exigui magis, atque rotundi ejusdem globuli, quare ceteris paribus e parte sanguinis ex chylis innumere efformabuntur elementares spherulæ exiliores magis, atque levigatæ, quæ vividissimum coccineum calorem præferrent, contra vero elementorum, qualitates & congeries imæres erunt, si chylus digestionis vitio peccaverit.

2. Sanguis demum vulgari velocitate in circulum actus dummodo cordis, & arteriarum contractionibus necessaria vi impellatur, atque naturalem conferret motum intestinum, ceteris paribus ex parte chyli ejus molleculæ a cruore magis alcoholizatæ confertiores apparebunt, tum quasiatæ magis, ac turnatæ coccineæ valde fient, contra vero imbecilliora evadent hujusmodi elementa, si iis deficiat conditionibus sanguis.

3. Tandem si tum chylus, cum sanguis ipse simul bene constituti sint eo magis globuli illi divisi, levigati, rubri conspici poterunt, contra vero si gemina causa infirmior extet.

Plures dantur causæ, quæ chyli qualitates vitare, atque sanguinis motum retardare, vel utrumque efficere valent, nil ergo mirum si vultus pallorem, qui potissimum a vitiatis globulis dependet tot valeant gignere affectus; illos tamen omnes nostrum non est hic perferutari, eos tantum detegere fas erit, qui suppressionis, aut segnis menstruationis ergo pallorem faciunt, quam *chlorosin* vocant; idcirco eo collinear quæstio.

1. Admonuimus jam superius capite III. segniores menses in juvenibus gastricum succum infirmare, ac digestionem perturbare, idemque evenire in suppressionis, aut imminutis Cap. IV. mensibus, vel conformationis vitio interceptis Cap. V. chlorosis igitur, in hoc triplici casu, a labefactato chylis oriri poterit, dummodo nulla alia adsit causa.

2. Vidimus pariter Cap. III. in retardatis mensibus cruorem segnius circumvehi, minusque plethoræ causa a cordis, & arteriarum viribus terri, idem supervenit suppressus, aut imminutis Cap. IV. mensibus, vel intermissis Cap. V. pallor enim in hoc triplici casu a solo oriri debet sanguinis vitio, cum quo chylus permisceatur, ceteris jam absentibus causis.

3. At in iis circumstantiis chyli simul, & sanguinis vitia copulantur, ut duplici hac de causa natus pallor intensior, sevirque evadat; Evidens itaque erit in eo triplici casu omnis corporis ambitus faciei præsertim; quæ gravior est, & diaphana eo colore imbui, quem cetera tria non coccinea elementa duplex nempe lymphæ species serumque suppeditare valebunt, & ea substantiæ cum album cinereum colorem, fuscum nonnihil, lutescunt referant, & agrotantium cutim simili ratione deturpant, ut chloroticæ mulieres omnem prorsus penultatem amittant.

At

At plerumque hujusmodi humores supra statum naturalem majori bilis copia infici solent, pro hepatis infarctus ratione diversa, quare agrotantium facies varias flavedinis species refert modo emortui folii, modo aurei numismatis colorem exhibet.

tandem si infarciens bilis viridis ac poracea sit, tunc sanguis viridem aut viride-nigerrimum colorem vultui communicabit.

### §. III.

#### *Symptomata.*

**C**hlorosis vetustior præsertim omnes pene functiones lædit, quam ob rem ut clarius incedamus in hac symptomatum congerie enumerationem prosequi necesse erit, quam in iis describendis articulo primo instituimus, idcirco ab iis initium faciendo, quæ ad læsas imi ventris functiones pertinent, ad toracis, capitis, cutisque innoxia sœnomena et licenda gradus faciemus.

1. Lacticulosus fluxus unoquoque mense nem infarciens, gastrico succo, atque salivæ pervertit, ut vulgariū ciborum impressiones maxime labefactentur, præsertim si dulcia sumum afficiant, & insipida videbuntur, si illa a seorsum evadent, a quibus inapetentia, gustusque comitantur dependent.

2. Eorum impressionum læsiones, quas lymphæ cunctæ possunt ita gustum depravare, ut non solum alimentorum, verum sordes appetant, quales sunt carbonēs, cineres, gypsum, creta, sal, aut acetum, quia hujusmodi substantiæ, vel irritant magis gustus organum, vel corrigunt salivæ, aut gastrici succi vitia, ac perinde eam depravati appetitus speciem producant, quam *Picam*, aut *Malaciam* appellant.

3. Ea depravatio pro subjectorum circumstantiis diversis varia est, nam uno alio, alio alteræ sordium genere vesci adamant pro speciale a salivæ, aut gastrico succo vitio adeptæ, aut ejusdem vitii intensitate diversa, ex varietates a consuetudine etiam derivare poterunt, aut exemplo ceterarum mulierum simile laborantium vitio, quod non raro accidit.

4. Posita enim salivæ, aut stomachicæ lymphæ corruptione, aut inefficacia id tantum sufficit, ut digestio sub optimo etiam vitæ regimine naturæ usibus impar evadat, verum vitæ regimen necessario impar esse debet, si ægræ pleraque sana alimenta contemnunt, ac viliora tantum possunt, quæ neque ventriculus subigere valet, neque optimam nutritionem suppeditant, nil enim mirum si ex ea gemina causa, in chloroticis mulieribus digestio segnīs, difficilis laboriosa, ac imperfecta nanciscatur.

5. Ab ea vero chymus, chylusque subactus in ventriculo morans ejusdem tunicas superiusque orificium irritare potest, tum cardialgiā, vomitum, atque singultum excitabit, mox ad intestina transductus borborigmata, colicos dolores, ac alvi fluxus inducere valebit.

6. Sanguinis spissitudo, quæ chlorosim præcedit, atque lactei humoris retentio, quæ illam comitatur, vel subsequens incompleta digestio varias secretionēs implicare, secretosque humores inspissare videbit; ex quibus viscerum obstructions oriri debent; eorum præsertim, quæ segniōres succos naturaliter separant, uti hepar, pancreas, splen, atque glandulæ mesentericæ.

7. Hypochondriorum elevatio pluribus de causis contingit.

1. Ab ventriculi intumescētia fluxu turgentis, aut indigestis cibis. 2. Ab inte-

intestini colon turgentia a retento acre circa ejusdem flexionem hypocondria veisus. 3. A tumore obstructi hepatis, aut lienis. 4. A sympatica diaphragmatis contractionem quam ventriculi dolor excitaverat.

8. Cum diversa sit in singulis morbis uteri conditio, varia simulerunt symptomata superventura; nonnullæ enim unoquoque mense de doloribus colicis conqueruntur, nam cum omnia tunc parata sint ad menstrua cienda, vasa idcirco vermicularia lacteo humore satura venas comprimunt, atque uterum dolorosa tensione, & levi phlogosiafficiunt: incassum tamen hæc omnia eveniunt, cum venosæ appendices nihilofecius referari renuant. Si dolores prout in utero diversum occupat spatium irruens menstruus sanguis modo hypogastricregionem aggrediuntur, modo lumbos, inguina, aut femora gravant; contra vero plures dantur morbi in quibus nulla adsunt proximæ menstruationis indicia; neutiquam itaque tensionem, aut dolorem ægræ perferunt, imo per uterum libera circulatio perficitur.

9. Ex una enim parte in chlorotico morbo sanguinis copia continens augmentum acquirit, suppressionis, aut mensum segnitiei ergo, quare vasa laxi partium contextus præsertim pulmonum videlicet turgida apparebunt; ex altera vero parte in hoc morbo sanguis spissior, viscosus jugiter redditur, quia ab imperfecto, aut impuro chilo producitur, ideoque vasa replere debet, pulmonum potissimum, quæ maxime tumefacit, ac ea duplici de causa vesiculæ pulmonales compressæ a circumpositis tumidis vasculis difficillime sese explicari valent, quod brevem, ac laboriosam respirationem faciet.

10. Consequens erit necessarium in hoc statu pulmones impares esse, omnem congestum sanguinem penitus exprimere, vesiculis non satis extensis, reliquis itaque exuberans sanguis sollicitabit singulis momentis novas inspirationes, ac proinde respiratio crebrior præcepta magis fiet, quo brevior erit, ac difficilior.

11. Cum sanguis vehementius a musculis exprimitur dum majori vi contrahuntur, ut sanguis ita elicitus uberius mollia viscera infarciat, qualia pulmones sunt, ideoque quo magis ægræ se exerceant, eo turgidiores cruores ipsi evadent, quod respirationem difficiliorem, molestam, breviorē, atque præcipitem inducere valebit; id præsertim evenit, quando velocius properant, aut clium ascendunt, ubi grandiores, & violentiores contractiones excitantur.

12. Cum sanguis vasorum pulmonalium turgentia potissimum causa difficultatis a sinistro cordis ventriculo ad aortam, & a dextero ad pulmonalem arteriam transgat, consequitur porro ventriculos imperfecte evacuari, quare fistoles cum incompleta evadat, crebrior etiam, & exigua magis erit, quam in statu naturali, & qui ei respondent pulsi, exiliores, & frequentiores apparebunt.

13. Demonstravimus jam superius articulo vigesimo, musculos in chloroticis infirmè contrahi, cor vero musculorum lege idem patiens pulsos debiliores, quam in statu naturali gignere debbit, dummodo saltem inertem ægræ vitam gerant.

14. At si illæ mox validiori corporis exercitio succutiantur, non modo pulsus crebrior evadet, quia sanguis a musculis expressus velocius in cordis ventriculos irrumpit; atque tumefacit, verum magnus atque fortior fiet, cum sanguinis copia cor replens, contractiones artierum vividiores, & ampliores excitaverit.

15. Cruor qui in hoc morbo per abominis viscera, atque matricem præsentis obstructionis ergo circumvehi impeditur, caput uberius aggredi debbit, atque capitis dolorem excitare in chloroticis obvium.

16. Hujusmodi vero capitis affectus vehementer augebitur modo ægræ animi pathematibus corripiantur, aut corporis exercitatione nimis concitentur, quæ

que sanguinis motum promovendo sanguinem magis, atque magis infarciri videbis.

17. Eadem de causa charotides arteriæ atque temporales pulsari crebrius conspicies, quia sanguis ibi copiose effectus ampliores, validioresque contractiones excitabit.

18. In chloroticis mulieribus parum spiritus animalis fecernitur, tum exigue copię ergo, quam spissus sanguis cerebro suppeditat, cum difficillimæ distributionis causa, quam cruoris segnitie inducit, ex iis cerebri fibras laxari videbis, spiritus ipsos a seroso sanguine serosos separari, tum fibras illas madesactas nimis molliores fieri, vero humectatis, laxatissime ceterarum partium fibris agram pertinaciori somno corripri in composita ratione laxitudinis, & mollietiei fibrarum earum.

19. Quam ob rem morbosa hac cerebri labefactione laborantes etiam expersæ factæ externis objectis quam debillime commoveantur, que abhorrescant, societatem effugiant, ac tristitia composites non appareant.

20. Quamvis contemptio rerum omnium, quæ deberent, satis huiusmodi agram desides faciat, quæ marcescunt pro vita sedentaria, qua magnopere producit, primo fluidi nervi inopia, & per nervos musculorum contractiones labefactantur, secundum instantiam infarciens resistentia, quæ ita musculos contrahi interdum pariat.

21. In eo morbi statu cruor pene omnis lymphæ est, serositate isque a cordis, atque arteriarum pulsibus, parum quassatur; serum itaque spissiori imperfecte remixtum facilius separari solet, verum vasorum emittentes infarciens uberius serositatem in lymphaticas venas impellet, tandem ex lymphaticæ venæ laxæ jam, & labefactatæ difficillime serum exprimere poterunt, quod ibi perfluit. Ex hoc enim causarum complexa facile concludi potest in chlorosi partes omnes serosa lymphæ infarciri, ut omnia *Leucophlegmatia*, aut universalem oedemam futurum esse pronuncient.

22. Die & vespere præsertim pedes, crura, atque femora interdum oedematosa fiunt; 1. Nam cruor contra leges gravitatis eveni coactus majorem lymphæ copiam ibi relinquit; 2. Verum, quia huiusmodi serosa lymphæ capillaria pertinacius obstruens difficilior sursum tolli poterit.

23. Lectulo jacentibus agram pro orizantali positu, tum extremitatibus, cum ceteris corporis partibus humores ad libellam se ponunt, eorumque circulatio æque facile undique perficitur, atque oedema evanescit, vultus tamen adhuc tumet, tumentque palpebræ, & oculorum vicinia, nam huiusmodi partes laxiori donatæ contextu, minus elasticæ sunt, minusque valent decentam lympham expellere.

24. Cerebrum ipsum mollietiei ratione oedemate affici posse suspicari licebit, quare ei tribui poterunt difficultas qua mane e somno excitantur, summa ad eum proclivitas donec jacent, atque stupor persistens paulo postquam ex cubili surrexerint, usque dum positus immutatio levet, vel saltem imminuat cerebri oedemam.

25. Veniunt tamen plura symptomata perpendenda, in chloroticis obvia, huiusmodi sunt inappetentia, vomitus, ventris tumor, convulsiva præfocatio, atque sordium quandoque appetentia, quæ ab hysterica causa derivare videntur, atque catameniorum in utero succussione; verum suspensionem nostram explanare omittimus, quod percipi difficile est, antequam hysterica passionem ostendamus, quam extremo Libri secundi capite explanabimus.



## §. IV.

*Diagnosis.*

I. **M**orbi indoles facile innotescit, nam si puberes inspicies, vel mulieres pallidas, ac decolores fieri, nullo præcedente morbo, cibos respicere, fordes appetere, neque sui compotes esse &c., quarum catamenia aliunde cognoscas retardata, imminuta, aut suppressa fuisse, tuto asserere poteris illa chlorosi laborare, quæ senonena menstruum segnitiei, aut suppressionis ergo in diem aucta, eo magis Diagnosis confirmant.

II. Neque arduum videtur diversas causas detegere, quæ varios morbigradus constituunt; chlorosis enim supervenit juvenibus nondum menstruantibus, etiam si puberes fuerint, quæ discrepantia catameniorum defectui tribuitur. In mulieribus viro junctis, quæ concepisce suspicantur ad mensum suppressionem pallorem referunt, quæ gestationem consequitur. Tandem si eo laborent nobiles jam menstruantes, vel jugatæ citra conceptionis suspicionem, aut viduæ, nisi menstruum inopiz, suppressioni, aut cunctationi morbus tribuitur; vid. cap. IV. & V., quibus eorum causas perferutati sumus; at ægræ ipsæ passionis historia non parum lucis præbere valebunt.

Interdum tamen mulieribus mentis valde interest, ut earum assertiones infidæ videantur: quot nobiles enim, aut viduæ jam factum gerentes potius quam crimen fateri, suadere student faciei pallorem, atque corporis laxitudinem ab interceptis, aut morbo suppressis mensibus procedere, neque illis credendum, quæ nos fallere nihili ipsis pendere affirmant; quoties enim jugatæ procul dolo gestare ignorant, atque pluribus symptomatibus lacessita remedia poscunt, quæ ipsis sanitatem restituant; tamen prudens Medicus de proprio nomine, atque artis decore sollicitus, monitus consulat, quæ Cap. IV. Art. 5. proposuimus, quæque recenseri hic supervacaneum censuimus.

III. Morbi gradus facile deteguntur; ab ægritudinis enim diuturnitate, symptomatum natura, & numero, atque functionum lesarum nobilitate plane delucuntur, quod tamen intererit perferutari tum ad Prognosin, cumq; ad optimam medendi rationem instituendam.

## §. V.

*Prognosis.*

I. **C**hlorosis plerumque morbus diutinus, & pertinax evadit, nam ut ei medeamur, catamenia provocare in iis, quæ nondum menstruarunt, vel ea restituere, aut confirmare oportet in menstruantibus mulieribus, quod utrumque difficillimum esse Cap. III. & IV. observavimus.

II. Haud infrequenter morbi vetustate ipse diuturnior, & pertinacior fit, temporis enim diuturnitate eruptionis impedimenta roborantur, atque necessariam humorum subactionem magis, atque magis implicant.

III. Felicem tamen eventum prænunciare poterimus, si semel menses apparere incipiant, etiamsi inopes valde, decolores, aut inordinate revertant, tunc remediorum continuatione integram eorum restitutionem sperare fas erit.

IV. Nihilofecius cum hujusmodi morbus facile renovari possit, idcirco caute de futura valetudine pronuntiabimus, sæpissime enim, dum ægras convalescere autumabis, ægritudinem reintegrari videbis, vel quod obstacula nondum remota fuerint, vel quod minima de causa novum sanguinis inquinamentum regi-

regiminis vitio, animi patematibus ortum, aut tempestatis rigor morbum innovent.

V. At quantumvis difficile chlorosim mederi videatur, ipsa tamen parum damni infert, dum recens est, ac leviora sanguinis vitia producere valet, quare cum viscerum obstructions, quæ menses intercipiunt nondum universales appareant, remediorum usu ea obstacula subijcere posse suadendum erit.

VI. Contra vero inveteratus morbus periculo non vacat, experientia tamen didicimus, cum feliciter curari posse, dummodo nullum perniciosum valde symptoma comitem habeat, atque agræ exacte Medico obediant, vitæque rectum regimen observent, quod raro tamen eveniet.

VII. Maximum tunc detrimentum patientur ægræ, si ipsæ sordida nimis possint alimenta, libenterque edant, tunc enim exustus appetitus ostendit, salivam, & gastricum sucum in sanguinem exuberante inquinari nimis, quod citi supponit, ejusque regressum, per venosas se parte, sordes quas appetere non renuunt, crassum in diem sanguinis spissitudinem augendo, obstrictas ceteris visceribus inducit.

VIII. Perniciosissimus, atque periculosus magis, si ampliores infarctus præbeat, eoque pertimescendus, scerum syrrhos, aut pulmonum tuberculos &c. gignat, creatus, vomitus, leucophlegmatiam, abdominis, aut uterini intermittentes, rebelles aut lentas ethicas producat.

IX. Tandem quæ diu chlorosi laborant steriles sunt, vel difficillime, aut sero concipiunt, aut foetus per idoneum tempus gerere, eosque sanos vividosque parere impares evadunt, quod ratione infarctus uteri tribuitur, qui conceptioni, aut foetus nutritioni officit, ut specialiter Libro tertio examinabimus.

X. Ab iis excipies, quæ gestationis ergo pallidæ sunt omni detrimento expertes, quæ a tertio, vel quarto mense naturalem colorem receperant, atque conservant, quia embryone tunc aucto ipse majori nutrimento indigens, omnem assumit lacteum humorem, cruoremque in vasibus exuberantem.

## §. VI.

### Curatio.

**T**res sunt chlorosis species a conceptione procedentes, quæ nondum vel incomplete menstruant puellas afficit, quæ suppressis aut valde imminutis mensibus laborantes vexat, quæ gravidas ad oritur.

I. Hæc postrema nullum remedium postulat, tertio enim, vel quarto gestationis mense sponte abit, neque remediis ei obvenire necesse erit, nam menses perperam provocando abortum facile induci posset, si forte pharmaca efficacius agant; optimum enim consilium erit morbum negligere cum pallor tunc necessarium videatur gestationis symptoma omni periculo expertis, vel saltem palliativa medela uti intererit, quæ hujusmodi scenomeni incommoda leviter comescat. Ea de causa

I. Egras admonere oportebit, ut optimum vitæ regimen observent, quantum ciborum depravatus gustus permiserit; igitur cavendum erit, ne nimia fordium cupidine laborent, neque tamen eas cupientibus pertinacius contendere conveniet, rationibus potius agras admonebis, verum si rationis compotes non sint, iis potius erit indulgendum, quam acriter obstrictum, nam experientia docuit ita minus lædi.

2. Sufficit tunc digestionem promovere, atque ventricularum aliquo idoneo stomachico modica dosi sumpto roborare, circa quod ægotantium gustui, & ventriculi viribus consulere censeo, usitatoria tamen hujusmodi, quæ magis commendantur remedia sunt, Extractum juniperi; Confectiones hiacinthe, & alchermes; Theriaca, Oppiatum Salamonis, Rhubarbarum, aut Cortex Peruvianum, vel ejusdem tinctura; Coralia rubra, Oculi cancrorum, atque ostrearum testæ, Elixir denique proprietatis simplex, vel garrus, quinta essentia absinthii, atque aqua Camellitarum.

3. Interdum usum blandis clisteribus demulcentibus, alvum cedere, si naturalis desit lubricitas, ita crassa intestina expiando ventriculus facile saburris liberabitur, quandoque enim suspicari licebit, quod sordium impuritates imperfecte subactæ, quibus gravidæ vescuntur in intestinis morantes arefcent ita, ut faeces citra abortum expelli nequeant.

4. His de causis præter clisteria interdum lenioribus purgantibus uti cogimur, ut efficacius primæ viæ repurgentur, qualia sunt Rheum, Manna, Sal vegetabile, simul etiam reuixta, aut pulpa Castiæ, fero luctis, aut infuso seminum lini soluta.

5. Nihil enim timendum est si mulieres primo gestationis mense sæpius vomant, imo saluberimum est si hujusmodi evacuatio a sordibus ventriculum liberet, quibus gravatur, vomitus sane tum matri, cum fœtui non parum nutritionis demit, at magis interest, utrumque primis mensibus deficere, potius quam deleterio exuberent nutrimento.

6. Moderare tamen vomitum juvat si pertinax nimis, & violentus evadat, idcirco longe a prandio postquam vomitu evacuatus fuerit ventriculus, ac pituitæ, aut thei poculo lotus, exhiberi poterunt grana decem theriacæ, aut unum pillularum Cinoglossi, aut Starki tertia quaque hora sumpta, donec penitus vomendi conatus compescantur.

7. Hanc methodum jugiter patienterque prosequi necesse erit initio laboriosarum gestationum, usque dum tertio definire incipiant, & quarto tandem mense ea phenomena prorsus abeant, tunc enim, aucto fœtui robore, qui uberius alitur, naturalis appetitus restitui, ac digestio in mulieribus rite perfici solet; vultusque vividus revertit in iis color.

11. Ceteris duobus palloris speciebus, quas segniores, aut suppressi menses producant catameniorum eruptionem sollicitando, aut revocando solummodo medetur. Patet enim nihil differre palloris medelam ab ea, quæ suppressionem, aut mensum segnitiam respicit, quorum morborum ipse tantum symptomata videtur, quare capite quarto pervolventibus, ubi multiplex exstat menses suppressos medendi ratio, facile patebit, quæ pro circumstantiis diversis ægotantium ætati, aut viribus, vel temperamento accommodata remedia seligere fas erit. Verum cautelis omnibus attendere oportebit, eodem capite articulo tertio indicatis, maximi sane momenti, quæ hic pariter animadversionem possulant.

Præter hanc tamen medendi methodum, quam eradicativam appellant, alteram hic quam palliativam dicunt ostendimus, quæ morbi progressus imminuere, aut præoccupare valet, non omnis enim tempestas eradicativam inire curationem permittit, imo temperatioribus in quibus magis convenit, haud raro eam subsequuntur optimi effectus, qui integrum valetudinem promittant, quamobrem palliativam plerumque methodum prosequi coacti sumus ad levandum saltem nisi tollendum morbum, quæ etiam si essentialiter a priori non multum distet, specialiter tamen hic explicationem meretur, &

1. Optimum vitæ regimen præscribere, atque alimenta boni succi, ac facilis digestionis subministrare oportebit, villiora quæ possunt strenue interdiceret,

*Affectus de Morbis Mulierum.*

F

utpo-

utpote quæ morbum confirmant, arque augment, quare huic sedulo incumbere nostrum erit, præsertim cum mulieres tunc citra gestationem omni periculo vacent, agris verum suadere intra epulas vinum aqua remixtum haurire, vel parum meraci a prandio quandoque saccaro, aut nuci miristica copulati ingurgitare, ipsas vero sollicitare ut primo mane cubile relinquunt, vere præsertim; denique ne melancolia corripiantur cum sociis latam consuetudinem ineant, tandem studere ut matutinis horis jejuno stomacho gradatim spariantur.

2. Si te non latuerit illas valde opprimi palpitationibus, aut pertinaciori capitis dolore magnopere laborare, præsertim cum pulsuum plenitudo, aut ver, vel citas id postulent, agras identidem sibi botomizare opus erit, brachium enim secare poteris si proximè absint menstruationis indicia quamvis pedem etiam scindere liceat; at hujusmodi venæ sectio magis idonea imo necessarissima videtur, quando menstrua cito futura suspicantur.

3. Caveto venæ sectionem frequenter nimis reiterare cui substitui poterit catidum pediluvium per horam, vel bihorum unum caloris gradum continenter servando, illud praxis docuit utilitatem æquare levioris venæ sectionis, inferius sanguinem evocando, atque caput, cor, & pulmones levando.

4. Si agræ pedum oedemate laborent in pediluvio decoctiones usuveniunt plantarum Aromaticarum, quæ sunt Rosmarinus, Thymus, Salvia, Serpillum, Majoranna &c., quibus addi poterunt duo vini sextarii, vel spiritus vini cnephori quadras, ut horum remedium spirituosissimis melleculis solvatur oedema, calore vero sanguis evocetur.

5. Quantumvis sedulo vitæ incumbamus regimini agrotantium, tamen errores, aut ventriculi vitia saburras, aut cruditates continenter producant, quæ in diem digestionem perturbant ut eas identidem purgare cogamur. Si ipsæ graciles sint, emaciata, lenta febre, aut phthisi corripì videantur, composita erunt ecoprotica adhibenda ex Reo, Sale vegetabili, Pollicrefto, aut manna, cassia, syrupo pomorum, aut florum persicorum constata; at si pituitoso donentur temperamento, & oedematosa fiant, insusum locum habet foliculorum fenæcin quo soluta fuerat uncia una & semis, aut duo manna calabriensis præscribi pariter poterunt diagridium, pulvis cornachinus, aloes, jalapa, vel turbit, sub forma bolari.

6. Ut constantem tamen purgancia affectum præstent, stomachicis interdum uti opus erit, quæ completam digestionem confirmando chylum perficiet in sanguinem transiturum. Hic idonea reperies stomachica, quorum agrotantium constitutioni, & morbi gradibus magis accommodata seligere poteris.

#### *Aromata.*

Cinamomum  
Cassia lignea  
Cortex pseudo-vintheramæ  
Cherophylli  
Macis  
Nux miristica  
Cardamomum

Quæ modica dosi, vel cibis permisceri poterunt, aut vina medicata preparari, quæ cocleatim mane jejuno stomacho hauriri licebit.

Crocus Oricasalis

Vel subtiliter pulverisatus, sumitur a granis x. ad xv; vel exigua dosi theiformi infunditur jejuno stomacho mane sumendus.

*Græ*

## Grana.

Semina Coriandrorum  
Baccæ Juniperi

} Hauriantur sub prifana, aut thei  
forma.

## Eleduaria, &amp; Confessiones

Theriaca  
Conf. Alkermes  
Conf. Hyacinthina  
Oppiatum Salomonis  
Extractum Juniperi

} a gr. xx. ad drachm. femis, ma-  
ne jejuno stomacho fumenda  
cum vini cocleare.

## Elixiria

## Aqua destillate, vel stomachica preparationes

Elixir proprietatis sine acido  
Quinta essentia absinthii  
Aqua Melissæ, seu Carnelitarum  
Aqua Mentha

Elixir proprietatis, seu Garrus

Decoctio absinthii  
Vinum absinthiatum  
Syrupus absinthii

} a gutt. xxv ad xx cum vini co-  
cleare jejuno stomacho mane  
fumenda  
ad unius, vel duplicis coclearis  
dosim.  
Dosis erit exiguum coclear cum  
aquæ, aut vini duplo com-  
mixtum  
ab  $\frac{3}{4}$  vi ad vii  
ab  $\frac{3}{4}$  iii ad iv  
ad  $\frac{3}{4}$  i

## Gummi, aut Resina

Mastix  
Myrrha

} a gr. x. ad xv. in substantia vel  
sub forma bolari

7. Stomachicis addi poterunt mitiora aperientia Cap. iv. indicata ex iis effi-  
caciore eligendo, at in genere ferrum vel chalybs utiliora suppeditant, qualia sunt,

Limatura ferri, aut chalybis por-  
phirifata

Crocus Martis aperiens Mali mat-  
tutino rore confectus

Crocus Martis per balneum Maris  
confectus, seu ut vocant Ethiops  
Martialis

Tartarum Martis solubile  
Sal Martis Riverii

} a gr. x. ad xviii., vel xx. je-  
juno stomacho, confessione  
hyacinthina, aut in prandio  
Rhabarbato remixta.  
cum oppiatis, vel ut limatura  
xv ad xx. grana fumitur.  
a gr. xv. ad xx.  
sub forma bolari fumitur, aut  
solutum prifana quadam, aut  
decocto a gr. xviii. ad xx.

F 2

Tin-

Tinctura Martis	} a gutt. xx. ad xxv. decocti aut ptisanæ poculo infusa.
Globuli Chalybei	
Vinum album Chalybeum superafusum videlicet, limaturæ Chalybis, aut Croco Martis aperientis	} decoctionis aperientis, aut ptisanæ cratere infusi donec fluidum nigro colore inficiatur.
Aqua Chalybeata infusione Croci Martis ferri cruginosi, aut clavonum	
	ab 3 iij ad iiij mane sumendum
	pro ordinario potu vino copulata

8. Aperientia remedia congrua dosi stomachicis confociando, infusa, decoctiones, apozemata, pulveres boli, opiata &c. innumera componi poterunt simili ratione ac Cap. IV. docuimus.

9. Cum aquæ thermæ intus sumptæ una congerant utilitates omnes purgantium, aperientium, atque stomachicorum, ideo efficacissimæ in chlorosi experiuntur, si idonea tempestate vere nempe, & autumnus per longum tempus modica dosi exhibeantur, dummodo ventriculi vires permiserint, in Gallia præstantiores sunt hæ *Vichi, Plombieres, Balaruc, Bèzege, Bagnères &c.*

Aquæ minérales ferrugineæ, quæ gallarum admixtione nigro inficiuntur colore Martis ergo quo saturantur, utilissimæ evadunt in chlorotico morbo, possunt enim exhiberi æstivo tempore per plures quidem dies modica tamen dosi, ipsis interdum permiscendo idoneam quantitatem Salis Policreſti de *Seignette*, aut de *Dubus* ut cito eliminentur; hujus sensus illæ sunt *Vals, Caranſac, Spa, Bussan, Forger*. Animadvertendum tamen est eas interdicerè debere quando ventriculi labe, aut artus inferiores œdemate laborent cum anasaræ metu pari ratione ut circa usum thermalium superius admonuimus.

10. Inter usitatoria remedia subsequens extat quæ præcipuas indicationes implet

¶ *Limatur. Chalyb. in aqua præparat Cinnam. pulverati, ana. part. j.*

*Sacchari tenuissime triti, part. ij.*

*M. F. pulvis, cujus dosi a 3 β ad 3 j.*

Hujusmodi pulvis exhiberi potest mane vel instante prandio jejuno stomacho, superbibendo simplex, vel duplex poculum diluti juris, aut decoctionis plantarum aperientium.

Cum agræ ventris stipticitate afficiantur, huic remedio bis in hebdomada grana aliquot Rhabarbari addi poterunt si ventriculus peccet; pulveris vero Cornachini, aut Hidragogii cujusdam, si pedum œdemata appareant: si auctoribus nonnullis fides habenda esset, uti specifica remedia in hoc morbo amplecti poterunt 1. Radix condita Angelicæ ad 3 vel 3 β mane comesta, aut ejusdem paullo majoris dosi decoctio duplici aquæ cratere sumpta. 2. Simili ratione commendant Scorzonæræ radicis decoctum. 3. Verum sex, duodecim, aut quindecim grana Bezoaris Orientalis quidam magni faciunt cocleare soluti decoctionis plantarum illarum; at multum deest, ut laudes eximias hæc remedia mereantur, quas de iis prædicarunt, quinimo experientia didicimus ceteris vulgaribus remediis ea nihil prorsus præcellere.

12. Cum palloris scenomena magis teterrima sint pulmonum labefactatio, aut pthisis ipsa, quæ ventriculi dolor crebra tussis humida, vel sicca, macies, insomnia, continenter prænunciant, tum motus vespertinus febrilis, aut nocturni su-

ni sudores &c., sedulo itaque ea præoccupare fas erit, cum nonnulla eorum indicia appareant, hac de causa identidem venam seccare intererit; primas vias cassia, manna, aut fero expiare, jura vero quandoque exhibere ex pullo, vituli rostro, ranis, aut testudinibus confecta, dein fursuricula aqua aut vituli jure cocta, & cinamommo, aut saccharo remixta proderit; verum vespere leviora narcotica usveniunt, qualia sunt decoctio capitum papaveris albi, syrups diacodii ad ʒ iij vel iiij, aut pillularum Cynoglossi similis dosis, quæ mox lestem tussim compescant, lac denique præscribi poterit plantis bechicis, & pectoralibus destillatum, aut serum depuratum floribus Verbasci supersufusum, tum lac caprinum, asinum, aut vaccinum, pro alimento si ventriculus sinat; interdum suspendere opus erit palloris medelam, & cum ad eam revertamur caute incedendum erit idoneis bechicis aperientia temperando.

13. Universalis oedema, seu anasarca obvium pariter est atque molestum chlorosis symptoma, ut ipsum igitur præoccupemus, atque una penitus subijciamus, erunt adhibenda 1. decocta farsæ parillæ, radicis petrocellini, decoctionibus diureticis remixta, aut mille pedibus. 2. Decoctiones diureticæ ex radicibus apii, cardui, cherophilli, nasturci fontani, pinipellæ &c. 3. Boli diuretici ex pulveribus confecti asellorum, salis admirabilis Glauberi, aut arcani duplicatis, quibus adduntur syrupus ramni cathartici, aut therebintina Veneta &c. de cetero remedia quæ in chlorosi adhibentur nihil efficiunt anasarchæ adversus quam simul conveniunt.

14. Neminem latet in diuturnis, & laboriosis morbis sæpe mutare remedia oportere, id tamen in hac morbi specie potissimum convenit ubi ventriculus medicamentis assuescit, quibus nova substituere necesse est, idcirco modo stomachica, modo aperientia, modo utraque sunt adhibenda, interdum purgantia iis addere opus erit, interdum humectantia, diluentia, aut demulcentia substituere, præsertim si toracem labefactari suspiciamur, tandem diuretica, & hidragoga locum habent, si oedema hydropem minetur.

15. Connubium denique optimam medelam præstat: id jam (a) Hypocrati innotebat, quod postea innumeræ observationes confirmarunt, admonendum tamen est, ut saluberrimos præbeat effectus eandem methodum profequi interesse, quam pro corporis exercitatione n. 1. commendavimus: primum videlicet viro sensim sensimque uti, si id temperantia sinat, crebrius vero donec uterus valeat subire utilitates omnes quæ ab eo possunt derivare, atque contractiones aut scissilicas obfessiones perferant, quas matrimonium inducere solet, lymphæ, cruoris, lacteique humoris circulationem restituendo, quæ catameniorum eruptionem perfecte revocabit.

## C A P U T IX.

*De mensibus nimis, atque uteri hamorrhagia.*

## §. I.

*Descriptio.*

Cum in mulieribus sanguinis fluxus imminui, vel intercipi possit, ita ubertus nimis quandoque evadit, ut viribus officiat, novumque morbi genus constituat, eo directe oppositum, de quo Cap. IV. differimus.

*Afruch de Morbis Mulierum.*

F 3

Hu- 7

(a) De Morbis Virginitatis.

Hujusmodi dupliciter considerari potest modo fluxus quamquam immodicus aliqualem adhuc periodi speciem retinet, & *mensēs nimii* tunc ipsum appellant, modo nullam periodorum legem præferunt, imo copia, aut pertinacia vitatur, ideoque sanguinis jacturam, aut uteri hæmorrhagiam vocare consueverunt, quare ambas species singillatim explicabimus, & primo

*Menses nimii.* Fluxuri sanguinis copia a tribus potissimum causis dependet, a periodo menstruum, a fluxoris persistētia, atque ubertate fluentis sanguinis, ut superius Cap. IV. perpendimus, ubi vidimus catamenia imminui eorum respectu dum raro revertuntur, cito desinunt, vel exigua quantitate fluunt; ex converso enim inferri poterit menstruum frequens regressus, effluuii persistētia, vel ejusdem copia menses nimios facere.

I. Hujusmodi conditiones vel singillatim peccare possunt ideoque immodici menses crebri, diutini, aut uberrimi apparebunt; & *primam* constituent morbi speciem.

II. Vel binæ simul conditiones vitiantur, quare crebri, & diutini; vel diutini, & uberrimi, vel uberrimi; & crebri menses redibunt, atque *alteram* morbi speciem inducent.

III. Vel omnes tandem hujusmodi conditiones continenter agentes *tertiam* producere valebunt mensium nimiorum speciem.

Ne decipiamur igitur animadvertendum est, cum haud facile sit in statu naturali determinare catameniorum stadia respectu eorum diuturnitatis ac copię, quę omnia in diversis subiectis pro ætatis, temperamenti, climatis, aut vitę gestę ratione variare solent, eo itaque difficilior erit hæc definire in iis, quę nimio laborant fluxu an morbosus sit, nec ne. Quapropter superallatę conditiones non sufficient, ut morbosus mensium status videatur, nisi nocua quædam superaddantur scenomena, quę illos contra naturę leges erumpere confirmant, hujusmodi sunt, gustus depravatio, pallor, languor, lassitudo, oedema, atque universalis labefactio.

Ut hujusmodi effluuium *sanguinis jactura* nuncupari mereatur, aut copiosum, aut diutinum valde esse debet; Quando uberrimum fluit, *uteri hæmorrhagia* solet appellari, quando diuturnum magis, minus abundans tamen, Latine, (a) *Stillicidium*, aut *Ploratus uteri* vocari solet, Gallico sermone *Perte mediocre*, aut *Suintement de sang de la matrice*.

Facilius est sanguinis jacturam, quam menses nimios detegere, nam proculdubio omne sanguinis profluvium, tum uberosum nimis, parumque persistens, cum modicum, diuturnum tamen inter veros morbos solent recenseri.

De cetero omnes sanguinis fluxus, qui utero gerentibus, aut puerperis superveniunt, & in partu sapissime aut abortu immodici fiunt, ad uteri hæmorrhagias sane referri debent, at cum in circumstantiis diversis adorianatur, quę specialia postulant remedia, sui generis scenomena producant, idcirco Lectorem mittimus ad Librum Tertium, ubi singillatim de gestatione, & morbis eam consecuturis verba faciemus.

## §. II.

(a) Auctores nonnulli uteri *Stillicidium* per mensium imminutionem habent, et valde decipiuntur, non diutinum, & continens effluviū, quale est uteri *Stillicidium* vera est sanguinis jactura, est mē modica. Aetias tale profecto cum consideravit dum primus de hoc morbo loquutus est. *Tetrabibl. V. Term. 4. Cap. 63.*



## §. I I.

*Causæ, quæ menses nimios inducunt.*

**I**d est trium morborum causam explicare, seu singillatim perferutari, quæ ratione menses, vel, 1. cito revertant: 2. nimis perdurent, aut 3. uberri-  
mi nimis fluant.

I. De *mensibus crebris valde*. Si paullisper menstruationis leges examinabimus tribus de causis apparebit menses citra naturæ ordinem citissime renovari. 1. vermicularium vitio, dum citius quam par est lacteus in iis cumulatut succus; 2. appendicum venosarum faciliiori productione, atque distensione, quæ a minima vermicularium turgentia referari sinunt, cruoremque crebre effundunt. 3. Sanguinis labe qui in eas appendices nitens ipfas haud infrequenter aperiri cogit. Tres hujusmodi causæ singillatim vel complexim binæ, vel omnes simul pro diversitate remotarum causarum a quibus originem ducunt, quæque diversa ratione inter se copulatæ periodos plus, minusve breviores producunt.

1. Vasa cito replentur vermicularia, atque crebre lactinoso saturantur lactice, ciborum abundantia valde nutrientium causa, quibus opulentiæ vescuntur mulieres; quæ vitam otiosam inertem plerumque gerunt, quales sunt Civicæ omnes; idem Altricibus evenit, quæ citius quam par est, mammis adhuc turgentibus, lac emittere student.

2. Appendices venosæ producuntur atque extenduntur facile ideoque crebre etiam referantur vermicularium turgentia ergo, quæ molli laxaque tunica obteguntur: in iis præsertim id accidere conspiciamus, quæ graciliori donantur corporis habitu, albo fluore laborant, vel quæ uteri excoriationes passæ sunt in difficili partu, abortu, aut secundinarum extractione, vel quæ uterum ulcere habent erofum.

3. Sanguis magno nisu appendices frequenter aperiri cogit, quando in vera plethora exuberat valde pro nutritione nimia, aut inertia, vel quando rarefcit in pseudo-plethoricis mulieribus, ubi velocius circumvehitur, quod iis accidit præsertim, quæ acrioribus cibis aromaticis, sapidis aluntur, vel spirituosos hauriunt liquores, nimis se exercent, vigilant, animi vexantur patematibus, aut sebre acuta laborant.

II. De *mensibus diu persistentibus*. Eorum pertinacia tribus de causis oriri videtur: 1. Ex vitio vasorum lacteorum, quæ supra statum naturalem lactinoso turgent humore, absque quo illum effundant, comprimuntque venas circumpositas; 2. Appendicum vitio, quæ dum segniter referantur lentefanguine, continenter tamen, manant; 3. Sanguinis vitio, qui continuo ibi affluens appendices distendit. Hujusmodi causæ, ut superiori articulo indicavimus junctim, vel complexim agere possunt pro remotarum causarum diversitate, quarum diversa copula, plus minusve menses producit.

1. Vasa lactea diu turgida persistent, atque vicinas premunt appendices, quia angustis suapte natura ipsa donantur orificiis, vel palloris reliquiis obstruuntur, quod lactinosi humoris effusionem retardat; Latex enim uberimus, (v. n. 1. Art. I.) qui vermicularia continenter; replet verum ejusdem humoris spissitudo (ibidem) effluviū implicat, atque impedit valde.

2. Appendices jam apertæ difficillime obducuntur pro tunicularum laxitudine (v. n. 2. Art. III.) aut claterii amissione (v. n. 2. Art. I.) vel quia excoriationibus labefactatæ fuerunt (ibidem).

3. Sanguis uberrieme in venosas irruiat appendices, quando veræ, vel spuria plethoræ causa per totum corporis ambitum redundat, (v. n. 3. Art. I.) vel

dum uteri vasculoso contextu a nimia lacteorum compressione retinetur, (v. n. 1. Art. III.) denique sanguis celeriter circumvedus in appendices pari velocitate irruit (v. n. 3. Art. I.).

III. De *menfibus nimis uberrimis*. Ubertas tres causas agnoscit: 1. Vitium vermicularium, quæ turgidissima sunt, comprimuntque vicina vascula, atque per appendices omnem erumpere sanguinem cogunt: 2. Lata appendicum orificia, quæ pro ampliori diametro ipsum effugere sinunt: 3. Cruoris velocitatem, quæ uterum versus coccineum laticem impellens ipsum uberius fluere cogit, hic pariter ex diverso remotarum causarum connubio plus, minusve abundans gignitur effluviū.

1. Vasa lactifera tument nimis, dum eorum ostiola, vel naturaliter exigua sunt, vel palloris ergo obstructa, ut proinde, lacticosum humorem minus valeant effundere, (v. n. 1. Art. II.) qui copia maxime illa replet, (v. n. 1. Art. I.) ac spissitudine difficillime erumpit (ibidem).

2. Orificia venosarum appendicum in iis laxiora sunt, in quibus circumvestientes tunicae laxæ nimis albi fluoris causa, aut aliunde labefactatae apparent, (v. n. 2. Art. I.) vel excoriatæ fuerunt in laborioso partu, abortu, aut sætus vel placenta extractione (ibidem) vel ulcere erosæ (ibidem).

3. Sanguis fluit velocius, & uberius in iis, in quibus eximia cruoris copia appendices infarcit (v. n. 3. Art. II.) vel in ipsas celerius irruit (ibidem) vel liquatus nimis facilius erumpit, ut in omni humorum solutione accidit.

IV. Animadvertimus jam superallata enumeratione frequentiam, persistentiam, vel ubertatem effluviū *priorem* constituere ordinem mensium nimiorum, qui plerumque ab iisdem, vel affinibus causis originem ducunt, quare nil mirum si interdum casu fortuito copulentur binæ earum causæ, ut *secundum* magis laboriosum ordinem efforment, vel tres simul agant, & *tertiam* producant maxime periculofam, uberrimam magis effusionis speciem; at incassum fusorem exhiberemus explicationem, quæ facile causarum earum comparatione innotabit.

### §. III.

*Causæ, quæ uteri hæmorrhagiam producunt.*

**S**anguinis morbosa jactura maximam, & continentem valde venosarum appendicum aperitionem supponit, quæ vel uteri hæmorrhagiam in copiosiori, aut *stillicidium* in diuturniori, sed modico profluvio inducere solet, ideoque hujusmodi dilatatio duplex esse poterit, vel quæ nullam continui solutionem conjunctam habet, vel quæ aliqua læditur exulceratione: examinabimus nunc singulatim ambas.

I. Appendicum dilatationes, quæ citra continui læsionem accidunt, iisdem de causis in uteri nimio profluvio producuntur, ex quibus menses nimii oriri solent; ex. gr. appendicum orificia, quæ maxime dilatari debent, quando causæ omnes (n. 1. 2. Art. III.) superius indicatæ simul concurrant, tunc fluit uberius sanguis per extensa orificia, præsertim si ipsis ceteræ jungantur causæ (n. 3. Art. III.) enunciatæ, quæ veram uteri hæmorrhagiam perducere valebunt, a sola ortam appendicum dilatatione, plus minusve persistentem pro causarum pertinacia quæ orificia distendunt.

Modicam vero sed diuturniorem eorum orificiorum dilatationem faciet causarum congeries (n. 1. 2. Art. II.) complexim agentium; exigua tunc copia erumpens sanguis per longum tamen temporis spatium præsertim si causæ ad-

dan-

dantur ( *n. 3. Art. II.* ) ideoque tunc habebimus a simplici orificiorum dilatatione absque continui evasione *uteri stillicidium*, seu *suintement de la matrice*.

II. Dilatationes vero cum continui solutione, aut appendicum excoriationes plures causas agnoscunt, quas tantum indicabimus, nam singulas alio nostrum erit persequari: hujusmodi sunt;

1. Ulcus uteri plus minusve extensum, profundum, aut scedum, quod visceris fundum, latera, aut collum intrinsecus deturpat, ab innumeris nactum causis infra *Lib. II. Cap. IV.* enunciandis.

2. Excoriationes aut scissuræ, quæ in laborioso partu, abortu, vel ante ortum discessi fœtus, aut adhærentis placentæ extractione anteriorem uteri superficiem lædunt.

3. Rhagadia, abrasiones, aut incisiones, quas in interiori uteri facie inducunt, albi fluores acriores valde, injectiones stimulant, aut distensiones, quas in violentiori partu ægræ patiuntur, læsiones tandem, quibus obstetricantes uterum sæpe lædunt.

4. Varicosæ, aut aneurismaticæ vasorum dilatationes, quæ repentinam mensium suppressionem, syrrhum, aut obstructions subsequuntur, liberam hinc circulationem intercipientes, vel quæ fungis, aut carcinomatibus succedunt, in cancro & cancerosis ulceribus obviis.

Cum hæ causæ omnes simul ex alterutro vasorum genere ampliore truncum offendant, ipsum late scindendo, aut erodendo uberrimum, tunc eveniet sanguinis effluvium, seu uteri hæmorrhagia; at modica cuoris læsura, seu uteri stillicidium tunc gignitur, cum hæ causæ segniter agant, vel leviter ampliora vasa abradant, vel exiliora tantum, atque capillaria erodant.

III. Neque præteribimus plures alias externas causas, quæ internis consociatæ valde conducunt ad sanguinis læturas provocandas, atque augendas quotiescumque in utero superallatarum dispositionum, aut vitiorum aliquod extet, quod impar sit ullum effectum gignere; eadem causæ possant catameniorum regressum promovere fluxum producendo, aut affluentis sanguinis quantitatem augendo, præposito jam lacteorum vasorum appendicum, aut sanguinis vitio, ecce vobis palam eorum præcipuas, quarum actionem tantum indicabimus.

1. Magnus tempestatis æstus, aut exacerbationes febrium, quæ præcedunt, aut comitantur morbillorum, aut variolarum eruptionem, vel supurationem; vigilæ crebræ, & immodicæ, intensiora animi pathemata, uti colerha &c., in quibus circumstantiis omnibus sanguinis rarefcentia magnopere crescit, ejusdemque circuitus acceleratur, quod sanguinem duplo nisu in uterum irrumpi cogit.

2. Usus nimius balneorum, aut semibalneorum calidorum, vel pedes calefaciendi abusus, quare rarefcentia quam inferius calor inducit, velocitatem ibi, atque sanguinis copiam auget, ut uteri vasa potissimum repleantur.

3. Subita frigoris aggressio, quæ totum corpus invadit, aut inopinata terroris perceptio, gelida pluvia, quæ repente madescit &c. frigus enim ejusque universalis convulsiva contractio, quæ tunc externum corporis ambitum adortitur sanguinem intus repellit, & internas partes, uterum præsertim tumefacit.

4. Veneris nimius usus, aut violentiora exercitia, qualia sunt deambulatio, saltus, chorea, tunc enim reiteratæ musculorum contractionem sanguinis circulum sollicitant, atque velocitatem intendunt ita, ut majori nisu ad uterum se transferat, præterquamquod Matrimonii usus, uteri fibras tonicis contractionibus nimis excitando, propria uteri vasa referari, atque circulum ibi augeri nititur.

5. Casus, aut æquitationis, vel rhedæ secutiones &c.: subsultus enim quibus  
tunc

tunc uterus exponitur vasa aperiunt, atque scindunt, quandoque, minima de causa aliunde superaddita.

6. Ululatus violentiores, aut declamatio, vel lectio elata voce diu continuata, crebra sternutatio, vomendi conatus &c., quæ musculos respirationis, diaphragma, aut imi ventris musculos contrahunt, frequenter, vehementerque; ac proinde agitato, comotoque utero ejusdem facile referantur, aut scinduntur vascula.

7. Intestinelorum tormina diu in diarrhoeis passa, tenesmus &c. aut nifus in sublevando pondere, quod magnam producit thonicam muscutorum respirationis, aut abdominis contractionem atque diaphragmatis quæ uterum premit atque aperit ejusdemque vasa discepiunt.

8. Abortus, aut laboriosus partus, casus, idus quos gravidæ interdum patiuntur, quique placenta adhesionem debilitant &c., quare in iis circumstantiis venosæ appendices, quæ gestationis ergo dilatantur, multum sanguinis effundunt, atque per longum temporis spatium, si semel referantur, aut uterus tumidus factus aut secundinarum præsentia obductionem magnopere impedit, at hujusmodi morbos Lib. III. singulariter perscrutabimur.

9. Efficaciorum tandem emenagogorum remedium abusus, irritantium persariorum, vel pedum venæ sectionum &c. ad menses revocandos crebre nimis obviorum, vel quando sponte catamenia abire conantur, nam eorum remedium actio eruptionem vehementius sollicitando, dum uteri vasa referari magis reuunt, eorum plerumque scissuras periculosas valde, & lethales interdum inducit.

#### §. IV.

##### *Differentiarum explicatio.*

Varietates omnes, quæ animadversione dignæ sunt, vel a diversa morbi specie, vel causarum indole diversa, vel a diverso positu quem in utero morbus occupat pendere videntur.

I. Ut jam *Articulo* primo ostendimus, differentias, quæ a morbi diversitate originem ducunt, hic reiterare licebit, &

1. Cum cruoris effluuium, quamvis uberrimum nimis atque diuturnum appareat periodorum tamen aliquam speciem referat *menses nimios* ipsum vocant, *hemorrhagiam* vero cum nullum periodum præferat.

2. Menses nimii immodici esse possunt frequentiz, perdurationis, aut fluxus ubertatis ergo, si ab unica earum causarum originem ducant, & *primus* hinc oritur mensium nimiorum *ordo*; si a binis *alter* prodit; *tertius* producitur, si tres omnes hæ causæ simul confluant.

3. Sanguinis jacture interdum uberrimæ sunt, breviores sint nec ne, & tunc *uteri hemorrhagiam* illas appellant, interdum leviores prodeunt, diuturniores tamen, quas *uteri stillicidium* nuncupari consueverunt.

II. Differentiæ, quæ pro causarum natura diversa inter se discrepant, speciationem hic explanationem postulant.

1. Omnis sanguinis fluxus immodicus, quem vel *menses nimios*, vel *uteri hemorrhagiam* appellant a continui plerumque solutione, vel a simplici ad eam dispositione dependent, quod *priorem differentiam* constituit.

2. Fluxus nimius, quem gignit quedam continui labes ab uteri ulceribus scissuris, aut varicibus oriri solet, & *secundam differentiam* præbet.

3. Omne immodicum cruoris effluuium, continui lésione expers, gignitur ab appendicum, aut vermicularium vitio, vel copia, aut velocitate sanguinis aucta, atque *tertiam suppeditat differentiam*.

4. Vitia lacteorum vasorum, quæ hujusmodi morbos producere valent sunt naturalis angustia, vel accidentalis obstructio excretoriorum, qui parum vel nihil lactificiosi humoris effundunt, ideoque turgida plerumque diu retinet vernicularia.

5. Venosarum appendicum vitia quæ similes affectus gignunt, naturali, aut acquisita earum laxitudini tribuuntur, quare referantur facile, ac diutius in eo remanent statu.

6. Sanguinis vitia, quæ easdem calamitates pariunt a vera vel spuria vasorum plenitudine, aut aucta sanguinis velocitate derivantur, quapropter in uteri appendices, earumque officia magno nisu cruor continenter irrumpit.

III. Tertium differentiarum genus, quod a continui solutionis positu descendet, vel locali dispositione, neque multiplex, neque magni faciendum videtur.

1. Hujusmodi affectio plerumque uteri cavitatem raro vaginam deturpat, quod patet sursum insipientibus *Cap. I.* ubi catameniorum semitas exposuimus.

2. Specialiter vero fundus, latera, aut orificium uteri afficiuntur, quare patientes de renum, umbilici, lumborum, femorum, inguinum, aut pubis dolore sæpius conqueruntur.

3. Si vero vaginam id sedet supra, vel infra; antè, vel postè locari poterit, ideoque dolorosæ impressiones, modo vesicam, modo rectum vexabunt.

## §. V.

### *Symptomata.*

1. IN omni morbo sanguinis effluvio ægræ debiles plus, minusve, atque laxè reperiuntur pro jacturæ ubertate, aut pertinacia diversa; hujusmodi phenomena necessario eveniunt a debiliore musculorum contractione, qui exigua spirituum copia irrorantur, tum a fibrarum laxitudine, quarum vasa sanguinea cruore valde depauperata ipsas alere imparia sunt.

2. Cordis & arteriarum pulsi parvi, languidi, atque segniores reperiuntur, tum sanguinis, cum spirituum defectu; *sanguinis inopia*, dum exigua copia, segniterque ad cor affluit, paucasve lentas contractiones excitare potius est; *spirituum paupertate*, qui in ratione inopis sanguinis imminuuntur, atque labefactantur ita, ut debilissimas desidesque cordis contractiones tantum gignere valeant.

3. Facies pallet dum cruor qui viridem colorem præbet nimio fluxu dissipatus cutis exiliora vascula necdum perfecte replet, verum pallor etiamsi universalis sit, vultu magis conspicuus fit, quia cutis ibi gracilior subtus positi cruoris qualitates tum sanitatis, cum morbi statu facilius ostendit.

4. Extremitates frigescent, tum quia sanguis caloris potissima causa inopiæ ergo exigua copia illic trasducitur, cum cordis lassitudinis ergo, qui segnius ibi pro majori distantia illum impellit.

5. Ægræ statim appetitum amittunt, tantumque ciborum horror, atque depravatio intenditur, quantum morbus incrementum, quod duplici de causa oriri solet. 1. Quia animales spiritus lingue, aut ventriculi nervas fibras parum irrigando eorum instrumentorum sensum imminuunt; 2. verum quia inops sanguis qui parum salivæ, aut gastrici succi suppeditat, fermenti actionem infirmat.

6. Quantumvis incumbant ægræ, tum alimentorum selectui, cum exiguæ copię quibus vescuntur, incompletam tamen digestionem patrant, defectu id eveniat vel paupertate gastrici succi, vel ventriculi laxitudine, qui nihilum suis contractionibus foveant fermenti actionem.

7. Pluribus de cavis ipsæ citissime emaciantur, 1. si parum alantur, 2. si cibos imperfecte digerant, parumque chyli proinde absorbant, 3. si tandem con-

continuo sint obnoxii cruoris effluvio, quod majorem nutrimenti copiam disperdat, quam alimenta restituant.

8. Obstructiones haud infrequenter imi ventris accidunt, quia humores per abdominis viscera fecernendi in his persistunt debilioris cruoris impulsus, & fibrarum elaterii causa, quae spirituum deficientia relaxantur.

9. Tantum sensum sensumque *Cachexiam* laborare incipiunt, in quo morbo plus lymphæ atque sero quam sanguine turgent vasa, & quantum cruoris disperditur, tantum seri potius restituit, hac de causa in iis in quibus pluries venam secare interfuit ultimum de promptum sanguinem serosum magis conspicies.

10. Serosa lymphæ tunc in sanguine redundans raro pura est: plerumque enim, aut chyli imperfecti admixtione quem prius viæ subministrant, aut humorum recrementis peccat, bilis præsertim quam abdominis viscerum hepatis potissimum obstructions in sanguine retinent, ac inde *Cachexiam* ipsa intendit.

11. Tunc egger stantes, vel sedentes pedibus aut cruribus oedemate afficiuntur, tum quia sanguis difficillime citra gravitatis leges sursum tollitur, majorem seri copiam ibi relinquens, cum quia lymphæ ipsa ibi superstes lymphatica vasa infarciens revehitur difficillime, eaque mora inflat.

12. Contra vero dum ægræ lectulo detinentur inferiores artus detumescunt horizontalis positus favore, qui cruoris, atque lymphæ circulationem promovet, vultus tamen, palpebræ, aut oculorum vicinia oedematosa sunt, cum in iis partibus maxima habeatur solidorum laxitudo, minimumque elaterium, quod lymphæ statim fovet.

13. Morbi pertinacia oedema augetur, atque sensum, sensumque crura, femora, renes aggrediens, anasarca producitur; identidem exuberans lymphæ abdomine, aut thorace effunditur, si qua ibi obstructio sistat, quam segnis lymphæ, aut sanguinis circuitus produxerit.

14. Si stantibus, vel sedentibus ægris uteri ostium ita locatum sit, ut sanguis facile erumpat, stillabit ille statim, iisdemque proprietatibus pollens, quibus ad uterum affluerat, fluidus nempe, ruber, calidus, atque odoris exers, qualis ex vena fluere excisa, ac si uteri orificio obtegatur, aut ægræ lectulo jaceant, sanguis ibi retentus figitur, grummosque parit plus, minusve extensos, duos, aut fortidos, prout sanguis ibi moratus est.

15. Hi grummi dum ex utero prodire conantur fibras irritando sistalticas excitant contractiones, atque uteri officio præsertim dolorem in exitu parient, plus minusve intensum pro ut magis hæ partes inflammatae sensibiles aut dolentes fuerint pro majori vel minori ostii attractione, vel pro diversa grummosorum magnitudine aut duritie.

16. Dolor quem ægræ tunc perferunt, animi deliquia producit sympathicæ reationis ergo, quæ partium mirifico consensu cor aggrediens motum ejusdem retardat; idem evenit cum ventriculus indigestis cibis gravetur, aut intestina flatu intumescant, præterquam quod ægræ sæpe languent si respiratio gravis ipsis superveniat, vel commoveri, aut pedibus stare contentur, nam circulatio in iis circumstantiis statim intercipitur, ideoque syncopes, seu lypothimix frequentiora sunt immodici fluxus scenomena.

17. Quandoque accidit grummosum sanguinem in exitu dolore comitari vehementiori qui convulsiones aut motus convulsivos inducit; ab utero enim redux sanguis partes omnes lacerat, quæ cum matrice sympathicam relationem habent.

18. Dum nulla continui solutione afficitur uterus, immodicum sanguinis effluviu si semel desinat, nullum vel levem album fluorem relinquit, contrarium tamen evenit si uteri læsio magnam uteri partem occupet, aut vetustior sit.

## §. VI.

## Diagnos.

**D**iagnos quatuor Articulos complectitur, quorum; 1. Naturam; 2. Species; 3. Causas; 4. Sedem morbi ostendit, quæ omnia sedulo perpendemus oportebit.

I. Circa morbi naturam mulieres sanguinis effluvio supra vulgarem fluxum uberrimo, diutino, aut frequentiori obnoxie præsertim si ex eo lassescant, ac scenomenis plerisque corripantur superius Articulo I. indicatis, illas ægrotare testari facile possumus, & contra naturæ leges id evenire fateri.

Puellæ tantum aut juvenes sponzæ hujusmodi profluvium cum mictu sanguineo confundere poterunt, ab eo tamen diu decipi nequeunt; facile enim est; 1. Urethram a vagina distinguere, aut ex quo eorum canalium stillet cruor; 2. Verum animadvertere intererit an citra mictum, vel inter mingendum sanguis erumpat, in primo enim casu ex utero aut vagina, in postremo casu e vesica prodiret. 3. Urinam denique observando si intimius cruenta appareat ex vesica sanguinem scaturire tuto asserere poteris; si verò sanguis urina simbriarum modo admisceatur, illum ex utero originem ducere suadebis. 4. Tandem si dubium ullum superesset ægram se decipisse ipsam percontari, verum partem affectum examinare necesse erit.

II. Neque difficile est definire varias effluvi species, quæ ab utero procedunt.

Sufficit enim detegere si fluxus aliquem periodum servet quem tunc *menfes nimis* appellabis, si vero continenter effluat ipsum uteri *hemorrhagiam* vocabis. In primo casu satis erit ordinem indagare mensium nimiorum, prout eos §. IV. Art. I. n. 2. indicavimus.

In altero casu si cruoris effluviium maximum sit, perduret nec ne, uteri *hemorrhagiam* ipsum audit, *stillicidium* vero uteri si modicum sit, sed diutinum ac pertinax valde.

III. Difficilius vero erit nos certiores fieri de diversis specierum causis, quantumvis enim de iis solliciti erimus quarum indagatio ad morbi curationem maxime conducit, tamen haud infrequenter conjecturis fidere coacti erimus.

1. Nihilo secius suspicari licebit aliqua continui læsione uterum affici, 1. Si effluviium contra naturam eveniat, & legitimam hemorrhagiam emuletur; 2. Si causam adfuisse cognoscamus eam solutionem inducere potissimam; 3. Si ægræ uteri calorem, tensionem, atque dolorem perferant; 4. Si nunquam hujusmodi morbosus fluxus penitus interceptiatur, sed album, vel rubrum aliquod stillicidium relinquat; 5. Tandem si is acer, foetidus prodeat, ac suppurationem indicet.

2. Detecta enim continui solutione parum intererit definire ejusdem speciem cum remedium selectui id nihil saveat, quæ omnibus solutionibus æque conveniunt, scissuræ enim ipsæ sint, varices, vel excoriationes, in ulcera tandem singulæ degenerant. Verum si cui rem intimius perferutari libuerit innotebit.

Hujusmodi continui solutiones ulcera peperisse quando earundem latex purulentus fluxerat, vel præcedentem inflammationem, aut abscessum non rite pertractatum, aut acrem album fluorem ægræ passæ sint, vel erodentibus irritantibus nimis injectionibus uterum laceraverunt.

Excoriationes vero vel scissuræ tunc in causa esse suspicabimur cum nullum adsit purulenti effluviij indicium, quinimo aliunde innoscat vehementiores ægrotas uteri divulsionem in laborioso partu aut placentæ extractione passas fuisse.

Vari-

Varices denique diruptas fluxum gignere suadendum erit, quando protinus adiutur ipse, uberrimus valde sit, & diutinam mensium suppressionem consequatur, quam uteri tumor atque gravitas comitabantur, vel si ille ab uteri syzygio procedat, qui circulum interceptando venas facile varicosas reddere valuisse.

3. Contra vero conjecturari oportebit nullam continui lesionem adesse, atque morbum a sanguinis copia, aut rarefactione, vel a sola vitiosa vasorum dispositione derivare, quando uterus in statu reperiatur eo directe opposito n. 2. indicato, quando videlicet 1. Contra naturam fluxus menses nimios tantum gignat: 2. Nulla causa precessa sit quæ eam solutionem parere valeret: 3. De uteri calore, tensione, aut dolore necdum quæ conqueste sint: 4. Nullum fluxus intermissio stillicidium relinquat: 5. Vel si ullum supererit acrimonia tamen fetore, aut pure expers videatur.

4. Cum omnis absit continui solutionis suspicio, *primam* morbi causam fateri necesse erit plenitudinem esse, aut rarefactionem sanguinis, vel ejusdem velocitatem qua circumvehitur, quod facile innotebit, 1. Pulsuum observatione, quos plenos, duros, anpros, crebros, aut celeres reperies: 2. Faciei inspectione, quæ vivida, coccinea, atque colorata apparebit etiam instante morbo: 3. Subito optimoque venæ sectionis effectu, quæ sollicite instituta ægritudinem facile subiger.

*Alteram* hujus affectus causam lassitudini tribuenda videtur appendicum venosarum, quæ elaterio deficientes referantur facile, difficillime coarctantur. Hujusce causæ indicia erunt: 1. Morbi perduratio, aut pertinacia, quæ venæ sectiones eludit: 2. Egrotantis gracilis corporis habitus, qui parem uteri ejusdemque vasorum debilitatem prænuñciat: 3. Fecunditas nimia per quam pluries gestando uterus facile elaterium amittit, præsertim si prima juventute fetus gerere inciperant: 4. Albi fluoris persistens, quæ maxime lassescit uteri contextum.

Tandem, quæ *tertia* considerari potest morbi causa rarior est, & vitium vermicularium respicit, quorum excretoria compacta nimis, & arcta menses crebros copiosos ac diuturniores reddit, continenter appendices comprimendo; ea causa in illis tantum oriri poterit, quæ diu pallore laborarunt, quæ sero vel imperfecte menstruarunt, aut in iis, quæ vermicularia obstructa habent, vel suspectæ natura oblecta.

IV. Parvi faciam sedem rite morbi distinguere, aut semitam inquirere, ex qua sanguis erumpat; raro enim, ita, e vagina procedit, ut hoc persequari pene frustraneum videatur; at si id interesse quis crederet, facile patebit ægram explorando, ut uteri tunicas vasorumque statum cognoscamus, atque uteri orificium examinare queamus, quod parvum, dilatatumque inspicimus, quando sanguis ex utero procedat; obstructum vero, si ille e vagina tantum perfluat.

Quo ad specialem partis affectus indaginem pertinet, uteri nempe, aut vaginæ, id ægram percontando de doloris tensionis, aut caloris tramite facile dignoscere poterit, nam vaginæ aut uteri partes eas affici videbis, quæ iis fenomenis respondent.

## §. VII.

### Prognosis.

- I. **O**mnis generice sanguinis peruterum amissio cujusve sit speciei vel a quavis causa procedat, periculosa semper, & nocua valde experitur, quia gravia symptomata inducit, depravatum nempe gustum, languorem, maciem, aut  
 finco-



syncopem &c., quæ sæpe infastas consequutiones habent, quales sunt cachexia, hydrops, consumptio &c.

II. Cruoris jacturæ quo vetustiores, eo deteriores esse solent, non solum quia earum persistencia a pertinaciori causa ipsas oriri indicat, verum quia temporis diuturnitate humorum qualitates infirmantur valde, atque uteri vasa magnopere labefactantur.

III. Idem pronunciabimus de sanguinis jacturis, quæ anibus accidunt in fausti plerumque eventui, tum quia in iis nisi a violentiori causa a vasorum nempe laceratione procedere poterunt; cum sanguinis ergo qui necessaria fluiditate, & balsamicis molleculis orbitur, quæ concisa valeant consolidare vascula, tandem ætate amisso solidorum elaterio vasa amplius claudi fluxumque sistere imparia sunt.

IV. Hæmorrhagiis difficiliss, quam mensibus nimis mederi quimus, nam illæ ab continui solutione, hæ a sola appendicum dilatatione, laxitudine, aut mollitie dependent, ut facilius, sublata causa, ad naturalem statum reducantur.

V. Menfes nimii prioris ordinis, qui ab unica causa producuntur, facilius quam ii secundi ordinis, convalescant; qui duplicem causam agnoscunt, atque isti facilius quam postremi ordinis menfes, quos triplex causa gignit.

VI. Citius promptiusque est sanguinis jacturis mederi a copia, rarefcentia, sive aucta velocitate sanguinis orti, quam iis quæ intimum pro causa cognoscunt uteri vitium, illa enim sanguinis amissio ipsa rarefcentiam, atque velocitatem subducit, vel aliquam tantum venæ sectionem postulat, at uteri lésiones continenter rebelles experiuntur.

VII. Inter varia hujusmodi vitia, quæ uteri vasa deturpant, scissuræ nempe, erosio, & ulcera, uno verbo continui solutiones difficiliss sanantur, quam eorum laxitas, distentio, atonia, aut inertia, quæ nullum comitem habent continuitatis vitium, quare illæ cruoris amissiones his deteriores sunt.

VIII. Uberiores hæmorrhagiæ simplici stillicidio periculosiores evadunt in iis enim copiose, & celerrime sanguis ammittitur plura hinc, & terribra magis scenomena producuntur; leviori quantitate vero erumpit stillicidium quod diu absque gravi documento perferre valent ægræ.

IX. Quandoque tamen difficiliss convalescunt stillicidia, quam uberrimæ uteri hæmorrhagiæ, nam ea vetustius supponunt interius uteri vitium, quod in ulcus degeneraverat curatu difficillimum, verum hæmorrhagiæ copiam potius rarefcentiam, aut celerritatem sanguinis pro causa agnoscunt, vel saltem nuperrimas scissuras facile coalescentes.

## §. VIII.

### Curatio.

**H**ujusce morbi medela tres casus complectitur. 1. Uberrimam, atque persistentem sanguinis amissionem, quæ vel repente aggreditur, vel menfes nimios emulatur; 2. Veram cruoris jacturam, sed modicam etiamsi pertinacem, ac diuturnam valde, stillicidium nempe, quod aliquam, vel nullam periodum servat. 3. Alterius post inceptam, aut perfectam valetudinem regressum, quem preoccupare nostrum erit. Nunc igitur breviter specialem utrorumque curationem plane explicabimus.

## CASUS PRIMUS.

*Uteri hemorrhagia.*

Cum præceptis hic sit morbus, cito idcirco eo mederi & efficaciter necesse erit, eaque de causa quatuor subsequentes indicationes implere prudenter nostrum erit, videlicet: 1. Copiam imminuere, aut velocitatem quibus sanguis in utero inrumpit: 2. Elaterium vasorum sustinere uteri laxati nimis vel aliquo modo labefactati: 3. Narcoticis epicraticis sumptis uteri sensibilitatem obtundere, ac ab ea natus systolicas contractiones, quæ fluxum augent: 4. Temperare tandem, atque sedare sanguinis expansionem, vel nimiam saltem ejusdem fluiditatem, aut acrimoniam corrigere, si iis de causis sanguinem peccare suspicabimur; quare

1. Aëras quiescere, atque continuo lectulo detineri jubeto; inversus itaque positus magis idoneus putatur, quia uterus tunc latior est; plures Auctores etiam commendant clunes magis, quam abdomen elevare, qua ratione fluxum imminui videtur, at cito percipimus tantummodo uteri cavitatem affluentem detineri sanguinem, ibique in gummos coagmentari, qui per vices erumpunt contractili uteri vi expulsi, cujus rei mitior effectus est affluxum augere, quam ob rem potius quam hanc amplecti methodum magis idoneum videtur aëras horizontali locari posito, qui cruoris effusionem statim finit ad uterum affluentis antequam in grummos ipse coeat; vulgares culcitra ex lana repleta plerumque aëris moleste evadunt, easque calefaciant valde, neque sanguine imbibuntur illuc putrescente, salubrior itaque erit culcitram stramineam vel si eam fastidiant ex crinibus confectam adhibere, tandem non solum oportebit, quod ægrotautes cubili detineantur, verum in eo quiescant, sileant, ac si fas erit cogitationes omnes a mente removeant; certum enim est præcípites locutiones, aut animi validas commotiones, hæmorrhagias facile reduplicare, aut revocare.

2. In hoc casu venam ex brachio secare magis idoneum remedium esse experti sumus, id enim universalem sanguinis redundantiam subducendo ad uterum etiam affluxus imminuitur, contractiones vero cordis moderando illius affluxus velocitas etiam retardatur, quare dupliciter brachii venæ sectio per patulas appendices affluentis sanguinis nifum imminuit, earumque obductionem efficaciter sovet, hujus tamen remedii usum cito instituere necesse erit, antequam vasa diu distensa suum ammittant elaterium, magis enim prodesse videbis sex venæ sectiones initio morbi sollicite peractas, quam duodecim sero, aut post longiora intervalla institutas.

Neque sectionum numerum, neque extraturi sanguinis copiam determinare facile est, circa quod ægroantium vires, ætatem, pulsuum conditionem, atque morbi gradum respicere oportet, plerumque tamen in præcipiti sanguinis jactura, quæ maximum detrimentum minatur, fas erit quarto quoque horio venam secare, vel saltem quatuor, aut quinque intra solis curriculum venæ sectiones patrare, duodecim, aut quindecim unciarum singulas, nisi quid valde obstat subsequenter diebus numero, aut quantitate pauciores venæ sectiones habere poterimus, modo fluxus non nihil compescatur; verum animadverti debemus minus aëras lædi duabus supra opus venæ sectionibus institutis, quam una, sed necessaria omissa; falso enim assidentes conqueruntur, de maximo ex utraque parte tunc morbi, cum medelæ causa cruoris dispendio, quo jam patientes penitus interim perterriti sunt, quare prudens tunc medicus qui satis pulsuum indolem noscit, iis sedulo perperis eorum animosæ querimonias contemnat, opportuniora interdum artis auxilia præscribendo.

Olim

Olim sane minus in hoc morbo obvia erant venæ sectiones, hisque substituebant plerumque validas (a) brachiorum, aut superiorum partium fridiones, tum arctissima digitorum (b), brachiorum, crurum, aut genuum vincula, vel cucurbitulas (c) mammis applicitas &c., ea tamen remedia patientibus valde molesta experta sunt, parumque pro valetudine restituenda efficacia, nondum tamen penitus exoleverunt, quinimo auctoritate antiquorum celeberrimorum suffulta interdum etsi frustra adhibentur, difficulter tamen sibi suaserunt Medici & nisi temporis diuturnitate cognoverunt aut melius dicam fateri ausi sunt, huiusmodi fraxim etiam veterum auctoritatibus tutam venæ sectioni non præcellere tamen, ne dicerent inutilem prorsus evadere, ingenui tandem recentiores ejusdem utilitatem testari non sunt veriti, eamque contemnere absolute suadent.

3. Suaeptæ natura sanguinis amissio neque purgantia, multoque minus emetica postulat, valde enim timendum erit quod dejectiones, aut vomendi conatus eam non intendant, ut crebre evenire solet, nihilo scilicet non desunt circumstantiæ, in quibus prodest ægras purgare, aut vomitum excitare, qua methodo interdum hæmorrhagias sistimus ceteris remediis rebelles. Eas tamen distinguere haud facile est, *judicium, difficile* sane; signa itaque eamdem pathognomonica ostendimus ubi *cautelæ in hoc morbo magis necessariae* enunciabimus; sufficit hic animadvertere vulgaria purgantia usucvenire, qualia sunt Manna, Cassia, sal vegetabile, aut Rheum; tum Tamarindorum sulpa, aut Sennæ folliculi infusi; emeticorum vero respectu tutiora, & utiliora erum hypecaqueanthæ grana viginti, aut viginti quinque thei poculo sumpta; at in potioribus circumstantiis quibus hæc conveniunt remedia, nisi prius venæ sectionibus vasa sufficienter depleveris non erunt propinanda.

4. Dum cruoris volumen imminuimus, atque sanguinis extractione vasa uteri explicamus, eorum appendices constringere laxas nimis, aut concisas opus erit, qua de causa adstringentia exhibebimus apozemata, aut bolos.

Hujusmodi apozemata ex decoctionibus perfici poterunt plantarum adstringentium, Plantaginis videlicet, Borraginis, Mille Folii, Urticæ Althææ ceterarumque hujus sensus, quas infra *Articulo subsequenti* enumerabimus; at salubrior erit earum stirpium succos depuratos apozematum modo haurire, ad trium vel quatuor unciarum dosim, cui circiter uncia additur syrupi appropriati rosarum nempe excicatarum, baccarum myrti, coraliorum, corticis granatorum, aut consolidæ majoris.

Boli vero coagmentantur ex sanguine Draconis, Terra Japonica, Mastice, Coralis Præparatis, Succino, ovorum Testis, Alumine Rupeo, Balauitis, Cortice Granatorum, Lapide hæmatite, Croco Martis adstringente &c., quorum duo vel tria seliguntur ad decem, duodecim, vel quindecim grana syrupo quoddam appropriato remixta sumenda; usitatiorēs tamen boli fiunt ex alumini, ac sanguinis Draconis singulorum granis quindecim sub forma bolari pauco saccharo remixtis.

Cum quarta quaque hora ægris jus propinare mos sit, ita simili intervallo inter medio tempore apozematum, aut bolorum eorum vel utriusque simul dosis si morbus urgeat exhiberi solet, bihori vero intermedio spatio semel vel bis ptyisanæ nonnihil calefactæ poculum pro vehiculo præscribite.

5. Si grave opus sit, atque lethale effluviū repente sistere, juri alter vel duo pugili addi poterunt florum *Scolymi silvestris* in taleolas divisi, vel eorum defectu drachma una ventriculi hædi, vel leporis probe loti, hujusmodi remedia

*Astruch de Morbis Mulierum.*

G

media

(a) Galenus. l. ad Glaucon. cap. 14.

(b) Galenus. *Ibid.* Hippocrates; li. de Morb. Mulier. &

Præf. Acetis; Tetralib. 1<sup>a</sup>. Sermon. 4. cap. 64. Paulus Aegineta, De Re Medica lib. 1. cap. 64.

(c) Hippocrates; Sect. 5. Aphorism. 50.

media tutissima sunt, eaque in uteri hæmorrhagiis valde prodesse compertum est.

6. Cum in hoc morbo obtusos dolores haud infrequenter circa uteri collum ægræ perferant aberratione, mora, aut grummi sanguinis productos, lique patientes invite commoveant, atque matricis excident violentiores subfultus, qui ægritudinem confirmant, atque augment, idcirco magni momenti erit narcoticis eas impressiones temperare, qua de causa pthifanæ ebullienti addi convenient capita aliquot papaveris albi, vel apozematibus syrapi diacodi parum, aut bolis tinturæ cujusdam annodynæ guttæ aliquot, modificando ita dosim eorum pro ægrotantium viribus, ut absque sopore quiescant.

7. Patet jam non esse tunc copiose ægras nutriendas, ne alimentorum ubertate cito plethoram restituamus quam vanæ sectionibus subducere conamus, exhiberi tantum oportunitate censeo lene nutrimentum non nihil glutinosum quod humores demulceat paresque reddat vasa consolidare; quare ægræ solo vapido jure alentur quarta quoque hora sumpto ex pullo aut vituli frustulis confecto, quod si densare volueris, cum radicibus Althææ aut Consolidæ majoris in bacteolas divisas ebullietur, eo pariter collineant vitulorum tali, aut pisces glutinosi exangues vel crustacei; si vero intererit effervescentiam, aut rarefactionem sanguinis moderare, pullorum coquendum venter seminibus repletur, mellonis contusus, & mundatis, vel eorum uncia culinari ola infunditur, aut juri emulso superadditur, quandoque tamen seminibus radices subtrahuntur aliquæ, aut folia oxalidis.

8. Ægras levi hac nutritione sustinere fas erit donec morbi vigor persistat, quo sublato largiorem dictam indulgere poteris, & loco bovis carnis aut vericis, quæ acriorem succum præbent, oryze, vitulinæ carni addi poterunt, aut eorum cremor, vel lentium decoctum coclearia aliquot, gelatina etiam interdum propinari potest ex carnibus patrata &c. imposterum si convalescere incipiant luteum ovorum jure solum, aut integrum si lubeat absorbere ægræ, vel orizarum parum aut jusculi cum pane cocti; sero tamen in hoc properato.

9. Morbi initio vini potum interdicto pro usu leniorem subadstringentem pthifanam exhibendo: subsequenti Articulo enumerabimus stirpes, quæ hic usu-veniant, sed usitiores sunt radices Consolidæ majoris, Poligani aut Bistortæ, verum folia Plantaginis, Millefoliorum, Urticæ, Althææ &c., ex iis tamentum radicibus cum foliis uncia est adhibenda ut levior fiat potus, facile fecerant, eumque patientes assatim haurire queant: crebre etiam efficax experitur *levior* decoctio lenticæ aut levissima tinctura terræ japonicæ.

10. Hujusmodi pthifanis præcellere videntur quæ ex corticibus aurantiorum immaturorum, aut radice oxalidis conficiuntur, præsertim si qua humorum solutionis aut rarefactionis suspicio adsit, quapropter in iis circumstantiis interdum ita proficue sunt ut nonnulli auctores quasi totidem specifica ipsas commendent.

11. Sæpiissime evenit ægras repente animi deliquiis aut lypothimiis corripi, quæ sane perterere solent, idcirco promptiora quadam auxilia ad manus habere necesse est, qualia sunt acetum simplex, compositum aut theriacale, Sal Anglicus volatilis vel aqua Carmelitarum; iis nares fricantur, ac tempora acetato, aut aqua Ungarica, frigida etiam aqua facies aspergitur; at his omnibus in cassum adhibitis exhiberi poterunt confectioes Alkermes, aut Hiacentinæ, tum Aqua Florum aurantium solutæ, proderit etiam coclear vini Rotæ, aut Alicantis, vel parum aquæ Carmelitarum, aqua fontana remixta.

12. Cum haud infrequenter ea animi deliquia a grummi sanguineis procedant, qui uteri orificium obtegentes, ejusdem limen premunt, vel mo-  
ra san-

ra sanguinis effusionem impediunt; ideo grummosum sanguinem remove cito oportebit, sedulo tamen cavendo ne uterus, ejusdemque ostium laedatur.

Plerumque proposita methodo prudenter, diligenterque instituta sanguinis jacluram sistimus ita, ut vel convalescere tantum reliquum sit, vel cruoris stillicidium superfit, de quo articulo sequenti &c., quandoque tamen evenit si uteri vasa concisa, aut erosa sint, hæmorrhagiam diu sustineri remediis usitatoribus rebellem, quam ob rem sapienti Medico efficaciora auxilia adhibere fas erit etiam si periculosa fuisse videntur, ea externa plerumque sunt, fomena nempe, cataplasmata, emplastra, pessaria, tum uteri injectiones, frigida pediluvia &c., de quibus attendite.

I. Inter ea infirmiores expertæ sunt somentationes; ipsæ ex decoctionibus sunt radicis Bistortæ, Polygoni, Burcæ Pastoris, Plantaginis, Equiseti; Rosarum Rubrarum, Baccarum Myrthii, quæ aqua veterinariorum ebulliant, hinc ex his madesacta linteola postquam expressa fuerint abdomini, ubi apponunt, interdum spongiam ebullienti aceto madidam applicant; animadvertendum est hujusmodi remedia pene frigida esse adhibenda, ne calore potius augeamus, quam specificis remediorum viribus jacluram minuamus, eidem consulto subsequendum topicorum ergo.

II. Neque his præcellent emplastra quæ lumbis, aut umbilico tantum applicare consueverunt, ut ceteris topicis spatium relinquatur; plura hujusmodi componi possunt ex adstringentium familia deprompta, ac sapissime officinalia usveniunt, *Emplastrum pro matrice*, *Emplastrum de massice*, *Emplastrum Comitisse*, *Emplastrum contra rupturam* &c.

III. Cataplasmata non immerito magis commendantur, applicantur ipsa pubi vel ossi sacro; ea multiplici ratione patrantur, ex foliis Urticæ combustis vel araneorum telis paucio aceto tostis, aut subero pulverato, ovi luteo, & aceto rosato remixto, ex quibus pulmentum conficitur; denique terra bolaris usu venit succo plantaginis lota & aceto subacta, vel simus asini, aut veris aceto lotus; gipsum tandem arabico gummi torefacto comixtum, ac ter quaterve ovorum albuminibus in fultem induratum magnopere commendatur.

IV. Pessaria simili ratione ac cataplasmata confici solent, verum cum proximis morbi sedi locentur, plurimi idcirco existimantur; id tamen incommodi habent, quod in utero erumpentem sanguinem repellant, ibi in grummos inspissaturum, nisi tamen brevi hoc utatur auxilio citoque removeatur.

Haud infrequenter ipsa consari solent 1. ex succis plantarum adstringentium, Plantaginis, Millefolii, Centinodiz, Urticæ, tum pulveribus balustorum, Gallarum, corticum granatorum omnia albumine ovi subjigendo, donec fultem referant, quæ velo aut multiciliis obducta vagina intromittitur.

2. Ex pulveribus interdum coagmentantur accaciæ veræ, masticeis, sanguinis Draconis multo succo Portulacæ aut Plantaginis solutis, ut facile imbibantur gossij grummi qui filo appensi utero apponuntur.

3. Ex fimo sui, aut asini, Plantaginis succo aut Portulacæ imbuto & mucilage seminum Cidoniorum, aut Tragacanthæ, rosarum aqua peracta subacta, qui sub pulvis forma linteo obiectus intra vaginam mittitur, certioreque ibi effectum præstare asserunt.

V. Magni facere poteris in utero injectionum effectus magis quam pessarium; ipsæ enim morbi sedem intimius attingunt, eadem tamen de causa caute incedendum erit ipsas levioribus componendo adstringentibus, quæ matricem minime lacerant.

Turissime fieri possunt ex decoctionibus radicum, & foliorum adstringentium, gallarum succis expresso, inter quos magis commendantur ii Plantaginis, Urticæ, Mille folii aut Consolidæ majoris, qui modo singillatim adhibentur, mo-

do gummi Arabico soluti, addito quandoque sanguine Draconis, aut amylo; si auctoribus fidendum sit ceteris præcellere videntur injectiones ex succo stercoreis asinini recentis, cujus efficacia in hoc morbo pluribus experimentis comprobatur.

VI. In quacumque tum uteri, cum ceterarum partium cruoris amissione ozierati potum veteres magnopere commendarunt quamvis, in uteri hæmorrhagiis pro summa sensibilitate, & nervoso gracili contextu eo parcius usi sint; id tamen hodie pene obsolevit ac ubi præceptum videatur occasio modica substitui solet copia spiritus salis, aut vitrioli dulcificati, vel salubrius aqua Rabelii ad gratiam aciditatem usque, pthiasis super effusa, quæ magis edulcorari possunt syrups consolidæ, aut rosarum rubrarum. Hoc sepiissime efficacissimum remedium reperi.

VII. Tandem frigida pediluvia ex astringentibus etiam decoctionibus patrata comode usuveniunt; vidimus enim capite præcedenti calida pediluvia per aortam descendentem, ad vasa uterina sanguinem derivare, quod fluxum valde auget, ex converso itaque patet gelidam aquam sanguinis cursum retardando ejusdem affluxum ad uterum imminuere simulque hæmorrhagiam non parum compescere.

## CASUS SECUNDUS.

*De modica sanguinis jactura, seu cruento stillicidio.*

**D**uplex esse potest uteri stillicidium, alterum ex se morbum constituit, alterum symptomaticum est, quod hæmorrhagiæ uteri succedit, atque sensim remedium usum aut fluxus continuatione imminuitur.

In utroque casu brachii venæ sectiones conveniunt prout symptomatica, aut ægrotantium vires postulerint, minus tamen licebit sanguinem extrahere quam in uteri hæmorrhagia, præsertim si stillicidium symptomaticum sit, ubi ægræ præcedenti cruoris amissione, aut institutis venæ sectionibus maxime langueant.

Uterque casus postulat ægræ epicatrice purgare alvum ciendo, aut vomitum excitando, modo nihil oblit, in iis præsertim circumstantiis, quas inferius indicabimus, ubi necessarias ad hunc morbum pertinentes cautelas enuntiabimus, tutius vero in idiopathico affectu alterutram purgandi methodum feligere oportebit, cum in eo plus virium superfit minusque adsit detrimenti metus, quam in symptomatico stillicidio, in quo nuper coalitæ appendices facile referari queunt; si primas vias expiare opus sit, magis idonea adhiberi poterunt, & ægrotantium viribus accomodata remedia; verum si vomitum excitare conveniat, ipecacuannha ceteris emeticis erit anteposenda modica tamen, sed sufficienti dosi.

Postquam purgatione, atque venæ sectionibus vasa depleta, & primæ viæ expiata fuerint causis mederi nostrum erit, quæ stillicidium induxerunt, aut confirmant; si ab ulcere affectus, syrpho, aut uteri cancro originem ducat, iis morbis propria palliativa saltem conveniunt remedia, quedam interdum læniora adstringentia ad imminuendum stillicidium magis oportuna suppeditando, quæ ex infra propofitis feligere poterunt; at si a vulgaribus causis dependeat quæ ad tres reducuntur classes: quarum: 1. Lassitudo est seu atonia appendicum venosarum, quæ laxè occluduntur: 2. Levis erosio, atque nonnullarum nuperima laceratio, quæ difficillime coalescit: 3. Obstructio lacteorum vasorum, quæ continenter repleta propinquas venas comprimendo earum dilatationem confirmant, ac cruoris amissionem intendunt, remedia singulis idonea sequenti articulo enumerabimus.

1. Quapropter appendicum tum laxitate cum atonia. 1. Adstringentia usuveniunt.

veniunt, quæ hujus partis elaterium restituere easque appendices arctare potis  
sint; cum hæc remedium classis confertissima sit, ideoque magis commendata  
hic enunciare tantum licebit; usitiora \* asterisco designando, etiam si fatemur  
præexcellentiâ eorum plerumque a præoccupatione, aut consuetudine pendere.

## A N I M A L I A.

*Radices.*

- \* Tormentilla
- \* Bistorta
- \* Filipendula
- \* Pimpinella
- \* Fragaria
- \* Pentaphyllum
- Geranium Robertianum

In decoct. a ʒ 6 ad ʒ j  
In subst. S. p. a ʒ j ad ʒ ij

*Folia*

- \* Polygonum
- \* Plantago
- \* Mille folium
- \* Bursa Pastoris
- Equisetum
- Pilosella
- \* Pimpinella
- \* Urtica alba
- Myrtus
- Pentaphyllum
- Pervinca
- Solidago Samcenica
- Pulmonaria
- Folia tenella Querci
- Pyrola
- Nummularia
- Brunella
- Betonica

In pthisan. aut decoct. a m. i. ad ij  
Eorum succus expressus, depu-  
ratusque a ʒ ij. ad ʒ liij.

*Flores*

- \* Rosæ rubræ Italicæ
- \* Balausta
- Flores Cotoneorum

In decoct. a ʒ j. ad ʒ ij.  
In subst. S. p. a ʒ j. ad ʒ ij.

*Fructus*

- Baccæ Capressi
- Gallæ
- Glandes, earumque calices, aut capsulæ
- Grana Coriaria
- Afruch de Morbis Mulierum.*

In decoct. a ʒ j. ad ʒ ij.  
In subst. a ʒ j ad ʒ ij.  
G 3 Baccæ

- \* Baccæ myrti
- \* Cortices granatorum

Cortices aurentiorum agrestium

} Pthifana conficitur, ex quatuor aurentiorum corticibus duplici aquæ cenophoro ebullitis.

### Succi

- \* Catechu five terra Japonica
- \* Mastix
- \* Sanguis Draconis
- \* Acacia vera

} In subst. a  $\varnothing$  j ad  $\varnothing$  ij.

### Ligna

- \* Santala
- \* Quercus
- \* Lentiscus

} In decoct. a  $\bar{3}$  fl. ad  $\bar{3}$  j.

### Balsama

- \* Coppay
- \* Canadense

} Sacharo remixta a gutt. xv. ad gutt. vi.

\* Terebinthina Veneta } a  $\varnothing$  j. ad  $\bar{3}$  fl. cum syrupi coclear aut ovi luteo

## A N I M A L I A.

- Perla
- Spodium
- \* Cornu Cervi pp.
- \* Testæ ovorum calcinatæ
- \* Os sepis

} In subst. S. p. a  $\varnothing$  j. ad  $\varnothing$  ij.

## M I N E R A L I A.

- \* Lapis Hematitidis
- \* Bolus Armena
- \* Creta Brianconia
- \* Terra sigillata
- \* Succinum Flavum
- \* Granata
- \* Alumen
- \* Coralia †

} In subst. S. p. a  $\varnothing$  j. ad  $\varnothing$  ij.

### Præ-

† Post contentiones innumeras tandem compertum est coralia producere insecta quædam, ex polyporum genere, quæ intra eorum corticem loca flores interdum refrunt, quare Maritimus, & alii decepti sunt ipsa falso inter plantas enumerando. Recentiorum sententia non solum veritate, & polyporum existentia est sufficiens, verum sale ipso Alcalino V. latill, quod Coralia recentè captata analysi suppediant, odore urinofo piscibus putrescentibus proprio, quem ipsa redolent dum aqua putrescunt, satis ostendit animalis naturæ. Nos tamen hic consuetudini consulentes inter mineralia coralia recensuimus.



*Preparationes Galenicae.*

- |                                    |   |                           |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| * Aqua Plantaginis                 | } | ab 3 j. ad 3 ij. vel iij. |
| * --- Bursæ Pastoris               |   |                           |
| * --- Mille Folii                  |   |                           |
| * --- Rosarum                      |   |                           |
| * --- Equiseti                     |   |                           |
| * --- Poligoni                     |   |                           |
| * --- Foliorum tenerrimorum querci |   |                           |
| * --- Ranarum                      |   |                           |

*Syrupi*

- |                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| * Syrupi Rosarum excicatarum | } | ab 3 j ad 3 j ʒ. |
| * Baccarum Juniperi          |   |                  |
| * Urticæ emortuæ             |   |                  |
| * Mille folii                |   |                  |
| * Plantaginis                |   |                  |
| * Cidoniorum                 |   |                  |
| * Coraliorum                 |   |                  |

*Trochisci*

- |                 |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| * Succini flavi | } | a ʒ ʒ. ad ʒ j. |
| Gordoni         |   |                |
| Terræ Japonicæ  |   |                |

*Preparationes Chymicae*

- |                             |   |                                     |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| * Crocus Martis adstringens | } | a ʒ ʒ. ad ʒ ij.                     |
| * Tinctura Coraliorum       |   |                                     |
| * Rosarum rubrarum          |   |                                     |
| * Terræ Japonicæ            |   |                                     |
| * Aqua Rabelli              |   | guttæ aliquot ad gratam aciditatem. |

Possumus ex multiplici plantarum vel aromatorum serie ad libitum plura seligere, & idonea dosi ptyšanas, depuratos succos, apozemata, jura, julapia, potiones &c., vel bolos, oppiata, rotulas &c., conficere secundum leges *Cap. IV.* enunciatas: frequenter enim convenit remedium formam innovare ut facilius ægrotantium gustui ipsa aptentur.

II. In appendixum venosarum erosione edulcorantia, & aglutinantia remedia opportuniora sunt, quæ nonnihil etiam adstringentia & vulneraria sint. Subsequens classis hujusmodi continet medicamenta, continuo ordine digesta, inter quæ asteriscus \* usitatoria designat.

## V E G E T A B I L I A.

*Radices*

- \* Symphitum majus
- \* Nymphaea
- \* Althaea
- \* Oxalidis
- \* Fragaria

} In decoct. ab ʒ j. ad ʒ j ʒ.

*Folia*

- \* Verbascum
- \* Hypericum
- \* Gnaphalium montanum
- \* Alchemilla
- \* Sanicula
- \* Bugola
- \* Lactuca
- \* Portulaca
- \* Caryophyllata
- Geranium Sanguineum
- Scabiosa

} In decoct. a m. j. ad m. j. ʒ.

*Semina*

- \* Semina frigida
- \* Lactuce
- Portulacæ

} In emuls. singulorum a ʒij ad ʒvj  
in decoct. duplum.

*Succi*

- \* Tragacantha
- Gummi Arabicum
- \* Ladanum
- \* Myrrha

} ad gr. x. aut xrr.

*Ligna*

- \* Lentiscus

} In decoct. ad ʒ ʒ. pro singulo œnophoro.

## A N I M A L I A.

- \* Spodium raspatum } In decoct. a ʒj ad ʒij pro singulo œnophoro
- \* Cornu Cervi rasp. } In subst. a ʒj ad ʒij.

## Syrupi

\* Consolidæ majoris  
Granatorum  
Oxalidis  
Limoni  
Omphacii  
Ribetiorum

} ab 3 ; ad 3 ij.

Ex super allatis substantiis us nuper demonstravimus sub diversa forma varia medicamenta componi possunt, decoctiones nempe, oppiata &c., animadvertendum tamen erit agglutinantibus, & vulnerariis, in casum adhibitis adstringentia addi debere ex prima remedium classe desumpta.

III. In postremo casu ubi a chlorosi superstitem aliquam suspicamur uteri obstructionem, quæ vasa lactea adhuc infarciat ac proinde sanguinis circulum intercipiat, mitiora appetentia usuveniunt Cap. VIII. indicata, ubi, de chlorosi differimus; modica tamen dosi, & adstringentibus copulata, alias augeri poterit potius quam imminui cruoris effusio.

IV. Non desunt interdum signa quæ varia causarum connubia in hoc morbo indicant, erosionem videlicet & laxitudinem simul, obstructionem atque erosionem, laxitudinem & obstructionem, at quod valde deterius est erosionem una, laxitudinem ac uteri obstructionem ostendunt, in singulis his casibus eadem remedia pariter copulare necesse est, quæ compositis causis mederi efficaciter valeant.

V. In omnibus nuper propositis circumstantiis. 1. Topica auxilia præcedenti articulo enunciata possunt adhiberi, fomenta nempe, emplastra, cataplasmata &c. quinimo minus timoris superest calorem ex his utero communicatum stillicidium augere, copiam ac velocitatem augendo affluentis sanguinis.

2. Præter ea alterum reliquum est remedium, quod adhuc indicare prætermisimus, in hemorrhagiis tamen caute adhibendum cum facile uterus calefaciat, verum in simplici stillicidio utilissimum evadit.

Hujusmodi sunt suffumigia, quæ diversa ratione patrari possunt; simpliciora sunt ex aceto candenti laminæ super affuso; magis composita parantur ex rosarum rubrarum corollis, Balaustris, Baccis Myrti, Mastice, Karabe, Ladano &c. omnia subtiliter terrendo, & gummi tragacantha subjiendo, inde in aqua rosarum, aut plantaginis soluta trochisci efformantur, quæ laminæ ignitæ superimponuntur. Quidam (a) Auctores inter specifica remedia ranas umbroso loco excitatas laudant, aut ungulas muli in bracteolas concisas eodem rationi igni, aut ferro candenti superimpositas.

Recipiuntur plerumque hujusmodi suffumigia per sellam familiaricam, ac cum fumus difficillime ita ad uterum pertingat, commodiustubus additur, oportebit tamen sellam elevare, ac ignem a tubo aliquantis per remove re ne tactu caleseat nimis, & uterum, aut vaginam ledat.

3. Cum uteri stillicidium hemorrhagia minus periculosum evadat minusque urgeat, etiam si diu persistat, ideoque largiori victui erit indulgendum, quare non solum gelatinas permiseris cornu Cervi aut carniem, verum juscula, oryzæ ram cremorem, fercula, ova sorbilia, aut jure soluta in frandio, carniū tan-

(a) Mi haec Johannes Pschallius. Methodi curandi Lib. I. Cap. 59. & q. i. adfert hoc methodo verum solum hemorrhagiam curasse.

tummodo usum interdicere, his interdum substituendo pisces assatos vel aqua parum excoctis, ægræ interim procul vino pthifanæ usu persistent sero levem narcoticum hauriendo, si difficillime somnum capiant.

4. Etiamvis frustraneum videatur turægris continuam quietem commendare, nihilo secius violentiora efecitia ipsis interdicare fas erit, in quo sedulo incumbere convenit ut ægræ cubili, aut bisellio silentes detineantur, verum cum latitiæ æque, vel mæoris ideæ ipsis noceant, itaque ab iis erit abstinendum, connubiū usum pariter intermittendo.

Ea medendi ratione, vel subjigitur ita morbus, ut lymphaticum effluvium album lacticinofum tantum, vel quali carniū locura cruentum fiat, quod flores albos appellat (de quibus capite sequenti) vel penitus eradicatur, ut regressui obistere tantum reliquum sit.

### C A S U S T E R T I U S.

#### *Methodus præcavendi hæmorrhagiæ regressum.*

1. **O**mnia remove satagere debemus quæ hæmorrhagiam aut stillicidium renovare valerent, quare ægras certa vitæ methodo regere necesse erit violentiora ipsis exercitia prohibendo, quæ cito lectulo quiescant, sero expectant, verum ut animi pathemata comescant, neve conjugis absentia tristentur hortari debemus, unam tantum comestionem permitiendo elixæ vel assatæ carnis, circa vini potum parcius indulgendum videtur, nisi parum interdum ventriculus poscat.

2. His cautelis, quæ potissimam constituunt prophylacticæ curæ partem, remedium usum addi potest, quæ meliorem in subjigendo morbo præstabant effectum, ac cum magna ex parte vel penitus sublata causa videatur, ea remedia modica dosi sat erit exhibere, mitiora etiam pariter eligendo.

3. Idcirco si inertes aut laxæ persistent venosæ appendices leviora adstringentia sub pthifanæ, aut succi depurati forma propinabis, vel bolos quibus uti poterit, usque dum catameniorum effluvium periodice absque ulla sanguinis jactura restitatur, identidem absolvitur medela sola pthifana, aut leviori decocto chinæ radicis, vel chinæ simul, & sarsæ parillæ.

4. In appendicum vero emissione demulcentium, & aglutinantium usu erit insistendum, ac præter superius indicata remedia commode usuvenient jura pulporum, seminum frigidorum, ranarum, testudinum &c., vulnerariis quandoque remixta, qualia sunt balsamum Coprai, aut Canadense, butyro simul cacci, aut spermate ceti subacta.

5. Usum reiterare poteris mitium aperientium ubi supersint lacteorum obstructiones, hujusmodi sunt decocta amara in quibus soluta fuerint grana quindecim aut viginti tartari chalybeati solubilis, tum viginti, aut vigintiquinque terræ foliatæ tartari, tandem lactis serum locum habet plantis amaris super assum, cui similia addita sint remedia.

6. In omnibus iis circumstantiis aquæ minerales ferrugineæ utiles evadunt idonea tempestate propinatæ, modo parum, vel nihil purgandi vi polleant, atque modica saturentur ferri copia, cujusmodi sunt illæ de Forge, ac si purgantes minus, aut ferrugineas adhibere coacti erimus, poterunt ipsæ aqua communi dilui.

7. Lactis usus in eo triplici casu opportunissimus experitur, aliqua tamen diversitate, quando enim elaterium restituere opus sit vasorum lacteorum, lac caprinum, vel nonnullorum auctoritate ovillum commendatur, modo cum ventriculus patiatur, et asininum valet edulcorare sanguinem, lacticinofum humorem solve-

solvere, aut vermicularia laxare; vaccinum vero magis idoneum videtur vulnerariis decoctionibus consociatum, quando nuperrimas cicatrices agglutinare interfit, vero eo simul asinum collineat.

8. Suffumigia tamen in singulis casibus conveniunt modo tepentia sint, cum unicus sit scorpus appendices roborare, atque laxam uteri interiorum superficiem, ideo trochisci usuvienti ex thure, mastice, ladano, rosarum corollis, aut balaustris confecti, vel ex duobus eorum, aut tribus aqua plantaginis subactis, quæ gummi tragacanthæ auxilio in trochiscorum formam redacta utero sub fumi specie excipiuntur.

*Cautele necessariae circa huius morbi medelam.*

I. Cum gravissima cui mederi interest indicatio sit sanguinis jacturam compescere, idcirco remedia quibus maxime fidere debemus reiterata sunt venæ sectiones, adstringentes phisane cum radicibus bistortæ, symphiti corticibus granatorum, aut aurantiorum viridum &c., decoctiones terræ Japonicæ, succi depurati, plantarum adstringentium urticæ, Althææ videlicet, Plantaginis, Mille Folii &c., boli tandem ex pulveribus stipticis sanguinis Draconis præsertim, aluminis rupei ad grana singulorum quindecim quarta quoque hora sumenda.

II. Menses nimii similia postulant remedia, mitiora tamen, & aptiori dosi.

III. Cum uteri stillicidium minus periculi conjunctum habeat in remedium usu, minus angustia fas erit; imo prudentis erit interdum cunctari naturæ conatus perscrutando, ut morbi gradus rite detegere, & magis idonea remedia exhibere valeamus.

IV. Generice effluentis sanguinis copia intercipere debemus, minime tamen citius quam par est ne violentiores superveniant hysterice suffusiones, neve, quod deterius esset, hæmorrhagiæ præceps detensio inflammationem, aut syrhum inducat, quare suspicari licebit de crebro adstringentium usu, quibus caute Medici fidere debebunt.

V. Frigida itaque pediluvia, pessaria, aut stipticæ injectiones, nisi periculum urgeat, minus conveniunt, ac in præcipiti casu caute incedendum erit, ne promptior remedium effectus magis quam morbus ipse agras offendant.

VI. Idem judicare debemus de aqua Rabelliana pthisanis, aut portionibus addita, etiamsi ejusdem modica dosis nunquam præcipites effectus præstet, aut ullam perniciem inferat.

VII. Admonuimus jam calida abdomini applicare, aut vagina intrmittere, nocuum esse, calore enim rationibus superius allatis sanguis ad uterum celerius transducitur; frigida tamen nimis pariter nocent, quæ sanguinem figunt, ibique morbosos infartos gignunt.

VIII. Medicorum nonnulli in uteri profluvio plumbi præparationes magnificiunt, saccharum videlicet magisterium atque liquorem Saturni, uteri injectionibus non solum, quod modica dosi minus periculofum foret, verum intus sumi jubent, quod omni contentione dignum est, ac prosequi nefas; magno itaque Boheravio in hoc parendum erit Chemia peritissimò, qui: *Saccharum Saturni* ait (a), interne commendatur pro remedio salubri contra hemoptem, hæmorrhagiam, mictum sanguinis, gonorrhæas, fluores albos, &c. similia, tum etiam pro mitigante remedio contra acria sanguinis; sed nunquam ausus fui facere periculum, quia felices successus baud vidi ab aliis adhibentibus natos, & quoniam novi vix dolofus haberi, tetrumque magis venenum, quam ab hoc plumbo statim

in ce-

(a) Chimie Tom. II. Proust 179. in Echelle.

in cerussam redituro, ut acidum ab occurrente quacunque re inde absorbetur: hinc lethale, nec facile postea sanandum venenum corporis inicitur.

IX. Quod nos magis implicat usus est emeticorum aut purgantium; hujusmodi remedia a celeberrimis praticis magnopere commendantur; quinimo mirabiles quandoque effectus præstant (a), id tamen valde incertum erit; certissimum contra esse conilat eorum actione morbum augeri, neque augmenti gradum dignosci posse, haud mirum enim in iis circumstantiis *judicium difficile* esse; cum nisi longa praxi & summa artis solertia obtinatur, circa quod animadversiones nostras sequenti capite complexi sumus.

X. Evidens enim est: 1. Nedum purgantia, aut emetica in uteri hæmorrhagia convenire, nisi ventriculi aut intestinorum cruditates jacturam intendant: 2. Has saburras confirmare non posse morbum nisi triplici ratione, aut febres excitando quæ sanguinis velocitatem accelerent; cruorem periodice inspissando quod infartum uteri augeat; intestina crispando aut velicando, quod pares in utero effectus inducit; ex iis ergo consequitur ea remedia numquam esse adhibenda nisi: 1. Cum ventriculus, aut intestina cruditatibus aut indigestis cibis graventur, quod nauseæ, tormina, languor ostendunt, vel inconcinnum vitæ præcedentis regimen: 2. vel si peridioca febre corripiantur ægræ, quam comitentur periodica pulsuum concentratio, horror, tormina, aut regulares collicæ insultus.

XI. Ecce vobis limites quibus purgantia exhiberi possunt, at maxima prudentia duas alias condiciones postulat ut tutius incedamus: *Prima* est vasa venæ sectionibus deplere ut uberiore caveamus efusiones, quas ea remedia excitare possent; *altera* procul esse dolorem, aut tensionem uteri, quæ in iis casibus inflammationem parere valeret.

XII. In conditionum earum etiam confluentia numquam eundem præstare ea remedia effedum expectabimus, plerumque tamen tutius usuveniant in simplici stillicidio, quam in uteri hæmorrhagia, cum minus pertimescenda sit hæc sanguinis irruptio; Tutius pariter in hydiopatico, quam symptomatiko stillicidio, quia minus languidæ ægræ facilius eruptionem patientur, si qua eveniet; tutius tandem in ea sanguinis jactura, quæ nullam continui solutionem comitem habet, nam integra uteri vasa magis eruptioni obstitunt quam lassa.

XIII. Cum de utilitate in hoc morbo aut pernicie purgandi certiorem facti sumus reliquum parum implicat; emetica enim erunt anteponenda modo cruditates adhuc ventriculum gravent, præsertim si ægræ facile vomant, purgantia vero si saburræ sint intestina ingressæ, vel quando stomacho adhuc morantibus ægræ laboriose erumpunt.

XIV. Eliguntur interdum mitiora purgantia & ægrotantium viribus accommodata, epieratice plerumque primas vias expiando, emeticorum vero respectu Ipecacuannha potissima est ad viginti, xxiv, aut xxx grana, aut tartarum emeticum, vel alia antimonialia; de cetero radix illa mitius agit, solvit, atque abradit facilius ventriculi saburras, tandem tartaro emetico alvum magis ciet.

*Remedia in uteri hæmorrhagis commendata, quibus utiliter, vel saltem innoxie uti potest.*

Quamvis adstringentium, & agglutinantium series, quas ostendimus innumera suppeditent remedia, diversa circumstantiis omnibus opportunissima non esse præter-

(a) Hippocrates, lib. 11. de Morbis Mulier, omnesque post eum, qui de hoc morbo scripserunt.

præternittenda censuimus nonnulla specialiter ab auctoribus commendata, quæ utilia vel tuta saltem experta sunt, hujusmodi sunt.

I. Alumen rupeum quod Adrianus (a) Helvetius, tamquam specificum remedium in omni sanguinis amissione proposuit, at in uteri hæmorrhagia potissimum paratur salis lusione argenteo præparata concleare, cui fuso subquaduplum sanguinis draconis additur, ac antequam massa indurefcat, pillulæ efformantur magnitudine pisi.

Si modica appareat cruoris jactura earum pillularum drachma semis quarta quoque hora exhiberi solet cum syrupi cydoniorum cocleare, at si hæmorrhagia maxima sit, scrupuli duo aut drachma præscribi possunt ptyphanam superbibendo graminis, aut infusum plantarum capillarium.

D. Helvetius hujus remedii efficaciam magnopere prædicavit, qui validos effectus vidit imo validos quandoque nimis prodire expertus est, citius enim quam par est fluxus supprimendo teterrima symptomata producit; plerumque aluminis sumpti copia ventriculum gravat, continentes anxietates inducit atque languores, alvum obstitat, ut conatus nimii necessarii sint in excernendis fecibus incassum clisteris exhibitis.

Hodie Helvetii specificum pene obsolevit, ei tamen substituitur alumen sanguine draconis, & paucò saccharo, tragacanthæ auxilio remixtum sub forma bolari, & simili intervallo bis in die exhibitum, qua methodo tutius evadit.

II. Essentia Rabelii cujus compositio in pharmacoepia Parisiensi describitur ceteris stipticis præcellit, & efficacissima est cujus actionem pro libitu moderare valemus.

Vulgaris exhibendi ratio est ʒ6. aut ʒ7. guttas poculo, aut libris duabusque symphiti radicis ad gratam aciditatem superaffundendo, cui additur uncia, vel uncia cum semise syrupi granatorum, ribesiorum, aut capillarium plantarum donec gratissima citreæ potionis species conficiatur.

Ejusdem ciatus quinque vel sex unciarum quarta quoque hora propinatur in uberiori fluxu, qui si modicus sit dua vel tria pocula pro singula die sufficient, aut semel in simplici stillicidio.

Hoc remedium nec ventriculum lædit, nec intestina costipat; si essentia deesset, spiritus vitrioli dulcificatus substitui poterit, qui simili ratione sumptus eodem præstabit effectus.

III. Succus (b) expressus ex fimo asinino aut fuillo rite depuratus utilis (c) censetur quotidie quatuor drachmarum dosi ter haustus, æqualis copia remixtus syrupi coralliorum, rosarum exicatorum, aut baccarum myrti parum aqua totius citri aromatizatus; interdum diluitur cum aquæ plantaginis uncia, vel alterius similis, tum ex eodem succo syrupus conficitur, qui simili methodo sumitur, tandem ex fimo catoplasmata coagmentantur, quæ hypogastricæ regioni quandoque applicantur.

IV. Radix filipendulæ, (d) cortex radicum mori albæ (e) testa ovorum (f) calcinata, epidermis (g) pedum asneris exsiccata, utraque remedia quasi totidem specifica commendata reperies, quæ ad drachmam hauriuntur aqua vel succo plantarum adstringentium prius soluta.

V. Ovi vitelum crudum vel leviter coctum vini rubri cocleare, aut aquæ plantaginis distillatæ haustum lenissimum, tutissimumque remedium suppeditat,

(a) *Traité des Ventes de sang.*, Paris 1697. in 8. (b) Rodeticus, a Calbo De Morb. Mulier. Lib. I. Cap. 3. & alii p. 110. (c) Johannes Schmidt. *Ephemerid. Medicæ-Plycar.* Decur. I. ann. IX. & X. Observat. 55. (d) Mercatus De Morbis Mulier. Lib. I. Cap. 8. (e) Idem, ibid. (f) Riverius, Cent. IV. Observ. 86. Raimundus Forstis, in Consult. & Respons. Medicis. (g) Joh. Attmannus, in *Actis Chymicæ.* R. 1700. ubi supra.

tar, quod per plures dies ingurgitare poterunt ægræ utiliter præsertim in uteri stillicidio.

VI. Gummi (*h*) arabici drachma aquæ plantaginis vel alterius stirpis simili virtute donatæ uncia soluta mane jejuno stomacho sumpta non parum prodest, hoc remedium æque ac superallatum ex glutinantium classe desumitur, & in uteri stillicidio a leviori excoriatione orto convenit.

VII. Flores (*i*) nucis decidui ombroso loco exsiccati ac in pulverem redacti eo collineant vini rubri coclear per aliquot dies propinati.

VIII. Remedium quod tot laudibus extollit (*k*) Forestus quasi secretum mirabile, ab Helideo summo Clinico Bononiensi præceptoris suo adeptum. Ipsum ita paratur.

Turtur sumitur modice pinguis, postquam plumis exutus, atque exenteratus fuerit, ipse paucò vino, ac aqua rosarum luitur, venter vero masticis ruditer contusi uncia repletur, & veru transversus, dum inassatur, butyri loco aceto rosato irroratur, sedulo dein adeps colligitur; asato vero turture, olla recenti, & vernice intus obducta ipse imponitur, lutatoque vase in fumo ad siccitatem comburitur donec pulvis fieri possit.

Forestus admonet per plures dies exhibendum esse coclear unum hujusmodi in aqua plantaginis aut quavis alia decoctione adstringenti, interdum ægras circa renes, pubim atque inguina illa pinguedine fricando, at si hujusce remedii virtuti fidendum esset mastici potius quam ejusdem præparationi effectus tribuendus videtur, cum parum vel nihil a præparatione eos pendere censeam.

IX. Subsequens decoctio quam (*l*) Septalius proponit ut potissimum, atque arcanum remedium experientiis comprobatum hic locum habet.

Cortices sumuntur trium aurantium viridum in bracteas concissi, & cum libris septem aquæ ad tertiam partis consumptionem ebulliuntur, residuum filtratur, cujus uncie octo aut novem quotidie mane exhibentur. Septalius animadvertit ejusdem decoctionis virtutem augeri si ebullitionis fine addatur pilosellæ manipulum, aut pluries ferrum ignitum in ipsa extingatur, potissimum itaque remedium esse testatur in morbo uteri estuivio, modo ille continui læsione non laboret.

X. Inter topica remedia (*m*) Solenandrus cataplasma quodam magnificat, quod primo morbi aggressu sanguinis jacturam sistit, vel vetustiore etiam, aut fertinaciore, atque (*n*) Riverii, Etmul. (*o*) aliorumque celeberrimorum prætorum (*p*) auctoritate fulcitur, eumque tali pacto componitur.

R. Giffi f. p. B. 1.

Gummi Arabici torefacti f. p. 3 X.

Albuminum ovorum quassatorum n. V. aut VI.

Misce, & sub cataplasmatidis forma umbellico, & lumbis applicito, & multo gossypio obducto.

Quanti pendeat hujusmodi remedium prætereo, at cum extrinsece tantum usueniat, neque ullum detrimentum comitem habeat; imo necessarium quandoque in uteri profluvio videatur, quare ipsum enunciare non prætermisi.

XI. Denum flanni calx in mensibus nimis aut immodico fluxu intus sumpta pauca rosarum aqua remixta quandoque exhibetur mane videlicet jejuno stomacho

(*h*) Mercatus, ubi supra. (*i*) Solenander in Consil. Medicinal. (*k*) Observat. Lib. XXVII. Observat. 10. (*l*) Animado. & Consil. Lib. VII. Cons. 115. (*m*) In Consil. Medica. (*n*) Praxis Medica Lib. XV. Cap. 3. (*o*) De Morb. Mulier Cap. 1. (*p*) Tumaus von Guldenklee, Lib. IV. Cap. 3.



macho ad grana x. xv. aut xviii. per dies aliquot continuata; Cum hoc remedium ventriculum nihil laceſſat ut vulgaribus adſtringentibus fieri ſolet exiguz ſtiriticatis ergo, ideoque uſum adſtringentibus tutiorem judico, eundemque nullam induxiſſe noxam quidam mihi aſſeruit amicus.

Eodem in hyſterica paſſione uti ſuadent circa quod eo leſtorem mittimus ubi ſpeciatiſſe de hoc morbo loquuturi erimus, ac de ſtanneorum noſtram exponemus ſententiam, quæ tanti exiſtimant.

*Remedia adverſus eundem morbum pariter commendata,  
ſutilia tamen, vel ſuſpecta.*

Nulla magis veterum Medicorum remedia ſulciuntur, quam cucurbitulæ mammis appenſæ, quare Hypocrates his verbis aſſerit (q): *Mulieri ſi placet menſtrua fiſſere, cucurbitulam quam magnam ad mammas appone: (r)* Galenus idem conſentit hodie tamen proſuſ obſoluerunt, me enim latet quem edant effectum cum iis nondum uti vididiſſe, verum ſuadeo ex brachio venæ ſectiõnem cucurbitulis valde præcellere.

II. (f) Foreſtus, (t) Majernus, (u) Artamanus offa humana calcinata commendant, imo ſecundum Majernum ad albedinem torrefacta ad drachmam ipſa propinquantur in vini rubri cyato diluta, aut aquæ plantaginis, verum præter horrorem quem horum remediorum habere ſolemus parandi methodus, potius aperiencia redere offa quam adſtringentia mihi videntur.

III. Franciſcus (x) Feyenus antiquus profeſſor Monſpeſſulanus proponit ſpongiam pice liquida imbutam, ac intra ollam furno ad ſcitatem toſtam, ut ex ea pulvum fieri valeamus; hujus pulveris grana xii, aut xv ſufficienti quantitate ſucci plantaginis ſoluta tum intus exhibet, cum injectionibus addit, eaque in uteri hæmorrhagiis utiliſſima evaſiſſe teſtatur, ac ille pulvis diureticus eſt, ac proinde emenagogus, neſas ergo erit pro ſiſtendo immodico fluxu ipſum adhibere.

Idem pronunciare poterimus de colophonio, quod (y) Solenandrus laudat, ſucco plantaginis dilutum ad drachmæ doſim ſumptum; ſatetur enim agram certo a quarta doſi valetudinem recuperaturam eſſe, id fiat quater, ait, & erit curata inſallenter Deo dante.

IV. Riverius (z) ejuſdem Univerſitatis profeſſor meritiffimus indubitanter aſſerit ſpicam nardi pulveriſatam ſimili doſi in liquore idoneo ſolutam optimum præſtaſſe remedium, apparet enim *Obſervat. 32. Centur. 2.* eo aliis copulato adſtringentibus utiliter uſum eſſe, plurimi ſane exiſtimo Riverii in rebus Clinicis ſolertiam, ac ſua pace valde id eveniſſe dubito; odor enim, atque ſapor aromatici indicant remedium attenuare ac aperire, auctorum etiam plerorumque opinionem ſi amplectamur, qui menſes ipſa evocare potius docuerunt.

V. Neque majorem laudem meretur tinctura antipthifica Etmulvi quam auctori idoneo vehiculo (aa) ſolutam ad guttas xii, xv. xviii. exhibebat, ejuſdem parandi ratio hæc eſt (bb).

N. Sac.

(q) *ſeſt. F. Aphor. 50.* (r) In *Comment. in hunc Aphoriſm.* (f) *Obſerv. Lib. xviii. Obſerv. 10.*  
(t) *Præſt. Medic. Lib. III.* (u) In *Præſt. Chimiſtrici.* (x) *Præſt. Medicin. Lib. iv. Cap. 58.*  
(y) In *Conſiliis Medicinalibus.* (z) *Præſt. Medicin. Lib. iv. Cap. 5.* (aa) *De Morb. Mulier. Cap. 1.* (bb) Vid. Etmullerum in *Comment. in Schrød. & in Morelli Method. Cap. de Tincturis.*

℥ Sacchari Saturnini,  
 ℥ Vitrioli Martis, ana. ʒ j.  
 Spiritus vini rectificati, ʒ viij.  
 Repone in loco frigido, donec rubescat spiritus.

Saccharum Saturni quod compositionem intrat satis obest ut nullus Medicorum quavis sit auctoritate suffultam illam amplecti debeat, animadversiones nostras ad trutinam advocare poteris superius pag. 107. expositas ubi Saturni usum perferutat fumus.

VI. Minus nocuus expertus est pulvis sperniolæ crolli quem hic (dd) ostendam, de cuius virtute anceps valde hæterem

℥ Myrrhe electæ & Thuris masculi ana. ʒ ij.  
 Croci triti ʒ ss.  
 Terantur, & misceantur omnia  
 Pulvis ex aqua spermatis ranarum per saccum resoluta imbibatur vigesses vel trigesses, ita tamen ut semper prius exsicceetur  
 Tandem adde Camphoræ ʒ iij.  
 Pulvis servetur ad usum, cujus dosis ad ij. vel iij. in aqua Artemisæ vel in vehiculo quovis idoneo.

Prima huiusce formulæ inspectione patet perperam thus & crocum feligisse emenagoga quidem pharmaca, & camphoram attenuanti facultate præditam ad uteri hæmorrhagiam sistendam, quare inutile non solum, verum perniciosum hoc remedium puto, ac si identidem detrimento expers fuit id tenuiori dosi tribendum censeo.

VII. Medicus quidam (ee) Alemanus smaragdorum pulvim ad grana octo sumi jubeat ac in desperatis cruoris amissionibus profuisse valde testatur, idem prædicant de turchesiis dupla dosi sumptis, at tum de cupri facultate smaragdus inhxerenti, cum de ossium calcinatorum efficacia quibus, (\*) turchesiæ referuntur maxime dubito

VIII. Usneam (\*\*) ad scrupulum unum intus sumptam non contemno, minus tamen commendo, quam Medicus quidam (ff) Alemanus qui pro specificico, atque potissimum habuit remedio, ut sequentem compositionem ex ea patraret.

℥ Usneæ pulverisatæ, ℥ Eboris fossilis seu Coraliorum, cum spermate ranarum recenter collecto preparatorum, ana. ʒ j.  
 Apii confecti, gr. j.  
 Cum syrupo idoneo f. Pillule parvæ foliato auro obductæ, quæ alternis diebus cum emulsione aliqua ex seminibus quatuor frigidis cum aqua spermatis ranarum prius recenter parata, circa decubitum sumantur.

Idem

(dd) In Bibliotheca Chimica. (ee) Daniel Crogerus, in Ephemer. Critic. Natur. Germ. Dec. 11. Ann. 1. Observ. 24. (\*) Petrus Boetii Medicus de Castro, & Academicus Patavinus primus ostendit, Anno 1664. Turchesiis Ossa esse putrescentia, atque Calcinata. Vide Antiquitates de la Ville de Castres, Liv. II. Chap. 12. Et la Description du Cabinet de l'Anteur, in eisdem libri fine. Dominus Hecanurius idem postea demonstravit. Vide les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année 1715. pag. 174.

(\*\*) Arabes omnes Muli species usneas vocant; vide Marthinie Commentaria in Dioscorid. Cap. 10. & Dodonæ. Stirp. Hist. Pempt. 3. Lib. 5. Cap. 11. at huiusmodi vocabulum nisi eam mulci speciem apud nos significat circa Ossa, & Cranium humanum adnam dum per diutinum tempus pluviz, frigori aut radiis Solaribus illatæ posuerunt, quibus valde emolita, atque terreis moleculis imbuta, necessestiam huic plantæ nutritionem valent suppeditare.

(ff) Martin Bernhard. a Bernis, in Ephemer. Critic. Natur. German. Decur. 1. Ann. 2. Observ. 33.

Idem auctor pulverem proposuit ex Usnez, simi æquini, & Sperniolæ anatina dosi peractum, quo flocci ex gossipio aut lana gummi simul arabici auxilio imitur, qui pessarium modo vagina intromittuntur neque inutiliter.

IX. Quasi totidem veteris credulitatis, atque superstitionis reliquæ sunt auxilia a nonnullis medicis recentioribus etiam commendata adversus uteri profluvia. Convalescere igitur ægras defendunt si ipsæ cadaver (gg) tangant, si subassillas (bb) aut prope scrobiculum buffonem edicatum gesticent, si proprii effusi sanguinis chalybeo cocleari torefacti guttas (ii) aliquot cum ovi luteo hauriant, vel novem stercoreis (kk) muris pillulas auratas comedant, si indusium (ll) ferant quo diu vir sit usus, si corpus circumvestiant (mm) musco repenti terrestri Matth. seu musco terrestri clavato C. B. P. vel Helleborastro, (nn) apud Gallos pied. de grisson aut (oo) Helleboro vero; adde tandem serici (pp) coccinei Kerme præsertim insecti minutim concisi drachmam, ovi luteo hauriendam, quod postremum remedium non erit proflus faciendum; at cetera antecedentia penitus contemnenda videntur, nisi horror interdum quem ipsa excitant motum aliquantisper sanguinis imminuerent, atque ita paullulum hæmorrhagiam sistere valerent.

## C A P U T X.

## Fluor albus.

## §. I.

## Descriptio, &amp; Differentia.

PRæter iterum hæmorrhagiam, de qua adhuc loquuti sumus, alteri fluoris generi lacteo, albo, vel lymphatico sunt mulieres obnoxie. Hujusmodi effluvium interdum uberrimum, interdum modicum, modo continens, modo intermittens est Latine *Fluxus muliebris*, aut *Fruor albus* appellatur, Gallice *Flueurs*, vulgo *Flours blanches*, aut *Perte en blanc*.

Raro hic morbus virgines aggreditur, non desunt tamen exempla earum respectu quæ diu chlorosim laborarunt, plerumque tamen eo corripiuntur mulieres, quæ pluries pepererunt, quæ laboriosos partus passæ sunt, aut abortum, demum ætate consistentes, quæque infirmam valetudinem gerunt, aut inconcinnam vitæ regimen ducunt.

Hujusmodi ægritudo modo mensum suppressionem, modo non comitem habet, verum in utroque casu modo persistit modo intermittit albus fluoer.

Hic qui citra suppressionem intermittens evadit aliquot dies plerumque catameniorum eruptionem præcedit, eaque instanti augetur, ac proflente sanguine perdurat etiamsi tunc distingui nequeat, patet denuo fluxu cruento desinente in diem imminui post decem, aut decem & octo dies penitus abire, utrum citius aut serius pro subjectorum diversitate simili ratione revertere.

Afruch de Morbis Mulierum.

H

Con-

128) Vitus Riedlinus, *Lin. Medice. Ann. 5. Febr. Observ. 20.* (bb) Daniel Crugerus, ubi supra. Ephem. Carol. Natur. Germ. Decur. Ann. vi. & vii. in Append. Tit. 3. Fœrie. 2. Medic. Casselhamorum (ii) Joh. Hartman, in *Praxi Chymiatrica*. (kk) Raimundus Joh. Fortis, in *Consult. & Artific. Medicis*. (ll) Etzmüller, de *Morbis Mulier.* Cap. 1. Johannes-Fredericus Helvetius, in *Disquisitione Medica*, pag. 119. Hic credulus valde sibi fuissebat penitus mensis, necipit ut necum rever aut 1 Sed menendum, sic, ut exinde in tantum supprimebantur menses, ut nunquam amplius in postum fluant. (mm) Martin. Bernhard, a Benitz, *Ephem. Carol. Natur. Germ. Decur. 1. Ann. 2. Ob. 51.* (nn) Renesalmus, *Observ. 21.* (oo) Johann. Harthaman, in *Praxi Chymiatrica*. Etzmüller, de *Morbis Mulierum*, Cap. 1. (pp) Ephem. Carol. Germ. Decur. 111. Ann. 11. & 2. Observ. 235.

Continens vero albus fluor eadem methodo prope menstrua increfcit, iis definentibus imminuitur donec vulgarem gradum recuperet; numquam tamen penitus deficit quinimo fimili ordine intenditur.

Quando ille intermittens eft cum menfium fuppreffione, catameniorum periodum plerumque æmulatur, quorum vices gerere videtur, perduratio etiam a menfium haud abfimilis eft etiamfi nonnihil diuturnior.

Tandem in menfium fuppreffione continens hujusmodi fluor varietatibus valde obnoxius eft, modo aggreffu aut perduratioe menfibus refpondet, modo nulum periodum fervat quod interdum obfervatur in intermittente albo fluore quem fuppreffio menfium comitatur.

Hæc totidem funt albi fluoris fpecies, aliz cum menftruorum fuppreffione; aliz ipfa expertes; continentes aliz; aliz intermittentes; quædam periodice intermittunt; nonnullæ intermittendo nullum periodum converfant; at aliz fuperfunt differrentiz, quæ a natura, colore, atque proprietatibus fluentis laticis defumuntur.

1. *Ab humoris natura*; nam ipfe modo feroſus, purus, lymphaticus eft, modo albus, ſpiſſus, lactiſinoſus apparet, quam ob rem alter *lymphaticus*, *lactiſinoſus* alter fluor vocari ſoleat. Poſtrema hujusmodi fpecies tres alias complectitur, quæ gradu inter ſe differunt; prior humorem præbet lac colore atque opacitate referentem, altera feri ſpeciem oftendit, humorem nempe dilutum magis, album minus, magisque translucidum, tertia tandem laticem præſtat diaphanum ſane, ſed mucilagineum magis, atque denſum ab aqua furfuris haud abſimile.

2. *Ab humoris profluentis colore*; qui varias conſtituit fluoris ſpecies prout fluor albus erit, ſuſcus, cinereus, flavus, viridis, aut quaſi carniū lotura rubefcens.

3. *Ab humoris qualitate*; quæ tres ſpecies gignit, quæ odore & acrimonia expertæ ſunt, quæ acris & corrodens experitur, quæ male olet.

## §. I I.

### *Cauſa.*

Hujusce humoris diverſitates quas adhuc recensuimus ſufficiunt ut duplicem ſpeciem albi fluoris inſtituamus, quarum una fluorem *lactiſinoſum* præbet; altera prorsus *lymphaticum*. In priori caſu noſtrum erit perſcrutari ſuccum lacteum a vermicularibus ſecretum, in altero caſu puram lympham qualis per lymphatica uteri vaſa circumvehitur, quare facile erit judicare: 1. Flores albos lactiſinoſos ab eo procedere quod lacteus uteri liquor antequam in vermicularibus colligatur pro eruptione faciendâ continenter ſtillet; 2. Lymphaticos vero fluores gignere liquidiorem lympham, quæ a propriis vaſis profluens in utero cadit, forasque erumpit, ſunt procul hæc diſtinctæ ægritudines, quas ſæpe Medici confundunt, etiamſi ſejunctionem eas pertractare conveniat.

### *Cauſæ fluoris albi lactiſinoſi.*

Lactiſinoſum fluidum, quod in utero vermicularia ſecernunt, atque ibi menſis ſpatio congeſtum catamenia fovere debet iis fluentibus ſolummodo ſtillando ut periodicus fiat menſium curſus, quem *Capite I.* explicavimus, nequit ipſum guttatim effluere, ac proinde album inducere fluorem niſi: 1. Ubertatis ergo vaſa eo repleta referari cogat; 2. Nimiz fluiditatis ergo per appendicium orificia etiamſi rite firmata ipſum effugiat; 3. Vaſa vel nimis laxa ſint, vel facile paren-

patentia ut minima vi eorum ostia dilatare valeat, speciatim igitur has diversas causas perscrutabimur.

1. Succus lacteus qui pro chyli exuberantia in vermicularibus abundat, parietes vasorum premit atque aperiri cogit in iis præsertim mulieribus,

1. Quæ uberius edunt, cibisque vescuntur valde nutrientibus, qui multum chylum suppreditant

2. Quæ parum se exercent vitamque desidem gerunt, aut sedentariam parumque chyli amittunt.

3. Quæ in puerperio lac fugarunt, vel cito nimis sortum alere desisterunt, ex quo chylus ad mammas evehi assuetus ad uterum transit.

In albo fluore ab hoc *primo* causarum ordine procedenti humor erumpens albus, fissus, lacteus prorsus apparet, nam mutato loco verissimum lac est redundans.

II. Succus lacteus, qui pro nimia fluiditate per extremitates etiamsi arctas vasorum effugit, seri tenuitatem pro causa agnoscit, inque iis reperitur.

1. Quæ phlegmatico ac pituitoso temperamento donantur aut aquam continuo potant.

2. Quæ sanguinem habent a lenta febris, aut alia morbosa causa solutum.

3. Quæ longo remediorum aperientium usu humores nimis attenuarunt.

In hoc *secundo* casu fluore clarus, mucilaginosus extat ab aqua nondissimilis, multæ serositatis ergo qua diluitur.

III. Orificia latorum vasorum seu vermicularium vel nimis, vel facile patent, idcirco contentum humorem cito effundunt in iis,

1. Quæ suapte natura debiles, & graciles sunt, in quibus vasa omnia, uteri præsertim, conformationis ergo laxa, tenuia, aut patula nimis sunt ut facile referari queant.

2. Quæ vermicularia eorumque orificia emollita nimis habent ab ipso succo lacteo multiplici de causa valde seroso.

3. Quæ intima uteri tunica quæ ea orificia obteggit donantur laxa nimis ob frequentes laboriosos vel immaturos partus debilitata.

4. Quæ uterum libidinoso tactu, aut pellicatu sunt nimis lacescitæ, ut crebre vermicularia exprimendo ipsa tandem, eorumque orificia penitus elaterio orbentur.

In hoc *postremo* casu fluore plerumque medium locum tenet inter mucilaginosum, & lacteum effluvium, ex una parte lactinosominus densus, albus, atque lacteus apparet; spissior tamen mucilagineo, albidior, aut magis lactinosus, æmulatur enim multa aqua lac dilutum aut serum imperfecte depuratum.

Usque adhuc de simplici lactinoso fluxu differuimus qui ab una triplici causa dependet, a copia nempe seri illius a tenuitate, tum ab inertia vermicularium, *primamque* ita floris albi *classe* in hac specie constituimus.

At facile innotebit dari posse fluores qui duas simul earum causarum copiam videlicet, & tenuitatem; tenuitatem, atque inertiam; inertiam tandem, atque succi ubertatem pro causa recognoscant, & *secundam* in hac specie constituemus albi floris *classe*.

Accidit tamen copulari interdum tres eas causas, copiam nempe, tenuitatem atque inertiam, at ecce vobis palam *tertiam* huiusmodi floris *classe*.

Frustra putarem in albo fluore diversa causarum connubia determinare quæ fluores producere valent ex secunda & postrema simul classe compositos, factis erit prioris causas rite indagare, iisque affines, ut speciales ortas comparationes facile detegamus.

*Causæ fluoris albi lymphatici.*

Lympha quæ per vasa lymphatica interna uteri facie reptantia circumagitur nequit in utero effundi, ac proinde lymphaticum fluorem parere nisi duplici sequenti de causa: 1. Quando in iis vasis detenta sibi œdematis speciem gignat donec trans uteri tunicas sibi pandat viam: 2. vel cum aliqua ex parte sint propria labefactata vasa ut lymphæ exitum facile finant; id evenit dum uterus aliqua continui solutione læditur, & ambas nunc causas singillatim examinabimus.

1. Lympha in vasis retenta per tunicarum hiatus exitum petit, atque in utero irrumpit, si

1. Maximus habeatur uteri descensus qui producendo, implicando, aut lacerando tunicas vasa comprimat lymphatica, ut inde lymphæ circuitus interceptiatur.

2. Si obstructions tubercula, syrrhia aut carcinomata in uteri substantia exoriantur, quæ circum lymphæ impediunt.

3. Si tumores adsint, infartus, aut durities, quæ glandulas lymphaticas obstruant ubi lymphatica vasa confluunt ab utero redeuntia, hujusmodi sunt glandulæ omnes lymphaticæ, hypogastri præsertim, quæ ad lliacarum bifurcationem locantur, quod refluxum inhibet lymphæ, eamque in propriis vasis coarcevari cogit.

Ea obstacula a sanguinis spissitudine, atque lymphæ oriri possunt vulgari de causa producta, vel crebrius a morbo vario larum, scorbuti, strumarum, aut carcinomatis fomite; eademque de causa plerumque hujusmodi fluoris species illas agitudines comitatur, vetustiones præsertim.

II. Vasa uteri labefactantur eorumque scissuræ, lymphæ jacturæ occasionem præbent, quando

1. Vasa illa lymphatica moranti lymphæ turgida nimis sponte sibi aliquam sternit viam, quod plerumque diuturnioris, aut uberioris plethoræ consequens est.

2. Quando interna uteri tunica excoriationibus aut scissuris læditur ut lymphæ erumpenti semitam aperiat; id tamen citra lymphaticorum labem evenire potest.

Causæ continui solutionis eorum lymphaticorum vasorum eadem sunt, quæ sanguinea vascula erodunt, de quibus fusius capite præcedenti disseruimus, vel saltem gradu differunt, cum major vis in corro dendis requiratur sanguineis vasis, quam lymphaticis.

Quod superius de diverso classium lactei cruoris connubio loquuti sumus, idem hic intelligi debet lymphatici fluoris respectu: nam

1. Hujusmodi fluores simplices esse possunt ab unica causa procedentes, lymphæ videlicet stillicidio, aut vasorum labe

2. Vel componi possunt ex duabus simul illarum causarum quod haud infrequenter earum affinitatis ergo accidere solet.

Tandem pro coronide addam sæpe evenire, quod tamen difficillime decerni potest, lacticinofum fluorem lymphatico copulari, quorum conubium fluorem gignit partim lymphaticum, partim lacticinofum, seu melius dicam lacticinofoso-lymphaticum.

## §. III.

*Explicatio differentiarum albi fluoris.*

**P**rima differentia. Fluor albus vel aliquam vel nullam mensium suppressio-  
nem comitem habet.

1. In albo flore tunc menses sistunt, quando ille lactinosus sit uberrimus, & secundi vel tertii ordinis cognatus; exinaniantur enim vermicularia antequam propinquas venas comprimi valeant, ut sanguis exprimatur qui catamenia producit; suppressio vero in lymphatico fluxu evenit, quando diuturnior sit, abundans, atque egras lacefcit, ut innanitionis statum inducat directe oppositum plenitudini ad menstrua cienda necessariz, denique in utroque casu suppressio numquam completa fit, nisi per varios prius diminutionis gradus transacta fuerit.

2. Abest mensium suppressio quando fluor huiusmodi prioris ordinis tantum & lactinosus sit, vel recens lymphaticus, in primo casu enim vermicularia nisi supervacuum humorem effundunt multum in iis reliquum ad menses evocandos sufficiens, in secundo vero casu nondum languent egrę ut impares evadant menstrua parere, morbi tamen pertinacia interdum post successivam diminutionem aberrant tandem catamenia.

*Secunda differentia.* Fluor albus vel continens, vel intermittens est.

1. Ille secundi vel tertii ordinis lactinosus plerumque continens est, præsertim in tenuitate humoris, aut laxitudine orificiorum vermicularium, quæ ipsum continent, lymphaticus pariter persistit positus vasorum labe, aut scissura.

2. Fluor contra prioris ordinis lacteus semper intermittens experitur quia vasa exuberantem tantum humorem effundunt, verum huiusmodi secundi etiam vel tertii ordinis intermittens apparet, quando modicę humorum tenuitatis atque vasorum laxitudinis ergo nequeat lactinosus succus nisi a magna redundantia sibi pandere viam, quod per vices accidit; patet enim intermittentes fluores continentes fieri posse, & contra.

*Tertia differentia.* Albi fluoris continuum effluvium, aut variabile est, & incremento obnoxium, aut unum persistit.

1. Quotiescumque penitus lacteo humore non exinaniantur vermicularia, constans ille album effluvium augeri valebit, reliquum vero novam congeriem laticis inducet, qui per intervalla profiliet; lymphaticus pariter fluxus variat, imminuitur enim dum alio erumpit lymphæ, augetur dum regiminis vitio, aut exercitatione nimia omnis ad uterum transducitur.

2. Fluores albi lactei & continentes procul augmento æque profluunt, si quantum laticis ad uterum affluit, totidem erumpat vasis prorsus exaustis: lymphaticis denique uniformes sunt cum nulla adsit vitę regiminis exercitiū, evacuationum aut sex rerum non naturalium perversio.

*Quarta differentia.* Fluoris albi utriusque incrementum modo periodum servat, modo nullam.

1. Huiusmodi periodicum augmentum ostenditur quando lacteus sit fluor, qui ex successiva fiat lactinosi humoris congerie ut menstruorum leges emuletur.

2. Illud vero incrementum a periodo aberrat in lymphatico fluxu si accidentales tantum causas recognoscit; quinimo in lactinoso aberrabit quando huiusmodi causę validius agant.

*Quinta differentia.* Intermittentis fluoris regressus modo periodici sunt, modo non;

1. Ii periodum servant, quando lactinosum intermittat effluvium, quoniam

*Aruch de Morbis Mulierum.*

H 3

regu-

regulares regressus pro causa agnoscunt lactei humoris copiam quæ vermicularia per æqua intervalla referari cogit, dum singulis mensibus laticis illius innovatur congeries; ideoque tunc modo non efficiant accidentales cause lacticinofum, fluxum paucis ante catamenia diebus revertere observabis, & idoneo transacto novæ congectionis tempore periodice renovari, augeri denique usque dum sanguis erumpat; imminuit tandem sensim sensimque prout vermicularia evancuant, imo prorsus desinit usque dum nova repletionem redux fiat, nisi causa fortuito aliqua obveniat causa, quæ periodum intercipiat.

2. Irregulares prodeunt regressus dum lymphaticus erumpit fluxus quia ab accidentalibus causis originem duxit. Vid. *Differentia tertia*. Quandoque lacticinofii floris etiam obviuntur periodi si qua extranea causa ordinem pervertat.

*Sexta differentia*. Hujusmodi fluores diversimode colorantur interdum albi sunt, & lac, serum, aut aquam fursuris referunt, simplicem interdum aquam æmulantur, tandem flavi, lutei, aurci, aut citrei coloris conspiciuntur, virides interdum, fusci, vel rubicundi.

1. Albi prodeunt fluores lac, serumque æmulantes, quando lacticinofi sint, ac prioris, secundi, aut tertii ordinis, minime deturpato lacteo naturali colore.

2. Aquæ limpiditatem ostendunt si eos pura lymphæ producat.

3. Lutei apparent quando bilis admixtione plus minusque densæ aut coloratæ inficiuntur, vel cruentis guttulis deturpantur, prioris fenomeni ratio satis patet, alterum explicaturus exemplum propono, flavi in peripneumonia creati, cujus croceus color a sanguine potius intimius remixto quam a bile procedit.

4. Virides prodeunt si ipsis addita bilis, poracea valde sit, vel illi pure faurentur, quod pravam colorem suppedient.

5. Loturam carnium æmulantur, vel roseum colorem pro diversa admixti sanguinis copia ejusque intima copula.

*Septima differentia*. Identidem albi fluores inodori sunt & acrimonia expertes, modo acerrimi, corrosivæ, aut male olentes.

1. Acrimonia omni orbantur, modo lacteus succus, aut lymphæ neque bilem, neve pus conjunctum habeat, illumque laticem purus sanguis gignat in utero non moraturum.

2. Contra vero acres rodentes sunt in triplici opposito casu; quando humores deturpantur bile, aut pure, vel a salino acrimonioso sanguine procedant, vel diu in utero morantes ibi facile rarefiant, aut putrescant.

3. In similibus tandem circumstantiis scitum plerumque redolent.

#### §. IV.

##### *Symptomata.*

I. Fluoris albi effluvium sanguinem depauperat, eoque magis quo uberius diuturnum, atque vetustius erit, ex quibus macies, pallor, in ratione magnitudinis, aut pertinaciæ morbi nasciscuntur.

II. Prout sanguis imminuitur, fibræ laxantur musculares exinanitis, quæ per eas reptant vasculis, tum animalibus spiritibus deficientibus, quos minori copia tunc cerebrum fecerit, quod vires proficit atque appetitum lædit.

III. Imminuto cruoris volumine minorem suppediant salivam parocides atque ceteræ sancium glandulæ, ejusque labefactatur actio; exigua vero ad papillas nervæ assuetum spirituum copia illas inertes redit sensumque delit, quare inapetentia, atque gustus depravatio erant superventura.

IV. Iisdem de causis gastrico succo deficiente ventriculi fibræ robur amittunt.



tent spirituum inopiz ergo , quare alimentorum subactio segnis , atque incompleta fiet.

V. Albus fluor electam demit chyli , atque lymphæ partem quæ sanguinem refocillare deberet , ideoque ab inopi , atque seroso chylo *cachexiam* facile procedet.

VI. Eadem causæ quæ ceteros musculos debilitant cordis contractiones imminuunt *vid. numer. 11.* Sanguis enim infirmiori cordis vi impulsus segnitèr ad extremitates corporis affluet , segnius etiam ad secretoria organa quæ ab extremitatibus arteriarum originem ducunt , at hi humores ab imperfecto chylo orti cum densiores evadant in propriis receptaculis stagnare , atque magis inspissari debent , quod plerorumque viscerum infartus , tum glandularum lymphaticarum obstructions producit.

VII. Viscerum infartus , atque obstructions modo grandiores sint sanguinis cursum interceptient , glandulæ vero obstructæ lymphæ gressum impediunt ; priori enim de causa lymphæ in valis retenta uberius in lymphaticis hinc natas venas transire debet , altera de causa illuc transducta lymphæ difficillime ad sanguinem revehi poterit , utique demum de causa serosa crioris lymphæ pro diverso corporis positu in diversis partibus cumulabitur , artus itaque infarci-ri videbis stantibus , vel sedantibus ægris , faciem vero , oculos , palpebras itis decumbentibus.

VIII. Deleteria indoles chyli quem primæ-viæ suppeditant , atque depravati humores quos obstructa viscera fecernunt sanguinem sensim sensimque deturpare debent , eique tandem acrimoniæ vitium communicare , ut tandem serosa nata *cachexia acrimoniola* , aut *mutiatica* fiat.

IX. Quamobrem fluores omnes hujusmodi etiam si prius mitiorem indolem præferant acrioris facti , & corrodescentes vaginam tandem , pudenda præsertim exco-riabunt , atque ulceribus deturpabunt.

X. Simili ratione ii *reluiones* fluores cum deteriores fiant , uteri internam superficiem laceffunt , atque phlogisiam inducunt plus minusve insensam , atque dolentem , uteri proinde dolor ac tensio nascuntur , tum lumbi , renes , inguina , atque pubes dolebunt pro diversitate partis affectæ.

XI. Superallata symptomata n. ix. & x. eo graviora supervenient prout acrioris , & perverfæ indolis fluores erumpent , verum biliolo magis ægrotantes tempeamento donatæ sint , aut incongruum ducant vitæ regimen.

XII. In his circumstantiis crioris vitium quotidie auctum ; purulenta humorum conditio , quæ uterum deturpat , & ipsum sanguinem ; continentes uteri dolores ; pravus chylus , quem primæ-viæ præstant , lentam febrem tandem excitabunt , exacerbationibus obnoxiam modicam primum , quæ tamen in diem incessans morbum intendere potis erit.

XIII. Illa mechanica causa , quæ vesicam in istu contrahit , uterum una constringit ideoque ibi affluentes lacteus , atque lymphaticus humores uno eodemque tempore cum lotio simul foras erumpere decernes , eorum miscella prius in usum peracta , quapropter in mulieribus albo flore correptis aring spiritus conspicimus densæ & filamentis aut flosculis purulentis sedata , atque magis quo fluor uberior , lactinosus , aut purulentus fuerat.

XIV. Floribus albis obnoxie mulieres steriles plerumque evadunt ; si vero concipiant vel immaturos fetus edunt , vel languidos aut imbecilles pariunt ; at cum nosci oporteat conditiones conceptioni , gestationi , atque embryonis nutritioni necessarias , itaque ad Lib. III. lectorem mittimus , ubi hæc fufius pertrahabimus.

XV. Eadem de causa Lib. II. pervolvite , ubi de ulceribus , hydropsi , atque uteri descensu loquuturi erimus , quæ a fluxibus albis manifestantur.

## §. V.

*Diagnosis.*

**M**ulieres haud infrequenter verentur morbum fateri, ut in summo morbi progressu tantum auxilium poscant; imo quandoque plures circumstantias pratermittant, quæ melius indolem, speciem, atque causam ægritudinis ostenderent.

Idcirco haud facile certiores fieri possumus ipsas albo fluore laborare; mox postquam diu in eas inquirimus testantur, albo fluxu sædari seroso, atque uberimo citra calorem, aut urentem dolorem, cumque neque urina ardore comitari, neque veneris usum implicare, verum circa menses augeri trans imminui modo periodice revertere, modo non; interdum continentem variationibus quamplurimis obnoxium apparere.

Nihilo tamen minus crebre confunduntur huiusmodi fluxus cum ceteris fluoribus, qui ex eodem fonte profiliunt, etiamsi diversam naturam & causam agnoscant, huiusmodi sunt qui ex uterico ulcere, gonorrhæa benigna, aut virulenta procedunt, quos distinguere necessarium est.

I. Nobis invicem veniunt distinguenda huiusmodi effluvia, *vel* quando albi fluores recensiores sunt, *vel* vetustiores.

In *priori* casu id est facilius; nam

1. Recentis fluxus latex nihil purulenti habet, pure tamen deturpatur, quod ulcus gignit.

2. Recens fluor, odore, & acrimonia expers est, aut parum viciatur, purulentus vero ascescit, atque scitum redolet.

3. In illo parum, vel nihil caloris, aut doloris adest, attamen calet vehementer, atque dolet uterus, in purulento fluxu.

4. Verum in albo recenti fluore febris abest, excitatur tamen plerumque dum ille pure inficitur.

5. Tandem purulentum fluxum præcedunt inflammationis accessus aut ulceris indicia, minime vero nuperrimum.

In *altero* casu fluores vetustiores eadem signa prænunciant quamvis diagnosis difficilior evadat; plerumque enim accidit in his febrem lentam, dolorem, aut calorem adesse, verum fluentem laticem foetidum, acrem atque purulentum, aut puri affinem esse, quinimo vetustiores fluores signa omnia complectuntur, quæ purulentum fluxum respiciunt, quare frustraneum videtur hunc a veteri fluxu distinguere, præsertim cum experti simus diuturniores albi fluores, & antiqui in chacheticis subjectis potissimum, etiamsi diverso gradu, & spatio purulentos tandem fieri.

Interdum distingui debent albi fluores a gonorrhæa benigna, quæ tres casus complectitur, quando recens est; quando antiqua in gonorrhæam degenerans virulentam, & continentem; vel tandem quando albo fluore copulatur, præcedat, aut succedat.

In *priori* casu dum recens est, ac proinde inflammationem comitem habet gonorrhæa benigna, facile innotescit.

1. Albus fluor nedum calet, ipsa tamen calescit.

2. In eo neque vagina, neque vulva inflammantur, in illa alterutra inflammatione læditur.

3. Dein albo fluore correptæ mulieres procul dolore virum cognoscunt, minime vero, quæ benigna gonorrhæa vexantur.

4. In

4. In illo tandem fluore circa lumbos de dolore conqueruntur ægræ plus minusve intentio, minime tamen in gonorrhæa benigna.

In secundo casu quando benigna syphilis in gonorrhæam persistentem degenerat, haud facilis erit diagnosi, modo subsequens signis non innoscat.

1. Tunc catameniorum eruptio persistit gonorrhæa nondum decrefcente, verum fluores sistunt, aut imminuuntur menstruo desinente.

2. Gonorrhæam continentem præcedunt syphilidis benignæ, recentis signa pathognomica, atque inflammatio, quæ omnia absunt in albo fluxu.

3. Demum gonorrhææ effluviū modicum apparet, uberrimum tamen in albo fluore.

4. Gonorrhæa tamen coitu communicatur, fluores vero albi viro innocui sunt, aut leves excoriations tantum pariunt.

In postremo casu in connubio nempe benignæ syphilidis cum albo fluore, vel 1. gonorrhæa albo fluori succedit, & tunc facile erit antequam superveniant unum ab altero per propria signa initio huiusce Articuli enunciata distinguere, verum gonorrhæa illa designabitur urinx ardore, calore, phlogosi, atque partis inflammatione, tum dolore in actu venereo.

2. Si denique fluor gonorrhææ succedat, quod tamen raro evenire solet, tunc perquam facillimum erit primum syphilidem nosci benignam, verum propriis pathognomonicis signis natum fluorem detegere.

III. Signa adhuc exposita sufficerent ut distingueremus album fluxum a gonorrhæa benigna continenti aut virulenta, si ægotantium historis fidendum esset, at ægræ quandoque levioris caloris ergo syphilidem latent, interdum ea symptomata quamvis vehementiora inficitia ergo animadvertere nesciunt, vel ipsa parvi faciunt, ut sepiissime sub silentio prætereant, quæ in diem eveniunt, aut accidere observent, ne fluxus mutationibus detectis proprios errores detegantur; in iis casibus ne in maxima versemur incertitudine, in qua ignorantia, aut fraus illarum nos impellerent, verum conspiciamus fluxus indeolem de quo conqueruntur, gonorrhææ itaque, aut albo fluori ipsum referre debeamus, oportebit.

1. Fluxum humorem pendere qui plerumque parum ponderat in continenti gonorrhæa, maxime in albo fluore, isque uberrimus erumpit, at fateri fas erit si modicus sit gonorrhæam tutorem designare, nam albi fluores interdum erumpunt qui syphilide parum uberiores sunt.

2. In hoc postremo casu ægras obstetricare oportebit, ut triplicem sedem benignæ syphilidis, ac proinde continentis gonorrhææ investigemus. 1. Prostratæ se offendent ex quibus virus stillat supremam versus vulvæ partem per orificia lacunarum Graffi ad latera urethræ locatæ: 2. Glandulæ vero conviperianæ se prodeunt interna vulvæ parte sitæ perineum versus, aut circa ostium vaginæ ex quibus gonorrhæa circa anum, aut limen vulvæ fluit: 3. Glandulæ tandem vaginæ, quæ virum in ipso vaginæ ductu fundunt per vulvam erumpens.

In eo duplici casu si ægotantium inspectione certiores fieri volumus syphilidem adesse materiam ex lacunis aut glandulis covperi exire observabimus, denique ipsam superius, inferius, aut interius vagina cumulari; contra vero asserere possumus fluore albo tantum laborare mulieres quando extremitates eorum canalium minime læsæ aut pure scedate apparent.

3. Verumtamen in postremo casu difficillimum erit fluorem album a vaginæ syphilide distinguere cum hæc æque ac illæ vaginæ fundo profiliant, quare reliquum erit ægras expendere, aut conjuges, qui si suspitionis causam præbeant, remedia antivenerea erunt exhibenda, quæ albo fluori æque idonea sunt, vel saltem innocua: huiusmodi praxis cito veritatem ostendet, verum gonorrhæa hæc methodo penitus aberrabit fluor persistet, at si incomplete a morbo convalescant ægræ; gonorrhæam fluore albo copulari fateberis.

IV. Nedum implicaremur si haberemus circa id quoddam pathognomonicum signum ut plures (a) Medici prædicarunt, quod syphilide, n. a fluore albo perbelle distingueret, si is fidendum esset, sufficeret in ægras inquirere an fluor men-  
fibus fluentibus persistat nec ne; in primo casu semper syphilidem adesse, in al-  
tero tantum album fluorem testantur.

Supervacaneum enim censuimus hic auctorum loca exhibere qui id pro certo habuerunt, iisque nomine supra indicatis vobis ipsos pervolvere relinquo, ver-  
ba tantum Baglivi (b) referre licebit, qui sola sui auctoritate huiusmodi indi-  
cii certitudinem jactat, at ejusdem exemplum tyrones potius adnovebit ne Au-  
ctoris effatis nimis fideant, cui in incipiti valde casu mos erat definire.

Fluor albus uterinus, ait, gonorrhea gallica ad id similibus comitantur sympto-  
matis, ut quisque medicorum fere semper decipiatur in aliorum diagnosi, præsertim  
cum muliercule verecundia persusæ gonorrheam per impurum scorum contrariam  
fluoribus uterinis mentiantur; ne succedant inopositum hoc incommodum dabo signum  
insalubre tales morbos ad invicem distinguendi. Pete a muliere an superveniente  
mensuræ sanguinis fluxu perseveret quoque eodem tempore fluor ille albus maneat,  
si dicat quod sic significat eadem quod morbus a quo dixeratur sit gonorrhea gallica,  
si vero durante menstruatione fluor albus evanescat, & eadem finitæ demum re-  
grediatur, pro certo habes mulierem fluore uterino laborare; cetera signa fallunt,  
hoc vero constans est, & mulierum dolum aperte deludit.

At Baglivi pace qui hanc sententiam strenue defendit nullum est eo magis  
erroneum signum, nam 1. Albi fluoris eruptio necdum desistit catamenii fluen-  
tibus, etiam si nos lateat cruoris ergo quo permiscetur; 2. Idem accidere solet  
in syphilide, quæ ex glandulis intimioribus vaginæ prodit ut ex sanguinis ad-  
missione impossibile sit hoc inutile signum distinguere; 3. Adde tandem fru-  
straneum esse & incertum in ea gonorrhea, quam glandulæ convalescentiæ, aut  
prostatæ faciunt; nam menstrua tunc totum cruore valvæ ambitum insciant,  
ut fluxum laticis illius conspici impediunt.

V. Demum quid interesset hujus morbi diagnosim perscrutari si cum Piton-  
nio prorsus inutilis evaderet, supervacaneum enim ipse docuit esse syphilidem a  
fluore albo distinguere, cum utrumque antivenerea postulet remedia: Non opus  
est, (c) ait, distinguere inter fluorem muliebrem gallicum, & non gallicum, cum  
raro (secus ac in viris) possit fluor albus tolli, etiam si virulentum non sit, nisi  
remediis sui gallicæ probris.

Ea de causa Picarnius album fluorem sepiissime Mercurio dulci, Cinabari,  
Guaiaco, & Sarfa parilla curavit, at ea methodus erronea est, & praxis nova  
experitur; ratio satis confirmat pauperum uluvenire remedia antivenerea in morbo  
ea lue profus experte, quod experientia pariter fulcitur.

Diagnosim specierum. Semel detecto morbo species distinguere necesse erit, cui  
lindeola fluxu madida valde favent, si ea sedulo inspexerimus.

1. Fluor prorsus lacticinosus erit si fluxa materies densa, ac ponderosa appa-  
rerit, atque linteo concretescens ipsum minime penetraverit, verum ad pri-  
mum, secundum, aut tertium lacticinosi humoris ordinem pertinet prout ille  
plum minusve albus apparebit, aut aquam fursuris referat.

Lymphaticus erit modo parum, vel nihil pendens, serosus sit, atque eo fa-  
cile linctum imbuatur.

## II. Lim-

(a) Johannes Bernellius, Patholog. Lib. vi. cap. 16. Jo. Liebaute, De la santé, & secondité, & mala-  
dies des femmes. Lib. 1. cap. 16. Ludovicus Mercatus, De aff. Vir. & Mulier. Lib. 1. cap. 15. Rodricus  
a Castro, De Morbis Mulierum. Lib. 1. cap. 24. Lætare Pe, Maladies des Femmes. Lib. 1. cap. 36. Ju-  
acobus Primarossi, de Morbis Mulierum. Franciscus Mauriceau, Malad. des Femmes grosses. Traité An-  
atomique des Parties des Femmes qui servent à la Génération, cap. 6. Guillelmus Charleton, De Causa  
Catameniorum & uteri Rheumatismo, cap. 4. Petrus Pechard, Remède, cap. 10.

(b) Travenç, Lib. 11. cap. 8. Art. 3.

(c) Liebaute, Medica. Cap. 27.

II. Linteola illa denique observando innotebit cito, an fluor albus, luteus, viridis, aut ruber erumpat, tum ipsa odorem atque dulcedinem, vel benignam morbi indolem ostendunt.

III. Agravæ vero ipse nos admonere poterunt quo fluxus acrimoniæ gradu poleat, si carnes excoriat vel alias ladat, aut si iis sit scænomenis expertus.

IV. Ipse tandem animadvertere valebunt si fluor intermittat, aut persistat, si intermissio periodica sit nec ne, si persistentia ejusdem variet, aut aberrationes ullam periodum servent.

*Diagnosis causarum.* Hæc tertium respicit diagnostica articulum causarum respicit pro diversis albi fluvioris speciebus prorsus diversas.

1. Si fluor lacteus profiliat, lac serum aut aquam fursuris referens redundantiz lactinosi humoris tantum tribuitur; hujusmodi effusio generice pro causa agnoscit copiam, ac fluiditatem humoris illius, tum vasorum laxitudinem, quæ in singulis specialibus circumstantiis variare solent, ideoque

1. Quando lacticosus humor spissus, albus, late haud absimilis circa menses erumpit a sola ipse copia procedit, præsertim si patientes obesa sint, multum comedant, parum se exercent, vel lac cito nimis post altum sætum fugaverint.

2. Si humor ille valde dilutus sit, serum referat, continenter effluat, id ubertati, atque tenuitati laticis illius tribuendum videtur, etiamsi laxitudo interdum orificiorum vermicularium id parere valeat.

3. Fluorem mucilaginem qui aquam ex fursure coctam æmulatur prope menstrua fluentem nimia gignit humoris liquiditas, vel simul vermicularium laxitas.

4. Quando postremus hujusmodi latex continens est, a nimia tantum humoris fluiditate, aut laxitudine dependet vasorum, quibus congeritur.

II. Lymphaticum albi fluvioris effluviu profilianti lymphæ tribuitur, quæ per porros tunicarum exiit turgentium vasculorum, aut per eorum scissuras erumpit a morbi generali causa productas, quare

1. Si egrè uteri descensu laborent tuberculis, obstructionibus, syrrho vel cancro, tum glandulosa lymphæ reducis receptacula in ipsis obstructa syrrhosa, aut dura reperiantur &c., quæ omnia tamen recentissima sint, albus fluor simplici lymphæ per tunicarum hiatus madori tribuendus videtur, præsertim si parcius erumpat.

2. Contra vero modo certiores fieri possumus, hujusmodi causas, vel aliquam earum vestigiorem originem agnoscere, aut pertinaciorem suspicari licebit, yasa diu aut nimis repleta jam abrasa fuisse, ac tunc eruptionem ab effusione procedere, præsertim cum uberrima appareat.

3. Nullum superest circa vasorum læsionem dubium, verum ab humoris effusione fluorem pendere, quando aliunde cognoscamus intimam uteri tunicam distrahant fuisse, erosam, aut ulcere scedatam.

III. Tandem a quacunque albi fluores causa procedant eorum color, odor, acrimonia satis internam uteri conditionem ostendunt.

1. Etenim cum humor ex lacteo, aut lymphatico genere albus, inodorus, dilutus, aut insipidus profiliat, utrum nulla tunc fateberis continui solutione ladi, vel si qua adsit nuperrimam esse, nondum pure refertam.

2. Contra luteus, viridis, aut cruentus hujusmodi humor indicat acrem etiam, & corrodentem esse, verum aliquam dari scissuram, vetustioremo, si pus, aut ulcus gignat.

3. Tandem prout magis vitiatur fluens hujusmodi liquor, eo male olet, acerr evadit, atque uteri ulcus profundum, pertinax, & periculosum magis creat.

## §. VI.

*Pronosis.*

I. **G**enerice. 1. Albus fluor molestissimus morbus est, qui mulieres coitui, aut conjugis blanditiis impares redit.

2. Periculosus experitur teterrimorum symptomatum ergo, quæ ipse parit, qualia sunt sterilitas, languor, cachexia, macies, inappetentia, obstructio, oedema, descensus demum, atque uteri ulcus.

3. Hic morbus diutinus plerumque, atque pertinax est, cui difficillime medemur, præsertim in male-affectis, ac cacheticis subjectis, quorum sanguis deturpatur, ac, modo uterus imbecillis sit erosus, aut obstructus, nisi cum vita abit.

4. Albus fluor neque incommodus, neque periculosus, aut curatu dicißillimus evadit, modo copiosus nimis, aut continens non erumpat, eique facile medetur, præsertim si modicus sit, & per longa intervalla recurat.

5. Raro tandem ipse mortem infert, etiamsi continens, aut uberrimus sit, modo tamen hydropem, ethicam febrem, ulcus, syrrhum, aut uteri cancerum non inducat.

II. Specialiter. 1. Fluores lactinosi minus infensi sunt, atque lymphaticis facilius curantur, cum ii nullum conjunctum habeant uteri vitium, ad vasorum lassitudinem tantum, cui mederi facile quit, lymphatici contra obstaculis intenduntur in utero obviis, quæ lymphæ cursum interceptiunt, quibus haud facile est auxilium ferre, aut ulceribus originem debent, quæ difficillime agglutinantur.

2. Inter lactinosos fluxus, qui simplex est, prorsus lacteus ceteris facilius convalescit quia nullum organi vitium adest, prosequitur pseudolacteus, quem producit plerumque humoris illius tenuitas nimia, quæ tamen facile corrigi poterit, tertius mucilagineus venit ab aqua surfuris non dissimilis, qui præter nimiam fluiditatem lassitatem supponit vasorum uteri lacteorum.

3. Quaecumque indolem præferant albi fluores, eorum facilius curantur, qui aliquam intermissionem ostendunt, difficiliter continentes; in illis enim vel adest, vel minima est vasorum imbecillitas; non ita vero in his in quibus continenter persistit.

4. Quo enim diuturniores intermissiones erunt, & breve effluvium, eo facilius morbus aberrabit; contra vero continentes fluores, & uberrimi remediorum virtutem eludunt.

5. Lymphaticorum fluorum respectu qui ab exuberanti lymphâ nascuntur, per vasorum hiatus invite erumpenti, iis mitiores sunt, & citius convalescunt, quam si aberosione eorum vasorum procedant, nam in hoc postremo casu continui solutio, etiamsi levissima, valde molesta experitur.

6. At a quavi desumantur specie lymphatici fluores, eo periculosiores evadunt, quo uberiores sunt, & incrementis obnoxii crebrioribus, & diuturnioribus; evidens enim est, tunc causas producentes, vel generales esse, & totum uterum respicere, vel graviore saltem si partem aliquam tantum offendant.

III. Ceteris paribus. 1. Albus fluor, acer, corrosdens, satens magis teterrimus erit, atque pertinacior, quam si ipse odore, aut acrimonia careat, ille enim proximum ulcus minatur, aut ipsum supponit.

2. Flavum hujusmodi effluvium viride, aut eructum pertinax est, aut infesum magis, quam albicans, cum illud acrior sit magisque corrosivum.

3. Mitior erit recens quam vetus fluxus, cum in eo liceat suspicari uteri intactam faciem diu scissuris ladi.

4. Hu-

4. Huiusmodi humoris iacturæ, quæ matricis dolorem comitem habent iis deteriores evadunt, quæ dolore sunt expertes, dolor enim inflammationem, ulcus, aut futurum cancerum indicat, cuius suspicio abest in uteri fluore indolente.

5. Juvenes mulieres plerumque facilius convalescunt, quam ætate consistentes, cum eæ dulciori donatæ sint humorum crasi, fibrarumque robur uteri præsertim adhuc conservent, vel facile recuperent, istæ vero acriori sanguine poleant, ut uteri laxitudo difficilius corrigi valeamus.

IV. Prorsus incurabiles esse experti sumus. 1. Veteres albos fluxus in mulieribus præsertim, quæ graciles sunt, ætate consistunt, aut cachexia cruciantur.

2. Eosque fluores, quos syrrhus, ulcus, aut cancer gignunt, aut in eorum alterutrum ipsos degenerasse cognovimus.

3. Quos doloribus uteri lancinantibus comitantur, cum ii præsens, aut proximum indiciunt uteri carcinoma.

4. Quos tandem lentam febrem, marasimum, anasarcam, aut insanabilem hydropem parere posse vidimus.

V. In singulis iis casibus, 1. Albi floris eruptionem necdum sistere fas erit nisi prius ægras idoneis remediis præparemus, quæ inquinamenta humorum eliminent, cruoremque demulceant, optimamque digestionem restituant.

2. Verum excepto simplici lacteo fluore, quia sola redundantia procedit, non sunt fluores ii repente cohibendi, ne partem ipsi nobiliorum invadant.

3. Iis denique mederi nefas erit etiamsi id sperare liceat, si ipsi vetustiores sint, vel male affectas, cacheticas, ætate consistentes mulieres vexent, ne in pectus incidant, at sat erit palliativa methodo incedere.

4. In ceteris laboriosis casibus eandem medendi rationem prosecuturi erimus multum obtinentes, si interdum ægræ facilius morbum patiantur.

## §. VII.

### *Curatio.*

Cum duplex sit floris species altera lactiginosi, lymphatici altera, quæ duplicem ægritudinem constituit, duplicem pariter, atque diversam medelam postulat, quam seorsim tractabimus, addita utriusque palliativa medendi methodo, modo eradicativa non obtineatur, vel ægotantium vires ipsam innui renuant.

### *Curatio floris albi lactei.*

Tres causæ lacteum fluorem faciunt, lactiginosi humoris ubertas, tenacitas nimia, aut lacteorum vasorum laxitudo.

1. Si lactus liquor tantum copia peccet, ut propria vasa infarciat nimis, eorumque orificia citius, quam par est aperiri cogat, tunc subsequencia opportunissima erunt auxilia, &

1. Idoneum vitæ regimen præscribere, uberiores cibos, & succulentos, aut nutrientes nimis interdici, verum ægras admonere, ut crebre se exercent, neve diu lectulo quiescant potissimum videtur.

2. Venæ sectiones utilissimæ evadunt, utpote quæ sanguinis, ceterorumque humorum volumen imminuant, brachium præsertim secando ut cruor ab utero revelatur.

3. Ægras purgare convenit, ut deorsum tendat exuberans chylus, atque una per lotium aut sudorem eliminentur, qui in sanguine superessent delesterii humores.

4. Eadem de causa vomitum excitare interdum fas erit, modo ægotantium constitutio, aut ventriculi, vel pulmonis conditiones non obstant.

5. Cli-

5. Clisteria quotidie ex decoctionibus radicis Aristolochiæ, foliorum Artemisæ, Mercurialis, Cammanelli, Melliloti, Matricariæ &c., utilissima sunt, quibus addi poterit uncia una olei Anisorum, aut Lauri ut carminativa fiant, vel si ipsa cathartica volueris, pulpa cassiæ addi oportebit, aut tamarindorum, vel foliorum Sennæ duplex drachma.

6. Tandem si morbus persistat, diuretica, aut diaphoretica præscribi poterunt, quæ per urinam, aut sudorem exuberantem lactinosum humorem expellant, vel saltem solventia, & aperientia usuvenerint, quæ hujusmodi laticem attenuando valeat ipse uteri vermicularia transibire, atque in venas lymphaticas irruere, quæ ibi originem habent, vulgarem lymphæ circuitum hinc profecuturum.

11. Si lacteus humor fluidior sit ut sensim sensimque per orificia vasorum effugiat citra morbosam eorum laxitudinem potissimum erit ipsum subsequenter remediis inspissare, quare opportunissima erunt.

1. Alimenta nutritientia, incrassantia, ut surfurcula, cremor orizorum, ferculum, surfur &c. lacte amigdalorum cocta.

2. Lac aluminum bis, aut semel quotidie, aut vaccinum mane, & vespere, aut pro integro alimento sumptum modo ventriculus finat optimum censetur.

3. Pthisanarum usus, earum tamen quæ valeant sanguinis moleculas condensare, qualis est pthiana Bismalvæ, Nymphæ, aut Symplicii radicis &c. utilis evadit.

4. Verum modicus narcoticorum usus ut ægræ facile somnum capiant, quod valde conducit, ad cruorem ceterosque humores inspissandos.

5. Absorbentium, aut adstringentium usus prodest, de quibus infra *Articulo sequenti* locuturi erimus, inter eos tamen mitiora minusque stiptica seligendo.

III. Si orificia vasorum lateorum pateant nimis, ut lacteum humorem non valeant retinere ibi affluentem, robur ipsis restituere necesse erit ea constipando, roborando, aut constringendo subsequenter auxiliis adhibitis.

Quare *primum* ut elastrium vasorum restituamus, conveniunt

1. Balnea, & hypocausta aquarum thermalium, bittuminosarum, aut sulphurearum.

2. Circa renes aquarum earum, lumbos aut os sacrum effusio, quæ plus minusve reiteratur pro diversis aquarum proprietatibus.

3. Iniectiones ex iisdem aquis, aut fumigia per idoneum instrumentum utero intromissa.

4. Earundem aquarum internus usus ea dosi, atque diuturnitate præscribitur quæ qualitatis, & effectibus magis convenire videntur.

5. Subdorifera qualia sunt viperarum decocta per decem quindecim, aut viginti dies continuata, aut pthisanæ, vel decoctiones ex guajaco, saxaphras, china radice, aut falsa-parilla confectæ per totidem & ultra tempus commode usuvenerint.

6. Diuretica, decoctiones videlicet, aut pthisanæ ex radicibus Api, Eringii, Anonidis &c., cui addi poterunt mille-pedes, Arcanum duplicatum, usque dum morbus requirit opportuna videntur.

7. Speciatim vero decoctio Afari, aut Api, quam magnopere Galenus (a) commendavit, cum Boëtii uxorem diu albo fluore correptam saneret; inter diuretica recensetur, neque inutiliter fortassis.

Ut *secundam* indicationem impleamus videlicet arctandi orificia vasorum lacteorum, vel vulneraria leviter adstringentia adhiberi poterunt, quæ sensim, sensimque ipsa constriquant, vel validiora adstringentia, quæ penitus illa arctent.

1. Vulneraria, leviter simul adstringentia sunt,

Rd-

(a.) Lib. de Prægnis, ad Posthumum, cap. 2.



*Radices.*

Sigillum Beatz Mariae  
Symphitum

} in pthif. vel decoct. ab ʒss ad ʒj.

*Folia*

Bugola  
\* Sanicula  
\* Bellis flore albo  
Mentha  
Salvia  
\* Argentina  
\* Alchimilla  
Virga aurea  
\* Marubium  
Calamintha  
\* Pulegium  
Rosmarinus  
Pyrola  
\* Sclarea vulgaris  
Nummularia

} In pthifan. aut decoct. &c. a m. ʒ.  
ad m. j.

*Succi*

\* Mastix  
\* Ladanium  
\* Myrrha

} S. p. a ʒss ad ʒj. vel ʒjss.

*Ligna*

Lentiscus  
Juniperus

} in decoct. ad ʒj.  
in subst. S. p. a ʒj. ad ʒij.

*Balsama*

\* Peruvianum siccum vel liquidum  
Tolutanum  
\* Copaiba  
\* Canadense

} ad gurt. xv. ad x. cum saccharo si-  
mul aut duplici syrupo coquantur.

\* Terebinthina } a ʒj. ad ʒss. cum ovi luteo.

2. Adstringentia validiora sunt.

## V E G E T A B I L I A.

*Radices*

- \* Bistorta
- \* Tormentilla
- \* Filipendula
- Sigillum Salomonis
- Pimpinella
- Quinque Folium

} in decoct. ab ℥j. ad ℥jss.

*Folia*

- Plantago
- \* Lamium, seu Galeopsis
- \* Mille folium
- \* Herniaria
- \* Burfa Pastoris
- \* Equisetum
- Thalictrum

} in decoct. a m.℥. ad m.ij.  
succus depuratus ad ℥ij.

*Flores*

- \* Balausta
- \* Rosæ rubræ nostratæ
- Bedoguar

} in decoct. ad ℥ss; In subst. S.p. ad ℥ij.

*Fructus*

- Glandes cum capsulis
- \* Gallæ
- \* Semina coriaria
- Dactila
- Capsulæ Coryllorum

} Dosis antecedentium

*Succi*

- \* Sanguis Draconis
- \* Mastix
- Acacia vera
- \* Catechu

} in subst. S. p. a ℥ss. ad ℥ss.  
in decoct. duplum.

*Ligna, & Cortices*

- Santala
- Suber combustum

} in decoct. ad ℥  
in subst. S. p. a ℥ss. ad ℥j.

## A N I M A L I A .

- \* Os sepis
  - \* Testa ovorum
  - \* Hebur pulv.
- } S. p. a ʒss. ad ʒss.

## M I N E R A L I A .

- \* Coralia preparata
  - \* Succinum
  - \* Terra sigillata
  - \* Osteocolla
  - \* Alumen rupeum
- } S. p. a ʒss. ad ʒj.

*Præparationes*

- Syrupus Granatorum
  - Coralliorum
  - Rosarum rubrarum
  - Rosarum exsiccatarum
  - Symphiti
  - Urticæ
- } ad ʒj. vel ij.

*Aqua*

- Alkimillæ
  - Argentinz
  - Millæ folii
  - Urticæ mortæ
  - Foliorum
- } Dosis antecedentium.

Eorum remediorum delectu, & congrua dosi prout ægrotantibus magis arridit phisanz, apozemata, jura, potiones, julapia, boli, opiata, pulveres, rotulæ, parantur ut *Lib. I. cap. iv.* docuimus.

IV. Tandem si causæ lactei fluoris duz invicem, vel tres simul copulentur, tunc remedia singularibus speciebus idonea componi debent, ut medela morbi compositioni respondeat.

*Curatio fluoris albi lymphatici.*

Lymphatici fluores pro causa agnoscunt vel lymphæ per vasorum hyatus eruptionem, vel effusionem ejusdem propriis erosio, aut concisis vasculis; ex una enim parte effugit lymphæ, quia ibi morans vasa replet nimis, & illam exprimunt uteri descensus, ganglia, tubercula, syrthi, arque obstructions; ex altera vero parte lymphæ effunditur excoriationum ergo, quæ internam uteri faciem deturpant, ac proinde pleraque ibi reptantia lymphatica vascula; quare albo fluori lymphatico incedenti tria veniunt pendenda; 1. Uteri descensus; 2. Obstructions, tubercula, ganglia, arque uteri syrthus; 3. Scissuræ, excoriationes,

*Abruch de Morbis Mulierum.*

nes, atque erosiones, tum internæ uteri superficiei, cum lymphaticorum, quæ per eam distribuuntur.

I. Quando albi fluores lymphatici sunt uteri descensus causa, remedia conveniunt adversus hunc morbum *Lib. II. Cap. X.* indicata; interim pessarium circulare adhibetur, quod uterum sublineat; haud infrequenter enim morbi vetustate eradicatoria curatione incassum tentata ad nocuos effectus imminuendos, novosque teterimos impediendos pessarium gestare continenter conatæ erunt.

II. Si huiusmodi morbi species ab obstructionibus, tuberculis, gangliis, aut syrro dependeat, utiliter exhibentur diluentia, & aperientia simul, vel secundum prout morbi gradus, aut agrarum conditio postulaverint; diluentia *sequenti Articulo* ostendam, ubi de palliativa medendi ratione disserturi erimus; aperientia vero, & solventia, de quibus jam *Cap. IV. & VIII.* verba fecimus, ubi de mensibus suppressis, hic usitatoria proponam, ac inter

## V E G E T A B I L I A.

### 1. Radices

- |                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| * Rubia Tinctorum | } | ab ʒj. ad ʒ ij. |
| * Asparagus       |   |                 |
| * Eryngium        |   |                 |
| * Anonis          |   |                 |
| * Bruscus         |   |                 |
| * Lapathum acutum | } | ab ʒß. ad ʒj.   |

### Folia

- |                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| * Cichorea Silvestris  | } | a m.j. ad m.ij. |
| * Pimpinella           |   |                 |
| * Cetrach              |   |                 |
| * Agrimonia            |   |                 |
| * Nasturtium aquaticum |   |                 |
| * Cherophyllum         |   |                 |

## A N I M A L I A.

- |                |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| * Mille pedes. | } | num. xx. vel xxx. |
|----------------|---|-------------------|

### Salia

- |                           |   |              |
|---------------------------|---|--------------|
| * Sal admirabile Glauberi | } | a ʒß. ad ʒj. |
| * Arcanum duplicatum      |   |              |

Ex quibus pthifanz, apozemata, jura patrantur, quæ congerunt proprietates, utilitateque omnes simul diluentium, & solventium magis ad hoc delectis idoneis radicibus, foliis, aut salibus.

## 2. Gummi, aut Resina

- |                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| * Gummi Ammoniacum    | } | a gr. iv. ad x. |
| * Opoponax            |   |                 |
| * Galbanum            |   |                 |
| Sagapenum<br>Bdellium |   |                 |

## 3. Preparationes Martiales

- |  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| * Crocus Martis aperiens                         | } | a gr. xij. ad xxiv. |
| * Erugo Ferri porphirifata                       |   |                     |
| * Crocus Martis aqua paratus, seu Ethiops Martis |   |                     |
| * Sal Martis Riverii                             |   |                     |
- \* Flores seu spuma Martis    } a gr. viij. ad xvj.

## 4. Preparationes Mercuriales, quæ non purgant

- |                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| * Ethiops mineralis igne paratus | } | a gr. xv. ad xx. |
| * Cinabaris artificialis         |   |                  |

## 5. A N I M A L I A.

Pulvis Asellorum            } a ℥j. ad ℥ij.

Ex his duabus vel tribus selectis pulveres, boli, opiata, aut pillulæ coagmèntantur, quæ apozematibus superius descriptis, aut decoctionibus confociari possunt.

III. Quando fluores albi lymphatici a scissuris procedant internæ uteri faciei, aut lymphaticorum per ea reptantium, aglutinantia statim usum habent, nutritia, farinacea, aut vulneraria, quæ partes consolident erosas, aut cicatrifent concisas.

1. Remedia aglutinantia sunt

## Radices

- |                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| * Althæa           | } | ad unciam |
| * Symphyti majoris |   |           |
| * Nymphæa          |   |           |

## Folia

- |              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| * Verbascum  | } | a m. j. ad ij. |
| * Portulaca  |   |                |
| * Lactuca    |   |                |
| * Borrago    |   |                |
| * Cymbalaria |   |                |

I 2

Ex

Ex illis pariter pthifanę, jura, apozemata conflantur, quibus, addi possunt cornua cervi, hebur ad unciz semis circiter dosim.

## 2. Nutrientia farinacea sunt

Oryza

Jusculum ex Furfuricula Hordei, aut Avennę confectum

Hordeum perlatum

Furfur, vel Furfuricula triticea

Vermiculi ex massa exculenti

Sagou †

Quibus primis curationis diebus aluntur egrę, in posterum usveniunt jura ex piscibus, ranis, limacibus, testudinibus &c. paratis modo interfit validius sanguinem demulcere, aut incrassare,

## 3. Succı concreti

Ladanum

Hypocistis

Acacia

\* Sanguis Draconis

} a gr. x. ad xx.

## Gummi, aut Resinę

\* Gummi Arabicus

\* Tragacantha

Karabe

} a gr. xv. ad xxx.

ii bolos prestant, opiata, pillulas, decoctionibus jungendas &c.

Vulneraria vero hic pariter idonea descripsimus jam superius pag. 27. & sequentibus, quę recensere supervacaneum judico.

IV. Tandem cum plures, vel omnes simul lymphatici fluoris species copulentur, etiam remedia diversa simul jungi oportebit ut circa lactei fluoris medellam admonuimus.

## Curatio eorundem palliativa.

Observavimus jam §. VI. Art. IV. & V. casus quos potius pręterire, quam curare debemus, etiamsi valetudo esset speranda; palliativa ergo medendi ratio sufficiet, ut morbi impetum compescamus, teterrimosque effectus retardemus: qua de causa

1. Optimum vitę regimen agris pręscribi nostrum erit, juscula tantum, oryzam, aut ferculum ex furfuricula exhibendo, parum carniū elixarum, vel assatarum permittendo, minutalguas aromatis paratas interdicens, tum vini usum, nisi parum ad ventriculi robur fulciendum requiratur.

2. Crebre agras purgare lenientibus, cassia videlicet, tamarindis, rhabarbaro, manna, vel syrupis pomorum, cicoreę compositę, aut florum perficorum.

3. In-

† Sagou ex Indis Orientalibus exportatur midulla est Palmę cujusdam Toda Paana dictę; arborum procream per longum conicidunt, & midullam separant uberrimam, camque concentricam in m. rario donec in pulcem redigant, vel ipsam aqua diluunt atque filtrant; ex sedimento condensato romle effluuntur, aut pulveres; hoc levissimum, atque edulcorantem cibum pręstat; paratur miscella jeris, aut hęti, pro libitu.

3. Interdum brachia secare opportunum videtur, si egræ juvenes sint, menstribus laborent, pulsi turgcant, aut uterus, vel abdomen doleat.

4. Denique humectantia diu demulcentia, atque diluentia remedia continuo exhibere necesse erit; qualia sunt.

Decocta Pulli, Vikuli, Ranarum, cum herbis refrigerantibus, Borragine, La-  
tuca, Petrofelinio, Parietaria &c., in subjectis præsertim gracilibus, &  
emaciatiss propinanda sunt, in phlegmaticis nonnulla addendo cancræ flu-  
viatilia.

Apozemata ex radicibus Consolidæ, Althææ, Oxalidis, foliis Lactucæ, Poi-  
culacæ, Verbasci, quibus addi poterit pro singulis vicibus uncia, vel uncia  
& semis syrupi Violarum, Bismalvæ, aut Symphiti radicis.

Serum depuratum, & chalybeatum, cum coctæ succi depurati Cherofilii, La-  
mii, Mille-folii, & uncia una aquæ secundæ calcis.

Lac Asinum, aut Caprinum semel vel bis in die sumptum, aut Vaccinum  
pro integro alimento, modo ventriculus sinat.

Balnea, aut semibalnea tepentia, modo pectoris conditio usum permittat.

Aquæ tandem minerales ferruginæ mitiores tamen, & modica copia haustæ,  
diu continuatæ, quales sunt illæ de *Forges*, *Passy*, & *Spa*.

Inter ea remedia decocta, apozemata, & serum hyeme magis conveniunt;  
vere lac & autumnio; æstivo tempore vero balnea, & aquæ thermæ usue-  
niant, nihil officit tamen, quod ea modo occasio urgeat, ceteris tempestatibus  
adhiberi queant.

5. Si opus requiratur leviora narcotica exhibentur, qualia sunt decoctio capi-  
tum papaverum, cum syrupus diacodii, vel Karabis ad drachmas iij, vel iv.  
Ladanum liquidum ad guttas x. xij, aut xv, vel solidum ad granum j. Pilla-  
læ denique Cynoglossi Starkey ad gr. iv., vel v. aucta pro circumstantiis dosi.

6. Pudendorum loctiones pluries in die reiteratæ profunt, ex levioris deco-  
ctione radicis Althææ, aut foliorum Verbasci, Cherophylli &c., cum pauxillo  
aquæ secundæ calcis, aut aquæ cujusdam vulnerariæ non spirituosæ; injectio-  
nes pariter semel saltem in die conducunt ex decoctione Althææ, Hordei, aut  
sero depurato.

7. Interdicere oportet matrimonii usum, quantum libido sinat, tum exerci-  
tia nimia ambulationis, equitationis, aut rhedæ; vitam sedentariam, aut qui-  
etem præcipiendo.

8. Ægris denique suadere, quod brachiis cauteria apponere non renuant;  
præsertim si phlegmatico, & pituitoso donentur temperamento, cachexia la-  
borent, aut ætate consistant; hujusmodi remedium plerumque utilissimum eva-  
dit, at sane fœdum est, & molestum, ut ipsum raro ægræ pati valeant.

*Cautele necessarie circa hujus morbi medelam.*

I. Necdum albi fluoris medelam innuere debemus, nisi prius diluentibus re-  
mediis, ac demulcentibus sanguinem expiaremus, ut in palliativa methodo  
ostendimus.

II. Eoque magis insistendum in præparandis ægotantibus, quo fluor, vetu-  
stior, & acrior, ægræ vero cachecticæ magis appareant.

III. Proposita remedia diluentia, humectantia, & demulcentia animose præ-  
scribi possunt, modo opus requirat, cum neque citius quam par est valeant  
fluorem sistere, aut uterum lacerare.

IV. Contra vero caute incedendum circa aperientium aut vulnerariorum, at-  
*Astruch de Morbis Mulierum.* I 3 que

que adstringentium usum, etiam si illa morbus possit, cum facile possint, fluorem interciperi, aut uteri inflammationem gignere.

V. Ut carybdem evitemus opportunissimum videtur diluentia aperientibus, humectantia adstringentibus, demulcentia vulnerariis confociari.

VI. Immo potissimum erit remedium eorum vires nonnihil interdum compescere narcoticorum usu, ut uterus præsertim tæatur.

VII. Præterquamquod ab iis prorsus abstinere debemus, modo uterum calefieri, aut dolore cruciari cognoscamus.

VIII. Patet enim tunc proscriptas esse injectiones adstringentes nimis, ut illæ quæ patrari possunt ex corticibus Granatorum, Balaustis, Rosæ rubris, Alumine, lapide medicamento Croli, Pulvere de Verna, aut sanguine Draconis.

IX. Suffumigia, ad summum concedi poterunt, ex floribus Salvæ, Menthæ, Mille-folii, aut Mastice, Ladano, Gummi Junj; eri, Succino luteo, modo in sola uteri latitudine, & modicâ dosi adhibeantur, verum tepentia tantum introducantur, ne matricem offendant.

X. Tandem nondum valetudinem lætabimur a sola floris absentia, verum cunctari paullisper oportebit, donec in menstruantibus mulieribus, catamenia concinno ordine restituantur, vel in anibus citra ullum nocuum symptoma sanitas confirmetur, neve alio laticem delexisse innoscat.

*Remedia in albo fluore commendata, quibus tute in quibusdam  
saltem circumstantiis uti potest.*

I. Drachma Semis, vel una Terebinthina Venetæ, sub forma bolari, Rei scrupulo remixta, ei superbibendo poculum tepentis phisane; hoc remedium per dies decem, aut quindecim continuatum, alvum ciet blande, atque uteri vasa confortat; eumque Riverius (a) magnificat.

II. Syrupus simi Asinini, paratur ex manipulis quatuor ejusdem infusis sextario circiter aquæ rosarum, infusum percolatur, & addita æquali sacchari copia syrupus conficitur, cujus dosis uncia est, per plures dies haurienda; istiufmodi remedium superius jam enunciamus in uteri hæmorrhagia, verum Balionius, (b) quasi mirabile secretum, ipsum in albo fluore commendat.

III. Levis decoctio ex uncia parata nucum pinearum, cum nucleis confusarum, & anatina parte corticis quercus pro potu quotidiano interdum præscribitur; hoc remedium virtutes jungit aglutinantium, & adstringentium, verum Dominicus Panarolus (c) experientiis suffultus illum magnopere exaltat, quod experiri facile est.

IV. Caro bubula summo exsiccata & subtiliter pulverisata, verum in exiguo vini rubri meraci cyato soluta ad drachmæ circiter dosim mane jeuno stomacho per plures dies comeditur; remedium Foresti (d) auctoritate comprobatur, at lenissimum præbet adstringens, quod nullum superat ceterorum adstringentium.

V. Decoctio foliorum quercus ad quinque, vel sex unciarum dosim, cum drachma simul coaguli lepusculi, per decem dies mane sumpta, pariter commendatur & illam Mercurialis (e) laudat, & sane haud parum confitatur.

VI. Decoctum sudoriferum Guaici, Chinæ radicis, aut Sarsæ-Parillæ, vel utrorumque simul prodesse testantur ejusdem poculo mane, & vespere sumpto, purgat etiam si folliculi Sennæ, aut osamarindi addantur idonea dosi.

Nul-

(a) Centur. 1. Observ. 46. (b) Comment. ad Hippoc. 11. Lib. 11. Conciliatorum.

(c) Observ. 48. Praerod. 2. (d) Lib. 11. cap. 11. Observ. 16. in Schol.

(e) De Morbis Mulier. Lib. 11. cap. 7.



Nullum magis a duplici auctore commendant etiam si confundant, ni fallor, album fluorem cum virulento, in quo convenire poterit, modo aegre sint obsecræ, & pituitosæ, minime vero in simplicis albo fluore nisi in circumstantiis §. VI. Art. III. n. 5. pag. 125. indicatis.

VII. Decoctio Saponariæ, quæ ebullitione peragitur triam manifestum huiusmodi stirpis, duorum Filipendulæ, & unius Cymbalariæ, cum libris novem aquæ fontis ad tertie partis consumptionem, residui mane jejuno stomacho duplex poculum exhibetur.

Hoc remedium celebravit Empiricus eximius Johannes Zapata (f), a Septuilio (g) laudatus; at illud in gonorrhœa gallica tantum usum habet quæ continens fiat; verum ad hunc morbum videtur referri Domini Zapata effatum, præsertim cum David Sçleiss (h), qui hoc opusculum latine vertit, atque commendavit id intelligat.

VIII. Millii decoctio, vulgo *Decoction d' Ambroise*, pro potu quotidiano per plures dies propinata usu venit, leviter diaphoretica est, aut diuretica, ac in vasorum lacteorum mollitie non inutilis, in quibus circumstantiis verisimile est ipsam Mercurialem (i) proficuum expertum esse.

IX. Drachnam femis, aut unam conservæ (k) *Lamii*, mane jejuno stomacho comestam prodesse ajunt, ex floribus, ejusdem theiformi superbibendo. Rajus (l) in albo fluore ipsam laudat, fateor & ipse urticam inermem elæsterium lacteorum nonnihil restituere quod in uteri albo fluore sæpissime desideratur.

X. Tinctura Myrrhæ, Spiritu Vini, & Tartaro extracta ad guttas decem, aut duodecim idoneo vehiculo propinata, aut sub forma bolari exhibita magni (m) Boheravi laudes promerita est, at efficacior evadit, si cum aqua Rabbelli eliciatur, sicut nos in (n) Tractatu de Morbis Venereis docuimus.

XI. Lactis vaccini, dempto cremore, chalybeati uncie sex, aut septem, cum uncis quatuor succi dejurati Nassurci aquatici, mane jejuno stomacho per tres hebdomadas, aut mensem debitis cautelis adhibitis ingurgitatur non parum auxilii præstant; hoc remedium uno eodemque tempore demulcens est, ac diureticum valet tum acrimoniam lactei humoris corrigere, cum vermicularium laxitatem tollere.

XII. Pulvis radice filipendulæ in unico cyato decoctionis *Pastinacæ sylvestris tenui foliæ*, C. B. P. usu venit, quam laudant Simon de (o) Paulis in veteri, & pertinaciori fluore, tum Needhamus, & Hermanus Corbeus Raio (p) teste.

XIII. Tandem decoctionem ostendemus florum melliloti, cujus poculum quotidie mane sumi poterit; illam proposuit medicus (q) quidam Alemanus, quam fateor ignorare, an magis tutam, vel inefficacem experiri.

*Remedia adversus eundem morbum proposita notua  
tamen, vel suspecta.*

I. Auctores nonnulli per plures dies mane jejuno stomacho camphoræ (r) drachmam

I 4

mam

(f) Li Maravigliosi Secreti di Medicina e Chirurgia. Cap. 9.  
(g) Ammadv. Lib. vii. Ammadv. 315. (h) Sub titulo de Mirabili, seu Secreta Medico-Chirurgica, ..... in Italico idiomate in Latinum versa. Ulmæ, 1696. in 8. (i) De Morbis Mulierum Lib. IV. cap. 7. (k) Joh. Bauhinus, Histor. Plantar. Lib. XXV. cap. 219.  
(l) In Catalogo Plantarum Angliæ. (m) Chym. Procrissa. 57. (n) De Morbis Venereis. Lib. IV. Cap. 12. pag. 334. Edit. secunda. (o) In quodripart. Botanico. (p) Histor. Plantar. Tom. 1.  
(q) Johannes Michaelis, in not. in Schenckium. (r) VVollgangus Hoeferus, Hæren. Med. Lib. VII. Cap. 1. Joh. Liebauk, De la santé, fiabilité & Maladies des Femmes. Liv. 11. Cap. 35.

mam semis, aut Nucis (f) Muscatæ dimidium exhibebant, idcirco alterutram solvabant in unciiis circiter duabus aquæ Rosarum, aut Nymphææ destillatæ.

At caute huic fidendum est; remedia enim spirituosâ aromatica, valde attenuantia antequam adhibeantur, sedulo perferutari debemus, præsertim cum in sola lacteorum laxitudine locum habeant, idcirco in mulieribus pinguini corporis habitu, & pituitoso temperamento prædictis pariori tamen dosi exhiberi queunt.

II. Neque tantum existimo sæculum Bryoniæ, quam Medicus quidam (t), Alemannus præscribit ad drachmam sequenti ratione paratam.

℞ *Fæculæ Bryoniæ* ℥j.

*Seminis Papaveris albi* ℥ij.

*Myrrhæ* ℥j.ß

*Cum Saccharo in aqua Cerasorum nigrorum soluto f. Rotule.*

Fæcula hujusmodi valde emenagoga est, uterum lacessit nimis ac proinde perniciosos ibi cruoris affluxus inducit, & inflammationem ipsam tunc potissimum, cum frustra menses revocare tentamus, quod crebre evenit in vetustioribus albis fluoribus.

III. Iis rigidiores censuram meretur *Aquæ Esculapi* nomine proposita, a Medico (u), vel potius Empirico Hispâno, qui non levem tamen tunc temporis famam abripuit, ea tali pacto paratur, cucurbita ænea stanno intus oblinita, aceto modice repletur, cui superimponitur plumbeum operculum, ac vulgari methodo, acetum destillatur; fluens liquor qui dulcis est, & aureo colore nitens aquam præstat de qua sermonem inuimus, quam mane jejuno stomacho ad uncias duas, vel tres Zapata præscribit, per aliquot dies, eamque summis laudibus extollit adversus plures morbos, uberiores tamen albos fluores præsertim, & fertinaciores.

Attendite tamen hujusmodi remedium valde suspectum esse, neque tuto exhiberi posse, nam re ipsa acetum est destillatum, & dulcificatum plumbeis moleculis ex operculo abrais, quibus est saturum, iis enim erit tribuenda aquæ hujusmodi efficacia, at ipsæ Saturni particule remedii contemptum indicant, modo cunctemur paullisper circa ea, quæ superius pag. 107. enuntiavimus, damnum videlicet, quod intus sumptæ solutiones afferunt, aut præparationes Saturni.

IV. Meum esse censeo de quibusdam remediis hic mentionem facere, quæ adversus fluorem album commendata in Dissertatione quadam reperi quæ accedit tractatui sub iis verbis edito, *Suite de la Description des Maladies Vénéériennes*, mihi que licere, circa ea animum pandere; cum opusculum enim Regis auspiciis fulciatur, idcirco facile Tyrones, aut minus seduli Medici decipi possent veritatis specie, ne illos admonerem quanti hæc pendeant remedia, quorum primum arcanum nunc vobis ostendam.

Repleto, ipse ait, vas fictile uncia una sublimati corrosivi, & novem simul Limaturæ Chalybis, materiam in cella subterranea reponite, eam quotidie idoneo instrumento aggitando donec in pulstem convertatur, quæ lebetæ aqua pleno ebulliat, verum Chalybeo cocleari super cartam bibulam affundito, ut pulvis ab aqua perbelle fecernatur, qui exsicabitur, & per tres, vel quatuor dies

(f) Hieronymus Resnerus. *Observ.* 1. 1.

(t) Gothofredus Samuel Pokhins, *Myrrholog. Sect. 17. Cap. 13. Art. 2.*

(u) Giovan Battista Zapata. *Le Maravigliose Secreti di Medicina & Chirurgia, Cap. 13.*

dies ad sex, aut septem grana, cum quinque simul, vel sex grani scamonii Alep-  
penfis interdum exhibebitur cum iusculi cocleare prope prandium, aut cenam;  
si quæ pulverem respuant boli confectur confectiois Hamec ope; solvit valde,  
purgat blande per duas, vel tres vices alvum ciendo.

Facile est percipere in ea compositione maximam partem sublimati, ferri li-  
matura intime copulari; ut pulvis ille supra cartam residuus ex utriusque ana-  
tina parte coagmentetur, quare pro singula sex, aut septem granorum dosi, tres  
vel quatuor grana circiter sublimati exhibebuntur.

V. Alterum quod commendat arcanum nocuum magis censetur, ceterorum  
enim remedium, quibus, Auctor, per viginti annorum spatium usus erat, in hu-  
jusmodi morbi, fluoris albi curatione non sanatione, hoc potissimum, asserit, re-  
perisse

R. Sublimat. corosis 3ß.  
Præcipitat. rubr. 3ß.  
Mercur. dulc. gr. xvij.  
Mercur. vivo. 3ß.

his rite comistis Mercurio vivo nempe, & sublimato primum, ut hujus casti-  
ca vis magis compescatur, adduntur infra præcipitatum, & Mercurius dulcis,  
denuo conterantur omnia addendo

R. Teste perlar.  
Cinammoni S. p. à 3ß.  
Scamon. Alleppens. 3 v.

& miscella perfecte peracta cum syrupi cydoniorum sufficienti quantitate fiant  
boli cujus dosis erit a gr. xxv. ad xxxvj.

Si hujusmodi boli secundum artis canones rite parati fuerant pro singulo-  
rum xxxvj granorum dosi xxij haberi debent syrupi grana, residuum xiv. grano-  
rum consilari debet ex grano j &  $\frac{1}{2}$  sublimati, & grani  $\frac{1}{2}$ , tum Mercurii  
dulcis cum præcipitatis rubri, verum ex granis  $\frac{1}{2}$  Mercurii vivi & xiiij; Scamo-  
nii; dubito magnopere additione Mercurii fluentis sublimatum, atque præci-  
pitatum posse satis dulcificari, ut tutus evadat eorum usus.

VI. Intendit vero auctor eorum actionem sequenti syrupo cathartico alternis  
diebus sumendo

R. Agaric. vegetabil.  
Folior. Senn. à ʒvj.

ebulliant cum libris circiter tribus aquæ fontis ad tertie consumptionem, verum

R. Aqu. vit. ℞ij.  
Sacchar. ℞ij.  
Scamon. Alepp. ʒvj.

misce, & ignis ope continuo agitando donec avolet spiritus vini, inde igne  
sublato frigeat liquor, qui per manicam Hippocratis percolatus cum superiori  
infusione copulabitur, cujus dosis sex, aut octo coctlearia non excedet.

Revera Auctor parvi facit efficaciam Scamonii; nam ad grana xij, &  
bolos

bolos pro singula dosi intrat, verum nunc exhibet octo coclearia, seu uncias iv. Syrupi, quæ copia calculo peracto tinctura saturari debet xxviii), aut xxx granorum Scamoneii præter decoctionem agarici, & sennæ, quæ non levem compositionis partem constituunt; puto enim ex cætenis mulieribus duas vix reperiri, quæ valerent actionem perferre hujusmodi remedii, præsertim cum a morbo labefactatæ fuissent quod crebre evenit in albi floris pertinacia.

VII. At multum superest, Auctor enim compositionis subsequæ, usum iis addere suadet.

R. *Hyuscyam. recent.* } cum radicibus ana. ℞vj.  
*Ling. canin.*  
*Folior. Nicotian. ℞iv.*  
*Vin. alb. ℞xxx.*

ebulliant omnia per horas quinque vel sex percolato liquore adde

R. *Ob. Oliv. recent.* ℞xxx.

ebulliant denuo donec amplius vinum, aut oleum non fremant, tunc remoto igne, & liquore frige facto ipse ad usum servetur, exhibentur enim prius boli n. v. alternis diebus, verum dosi syrupi n. vj., & interjectis diebus hujusmodi liquoris coclear sumentum est eumque frequenter reiterare optimum censet.

Videtur enim auctorem intermedicinalia magis suspecta concessisse; usui enim interno sublimati corrosivi, quod nemo præscribi auderet arctam addit decoctionem hyuscyami, & nicotianæ, plantarum videlicet, quarum efficaciam adhuc novam putant.

VIII. In ea dissertatione epistola reperitur litterati cujusdam viri silentio prætereundi, quem dicunt physicam, & anatomem coluisse, eandem sententiam amplectentem: defendit iste adversus strumas specificum esse sublimatum, at ne a via recedamus in albo fluore pariter commendat injectiones lactis Mercurii methodo pharmacopœ Batheanæ parati, docet sane deslegmari cum uncis (x) quatuor liquoris singulam drachmam sublimati, verum asserit ad miraculum citissime fluorem sisti.

Methodus Batheana est, solvere drachmas sex sublimati corrosivi cum uncis duodecim Aquæ summariz, ut singulæ drachmæ Mercurii, unciz duæ aquæ respondeant, quare duplum sublimati continet hujusmodi præparatio, quam et Auctor anonimi, at Batheus de lactis mercurialis usu obmutuit, lectori tantum suadet ea animadvertere, quæ alias de aqua mercurialis locutus est, ubi ipsam valde commendat adversus faciei tubercula, maculas, pustulas, iis verbis. *Ad faciei ruborem pustulas &c., curandas certissima aqua*, de usu vero interno neque verbum facit, verum externi usus respectu admonet leviter affectas partes tangere statim linteo illas lambendo, *tange loco sepe cum guttula minutissima statim exsiccando cum linteo &c.*, animadvertendum tamen est hujusmodi aquam componi ex duplici tantum drachma sublimati corrosivi, in libra una emulsionis decoctæ radicis liliorum soluta, quare illa duplo mitior evadit lacte anonimi; Batheus itaque, quem non latebat aquæ hujusmodi indoles, cosmeticorum more extrinsecus tantum ipsam præscribebat, & modicæ dosi partes affectas obliniendo, & solícite exsiccando, ne sanam cutem læderet; qua ergo ratione fulcitur anonimus? qui etiam si perperam Batheum sit profecutus, ausus est hujusmodi reme-

Cujus Batheus duas uncias impendit pro singula drachma sublimati pro suo lacte Mercuriali conficiendo.

remedium intus exhibere, tum vaginæ plenæ injectiones solutionis corrosivi mercuriali illa præparatione duplo efficaciares præcipere, ubi partium fragilitate, & sensibilitate summa tantum periculi adest.

IX. Dominus (z) Morganus Medicus Anglus asserit tincturam Cantharidum cum decoctione simul Guaiaci haustam in recenti fluore utilissimam evasisse, ac in vetustiori mercurialia esse potissima.

A plerisque Auctoribus sane hujusmodi tinctura in gonorrhœa gallica proposita fuit, ut in Tractatu de Morbis Venereis ostendimus Tom. I. pag. 272. 499. Editio Gallica. Verum ea de causa putarem Morganum remedium proposuisse in albo fluore, quia ipse confunderet hujusmodi morbum cum virulento fluxu ut intelligendum videtur dum mercurialibus uti consuevit in veteri albo fluore; sed, hoc vero, dupliciter ille deceptus est, primum nullam intersyphilidem, & album fluorem differentiam statuit; alterum autumat in utroque casu tincturam Cantharidum convenire, quod utrumque falsum est: observavimus enim superalato tractatu ipsam in gonorrhœa virulenta suspectam esse, atque nocuam, quod magis suadendum in albo fluore, in quo mercurialia prorsus fatilia sunt, aut insensa experiuntur.

## C A P U T X I.

*De cessatione menstruum, & scenomenis quæ ab ea procedunt.*

## §. I.

*Descriptio.*

**M**enses quæ certo ætatis tempore incipiunt certo etiam naturæ lege desinunt, cum diversum sit primæ eruptionis initium, varius pariter finis erit, idque pro diversis subjectis, temperamentis, regionibus, aut ætatibus &c., generice tamen mulieres mensibus deficere incipiunt 45., aut 50. vitæ anno.

Interdum menstrua repente sistunt citra ullum diminutionis indicium, quod tamen raro accidit, quandoque sensim sensumque desinunt; menses enim immutantur, nonnihil serius revertunt, modo deficient, semel vel bis antequam restituantur penitus tandem abeunt, aberrationes illæ quando breviores sunt, quando sex menses, aut unum vel duplicem annum perdurant.

In nonnullis mulieribus menses alienantur citra ullum incommodum, vel levem tantum comitem habent, cui consulere frustraneum videtur, in aliis eorum amissio hystericas suffocationes inducit vehementiores interdum, in aliis hæmorrhagiæ superveniunt diutius persistentes lethales, in aliis denique fluor albus est reliquus pene incurabilis.

Quædam vero desinentibus mensibus per vices sunt pluribus scenomenorum eorum obnoxie, diversimode confociatis, modo suffocationibus, & lethali hæmorrhagiæ laborant, modo cruoris simul, & albi laticis jactura, modo vaporibus, & albo fluore corripiuntur; nonnullæ tandem alterutro eorum alternatim vexantur, vel utrique uno eodemque tempore cruciantur.

## §. II.

(x) *The Mechanical practice of physic*, Lond. 1755, in 2. Vol. *Essais & Observations de Médecin*, ou de la Faculté d'Edimbourg, l'incise verum a D. Dugours, Médecin Docteur, Tom. IV. pag. 609.

## §. I. I.

*Causæ, & Symptomata.*

**C**ommunis lex est fibrarum animalium elasticarum, quod progrediente ætate indureſcant, & breviores fiant, ea de cauſa quo ingreſſeſcit ætas, viduum anxiſtunt, atque rubicundum faciei colorem, tum carniſum molliſtiam, eadem cauſa rugas parit, cutim coſtipat, atque corneam qualiſi reſcit, uno verbo ea præſentia ſunt, atque concomitantia tarda ſeneſtutis.

Uteri fibræ atque tunicaſ vasorum per eum reſtantium iſſdem ſunt obnoxie ſcænomenis, verum etſi generalior hæc abeſſet cauſa uteri ſaltem reſpectu admittenda videretur, mammarum exemplo, quæ cum utero ſumman affinitatem habent, tum ſtructuræ, cum functionum ergo, quæ, ut jam enunciamus 45. aut 50. circiter anno deprimuntur, atque valde atreſcunt.

Id enim pro certo haberi poteſt, quod illud tempus verſus uterum ardari atque proſus occludi debeat, vaſa vero lactea deprimi, aut coſtipari ut imparia evadant, quod iſſis mos erat humorem lacticinofum recipere, venoſas deinde appendices coſtringi, ut amplius reſerari nequeat, vel pro cruore ibi aſſuente recipiendo, vel pro illo in uteri cavitate eſſuendo, quod idem cadit, ac totum deſiceret organum menſtruationis, quale ſuperius *Cap. II.* deſcripſimus.

Quapropter menſium amiſio neceſſarium videtur ætatis conſequens eſſe, quod noſtrum non eſt avertere, ſed a mutationibus, tunc in vaſis vermicularibus ortis, & appendicibus venoſis dependet, etiamſi huiuſmodi aberrationes innumere ſint ac diverſimode in diverſis circumſtantiis aggredi poſſint, ut facile patet ex varietate ſcænomenorum, quæ in diverſis ſubjectis menſium abolitionem antecedunt, aut ſuccedunt, nihilo tamen minus ad quatuor claſſes præcipuas reſerri poſſunt, quare

*Primus in hoc morbo uteri ſtatus.*

In hoc ſtadio vaſa lactea aut nihil, aut parum reſerantur, neve ſint aſſuſcentis lactei humoris ingreſſum, eoque parum vel nihil replentur, parum nihilque propinquas venas comprimunt, ut ſanguis recipiatur; appendices vero ex una parte parum extenſæ inopis ſanguinis ergo, ex altera vero parte compactæ nimis ſtationum rigiditatis cauſa menſes retardant, imminuuntque donec tandem abeant.

Tunc 1. Interdum periodus ſubſiſtit imminuta ſtuoris copia; periodus perſiſtit quia vermicularia adhuc dilatantur aliquantiſper ſingulis menſibus, tantumque cruoris recipiunt ut periodicum conſervent eſſuſium, at appendices magis compactæ aperiri renuunt, aut imperſecto reſerantur ut paucum hinc ſanguinis eſſuſcant.

2. Interdum ex converſo copia ſervatur diu menſtrui fluxus diuturniori tamen periodo; ubertas enim eſſuſii perſiſtit quia appendices adhuc moles ſunt, aperiri ſint, cruoremque recipiunt pro vulgari ſtuoris diuturnitate neceſſarium, & periodus diuturnior magis fit, lacteorum ergo, quæ pro adepta rigiditate difficilius ſeriusque ſucco lacteo imbibuntur.

3. Quandoque menſes imminuuntur, & periodi una remouentur quod antecedenſia confirmant, difficultatem nempe qua lactea vaſa compacta nimis dilatantur, & venoſæ reſerantur appendices.

4. Nonnullæ mulieres in quibus menſtrua depauperantur, imminutio per gradus

Quis sensum, sensumque æqua apparet, in aliis sine lege aberrant; in primo casu una eademque ratione confusio tum lacteorum, cum appendicum progreditur, atque sanguis uniformem motum conservat, in altero vero casu inæqualiter arescunt vasa illa aliqua extranea de causa, aut pro irregulari sanguinis cursu.

5. In aliquibus mulieribus catameniorum abolitio ad sex menses, unicum, vel duplicem annum protrahitur cum tantum temporis requiratur, ut vasa aperiatur; id in mulieribus evenit in phlegmaticis subjectis aut sanguineis, verum id salubrius est ut natura perferat facilius ita mensium defectum.

6. In aliis celerius desistunt repente valde, quia vascula illa citius occluduntur; id in mulieribus evenit bilioso aut melancholico temperamento præditis, quod frequenter tamen teterrimos effectus gignit, inopinata exuberantia cruoris ergo alio desiccantis, qui per uterum erumpere adhuc deberet.

7. Quando menstrua absunt ex proportionali simul æquali & uniformi lacteorum & appendicum occlusionem nullum consequitur nocuum symptoma, vel ad summum supersunt 1. aliqua gustus depravatio, aut sordium appetentia quando lacteus succus in sanguine redundans saliva aut gastrico latice permiscetur: 2. vel aliqua præfocatio, aut capitis gravedo quando redundans sanguis pulmonem, aut caput adurit.

Hæc eveniunt iis quæ uterum bene constitutum habent omni vitio expertem

Quæ æquali gaudent tunicarum fibrarumque uteri robore;

Quæ menses amittunt secundum naturæ leges citra ullam externam morbosam, aut repentinam causam;

Quæ tandem lactea vasa, & appendices occludi experiuntur a sola aucta fibrarum rigiditate, idque fieri placide, & proportionaliter.

#### *Status alter.*

In hoc stadio vasa lactea adhuc mollia sinunt ingressum lactei humoris, tamēn comprimunt proximas venas atque sanguinem retardando ipsum cogunt appendices intrare, verum officia eorum valorum tum appendicum compacta nimis aperiri negant, quare frustra vasa inflantur, neque menses apparent etiam si omnia disposita videantur.

Tunc 1. Mulieres persentiunt instantium catameniorum molestiam ut ipsa revera essent eruptura cum etsi incassum omnia ad hoc in utero parata sint.

2. Incomoda quæ præcedunt menstrua aut iis succedunt diuturniora, & perpertinaciora experiuntur, imo vehementiora quandoque, quam in statu naturali cum vasa, quæ depleri nequeunt, diu turgeant, ac magis interdum quam circa mensium instantis effluvium.

3. Dum impressiones tunc utero obvix grandiores fiunt, & vividiores, vapores sane hysterici excitant, vel ea saltem fœnomena inducunt, quæ ad eos vapores pertinent; huiusmodi sunt faciei repentinus calor, coloris per breves sudores evanescentes, suffocationes convulsivæ diaphragmatis, contractiones, intestinorum borborismata, risus inconcinus tandem, aut fletus.

4. Ea fœnomena sensum imminuunt, debilitantur gradatim atque rariora sunt cum vasa illa lactea vel appendices in diem constipentur, minusque tinent ingressum humorum, qui proinde leviolem plethoram gignunt, nihiloscius ea unum frequenter, aut duos annos perdurant invita tamen natura nec procul molestiis.

Huiusmodi secundum stadium ad eas plerumque mulieres attinet quæ officia uteri vasorum parietibus densiora, & compactiora habent.

Quæ

Quæ interna donantur uteri tunica, dura nimis, tendinea, ut vasa omnia maxime constringat, quæ proxime obtegit.

Illæ vero præsertim, quæ nondum utero gestarunt, aut raro, in quibus vasa lactea, & venosæ appendices minus dilatatae fuerunt in eo compactionis statu persistentes.

### *Tertius status.*

In hoc lactea vasa cum mollia adhuc sint dilatata sinunt, lacteoque humore replentur, necdum tamen exauriuntur cum compacta eorum orificia referari renuant, quare ipsa turgida nimis proximas venas comprimunt, in iis circulationem intercipiunt, atque in appendices sanguinem devehunt, easque pandunt, quod sanguinis iacturam modo maiorem, modo minorem inducit.

Tunc 1. hemorrhagia habitualis est, atque pertinax quia vasa lactea adhuc plena veras premunt continenter, ac in appendices venosæ sanguinem deſectant, coguntque illas patulas morari.

2. Sanguinis iactura non solum persistit periodice, verò singulis mensibus duplicatur, cum vasa vermicularia prope menstruum tempus, turgant magis, magisque premunt proximas venas, cruoremque ibi detineant, atque majori proinde copia effusant.

3. Tensio solidorum, tunicarum præsertim uteri, quam excitat vasorum in utero inflatio, vapores hyſtericos frequenter inducit superiori statu secundo, num. tertio enunciatis.

4. Etiam si pertinaces sint huiusmodi sanguinis iacturæ, sponte tamen desinunt quando vasa sensum, sensumque arctantur, lacteum humorem respuunt, neve amplius venas comprimunt, aut aperiiri cogunt.

5. At Mensium amissio haud raro album fluorem relinquit lymphaticum qui a levioribus excoriatioibus procedit extremitatum appendicum venosarum jam constrictarum, ex quibus lymphæ perfluit donec perfecte agglutinatae fuerint.

6. Interdum huiusmodi sanguinis amissiones in ulcera degenerant, erosio-num causa extremitatum venosarum, quæ marcescunt, & pure foedantur acriori, & corrodente.

Super allata signomina facile iis accidere solent, quæ appendicibus donantur, & vasis lacteis laxioribus;

Illis vero quæ in utero suapte natura imbecilliores portiones habent, ubi venæ varicosæ lactæ sunt.

Iis quæ pluries utero gestarunt vel partus passæ sunt diutinos, laboriosos, aut difficiles, in quibus appendices crebre laxatæ, aut erosæ fuerunt, aut uterus inequaliter labefactatus fuit, ubi placenta adhæsit.

Tandem illis, quæ in primo aut secundo casu nuper allato imprudenter pedes secarunt perperam mensium revocandorum causa.

### *Status postremus.*

In hoc postremo casu uteri vermicularia lacteum humorem adhuc recipiunt, quantumque affluit totidem effundunt per orificia, quæ patula facile persistunt, ideoque illa neque inflantur, neque venas comprimunt, sanguinem intercipiunt, seu in appendices devehunt, neve eas referari cogunt, uno verbo eruptionem mensium minime fovunt.

Tunc 1. Mulieres rubro fluxu deficiunt verum albo continenter laborant menstruum tempore periodice incrementi, cum tunc uberius fiat laticis illius secretio.

2. Vasa non tumescunt, neque uteri tunicae lacerantur, ideoque patientes sunt.



sunt vaporibus expertes, verum persistenti albo fluore, languore, macie, & marasmo laborant.

3. Quandoque affectio in ulcus uteri degenerat quando humoris lactei continua effusione relaxantur nimis, dein corroduntur orificia lacteorum, arque ipsa interna tunicarum matricis facies leditur, in iis præsertim, in quibus acer humor affluit, & corrosivus.

4. Denique modo mulieres sanæ sint & sedulo curatæ plerumque sensim sensimque sponte aberrat hoc album morbosum effluvium prout in diem vasa illa constipantur.

Mulieres ille crebre ad hunc statum pertinent, quæ phlegmaticæ sunt, & pituitosæ, quæ fluoribus albis obnoxie sunt & diu lassis orificiis vasorum præditæ.

Quæ uteri ejusque intimæ tunicæ contextu laxiori donantur, id sponte eveniat, vel gestationis causa.

Ille tandem quæ perperam aperientibus hæmenagogis menses revocare tentarunt abeuntes.

#### *Status uteri compositus.*

Simplicibus illis mensium abolitionibus usque dum explicatis aliæ plures compositæ species adduntur ex priorum connubio trium saltem nuperrimorum quæ simul eodem tempore atque in eadem agrotante occurrunt, diversam tamen uteri sedem afficientes, quare post simplicium explanationem mensium sistentium compositionem ejusque præcipua sænomena enunciamus.

Idecirco 1. Dum secundus, & tertius status simul agunt, ægræ vaporibus simul corripientur, & uteri hæmorrhagia.

2. In confluentia secundi & quarti vaporibus simul & albo laticinoso fluori erunt obnoxie.

3. Quando tertius status quarto copulatur, mulieres tum sanguinis cum lactei & lymphatici humoris jactura vexabuntur, quam haud facile distingui poterit, præsertim si copiosum sit cruentum effluvium, modo eo interdum non deficiat.

4. Tandem in utrorumque concursu quod raro evenit, etsi non impossibile, ægræ vaporibus cruciantur hæmorrhagia & simul albo fluore.

Componuntur ii diversi morbi gradus quando causæ simplices species producentes simul agant, lacestantque diversas uteri partes, simplicium tamen causas perscrutando compositionum facile quot, & quales uriri poterunt innotebit.

### §. III.

#### *Diagnosis.*

I. **D**agnosis desinentium menstruum eo collineat, ut amissionem distinguamus ab ætate procedentem ab ea quæ suppressio, aut gestatio pariunt.

1. Ea a suppressione distinguitur 1. Ex eo quod naturalis mensium defectus 45. vel 50. anno tantum occurrat, morbosa vero suppressio quovis alio tempore evenire possit: 2. Verum salutaris amissio nunquam repente aggreditur, sed sensum sensumque per vices confirmatur, suppressio tamen plerumque statim adoritur: 3. dein naturalis mensium abolitio levioribus symptomatis solummodo comitatur, suppressionem vero teterrima sænomena consequuntur.

Modo mulieres ætatem faceri non verentur, arque signa illa pleraque saltem con-

concurrant, eaque sedulo scrutemur, facile erit naturam, & causam abeuntium menstruorum detegere, at parum in dubio hærebimus, nam ab unico, aut duplici mense, quæ erunt consecutura satis ostendent, an naturæ legibus referri debeant, quæ mensium defectum possunt, vel morboſis causis, quæ citra naturæ ordinem menses intercipient.

2. Haud facile tamen est naturalem distinguere catameniorum amissionem, ab ea quæ a gestatione procedit; decipiuntur enim sapissime mulierculæ, nam cum natis deficient, eosque cupiant vehementer 45. etiam vel 50. ætatis anno omnes gestationi tribuunt mensium imminutiones, quæ totalem prænunciant eorum silentium; contra vero quæ plures foetus ediderunt menstruâ defecturis identidem veram conceptionem referunt.

Neminem latet mulieres ciborum gustum amittere, extraneis cogitationibus, conturbari, cordis angustis, atque vomendi conatibus cruciari primis, quibus foetum gerunt mensibus, sinum vero inflari atque tendi, abdomen contra depressum ac constringi, ut eorum pleraque eveniat in repentina mensium suppressione, & laboriosa obvia, quæ dubitationem nostram confirmabunt, quare modo nobis illudere non velimus hujusmodi ambago prorsus evanuerit a quarto vel quinto mense dum vel foetum convelli in utero agræ perſentient, vel hoc signo deficiente naturali mensium cessationi suppressio tuto referri poterit.

In utroque casu enim hujusmodi incertitudo, aut cunctatio ægris nullum detrimentum inferre poterit; catameniorum igitur abolitio vel nullum postulat remedium, vel aliquam tantum ex brachio venam incidere, ac stomachicâ exhibere, quæ æque gestationi conveniunt; suppressionis vero respectu, quæ plerumque efficacioribus remediis indiget purgantibus videlicet, & aperientibus procul damno circa eorum præscriptionem cunctabimur nonnihil, donec veritas elucescat.

II. Diagnofis diverſarum ſpecierum deſinentis menſtrui ſimplicis, vel compoſiti ægrotantes inquirendo facile noſcitur;

1. In priori igitur ſpecie quæ naturæ magis conſona eſt, tumor, tenſio, atque dolor uteri abſunt, neque ullum conſequitur grave ſymptoma præter leve aliquod palloris, aut plethoræ.

2. Secunda ſpecies adest, quando menſium periodus adhuc perſiſtens, verum uteri tumor, tenſio, dolor &c. tum plura palloris ſcñomena ægras vexant, atque hyſtericæ accedunt paſſionis incomoda.

3. Tertia dignoſcitur dum uteri hæmorrhagiæ periodice ſuperſunt, quæ vero continentes ſunt, aut comites habent hyſtericos vapores, guſtus depravationem, atque menſium aberrationes.

4. Quarta ſpecies extat quando mulieres albo fluore corripì perſpicimus continent, pertinaciori & periodice increſcenti, quo neglecto languor, aut maraſmus augetur.

5. Tandem compoſitæ ſpecies innotebunt ſymptomatum indagine quæ ad ſimplices pertinent nuper indicatas, ut earum vario connubio novæ plures ori-ri poſſint.

III. Diagnofis diverſarum uteri conditionum, eorumque vaſorum ab indole deducitur ſingularum ſpecierum ceſſationis propoſitarum, quare

In prima ſpecie æque vaſa lactea, & venoſæ appendices occluduntur reſpuuntque ingreſſum lacticinofæ lymphæ, atque cruoris.

In altera ſpecie vaſa lactea referantur, & appendices; illa ad lacteum humorem recipiendum, iſtæ ad ſanguinem hauriendum, utrorumque tamen oriſicia compacta nimis renuent detentum laticem eſſundere.

In tertia idem evenit ac in ſecunda ſpecie oſtendimus, præter appendix æperitionem, a quibus copioſe ſanguis in utero crumpit.

In postrema demum specie lactea vasa penitus referantur, ut omnis erumpat lacticosus liquor, atque continens producat albus morbosus fluo.

In compositis denique catameniorum amissionibus natura & qualitas symptomatum satis indicant conditiones vasorum lacteorum appendicum, atque uteri totius.

## §. IV.

*Prognosis.*

I. **M**enstruorum cessatio circa 45. vel 50. annorum naturæ conatus seu melius consequens corporis totius & uteri præsertim constitutionis necessarium videtur, quare prorsus innocua, aut periculosa evadit modo citius quam par est non eveniat, & sævioribus sænomenis non comitetur.

II. Mensium abolitio morbosa est, quæ 30. 35. aut 40. annum versus supervenit, mox 45. aut 50. anno periculosa est, si repentina de causa metus, doloris, aut abortus ergo occurrat.

In hoc casu periculum adest tum quia suscipiari licebit vasa uteri, & appendices inæqualiter reserari, cum ratione lactei humoris qui immatura æque, ac naturali cessatione exuberans sæva symptomata asserre potest.

III. Hujusmodi affectio molesta evadit quando hystericos vapores hæmorrhagiam, aut album persistentem fluorem gignit, verum uteri infartum, syrrhum, cancerum, aut ulcus minetur; in singulis his casibus periculi mensuram faciant concomitantium symptomatum indoles, numerus, vehementia, quæ rectam prognosim definire valde implicant.

IV. A sænomenis cuique speciei propriis singularis quaruncumque prognosim deduci poterit, idcirco

1. In prima mensium abolitione cum ex parte uteri nihil detrimenti accidat, verum ad pallorem, aut leviolem plethoram pauca superventura sænomena attingant, quibus mederi facile erit, neque vaporibus, vehementioribus saltem, ægræ laborent, ideo ea periculo vacat, aut parum pertimescenda videtur.

2. Cum in secundo casu omnia adsint symptomata palloris, atque plethoræ verum grandiores hysterici insultus, qui valde perterreant, superveniant, tum uteri hæmorrhagiæ; aut abundans album effluviū suspicetur, cum etiam infartus pertinacior, atque uteri obstructions esse reliquas, idcirco hujusmodi speciei præcedenti valde periculosior censetur.

3. In tertia vero specie pallor, plethora, & vaporibus cruciantur ægræ quæ cum diuturniores fiant, in utero syrrhos, atque obstructionem parere valebunt; verum ipsæ continenti laborant hæmorrhagiæ e qua valde læscunt, tum frequenter ulcus, aut cancer inducitur, hæc enim præcedentibus magis nocua experitur.

4. In quarta hujus affectionis specie albus continens fluo, atque pertinax maciem, ethicam febrem, ulcus atque cancerum uteri minatur; ut in hac summum periculum adeste videatur.

5. Compositarum speciarum respectu prognosim derivabitur ab indole, numero, ac symptomatum violentia, quæ eas comitatur, aut a morbis consequentis.

## §. V.

## Curatio.

**I**lla scenoinena eandem hic medendi rationem postulant, quæ in ceteris aliis casibus postulaverant, quare consulere poteritis *Cap. VIII. Lib. II. ubi De Hysterica Passione & Vaporibus* &c. sermonem faciemus. Ut eos vapores compescatis ad secundam speciem pertinentes, fas erit pervolvere *Cap. IX. Lib. I. ubi de hemorrhagia, atque mensibus nimis pertractatur*, ut sanguinis iacturam cohibere discatis. *Cap. X. vero perlegere vestrum erit Lib. I. ubi de albo fluore loquitur* ut illum qui tertiam speciem cessationis respicit subijciatis necessariis interdum cautelis adhibitis.

Quare hujus capitis materiam ad primam menstruum cessationis speciem pertinere constat, ut præoccupare valeamus scenoinena mulieribus superventura, quæ menstruum fluxum amittere incipiunt, aut ea compescere protinus dum modica sunt ne morbos inducant, præsertim cum ea leviora palloris, aut plethoræ scenoinena esse videantur.

Statim ac mulieres modo prudenter incedere velint cognoscant proxime camentia esse abitura, debent de propria valetudine sollicitas esse, quo magis attendendum erit quo sanguinis, aut uteri conditiones id minentur, hac de causa

1. Haud infrequenter venam secare intererit per integrum, aut duplicem annum ut sanguinis exuberantia vasorumque turgentia imminuantur; quæ ex brachio instituuntur venæ sectiones, salubriores existimantur, ut sanguis ab utero revelatur; haud facile est determinare numerum, aut copiam, nam quædam singulis mensibus hoc remedio egent, aliæ in duplici mense tantum, at plerumque tertio aut secundo quoque mense prout temperamentum, aut vitæ regimen possant, venæ sectio reiteratur.

2. Optima vitæ gerendæ methodus præscribi debet, tum copiæ, cum qualitatibus alimentorum ratione; quantitatis respectu, ut minus comedant, ac minorem tum sanguinis, cum humoris lactei quantitatem adspiciantur; qualitatis respectu, ut alimenta leviora, aquea, parum nutrientia ingurgitent, quæ sanguinem chylumque dilutiorem suppeditent, minisque aptum vasa uteri infarcire.

3. Identidem ægras purgare necesse erit lenientibus nempe, tamarindis, manna, cassia, rhabarbaro, sale vegetabili aut ebsonensi &c. ut primæ viæ expientur, & per alvum exuberans chylus eliminetur, qui in sanguine lactei humoris redundantiam gignit.

4. Ipsis præcipito quotidie simpliciora remedia cum aqua tepenti, aut decoctione Artemisæ Matricariæ aut melliloti &c. quibus addi poterunt unciz duæ olei amigdalorum dulcium, aut uncia una Diachotolici, vel æqua dosis pulpæ cassiæ, modo venter arefcat, verum si ægra flatibus crucietur addi potest uncia una olei Lauri, vel clisleri intromittere ex bacis Laurinis paratum.

5. Quotidie, aut frequenter diuretica mitiora præscribi debent, ut per lotium lacteus humor eruipiat; opportuna videntur infusiones capillarum, thei, salviæ, melissæ & vulnerariæ Elveticæ, aut decoctiones leviores cherophilii, matricariæ, aut artemisæ; eadem virtute pollent aquæ minerales refrigerantes & diureticæ De Forger, aut Passi.

6. Efficaciora quandoque diuretica adveniunt si ea vehementiora symptomata possant; quare iis infusionibus, aut decoctionibus adjungi possunt 3 j. vel

vel 3 j. ſ. quotidie ſalis admirab. Glaub. aut Arcan. duplic. ſalis Prunell. & chartar. vitriol. , vel eas infuſiones ſuper affundi xx. aſellis in pultem redactis.

Tandem ſi hyſterici vapores crebriores ſint , & inſenſi, ægris coclearia aliquot erunt exhibenda potionum antehyſtericarum quæ componuntur ex aqua diſtillata nucum viridium, cereſorum nigrorum, aut florum tilliæ, quibus adduntur pro ſingulis quatuor unciiſ guttæ viginti, aut triginta tincturæ mirrhæcum ſimili doſi Caſtorci, vel grana aliquot aſſæ ſœtidæ in iſſis ſolvi, aut guttas tincturæ annodynæ permiſceri poterunt, ſi vapores vehementiores ſint, & convulſionibus, aut convulſivis motibus comitentur.

*Cautela neceſſariæ in mulieribus pertraſlandis, quæ menſtruationem tandem amittunt.*

I. Quotidie pedes ſecare prætereundum erit in menſum vera amiſſione; tunc enim venæ ſectionibus aortæ deſcendentis ſanguinem attrahunt, qui uteri vaſa infarcit, uterum ipſum inflat atque tendit, tum hyſterici aſſectus ſymptomata augeſcit, & hæmorrhagias uteri haud infrequenter inducit.

II. Eadem de cauſa emenagoga omnia veniunt proſcribenda, ſolventia, aperientia aut aquæ thermaleſ &c. nam ſolicite caveri debet ne deſinentes menſes invite revocemus, cum ab hac methodo recedamus potius quam juvare, plerumque ægras ladimus, morbus ingraveſcit, & uteri hæmorrhagiæ nanciſcuntur haud facile curabiles.

III. Non ſufficit nutritionem demere, verum ut jam admonuimus nutriëntia magis alimenta interdiceret oportebit quæ chylum pinguiorem, aut ſpiſſiorem producunt, huiuſmodi ſunt, caro bubula aut vervicis, pedix, cremor orizæ, ſpiſſior, ruſcula denſiora, extracta, lac aut percolatum.

IV. Ex eodem principio deducitur ſanguinem caleſcentia, aut rareſcentia eſſe interdicienda ne uteri eorumque vaſorum reſpectu ſimiles effectus plethoræ edant, pariter prohibenda erunt tunc temporis pervigilia, animi pathemata, exercitia violentiora, ſpirituofum potum, vinum ipſum ſaltem largiori doſi, caſſe etiam & cocolatam vanillæ præſertim remixtum.

V. Cum matrimonii uſus uteri fibræ ejuſque tunicæ valde laceſſat ſanguinis curſus implicando ut ipſum cogat intra vaſa atque venoſas appendices retineri, verum contra orificia vaſorum niti; ideoque crebrior ſaltem coitus nocuus videtur in deſinentibus menſtruis, præſertim ſi laborioſi ſint aut ſanguinis jaçturam comitem habeant.

VI. Si mulieres alicui cronico morbo ſint obnoxie, cujuſque generis ſit valde timendum eſt ne ipſe circa hoc tempus augeatur, quod animadvertere fas erit ne ægræ comoveantur nimis, remedia facilius hauriant neceſſaria, & regimen obſervent, quod tunc opportunum cenſebimus.

VII. Generice ſuſpicari licebit menſium amiſſionem prompte a natura patrari modo ſcœnomeni expertis ſit, ut in bene conſtitutis mulieribus, in quibus uterus ſuum elaterium ſervat, conſpici ſolet; at in ultima catameniorum laborioſa eruptione quæ aliquo ſaviori ſymptomate comitatur prodeſt ipſam ſenſim ſenſimque & ſegniter fieri ut vaſa uteri valeant æque conſtari, & natura menſium deſicientiæ allueſcat, de cetero nihil agere debemus ut naturæ conatus ſolicitemur, aut vaſa uteri cito nimis occludantur, quod irregulariter fit, & ibi ſanguinis aſſluxus parit.

VIII. Quanto in menſtruorum ceſſatione plures copulantur circumſtantie eveniunt quandoque ſanguinis jaçtura, quandoque albi fluores, modo uteri inſectus, modo colici dolores aut vapores; pendere igitur noſtrum erit cau-

fas, atque detrimenta ab iis scemenis orta, eaque vel singillatim subjicere a vehementiori gradum faciendo, & periculosiori, vel omnes simulcompefcere, diversa remedia si fas erit copulando singulis speciatim idonea.

IX. Tandem parum fidendum est fluxui catameniorum qui post 50. annum persistit, vidi enim mulieres trans hanc ætatem mensibus polere pascantes quasi juvenes essent, at re sedulo pertractata reperi has putatas eruptiones verum morbum constituere ab ulcere aut uteri infartu, varicibus dependentem, imo pleræque mulierum quæ sibi diu mensibus gaudere suadent plerumque in cancerum, aut ulcus desinunt.

Dantur etiam puberes, quæ nono, aut decimo ætatis anno catamenii pollere periodicæ revertentibus affirmant, at id crebre consequens est vitii uteri alicujus aut vaginæ cui venæ sectionibus aut decoctionibus refrigerantibus, sero, lacte asinino & semibalneum mederi oportet. Sane verum est quantumvis natura variae videatur in speciali earum circumstantiarum scrutinio, verum tamen est ipsam constantem esse in legibus faciendis, essentialibus æconomiz animalis.

## C A P U T XII.

### *De Furore uterino.*

#### *Seu ΜΗΤΡΟΡΡΑΓΙΑ,*

*Furor Uterinus morbi genus est spurcum & propudiosum: Sed commode cadit, quod raro obvenit; attamen non ita raro, ut e Mulierum Morborum numero expungi possit, aut a Medico, qui eosdem explicandos suscepit, debeat omitti, seu a plerisque fastidium videatur, ut mox indicabitur. Ipse quidem officii mei esse duxi de illa differere, sed cum puduerit de obscænis gallice dicere, satius visum est latino sermone uti,“ (a) in quo vocabula & tolerabilius se habent, & accepta jam usu sunt, cum in omni fere Medicorum volumine tractentur.*

#### *§. I.*

#### *Descriptio.*

**F**Uror Uterinus, græcæ ΜΗΤΡΟΡΡΑΓΙΑ, derepente numquam invadit, sed per fallentia incrementa lentis passibus ingreditur, eo, qui sequitur, ordine.

I. Incidit aliquando, ut Virgines viro jam maturæ, si quem amatum perdidit ament, quo potiri non detur; ut Puellæ palestræ veneræ assuetæ, a qua accensus invitat; ut mulieres nuptæ, quæ frigido vel senî conjunctæ sunt; ut juniores Viduæ, quæ marito valido, & ad opus non segni, quo cum consueverant, sunt orbatæ, libidinose cogitent alte, fortiter, frequenter, continuo, præsertim si in libidinem proclives sint natura, quam proclivitatem intendant magis in dies, legendo milesias fabulas, quæ non teneros tantum, sed etiam lascivos amores spirant & edocent; cantitando versus fescenninos; colloquendo spississime de rebus veneris cum sodalibus; petulcis digitis sese contrahendo, aut se contrahantur patiendū; aurem præbendo faciliem virorum blandimentis,

(a) Cellus, de re medica, Lib. VI, Cap. 18.

tis, illecebris; in cibis adhibendo edulia falsa, piperata, acria; fumo indurata; vino meraciore, liquoribus spirituosius, potu Coffe, Chocolata utendo vel potius abutendo; quæ singula, aucta sanguinis acrimonia, veneris cupiditatem inflammant.

Ea quidem in principio levia, sed si pergant, paulatim ingravescent. Manent in eadem cogitatione perpetuo defixæ, a qua nolunt se dimoveri; id unum cogitant, in eo totæ sunt; cetera nec vident, nec curant; tristes, meditantur, silent vel mustitant; libidinem qua æstuant, caute dissimulantes & contegentes, quoad ejus facere possunt. At si forte quis venustus adolescens, imo si vir qualicumque occurrat, lascivientibus oculis illum cupide spectant, & si quid dixerit blanditiarum, ut communis fert usus, avide auscultant, lætæ arident, gestiunt, prævertunt serio quæ joco dicta sunt, & non tantum faciles, imo etiam paratas ultro sese præbent.

II. Quæ jam nimia est, gliscit tamen in dies egritudo; effrenata & furiosa veneris cupiditate, quasi æstro, percita, pudicitia immemores, inconsiderate multa garrunt, quæ libidinem qua flagrant, aperte produnt, & deposita omni vercundia, impotenti animo, obvios quovis, notos ignotove ad ad opus provocant, sollicitant verbis flagitiosis & turpibus. Si cunctentur, pellicunt voce, gestu, & si pertinacius renuant, probros illos insectantur alta voce, & quantum valent, conantur pugnis impetere.

III. Hucusque tamen morbus, quantumlibet gravis, intra melancholici delirii fines se continet, sed brevi in apertam maniam erumpit. Amentes vociferantur, absurda deblaterant, nutu, gestu, sermone circumstantium libidinem tentant, imo quandoque ut pelliciant efficacius, succinctæ se nudas exhibent; in reluctantibus vel segnes insiliunt furibundæ, aperte delirant de multis, si non de omnibus. Adfunt vero simul symptomata omnia, quæ maniam comitari solent, agrypnia, anorexia, fervor totius corporis, frigoris tolerantia, sitis defectus dum æstuant, pigrities alvi, urinæ spissæ, paucæ, crocæ, lutulentæ, &c.

Cave tamen putes hæc omnia in omnibus, & eodem modo concurrere; singula in singulis varie variant, pro temperie, & indole nativa, pro educatione qua informatæ sunt, pro morbi vehementia, ita ut hæc affectio sibi semper constans & sui similis, in eo quod essentielle est, sin ceteris omnibus dispar sit, & dissimilis.

Morbus ille, utcumque rarus, frequentius tamen occurrit in regionibus calidioribus, ubi intensior est causarum energia, a quibus inducitur; ideoque mirari subit (b) Hypocratem, Galenum, Celsum, Aretæum, Orisbanum, Paullum Æginetam, qui in Græcia, & Italia, Medicinam tractaverunt, de eo alte sentire. Sed mirationem majorem facit taciturnitas Medicorum, qui inter nos ante renatas literas floruerunt, eorum præsertim, qui in climate calidiore, ubi morbus ille debuit olim, ut hodie, vulgatiores esse, (c) nempe Arnaldi de Villanova, Valefci de Taranta, Bernardi, Gordonii, Gulielmi Rondeletii inter Narbonenses; Antonii Guainerii, & Alexandri Benedicti (d) inter Italos, a quibus, dum ceteros morbos muliebres explicant, morbus ille consulto prætermissus esse videtur, quasi noluissent de aëstu dicere, cujus Antiquiores mentionem nullam fecissent.

*Afruch de Morbis Mulierum.*

K 3

Sora-

(b) Addeitur tamen ex Hypocrate & ex Galeno loci unus & alter, quibus, si berig: accipiuntur morbi a verbo indicari vel perscringi videntur. (c) Illi omne: inter cetera deliriorum genera, de Amore insano Virorum in Mulieres mentionem faciunt, specialibus capitulis; sed ne jam quidem de Furore uterino inter mulieres, quos explicant. (d) Mirum profecto Alex. Benedictum de Furore uterino filere suo loco inter Morbos Muliebres, cum ipse Observationem unam referat sanæ ab utero surgentis; Lib. I. Cap. 28. de Insani; pag. n. 49.

Soranus, Medicus Græcus, qui sub Trajano principe floruit, Galeno paullo antiquior, solus est, quem sciam, qui de Furore uterino expresse dixerit. Intercederunt quidem illius scripta, sed Ætius, fatetur ab eo deproptum esse *Caput 74. Libri XVI. Operis sui de Contraſta ex Veteribus Medicina*, in quo de affectione illa diſerte quaſtio eſt. Illud autem Ætii caput inſcriptum quidem *De Furore uterino*, ſed cum hæc inſcriptio Jani Cornarii ſit, qui Ætium latine reddidit, & cujus interpretatio Baſileæ prodiit apud Frobenium, anno 1535, placuit Græcos fontes adire, ut certo noſſem, quo genuino vocabulo Ætius, vel potius Soranus ipſius, quem exſcripſit, morbum græce nominaret, in quo provinciam ſuſcepi difficilem, & opinione operoſiorem. Nam opus Ætii libros continet ſexdecim, quorum octo tantum priores apud Aldum & Aſulanum Venetiis in ſol. græce editi ſunt, anno 1535. Reliqui octo poſteriores latent adhuc inediti. Sed opportune mihi ſuccurrit in Bibliotheca regia locupletiffima quatuor eſſe integra Græca Ætii exemplaria manuſcripta; nec mora, illa pervoluavi diligenter, unde mihi conſtitit caput illud ab Ætio inſcribi *περί τῆς Μετρομανίας*.

Eodem quoque vocabulo uti memini, tum Nicolaum Myreſium, Alexandrinum, apud quem proſtrat Antidotus (e) quem valere ait *contra Μετρομανίαν* quo nomine *Furorem uterinum* intelligi extra dubium eſt; tum apud Zonaram, Historicum Græcum, qui narrat *Annaliſum Tom. III. pag. 23. Eufebiam*, uxorem Conſtantii Imperatoris, filii Conſtantini Magni, forma quidem celebrem, ſed ob maritum calamitoſam, cum natura, tum morbis mollem, & ad venerem ſegniorem, unde paulatim contabescens ante Conſtantium deceſſit, nullo unquam ſortu edito, & ut quidam dicunt, *uterino Furore percita mortua eſt*; cui *μετρομανίας νοσήματι περι-πνεύσα* ἰηλίστα.

Sunt alia quædam ejuſdem morbi nomina. Sic a (f) Moſchione, Medico Græco recentiore, ſed incertæ ætatis, (g) *Satyriaſis* appellatur. Sic a nonnullis Recentioribus dicitur *Nymphomania*, quaſi dicas *Maniam Clitoridis*, cui olim *Nympha*, nomen fuit; vel *Erotomania*, hoc eſt, *Mania amoris*; ſed a vocabulis iſtiusmodi abſtinebimus, quoniam non ſunt communi uſu recepta.

## §. II.

### *Cauſæ.*

**P**Atet attendenti in Furore ſerino duos morbos conjungi, eſſeſſenatam, & veſanam veneris cupiditatem, quæ ab uteri vitio; & delirium initio melancholicum, & deinceps maniacum, quod a vitio cerebri dependet. Si ambo concurrant, aderit Furor uterinus, de quo quaſtio eſt; ſi deſecerit alterutrum, erit vel eſſenata coeundi cupiditas ſine delirio, vel melancholia aut mania ſimplex ſine veſano veneris deſiderio. Proinde ad explicandam Furoris uterini naturam, ordine dicendum eſt.

1. De eſſenata veneris cupiditate ſimplici.
2. De eadem conjuncta cum delirio melancholico.
3. Denum, de eadem, cum in maniam abit.

*Primo* Eſſenata veneris cupiditas inducit vividiorē & fortiore ſuccuſſione organorum, quæ ſunt in feminis ſedes voluptatis veneris, haud diſpari modo, quo fames aut ſitis intenſa oritur a validiore impreſſione ventriculi aut ſaucium tunicis illata.

Orga-

(e) De Antidoto *lib. I. Cap. 118.* (f) De affectibus muliebribus, *Cap. 128.*

(g) Nomen minus idoneo, & deſecto a conſimili virorum affectu.



Organa autem, quæ in feminis voluptati venereæ excitandæ a natura destinantur, plurima sunt.

1. Clitoris, quæ omnium consensu exquisitissima est voluptatis sedes, unde vulgo dicitur *amoris dulcedo*.

2. Tota vaginæ amplitudo, quantum patet, maxime tamen pars ejusdem antica, quæ cum vulva connectitur, & angustissima est.

3. Facies interna ipsiusmet uteri, quæ & ipsa voluptatem sentit, & ad venerem sollicitat, perinde ac in fame & siti intensiore certum est ventriculum esurire & sitire. Quæ autem de uteri sensu dicimus, possunt inde confirmari quod in animantibus cesset venerea cupiditas, ubi primum utero gerunt; hebescat tunc saltem in feminis, immينو scilicet uteri sensu.

4. Debent etiam inter organa, quæ veneri favent, recenseri vasa cuncta, quæ secernendo semini vacant in feminis, quippe quæ & ipsa in consortium voluptatis veniunt. Ea autem sunt.

1. Prostrata, qui in feminis urethram ambit, & duobus ostioli seu *lacunis* ad lactera urethræ in partem vulvæ superiorem, subter clitoridem, secretum humorem ubertim profundit.

2. Glandulæ Cowperianæ, quæ in perineo, isthmi instar, inter anum & vulvam intercedente sitæ sunt, & juxta caruncularum myrtiformium radice bino ductu patefunt ad vaginæ principium.

3. Glandulæ plurimæ, solitariae, vel racematim congestæ, quibus vaginæ facies consistit est, unde humorem subviscidum semini analogum excerni certum est.

4. Lacunæ variz, cæcæ, per faciem vaginæ dispersæ, unde depluit humor limpidus & subviscidus, sed paucus.

5. Demum, oscula varia excretoria per internam uteri faciem distributa, e quibus prolicuit in actu venereo humor non paucus, subinguis, quo uterica vitas madet.

His præsuppositis, quæ in dubium venire non possunt, consequens est feminas posse vividioribus organorum impressionibus percelli, atque adeo ad venerem magis inflammari tribus de causis.

1. Si succussiones, quæ debent memoratis organis imprimi ad movendum in feminis veneris sensum & desiderium, validiores sint.

2. Si dispositio peculiaris organorum ad excipiendas illas succussiones necessaria ita intendatur, ut excipiantur vividius.

3. Demum, si concursu simultaneo utriusque causæ, & motiones inferantur organis validiores, & ab iisdem excipiantur vividius, unde debent veneris sensus & cupiditas augeri in ratione duplicata.

1. Succussiones, quibus in feminis accenditur veneris desiderium, ad tria revocari possunt.

1. Ad affricus organorum sæpe memoratorum, blandos, certi gradus & certæ speciei, quibus titillantur.

2. Ad punctiunculas lenes, gratasque, quibus stimulantur.

3. Ad morsiunculas blandas, certæ & determinatæ intensiois, quibus vellantur. Qualis autem gradus, qualisve species harumce motionum esse debeat, ut sensus veneris inde sequatur, nulla certa ratione definiri potest. Id unum liquido constat differre illas a motionibus aliis earundem partium, quibus deolor inducitur, ut motiones ventriculo & faucibus illatæ ad famem & sitim, differant a motionibus earundem partium, a quibus dolor.

Jam vero affricus muliebrium hic locum non habent, quia sunt a causis extrinsecis, quæ Furorem uterinum non producant; ac proinde in duas alias causas oportet tantum inquirere, punctiunculas scilicet & morsiunculas, quæ eodem

dem proxime recidunt, & quæ inducuntur a femine vel feminali humore depluentibus in vulvam, vaginam, uterum, & illarum partium cavitates perlucetibus.

Ille autem punctiunculae sive moriunculae vividiores sunt, atque adeo ad venerem fortius excitulant.

1. Si semen & feminales humores quantitate abundant.

2. Si acrimonia peccent.

3. Si simul abundent copia, & peccent acrimonia.

1. Abundant autem copia, si sanguis ipse, unde scaturiunt, abundet in corpore, ut in feminis.

Quæ laute & opipare vivunt, & edulia jusculentia, polytropa in cibos adhibent. In genere, ait S. Hieronymus, (a) quodcumque cupidiarum genus, omnisque ventris saturitas seminarium est veneris amoris.

Quæ mollem & sedentariam vitam vivunt, unde parcior transpiratio, quæ sanguinis quantitas non satis exhauritur.

Quæ habent organa secernendo semini a natura destinata, ampliora & patientiora ex conformatione nativa, unde uberior illius humoris secretio.

Demum, quæ ex frequenti cum viris consuetudine, & iteratis muliebrium titillationibus, uberiore gaudent feminis proventu. Sic nemini non notum est iterata suctione lac in mammis, & repetito pyalismo salivam in glandulis salivalibus copiosius secerni.

2. Semen peccat acrimonia præternaturali in feminis.

Quæ sunt temperamenti biliosi, atra-bilarii, & quarum sanguis acer, muraticus, ammoniacalis semen ejusdem conditionis subministrat.

Quæ vescuntur cibis salitis, piperatis, fumo induratis, acrioribus; quæ vinum meracius aut liquores spirituosos bibunt; quæ sese prolunt cocholata aut decocto castæ, quæ singula sunt veneris irritamenta.

Quæ sanguinis fervorem & acrimoniam intendunt vigiliis diutius protrahitis, aut animi pathematis vehementioribus, quibus sanguis exardescit.

3. Fit concursus utriusque feminis vitii, nempe copię & acrimonię, quoties concurrunt causę a quibus utrumque solet induci, quas quidem, si non omnes, at saltem plerasque non raro concurrere posse manifestum est ex affinitate, quam inter se habent.

II. Dispositio peculiaris, quæ organa quælibet ad vividius excipiendas succussiones illatas comparantur, in tribus consistit.

1. In tenuitate & exilitate fibrillarum nervearum, quibus fit, ut ceteris paribus, facilius, celerius, fortius succutiantur:

2. In tensione majore earundem fibrillarum, quæ, ceteris paribus, idem præstat:

3. In simultaneo concursu tum exilitatis, cum tensionis majoris fibrillarum nervearum, unde fit ut earundem oscillatio, ceteris paribus, faciliior, celerior, fortior sit in duplicata ratione.

1. Nervæ autem muliebrium fibrillæ exiliores sunt.

Ex primigenia conformatione; sic constat organa quædam in his sensu gaudere acutiore, quam in aliis subjectis; imo vero in eodem subjecto partes esse quasdam, quæ præ aliis sentiant acutius.

Ex iteratione sæpe repetita prægressarum succussionum, ut in illis quæ frequenti veneris usui vel muliebrium frictioni dudum assuetæ sunt, unde fibræ nervæ flexibiliores & vibratiliores fiunt; quemadmodum in instrumentis musicis comperitur est fides sive chordas, quæ sæpius pulsatæ sunt, acutius sonare.

2. Fibræ eodem magis tensæ sunt, unde vibrantur fortius,

A na-

(a) In epistolam ad Iuliam.

A nativa conformatione. Inde repetenda est diversa sentiendi facultas indiversis organis; sic videt ille acutius, audit alter liquidius.

Ab exarescentia, quæ accidit in feminis, quarum loci natura vel morbo sicciore sunt.

Ab inflammatione phlogode muliebrium, qua fibrillæ nervæ distrahuntur validius. Inducitur autem illa tensio phlogodes vel ab erethismo, in quem fibræ uteri aguntur iteratis punctationibus & vellicationibus, quas semen acrius infert, vel a catamenii instantibus, maxime si diutius morentur & substant.

3. Demum, fibræ illæ nervæ exiliore sunt & simul nimis tensæ, quoties concurrunt, si non omnes, saltem aliquæ ex causis quas memoravimus; & debent illæ sapius concurrere propter affinitatem. Quoties autem sit ille concursus, toties inde futurum est ut sensus rei veneræ intendatur in ratione duplicata tum nimis exilitatis, tum majoris tensionis fibrillarum nervearum.

III. Porro tandem, si contingat duas causas hæcenus recensitas, quarum altera a feminis copia vel acrimonia, altera a nimia fibrillarum exilitate vel tensione dependet, una concurrere, ut plerumque solent, quoniam affines sunt, fiet inde ut *bine* femine acriore & copiosiore nervæ muliebrium fibrillæ fortius lacestantur; & illine simul motiones, quæ illis inferuntur, excipiuntur vividius, quia, cum sint exiliores & nimium tensæ, magis vibratiles sunt; unde consequens est fore ut veneris sensus cupiditasque intendatur in ratione duplicata utriusque causæ.

*Secundo.* Hæcenus de effrenata in venem propensione diximus, qualis in *primæ* morbi stadio, quæ tamen Furorem uterinum non facit, nisi superveniat delirium, saltem melancholicum, de quo jam dicendum, sed paucis.

Itaque 1. *Ægrota*, utcumque veneris cupiditate ardeant, quamdiu sui composites sunt, ex naturalia dissonantia seu heterochronia fibrarum cerebri, quibus in mente refricantur ideæ tum subjecti, tum attributi hujusce propositionis, *libidini obsequi nec honestum, nec licitum est*, id verum esse omni asseveratione affirmant, neque ab ea opinione dimoveantur unquam, quantumvis affluant libidinis ardore.

2. Sed iteratis ac frequentissimis fibrarum illarum succussionibus, quæ simul fiunt, accidit tamen, ut fibræ accessu mutuo ad eundem tonum perveniant, & ex dissonis consonæ, seu quod eodem recidit, ex heterochronis evadant isochrone, unde *ægræ* mutata opinione, jam sibi suadeant *libidini obsequi baud turpe esse*, & inde *delirium melancholicum*, quod *secundum morbi stadium* constituit.

3. In principio tamen, præternaturalis illa fibrarum consonantia morbo inducta, sibi non constat perpetuo, sed varie variat diversis de causis, si veneris cupiditas hebescat; si somni quiete præcipientes fibrarum motiones compescantur; si anodynorum usu fibræ relaxentur; si fervor nimius sanguinis tepescat; si *ægræ* monitis, objurgationibus, imo verberibus ad officium revocate respiciant, unde est quod delirium melancholicum in illo morbi stadio plerumque mutabile sit; vehementia & intensio, & pariter mutabilia quoque *ægræ* dicta, factaque.

*Tertio.* Sed omnia in deterius ruunt in *tertio* morbi stadio, in quo

1. Quidem, ut morbi diuturnitate, inter se tono perfecte mutantur fibræ, quæ representant ideas subjecti & attributi propositionis allatæ, sic ille tono quoque mutantur simul cum aliis fibris non paucis, quibus excitantur ideæ variegæ, quæ ad venem pertinent, ita ut jam consonent cum fibris multis, quibuscumque dissonabant antea, unde *ægræ* debent ex illa fibrarum mutatione affirmare, quæ negabant, & negare, quæ affirmabant, & hinc delirium varium & multiplex, cui Furor brevi quoque accedet, quippe *ægræ*, a recta ratione deviaz,

viæ, & vehementiore spirituum motu concitatæ in omnes impetum facient furiatæ, quos omnes vident sibi adversari, atque inde *Delirium vere Maniacum*.

2. Notandum tamen in Mania, quæ Furorem uterinum facit, delirium tamen si latius pateat, quam melancholicum, non esse universale, sed circa pauciora aliquot objecta versari, quæ ad res venereas pertinent, ut modo dicebamus, unde prima mali labe, quod Maniæ uterinæ non proprium est, sed convenit in omnem Maniam *deuteropathicam*, quæ delirium melancholicum consequitur; contra quam accidit in Mania *protopathica*, in qua delirium multo latius patet. Sed hæc indicasse sufficiat, quæ fusius & dilucidius explicabuntur in Tractatu de Morbis Capitis, quem brevi edituros esse speramus, si Deus vitam & otium dederit.

### §. III.

#### *Differentiæ.*

Quamquam Furor uterinus morbus sit natura satis sibi constans, suas tamen patitur differentias, non essentielles quidem, sed quas tamen oportet præcognitas habere ad plenioris morbi notitiam.

Itaque Furor uterinus

1. Distinguitur ratione status, sive stadii:

1. In *Incipientem*, in quo immodica quidem salacitas adest, sed quam egræ, adhuc sui compotes & turpitudinis consciæ quam abhorrent, fortiter reprimunt, vel caute contegunt.

2. In *Confirmatum* cum delirio melancholico, in quo invalescente morbo, salacitas ita effrenata est, ut egræ jam deliræ, deposita verecundia, si sui copia ultro non offerunt, at saltem se ad opus parata esse satis significant gestu, lascivia, viva voce.

3. In *Deploratum* cum delirio maniaco, in quo morbus in Maniam erumpit, hoc est, in delirium magis universale cum furore, atque adeo in quo, deposita omni pudore, egræ, impotenti animo, plane vecordes viros quoscunque ad concumbendum sollicitant & urgent, & si renuant, in illo insiliunt furibunde.

II. Distinguitur ratione causæ in Furorem:

1. Qui a *vitiis seminis fibrillarum*, copiosioris vel acrioris, vel acrioris simul, & copiosioris, unde aucta in venerem stimulat.

2. Qui a *vitiis fibrillarum* nervearum mulieribus intextarum, quæ solito viratiliores sunt ob exilitatem, vel ob tensionem, vel ob tensionem simul & exilitatem, unde vividior sensus veneris perceptio.

3. Denum, qui a *vitiis tum seminis, tum muliebrium*, in quo omnia sunt magis intensa in ratione duplicata causarum simplicium.

III. Distinguitur ratione symptomatum, quæ superveniunt:

1. In Furorem *uterinum sine delirio*, qualis est in primo stadio, dum incipit.

2. In Furorem *uterinum cum delirio melancholico*, qualis est in secundo stadio, sive confirmatus.

3. In Furorem *uterinum cum delirio maniaco*, qualis est in stadio tertio jam deploratus.

### §. IV.

## §. IV.

*Symptomata.*

**S**ymptomata Furoris uterini diversa sunt pro diverso morbi stadio, sed cuncta ex proposita theoria facili negotio deducuntur, ceu totidem consecutaria.

## I. In primo stadio,

1. Aegre sentiunt invite se flagrare libidine, sed sibi probe conscię *tarpe* *conprobrosus* esse desiderii istiusmodi obsequi, hærent anxie, solitarię, segetes, mestę, meditantur, tacite.

2. Si nihilominus obscenis cogitationibus perpetuo defixę obtusius afficiuntur ab aliis quibuscumque sensationibus, a fame etiam & siti, & inde est quod illę nec esuriant, nec sitiant, quantacumque sit esuriendi & sitiendi causa.

3. Imo vero tam vivida est illa de rebus venereis meditatio, quę perpetuo detinentur, ut fibre cerebri, quibus illarum rerum ideę refricantur, fortiter tensę sine intermissione oscillent, ex quo fit ut illę præter naturam vigilantes sint.

4. Interim turpitudinis suę conscię, & adhuc dum mentis integre cupiditatem quę æstuant, conantur continere, vel caute contegere.

5. At vero si incederit sermo procacior, si quid blanditiarum audiant, si se illecebris tentari putent, animi impotentes male testā desideria cito manifestant.

6. Solet tamen in illo stadio morbus inducias interdum habere, quas adhibita remedia, aeris vel tempestatum mutatio, diætā accuratior, critica quadam evacuatio producant, & in quibus egrotę consideratius se gerunt, & videntur resipiscere, quamquam raro perfecte; sed dilucidis illis intervallis nimium non fidendum, quippe quibus morbus recidivus brevi succedat, priore pejor, & intensior.

## II. In secundo stadio,

1. Invalescente morbo, incipiunt tono ita perverti, ut supradictum est, fibre cerebri, quę rebus venereis refricandis natura destinatę sunt, ut cum egre certo conscirent antea *licitum non esse libidini se dedere*, jam ex errore novo, quod est principium delirii melancholici, hæreant ancipites, & interdum mente consistere videantur, insanam cupiditatem reprimendo; interdum vero deposita verecundia, libidini conentur obsequi, obvios quoscumque procaciter alliciendo, vel aperte rogando.

Si quę spes eis effulgeat fore ut adipiscantur quod cupide desiderant, hilares garrunt, blandiuntur, quos detinent, ut properent, postulant, rogant, errore ductę quo tunc cęcantur. At si sentiant spe sua se deludi, mærentes & querulę recedunt mustitando.

3. Verum omnia in dies magis ingravescant, & naturalis fibrarum tonus ita tandem pervertitur, ut illarum dissonantia abeat in perfectam consonantiam, atque adeo aegre tunc firmam sibi persuasionem inducant *facile posse se libidini dedere*, & proinde dicant faciantque omnia, quę suadet turpissimus mentis error.

## III. In tertio stadio,

1. Morbus in Maniam recidit, ut modo dictum est, & aegre mente alienata, maxime circa ea quę ad rem veneream pertinent, obscena, impudica verba proferunt continuo, obvios quosvis notos, ignotose, ad opus sollicitant, cunctantes urgent & compellunt, & si pertinacius reluctentur, eos pugnis & unguibus impetunt furibundę.

## 2. Por-

2. Porro accedunt cetera symptomata, quæ Maniam comitari solent, ut agrypnia constans, famis, & sitis defectus, fervor totius corporis, sed sine febre, frigoris tolerantia, alvi pigrities, urinarum paucitas, spissitudo, color croceus, &c. quibus explicandis superfedimus, cum non sint hujus loci.

IV. Præter hæc adfunt alia symptomata, quæ ad omnia morbi stadia perinde pertinere videntur. Sic,

1. Vellicatio fortior, quam semen acius utero & vaginæ insert, erethismos ferre continuos illarum partium ciet, unde convulsive contractæ vasa stringunt circumflua, cursum sanguinis morantur, atque adeo locum dant phlogosi, qualem pluries in cadaveribus metromaniacarum (a) observatam fuisse legimus. Ea autem phlogosis, ut interdum morbi causam esse supra vidimus, sic aliquando metum est illius symptoma, sed quo, si superveniat, morbi vehementia multum intenditur.

2. Inde minime mirum, si serveant in Metromania, & exarescant muliebria, si uteri & vaginæ parietes seu tunicæ rigeant, si vagina a rigentibus tunicis distenta tentiginæ (b) hiat perpetuo & adaperita sit, quæ singula Observatione compta sunt.

3. Vero consentaneum est inde quoque venire, quod in Metromaniacis Clitoris (c) valde turgeat solito grandior; quod ovaria ambo, vel alterutrum, tumeant præternaturaliter humore spisso, viscido, purulento; vel oculis naturalem molem excedentibus plena sint; quod tubæ ipsæmet similem labem non raro participant, ut in pluribus egrotis morbo defunctis (d) observatum est.

4. In metromaniacis virus distillat aliquando ab inguine, sive quod petulicis digitis locos contrectando perpetuo, ut venerem sollicitent, quid paucum scabendo eliciant spissum viscidumque, quod e vulva manat; sive quod ab ulcere fistuloso uteri vel vaginæ quid purulentum profundatur.

5. Liquet ex dictis in Furore uterino tumores, steatomata, hydatides, apostemata, puris colluviem, phlogosum uteri, & partium quæ utero confinesunt, sæpe numero morbum antecedere tamquam causas, vel subsequi tamquam symptomata; & quoties alterutrum evenit, quomodocumque eveniat, toties morbum induci, qui curationem nullam admittit absolutoriam, sed ex quo egrotantes, post cruciatus varios plurimosque, misera morte, tardius ciuitiusque intereunt.

## §. V.

### Diagnosis.

I. **Diagnosis morbi** evidens est signis pathognomonicis, quæ recensuimus, nempe salacitate effrenata, delirio melancholico circa venereæ, & delirio maniaco, quod melancholico succedit.

II. **Diagnosis statuum** seu **stadium** morbi non minus obvia.

1. Si adit sola salacitas effrenata, quam agræ quidem mentis adhuc integræ conentur continere, aut saltem contegere, sed ejus tamen interdum non obscura præbeant indicia, *primus* erit morbi *status*, seu *primum stadium*.

2. Si

(a) Josephus Lanzanius, *Miscellan. Natur. Curiosos. Decur.* III. Ann. 5. & 6.

(b) Christin de Helvich, *Ephemerid. German.* Centur. 1. & II. pag. 110.

(c) Citrix tunc etiam in Metromaniacis propter tractionem, quæ abundant.

(d) J. Michaelis *Praxis Clinica Specialis Casa 22* Dominicus le Duc, *Zodiaco Medico gallici Ann.* 1. Observat. 7. Fridericus Lochnerus, *Ephemerid. Germanicar. Centur. VII. & VIII.* Stephanus Blencardus, *Anatom. Prælex. Centur. II. Observat.* 99. Item *Collegium Medicophysica, Part. 1. Observat.* 28. Carolus Philippus Celsus, *Altit. Physico-medica, Folium. VII. Observat.* 30.

2. Si invalescente lascivia incipiant desipere, & delirio teneantur melancholico circa res veneretas, ac eam persuasionem in animum inducant *haud turpe esse libidini se dedere*, atque adeo ex opinione impure errante se gerant, adest *secundus morbi status*, seu *secundum stadium*.

3. Si furore actæ absurda deblaterent varia, seu delirent cum furore circa plura, uno verbo, si maniacæ sint, obvios quoscumque compellant ad opus, impudicis gestibus eos alliciant, & si reluctentur, incessant furiosæ, morbus tunc ad *tertium statum seu tertium stadium* pervenit.

III. *Diagnosis causarum morbi* vere ardua foret, si opus esset eas accuratius dignoscere, sed ea diligentia nullam præbet utilitatem ad curationem, tum quia ambæ morbi causæ, vitia uteri cum vitiis feminis plerumque concurrunt, atque ideo simul methodo eadem curandæ veniunt; tum quia si non concurrant, quod nec frequens est, nec diuturnum esse potest, eadem vel affinia postulant remedia.

## §. VI.

*Pognosis.*

**M**etromania sive Furor uterinus morbus est probrosus & dedecorosos, cuius ignominia non solum in ægrotas recidit, sed in propinquos etiam redundat.

In genere semper curatu difficilis est, quod cum delirio quovis commune habet, & tanto difficilior, quanto magis inveteratus. Quod si velis singula curiosius persequi, oportet diversos morbi status distinguere.

I. In *primo*, morbus, ut plurimum sanabilis est, dummodo diligenter ac cito illi occurratur, cum nondum accessit delirium. Frustra enim conaberis moderi, si tardius moderi cœperis, nec ullum aliud malum esse puto, in quo verius sit verbum illud, quod vulgo dicitur:

*Principiis obsta, sero Medicina paratur,  
Cum mala per longas invaluere moras.*

II. In *secundo*, ubi primum adest delirium melancholicum, malum est fere immedicabile, quod tandem in fatuitatem & stultitiam abit, nisi mortem inferat celeriores. Nonnumquam spes aliqua sanationis affulgere videtur, si morbus inducias habeat frequentes, diuturnas, dilucidas, sed quibus numquam fides certa, & sine ullo recidivæ metu, quoniam semper periculum est, ne male sopitum incendium resurgat.

III. In *tertio* demum, in quo Mania, morbus insanabilis merito censetur, cum vix spes ulla sit, fore ut ægrotæ ad saniores mentem revocentur, sed omnes absumantur (a) apostemate, ulcere, syrcho uteri, tubarum, ovariorum, quæ vitia Metromania intulit; vel in stoliditatem & amentiam morbi diuturnitate delabantur, donec mortem obeant.

IV. Indubitatis Observationibus comperta sunt sequentia, quæ ad prognosim faciunt, & quæ ideo recensere visum est.

Metromaniam sponte solvi,

I. Si

(a) Vide Auctores supra laudatos, ad *Symptoma 3. Art. 1<sup>a</sup>. 9. 10. p. 345.*

1. Si ægrotæ laboraverit immolico (b) catameniorum profluvio, seu hæmorrhagia uterina, quod inde emolliat, & relaxata uteri facie, veneris sensus redundatur.

2. Si largior supervenerit hæmorrhoidum fluxus, quod per anastomases, quibus vasa inter se communicant, venæ uteri extinganantur dum hæmorrhoides fluunt, uterique inde detumescat, & relaxetur.

3. Si fluore muliebri largo, & diuturno ægrotans colliquefeat, quo uterus madesit, & temperatur, atque adeo libidinis stimulis debilius pater.

4. Si ægra (c) imprægnetur, quod humor embryi fecundinis contentus, & inde refusus, uteri tunicas emolliat, & relaxet, & ad libidinis incentiva reddat hebetiores, sed facilis est morbi recidiva, nisi intra unum, aut alterum annum a puerperio iterum gravida fiat.

5. Si strenue subagitetur, quod felicem quidem successum pluries habuit in ipso (d) matrimonio; sed multo feliciorem, si vera narrant, (e) venire vulgigava, quoties accidit ut ægræ, quæ fugitivæ vagabantur, a nebulonibus pluribus compressæ fuerint.

6. Si uterus casu procidens aeri permittatur, dum infrigidetur. Id relatum quidem novi ab Harvey solo, sed qui unus instar plurium est. Novi, (f) inquit ille, feminam nobilem, a furore, & melancholia uterina ultra decennium delirantem, cui postquam omnia frustra tentata essent, contigit uteri prolapsus. . . . Auctor sui, pergit ille, ut uterus non reponeretur, donec a frigore externo intemperies ejus deferuisset. Successit res ex sententia, brevique postea convalescit, atque verus demum loco suo restitutus permanfit, vitamque etiamnum salubriter degit.

## §. VII.

### Curatio.

Quot sunt stadia in Furore uterino, totidem sunt morbi peculiare, qui quantumcumque affines esse videantur, & ab eadem causa inducti, ratione tamen paullisper diversa, si non specie at saltem gradu, debent impugnari, quam ideo distinctis articulis explicare necessum est.

### Curatio in primo Morbi stadio.

In illo morbi statu debent indicationes omnes eo intendere,

1. Ut sanguis acrior, semenque inde deciduum, & ejusdem vitii particeps, diluantur, & demulceantur.

2. Ut tota uteri, & vaginæ facies interna humefiat, & relaxetur, ad salacitatem morbosam, & effrenatam compescendam.

3. Ut interim ægrotes, quoad ejus fieri potest, ab oscenis cogitationibus evocentur, & in viam regressû animum ad saniora adjiciant, quæ singula sequentibus auxiliis possunt obtineri.

### I. Ad

(b) Alexander Benedictus; de Curand. Morb. Libr. 1. Cap. 28.  
(c) Dominicus Panarolus; Pentecost. III. Observ. 9. Johannes Matthæus de Gradibus, Consilio 8.  
(d) Zacutus Lusitanus; Prax. Medicæ. Admir. Lib. II. Observ. 91. Johannes Riolanus, pater, Method. Medendæ Sæc. IV. Tractat. 3. Cap. 21. Dominicus Leo; Arr. Medendæ Libr. II. Cap. 9. Ambrosius Sydenhamus; Ephemerid. Germanicæ, Decem. III. Ann. 1. Observ. 15.  
(e) Alexander Benedictus; de Curand. Morb. Libr. 1. Cap. 28. Thomas Bartholinus Observat. Anatomie. Cent. II. Observat. 69. Christoph. Johann. Langus; Praxiæ Medicæ, Cap. 24 §. XV. Uti laudat Observationem Plasteri. (f) De Partu, extremo Libro.



I. Ad diluendum, & demulcendum tum sanguinem, tum semen, profunt,  
 1. Sanguis missus e brachio, nisi exiturientia, vel exeuntia catamenia e mal-  
 leolo mittendum esse suadeant. Oportet autem sanguinem largius, & frequen-  
 tius mittere, pro ratione ætatis, temperamenti, virium agrotantium, & pro  
 symptomatum vehementia.

2. Catharsis siccuens cum purgantibus mitioribus, quorum virtus, & efficacia  
 sit idonea deducendæ primarum viarum cacochylæ, & evacuandæ cacochymie  
 sanguinis, sed que intestinis irritandis, convellendis, in spasmos agendis mi-  
 nime par sit, ne uterus in consensum trahatur.

3. Usus jusculorum aut apozematum, quæ fiunt

Cum radicibus Nymphæ

Althææ

Cichorei

Acetosæ

} ad ʒj.

Cum foliis Nymphæ

Lactucæ,

Portulacæ

Salicis,

Lenticulæ palustris

} ad m. j.

Cicutæ ad pugillos ij.

Cum floribus Nymphæ

Malvæ,

Papaveris,

Violarum

} ad pug. ij. vel iij.

Ex quibus tria, quatorve seligi debent, quæ magis probabuntur, & ex illis  
 confici jacula vel apozemata, ut artis est, bis in die, mane, & vesperi, lon-  
 ge a pastu per plures dies continuos exhibenda, addendo cuilibet salem prunel-  
 læ, crystallum mineralem, vel salem sedativum Hombergii, ad ʒj.

4. Serum lactis clarificatum, & cartha bibula percolatum ad cyathos sive  
 haustus quatuor in die, sed longe a pastu, in quorum unoquoque potest inco-  
 qui uncia una radicis nymphæ, in talleolas dissectæ, vel dilui syrupi de nym-  
 phææ semuncia. Proderit efficacius idem serum, si pro omni potu exhibeatur,  
 modo agrotæ non reſurgent.

5. Lac asininum, bis in die sumptum ad uncias novem vel decem, mane &  
 vesperi, si ventriculus illud concoquat. Imo vero, si agrotæ obsequiosæ sint,  
 & tædio hujus diætæ se faciles præstent, conducilius erit lac pro omni ali-  
 mento adhibere, & loco tum prandii, tum cænæ, ultra haustum lactis asinini  
 matutinum, & vesperinum, haustus alios duos lactis vaccini, vel edulia varia  
 lacte illo præparata exhibere.

6. Emulsiones bis in die mane & vesperi, quarum haustus quilibet fieri po-  
 test ex feminibus quatuor frigidis majoribus ad ʒʒj. vel ex

Semi.

Semine Lactucæ, Portulacæ, Papaveris albi, Cannabis.	}	a ℥ij. ad iv.
---	---	---------------

Quæ contusa in mortario marmoreo diluuntur,

In aquis Distillatis Nymphææ, Lactucæ, Portulacæ, Endiviæ.	}	ab ℥iv. ad γ.
--	---	---------------

In colatura dissolvitur

Syrupus Violaceus, Nymphææ, Althææ	}	ad ℥j.
--	---	--------

Solent ex illis feminibus, aquis & syrups eligi, quæ maxime probantur, numero tamen pauciora, & ea dosi, quæ nec nimis amplum, nec æquo spissiorum haustum faciat.

7. Aquæ minerales acidulæ & chalybeatæ potandæ per mensem, si tempestas faveat, quotidie a Libris II. ad III., addito in primis haustibus sale quodam cathartico, v. g. sale *de duobus* ad ℥iij, sale Polycresto Rupellenfi ad ℥ß, sale Epfomenfi eadem dosi. Inter aquas istiusmodi commendantur maxime inter nostrates, aquæ de *Vals*, de *Caranfac*, de *Bujan*, de *Pougues*, de *Forges*, & inter exoticas, aquæ de *Spa*, de *Selter*.

8. Dixta accurata, juxta quam ex artis legibus, debent ægræ iis potissimum cibis uti, qui humescunt, temperant, diluant, refrigerent, ut sunt Olera varia.

Cucumeres, Mellones, Borrage, Beta, Endivia,	Lactuca, Portulaca, Cichorium, Spinachia, Atriplex.
--	---

Et Fructus horæi, ut

Cerafa Fraga, Poma dulcia,	Uvæ maturæ, Pruna dulcia, Ribesia,
----------------------------------	--

Demum offæ vel cremores oryzzæ, cum jusculo tenuiore ex carne vitulina vel gallina juniore.

Interdicendæ vino, chocolata, decocto caffè, & carnibus omnibus, si vitulinam, pullosque & cuniculos juniores excipias.

Demum exhibenda narcotica, quæ sompnum concilient, si morbo parcior sit breviorque.

9. Pos-

9. Possunt propolita remedia, si videbitur, vel vicissim commutari, vel conjunctim præscribi, modo invicem congruant; sed oportet illis diu insistere, neque enim existimandum est, vitium tenax & vix emendabile, universæ humorum massæ alte inustum posse facili negotio corrigi, aut in melius verti.

11. Humefaciendo & relaxando utero apprimè conducunt interna remedia, de quibus jam abunde diximus, sed multo efficacius externa seu topica, quæ sequuntur,

1. Balnea vel semicupia in aqua fluviali egelida, in qua incocta fuerint folia plantarum emollientium, quas modo recensuimus *Articulo præcedente*, n. 3. In illa ægræ bis in die demitti solent, & ibi contineri per duas horas, jussæ manu vel spongia aquam in muliebria alte propellere, qua proluantur.

2. Clysteres frequenter injiciendi,

Ex fero Lactis,

Ex decocto, Lactucæ,  
Portulacæ,  
Umbilici Veneris,  
Sempervivi,  
Nymphææ,  
Foliorum Salicis,  
Viticis,

Quibus potest Oxycratum ad uncias aliquot addi. Ceterum semel recepti, debent diu contineri, ut refrigerationi & humefactioni interaneorum tanto certior locus detur.

3. Immisæ per metrenchyten injectiones subtepidæ.

Seri Lactis

Decocti Hordei,  
Lactucæ,  
Aliarumve plantarum modo recensitarum,

Quæ debent in uteri cavitatem caute propelli, si illius os dehiscat, ut in illis plerumque solet, & in eo aliquandiu subsistere, ægris ad situm congruum compositis. Si morbus urgeat, præderit singulis injectionis uncis addere semidrachmam, vel drachmam unam succi Solani, *Morella*-dicti, Sempervivi, imo etiam Cicutæ.

4. Pessaria in vaginam intrusa, quæ varie conficiuntur, nam modo telæ particula in formam rotuli convoluta, vel spongia mollis in longitudinem secta, spisso & frigido decocto herbarum aliquot emollientium, quas recensuimus, imbuta, vaginæ insinuat; modo vero sacculus oblongus linteus, plenus pulpæ earundem plantarum, in vaginam intromittitur; sed quæcumque fuerint, oportet introducta pessaria identidem removere, & recentia reponere, ne mora nimis incallescant.

5. Hirundines, plures paucioresve, prout opus esse videbitur, margini podicis admotæ, maxime si phlogosi tumeat, quoniam illarum suctione sanguis ab uteri vasis revellitur, quibus cum venæ hæmorrhoidales multiplici anastomosi communicant, unde depletis vasis substantia uteri relaxatur. Non is ego sum, qui velim id auxilii genus prædicare tanquam absolutorium, sed cum jurare aliquando possit, nunquam ledere, noluerim illud omitti.

*Abruch de Morbis Mulierum.*

L

III. Dum

III. Dum tentantur remedia, omni ope & opera annitendum, ut ægræ ab obfcenis cogitationibus avocentur, & melancholiz modum ponant, in quem finem,

1. Crebris cohortationibus, monitionibus, increpationibus excitandæ, erudiendæ, continendæ sunt, ut ipsæ suam lasciviam perhorrescant, & pudore suffusæ delideria sua refrægent, & tandem e corde evadant.

2. Curandum, ut consuetudinem jungant cum sodalibus prudentibus, probatæ virtutis, sed festivis & hilaribus, quibuscum possint lepide & urbane versari, & quarum exemplo & colloquio ad sanio rem mentem paulatim reducantur.

3. Occupandus illarum animus ambulatione, chorea, epulatione, villicatione, peregrinatione, ut omni gaudio expleta ab obfcenis cogitationibus, in quibus delixæ sunt, destineantur. Præstaret quidem negotia domestica illis demandare, si sedulo operam dare vellent, sed plerumque vel nolunt, vel nequeunt.

4. Caute illis interdicens omni de re venerea colloquio, libris amatoriiis, lascivis canticis; & sedulo cavendum ne viris ullis utantur familiarius, nec in consuetudinem ullum admittant omnino, præsertim eos quorum amore teneri videbuntur.

5. Prospiciendum, ut non incubent culcitæ plumæ, *lit de plume*, vel lanæ, *metelas*, unde lumbi ardenti incalescerent, atque adeo æstus muliebrum, qui jam nimius est, magis intenderetur; sed culcitæ stramento molliore plenæ, *une paille*, vel ad summum seta equina, vulgo *erin*, fartæ.

6. Ultimo, si hæc ex optato non proficiant, omiſſa cunctatione connubio jungendæ, si non obſtet vitæ institutum, cum amariis quidem suis, si commodum fuerit; sin minus, cum adolescentibus venustis, qui amabiles sunt, si non amati, quæ Medicina in illo morbi stadio certissima est & efficacissima, ut supra dictum est, §. VI. *De Prognosi*, n. 5.

### *In secundo stadio.*

Cum, accedente delirio melancholico, omnia tunc in pejus ruant, necessum est remedia adhibere diligentius, majore doſi, & selecta inter efficacissima, sed ex iisdem tamen familiis, cum indicationes curatoriz eadem sint.

Itaque

1. Balneatio adhibenda frequentior & bis in die, in aqua subfrigida, capiti iterato super superfuenda, in qua ægræ per duas horas detinendæ si fieri possit.

2. Oportet experiri omnia remediorum genera in præcedente stadio propoſita, sanguinis missiones frequentes, serum lactis pro omni potu, vel pthifanas valde refrigerantes, juscula aut apozemata diluentia, & temperantia, emulſiones aut julepos, aquas minerales, &c., quibus diu est inſiſtendum, ut morbi ferocia debelletur vel ſaltem retundatur.

3. Curandum ut ægrotis nutritio ſufficiens, imo larga ſubminiſtraretur, ſed ex alimentis euceptis, & refrigerantibus, qualia propoſuimus in præcedente stadio.

4. Si noctes ducant inſomnes, aut irrequietas, narcoſtica exhibenda ſunt doſi modo congrua, inter quas primas tenent tinctura anodyna, a gutt. xxiv. ad gutt. xxx. vel laudanum opiatum, a gr. i. ad gr. ii.

5. Purgari debent frequentius, & catharticiſ validioribus, ſcilicet in forma liquida, cum decocto ʒiſſ folliculorum ſennæ, & ʒiſſ ſalis de duobus in colatura diſſol-

dissolvendo ℥ij & addendo Diagridii gr. x. vel xv. In forma vero solida cum bolo ex Diagridii & Jalappii pulverati ana. gr. xij. additis gr. viii radices Hellebori nigri pulveratæ, ea cautione, ut dum operatur medicina, exhibeatur unaquaque hora haustus iusculi levioris carnis vitulinæ cum foliis aliquot cichorei coctæ.

### In tertio stadio.

Ubi primum Mania supervenit, morbus fere deploratus est, neque tamen omnis ægrotantium cura ideo deponenda, sed contra eo diligentius enitendum est, ut illarum miseriis, quoad ejus fieri poterit, quid levamenti conferatur.

In quem finem,

1. Frequenti balneatione opus est in aqua frigida, quæ capiti iteratis vicibus debet superfundi, & in qua ægræ detinendæ sunt quandiu vires sufficiunt.

2. Sanguis largiter & pluries mittendus, e brachio, e talo, e collo, donec imminutis viribus reprimatur ægrotantium furor, & suæ debilitatis consciz famulantium monitis sint magis obsequiosæ.

3. Mochlica purgatio sæpius iteranda cum catharticis drasticis, aut cum vomitoriis, quæ quicquid vitiosum inest non solum intestinalibus viis, sed etiam visceribus omnibus, quæ cum intestinis communicant, efficaciter subducatur.

4. Uterus fervens injecto oxycrato frigido vel parum tepido temperandus est identidem, si ægræ huc remedio se faciles præstant, ut se plerumque præstant, quoniam ipsæ quærunt remedia adversus pruritum & calorem uteri, quibus se cruciari sentiunt.

5. Aëris, si nocte insomnes ducant, ut fere perpetuum est, narcotica exhibenda, dosi quidem magna, quæ somno conciliando par sit, sed quam necessarium est partitis vicibus dare per intervalla, ne quid detrimenti succedat a nimia dosi simul & semel data.

6. Curandum, ut utantur victu largo, sed eupepto & refrigerante; ac demum si vehementius ferociant, verberibus mulcandæ, imò vinculis coercendæ, ne violentas manus sibi vel adstantibus inferant.

### §. VIII.

*Remedia quedam, quæ adversus Furorem uterinum commendantur.*

I. **A** Plerisque (a) Medicorum certatim laudatur Camphora, seu specifica ad libidinis æstus compescendos in Furore uterino. Datur in substantia a gr. x. ad xv. in quocunque vehiculo, vel forma boli. Aliquando illius frustulum granorum duodecim inflammatum in haustum aquæ projicitur, quideinde exhibetur potandus.

Miror undenam nata sit ea opinio de virtute Camphoræ anti-aphrodisiaca; an ex decantatissimo illo versiculo,

(a) Vide Michaelem Bismullecum. De Morbis Mulierum Cap. 2. Et alios passim.

*Camphora per nares castrat odore mares,*

qui non alio nitebatur fundamento, quam præjudicio falso, quo Camphora qualitate frigida esse censcebatur, quam tamen constar calidam esse.

Ipse quidem experientia compertum habeo vulgarem de Camphoræ virtute opinionem, si non falsa sit, at certe perpetuo veram non esse, nam in feminis duabus ab utero furentibus Camphoram frustra adhibui & pluries, & magnis dosibus.

II. Si Ettmullerius (b) audiatur, Furori uterino prodest efficaciter liquor limpidus & aquosus, qui extillat e teneriobus salcium ramis, dum verno tempore amputantur. Propinatur autem ille succus, vel solus, vel ex farina illo subacta placenta conficitur, quæ egrotæ data omnem ad venerem propensionem extinguit. Idem etiam facit, pergit ille, decoctum salicis junioris, aliquoties epotum jejuno stomacho, nam & hoc omnem appetitum venereum cohibet, quin & interdum mulieres omnino steriles facit.

Tam disertis promissionibus plene persuasus in feminis iisdem non liquoris ex relectis salicum ramis depluentis, qui non erat ad manum autumnali tempestate, dum illas ope medica conabar adjuvare, sed decocti foliorum salicis periculum feci iterato & magna dosi, at vero ne hilum quidem me profecisse memini.

III. Agnus castus sive Vitex ad compescendos libidinis stimulos celebratissimus est. Decoquitur in jussulis, apozematis, pchisanis, aut injectionibus uterinis. Illius virtutem usu nondum exploravi, sed vim ejus anti-aphrodisiacam merito dubiam reddunt amaror & acrimonia, quæ in masticatis foliis & præsertim seminibus percipiuntur. Adde quod Vitex ad menses ciendos (c) usurpatur, argumento maximo illum virtute anti-aphrodisiacæ minime pollere. Porro tamen, cum ex ejus usu nihil discriminis impendeat, causa nulla est cur non liceat unicuique pro lubitu periclitari, si occasio fuerit.

IV. Vidimus supra in curatione stadii primi opus esse ut ægrotæ incubent culcitris stramento molliore plenis. Volunt autem, qui viticis efficaciam laudant, ut ex foliis ejusdem siccis ægrarum culcitæ infarciuntur; exemplo scilicet ducto ab Atheniensibus Matronis, quæ in Thesmophoriis, seu sacris Cereris castitatem custodientes, foliis viticis seu Agni casti cubitus sibi sternebant, referente (d) Plinio, & (e) Dioscoride, cui consilio non repugnauero, quamvis de virtute viticis mihi certo non constet, modo prius monuero quotidianum laborem inde impendere in reficiendis culcitris, quoniam sicca viticis folia in pulverem cito resolvuntur.

V. Medici, qui de Furore uterino disseruerunt ceteris diligentius, (f) Sennerthus, (g) Riveriusque, inter alia simplicia vere anti-aphrodisiacæ, nonnulla numerant, quorum potestas longe dispar, ut Anetum, semen Dauci, lignum Aloes, Rutam, Mentham, ipsam etiam Terebinthinam, &c. quæ cum acria sint, & ad menses movendos efficacia, immoderatam veneris cupiditatem potius inflammare, quam mitigare valent, qua de re monere visum est, ne quis tantorum Virorum auctoritate motus, imprudens credat remedia istiusmodi adversus Furem uterinum cum successu adhiberi posse.

VI. II-

(b) Ibidem. (c) Dioscorides, Lib. I. Cap. 135.

(d) Hist. Nat. Lib. XXV. Cap. 9.

(e) Lib. I. Cap. 135.

(f) Prædixio, Lib. V. Part. II. Sect. 3. Cap. 5.

(g) Paresco, Lib. XV. Cap. 5.

VI. Iidem encomiis nimium extollunt remedia quædam, quæ spes datas minime impletura esse videntur. Sic Sennertus (h) laudat aquam quamdam, quam *castitatis* appellat, & quæ species est Julapi ex commixtis aquis distillatis.

℥ Aquar. *Menthæ, Chelidoniæ, Anethi, Liliorum convallium, Liliorum alborum, Nymphææ*, ana. ℥j. M. *Dosis unc. ij vel iij.*

Laudat idem aquam aliam ex plantis pluribus distillatam, quæ sequitur.

℥ Fol. *Nymph. Vitis, Salic.* ana. m. iij.  
*Laſſuc. Portulac. Umbilic. Veneris*, ana. m. j.  
*Semin. Laſſuc. Papaver. quatuor Frigidorum majorum*, ana. ℥℔.  
*Aneth. ℥ ij.*  
*Florum Nymph. m. j.*  
*Violar. m.℔.*

*Contundantur omnia recentia, & irrorentur succo Limonum, ac fient in digestionem horis 24; postea distillantur, & distillati singulis libris add. Camphoræ ℥j. Servetur ad usum. Dosis ℥ j.*

Quod totidem verbis apud (i) Riverium legere est. Sed hæc ambo remedia in Furore uterino parum prodesse puto gemina de causa,

1. Quod in compositionem admittant plantas aliquot, ut *Menthæ, Chelidoniæ, Anethum*, augendæ potius quam sedandæ veneri natas:

2. Quod certum sit aquas ex plantis distillatas minus valere, quam earumdem decocta, quamobrem in usum non veniunt, nisi cum plantæ recentes deficiunt.

VII. Cicutæ ab omnibus Medicis antiquioribus commendatur ad Furem uterinum, ex cuius sotiis contusis parabant cataplasmata lumbis & pubi apponenda, & cuius expressum succum admiscebant cum uterinis injectionibus, imo etiam guttatim infundebant haustibus variis ore assumendis; quam medendi rationem ut confirmant, adducunt auctoritatem, tum B. Basilii, qui ait (k) se vidisse quasdam feminas, quæ porione Cicutæ extinxerint rabiosas cupiditates; tum B. Hieronymi, qui (l) scribit *Hierophantas Pontificatum adeptus Cicutæ se castrasse.*

Quid de virtute anti-aphrodisiaca Cicutæ sentiendum sit, ipse ignoro, ut qui nullum periculum feci, sed opinor huic plantæ auctoritatem conciliatam esse ex falso præiudicio frigidam esse, cum e contra constet esse calidam. Sed id commodi accidit, quod jam liceat rem tuto periclitari, ex quo notum est succum Cicutæ leviter inspissatum ægris carcinomate laborantibus quotidie ad multa grana sine discrimine exhiberi, qua de re plura infra, *Libr. II. Cap. 7.*

VIII. Ut primum varia Chimix præparata in medicum usum recepta sunt, non cessare quicunque Chimix nimium credunt, ad morbos multos, & sciatim ad Furem uterinum obtrudere præparata multa ex Saturno, porissimum Saccharum Saturni, cuius grana aliquot in injectionibus uterinis, & quod gravius est, in ipsis haustibus, qui ore assumuntur, dissolvenda proponunt. Sed hunc usum, nec injuria, improbavimus supra pag. 107.

*Afruch de Morbis Mulierum.*

L 3

IX. Su-

(h) Ubi supra. (i) Ubi supra.

(k) Homil. V. supra Hexæmet.

(l) Contra Jovian.


IX. Superest quaestio majoris momenti. Nonnulli Medicorum ( *m* ) auctores sunt, ut ritillando muliebria feminarum ab utero furentium, proluvium corrupti feminis proliciat, unde prima mali labes, quod alii ( *n* ) nefas esse censent, & religione vetitum. Non nostrum est tantam litem componere, de qua viderint quos pene jus est & norma decidendi; sed illos monitos velim decisionem frustra futuram esse quod ad factum, quandoquidem ægrotantes ipsæ naturæ vel potius morbi ductu sese fricant perpetuo, nec aliena petunt aut expectant auxilia, in quo sibi pessime consulunt, ut quæ fricationibus illis cupiditatem nedum sedent, sed magis exasperant. Verum surdis canas, si eas ab illa turpitudine hortatu coneris dimovere, a qua arceri non possunt, nisi vinciantur.

( *m* ) Varandæus, *De Morbis Mulierum*, Lib. I. Cap. 5. & Antiquiores omnes.

( *n* ) Rivierius, *ubi supra*.







# TRACTATUS DE MORBIS MULIERUM. LIBER SECUNDUS

*De Morbis, qui a diversa uteri conditione dependent*

## CAPUT PRIMUM

De Uteri inflammatione.

### §. I.

*Ejusdem descriptio, & species.*



Artes omnes humani corporis præter-naturali sanguinis affluxu corripipi possunt, quem subsequuntur partis affecte tumor, tensio, rubor, calor, dolor, atque febris ipsa haud infrequenter, dummodo illa graviora appareant; hujusmodi infartus species, communi nomine *tumores inflammatorii* appellantur, qui morbi intentione diversa distinguuntur, in *phlogases* dum leviora, & *phlegmones* dum sevimora ostendunt symptomata.

Præter inflammationem tres supersunt tumorum species *Erysipela* videlicet, *Oedema*, atque *Syrrhus*; inflammatio enim, vel simplex esse potest, quæ inflammationem *Phlegmonosam* gignit, vel alterutro eorum tumorum complicata, a quibus *Erysipilatoza*, *Oedematosa*, vel *Syrrhosa* nuncupatur.

Uterus æque ac ceteræ corporis partes inflammationi est obnoxius, ab his in hoc tamen differt, quod externarum partium tumor, calor, rubor facile morbi indolem aperiant, at uteri inflammatio, in abscondito latitans, nisi per scenomena, quæ extrinsecus præsefert deduci possit.

Ex eo enim de uteri tumore, atque tensione judicamus ab aucto imi ventris volumine, ejusdemque tactui resistentia; ipsius calorem indicat regionis hypogastricæ calor; pubis, & vaginæ præsertim; ruborem vaginæ rubor ostendit, si eo usque observatio pervenerit, quod etiam a calore, quem animadvertit æger, ceterisque externis signis facile deducitur; dolorem ægræ quærelæ fatisdemonstrant,

strant, atque uteri tactu summa sensibilitas; febris tandem, uteri inflammationis indivisibilis comes, pulsibus manifestatur.

His, quæ ad uteri inflammationem essentialiter pertinent, alia plura leviora superaddantur scenomena tamen non contemnenda; hujusmodi sunt Lochiorum, aut Mensium suppressio, si tunc temporis morbus occurrat. Verum urinæ ardor, ac mingendi difficultas alvi dejectiones raræ, & molestæ, cordis anxietas, singultus, vomendi conatus, capitis dolor, sed oculorum præsertim, sopor denique, delirium, vigilie, dentium stridor, motusque convulsivi, tum pulsuum exiguitas, ac inequalitas; pubis tandem, inguinis, lumborum, femorum, atque cocigis dolor aggredi solet.

Quamvis inflammatio unam indolem constanter servet, iisdemque plerumque morbis copuletur, nonnullæ tamen differentiæ animaliverti possunt.

1. Morbi gradu, si inflammatio levioribus symptomatis affecta tumor, tensio, calor, ac dolor mitiores existant, nullaque febris superveniat, tunc *phlegosum* appellari censuimus, *phlegmonem* contra, si illa feveri, ac febris augeri minentur.

2. Morbi extensione, si inflammatio enim, quod raro contingit, totum uterum afficiat *universalis*, si illius partem aliquam *partialis* dicitur; pars hæc affecta esse potest antica, vel postica, dextera, vel sinistra, ima seu fundus, superior, seu collum uteri, quod novas producit varietates.

3. Morbi natura; nam ut supra enunciamus cum de inflammatione generice disseruimus, vel simplex erit, suumque nomen retinebit, vel eam inflammationem phlegmonosam appellabimus; aut erysipela, œdema, syrrhumque conjunctum habet, ideoque *erysipilatoza*, *œdematoza*, aut *syrrhoza* inflammatio vocabitur.

4. Postremo; inflammatio internam, vel externam uteri superficiem, aut ipsius substantiam invadit, ac tres alias inflammationis species gignit.

## §. II.

### Causæ.

**S**atis de inflammationis indole locuti sumus dum tumores examinavimus, quare ne superallata inutili sermone repetamus neminem latere putabimus.

1. Inflammationem in genere a tribus potissimum causis oriri:

Ab infartu partis affectæ utriusque generis extremorum vasorum sanguineorum, in quibus sanguinis copia lumen eorum nimis repleat, ac parietes distendat, a quo prior inflammationis gradus, seu *phlegosis* tantum originem agnoscat.

Si in illis vasibus coarctatus sanguis in lateralia lymphatica vascula irrumperet, secundum oritur inflammationis genus, seu *vulgaris inflammatio*.

Verum si sanguis labefactatis utrorumque vasorum extremis in circumpositum cellularem contextum erumpat, tertium producitur inflammationis genus, seu *inflammatio syrtrophica*, quæ ad supurationem vergit.

2. Tres vero hujusmodi inflammationis causas inter se ita conferre posse, ut maxima, vel nimis protracta capillarum repletio irruptionem in lymphaticam inducat, ac utraque ceteris paribus eruptionem faciat.

3. Quod omnis inflammationum lex eo collineet ad causas nempe statuendas, quæ vasorum sanguineorum infartum pariant, quo neglecto necessario posteriora irruptionis, eruptionisque scenomena oriri possunt, atque debent.

Hæc si uteri inflammationi applicaveris facile innotuerit;

1. Hanc peculiarem inflammationem vel a nimia repletionem uteri sanguineorum

rum vasorum; vel a sanguinis hinc orta, in lymphatica irruptione; vel a lymphæ, aut cruoris, discisis extremis vasculis, in uteri testuæruptione originem ducere,

2. Verum has duas posteriores causas a priori ita derivare, ut ad originem hujusmodi inflammationis investigandam nihil amplius requiratur quam nimia vasorum sanguineorum repletionis causas indagare.

His politis cognita sanguinis in æconomia animali circulatione facile patebit, hujusmodi repletionem a tribus præsertim causis nascisci, vel quod sanguis ad uteri vasa præternaturali confluat copia, vel quod ab iis minori quantitate refluat, quam opus requirat, vel quod ambæ hæ causæ, nimis scilicet affluxus, ac imminutus refluxus simul concurrentes inflammationem promoveant.

Ecce vobis præcipuæ, & universales causarum uteri inflammationem præducentium classes, reliquum est, ut specialiter eas perpendamus, in quibus, ut clarius procedamus, sit

I. *Classis*. Sanguis in utero redundat, si ille, qui vicinas partes debet irrigare, retrogrado cursu irritato in uterum irrumpat

1. Id evenit quoties uteri partes propinquiores jam inflammatione laborantes respuant superventurum sanguinem, ex hoc enim vesicæ, intestinorum, atque hæmorrhoidum inflammationi, uteri inflammatio succedit

2. Quoties vero in his partibus pressio sanguinis circulationem intercipiat, vel segniorem saltem reddat; qua de causa uteri inflammationem sæpe inducunt validi, crebrioresque vomendi conatus, alvi fluxus, tormina, tenesmus, atque molesta tussis.

II. *Classis*. Sanguinis necessarius refluxus minuitur si uteri venæ contractæ, aut compressæ diametro coarceantur.

1. Venas uteri contrahunt causæ omnes, quæ in eo fibras delicatiori præditas sensu, valeant crebro, vehementerque irritare, at hæc immensæ esse possunt, ex: gr:

Repentina lochiorum, aut mensium suppressio, ab subita constipatione, inopinato metu, gravi dolore orta, aut pessariorum, vel injectionum adstringentium abusu:

Validiores uteri contractiones a nimia venere, ipso adhuc infirmo, aut injectionibus stimulantibus nimis:

Fortior internæ uteri superficiei irritatio per acres injectiones, aut in ejusdem cavitate per embryonis, vel placentæ putrescentiam excitata:

Omne, quod uteri substantiam lacerare, vulnerare, aut aliquo modo ledere valet, uti abortum promovendi, contemnenda methodus; longiores, sævioreque partus angustię; secundarum aut fœtus violenta extractio, unguium læsio ab obstetricante imperito facta, vel ab aliquo instrumentorum, quibus in partu præternaturali uti solet; imi ventris vulnus usque ad uterum protractum, vel ictus, qui utero etiam damnum inferat.

2. Venas uteri comprimunt intumescencia, aut durities propinquorum vasorum.

Hujusmodi sunt uteri lactifera vasa, quæ expanduntur ab acquisita humoris lactifici spissitudine, qui in illis coacervatus indurescit; hujusmodi census sunt tubercula in glandulas enacta, ubi per vasa lymphatica fluens lymphæ mora densatur.

Tales sunt syrthi aut syrthosi infartus inter diversos uteri anfractus geniti a causis infra enunciandis cap. V.

Animadverti enim oportet causas omnes usque adhuc allatas venarum uteri compressionem paullatim generare; ideoque ab his raro uteri inflammationem oriri,

oriri, quæ est repentina vasorum repletio a celeri causa producta, illa tamen nisi immediate, mediate saltem inflammationem poterit excitare, si ipsa occurrat alterutra earum causarum consociata, atque ex eo inflammationis gradus augeatur.

III. *Classis*. Sanguis præternaturaliter in aliquam uteri partem influit, ab altera deficit, si qua simul prioris classis causa cum aliqua secundæ classis concurrat, ab hac copula; quæ facilis, & frequens est augeatur inflammatio in ratione intensitatis, & numeri causarum concurrentium.

Causæ superallatæ sufficiunt, & valent ex se ad inflammationem producendam, & ab his majores, & perniciosiores fiunt, si simul copulentur dispositiones antecedentes, quæ illas astuent, vel quæ uterum disponant ut intensiores impressiones valeat suscipere.

Ex antecedentes dispositiones duplicis sunt speciei; aliæ universales, quæ a quantitate, aut natura sanguinis dependent; peculiare aliæ, & locales, quæ specialem uteri, vasorumque conditioni rationem habent.

Generaliores dispositiones sunt plethora, sive sanguinis redundantia ejusdem expansio, aut ad rarefactionem prædispositio, quæ plethoræ æquiparatur; acris, & biliosa humorum crasis, quæ sanguinem reddit rarefactionis minima de causa susceptibilem, cui additur vini, liquorum spirituosorum, Cocolati, aut Cassie immoderatus usus; vigilie continuæ; animi pathemata, ira, nimius corporis motus, urens tempestas &c. Causæ potius sunt omnes sanguinem nimis rarefacere, atque commovere ejusdemque motum per vasa maxime intendere: Locales, seu peculiare hujusmodi dispositiones sunt; lassitudo naturalis, aut atonia texturæ uteri, a quibus deficit necessarius robor, quo vasa se contrahendo progressui sanguinis favent; obstructio, syrrhi, aut syrrhosi infartus, qui haud raro uteri fluxum inducunt; varices vasorum, quæ facile statim sanguinis permittunt; vitium quodque peculiare alicujus uteri partis, uti erosio, vulnus, ulcus, &c. in quibus impedito sanguinis circulo ejusdem cursus quodammodo intercipitur.

Reliquum est, ut ejusdem dispositionis indolem, & gradus perpendamus varias rationes investigando; quæ cum diversis uteri inflammationis causis habere possunt, quod obtineri potest recto judicio, quod efformabimus a magnitudine inflammationis pertractandæ a gravioribus scenomenis, quibus consociatur, & consequentiis, quæ præcaveri oportebit.

### §. III.

#### *Differentiarum explicatio.*

I. *Differentia*. Inflammationis magnitudinem facit duplex causa, intensitas nempe causarum producentium; & uteri conditiones antecedentes; si ex causæ ambæ simul vehementer agant, inflammatio maxima est, & phlegmon nuncupatur; si alterutra earum causarum tantum adsit inflammatio mitior evadit; tandem phlogosis dicitur, si causæ illæ leniter uterum perturbent, ut sanguinis modicum affluxum inducant.

II. *Differentia*. Inflammationis positus ab causarum applicatione dependet multiplici ratione diversa; at speciales uteri partium conditiones, aut antecedentes ejusdem alterationes hanc, vel illam uteri portionem plus minusve iis morbos causis subjiciunt.

III. *Differentia*. Præter eam inflammationem tres aliæ dantur species, quæ Oedema, Erysipella, Syrrhumque comitem habent, idcircoque si præter sanguineorum vasorum turgentiam lymphaticorum etiam adsit repletio, quæ oedema constituit, inflam-

inflammatio *Oedematosa* appellatur; id præsertim evenit quando sanguis multo sero deturpatur; *Erysipelatosa* dicitur, quando internam tantum, aut externam uteri tunicam occupat, quam gignunt obstacula ibi locata, quæ sanguinis circulum intercludunt, eamque producit sanguis acer, atque servens plus minusque pro ægrotantis indole; dum inflammationem faciunt glandulæ, tubercula, aut syrrhus, quæ in paraxifino perferantur, & post resolutionem persistant, inflammatio *Syrrhosa* vocatur; *Pblegmonosa* denique appellatur, cum a sanguineorum vasorum repletudine, aut uteri substantiæ infartu originem ducat.

IV. *Differentia*. Ipsa internam uteri faciem occupat si eam vitium producat lacteorum vasorum, aut venosarum appendicum, aut in causa sint scissuræ, exulcerationes, aut excoriationes, tum irritationes uteri internæ, quæ vulgatissimam inflammationis speciem producant; externam vero faciem deturpat si ab ulcere, ictu, aut contusione originem agnoscat; tandem integram uteri substantiam infirmat, cum ex utraque parte labefactetur uterus, quod raro evenit, vel quod crebrius accidit ex alterutra parte morbo incipiente, totam denique uteri crassitudinem ipse pervadat.

## §. IV.]

*Symptomata.*

1. **T**umor, tensio, atque uteri resistentia consequutiones sunt necessarissimæ intumescentiæ turgentium vasorum, quare ea scenomena numero respondent tumentium vasculorum, & infartus magnitudini.)

2. In puerperis lochiorum suppressio, atque catameniorum in menstruatis mulieribus ab uteri tumore procedit; nam compressis vermicularium osculis, obductisque venosis appendibus sanguinis, aut lactis fluxuri cursus interceptur; incompleta tamen eorum fit suppressio si modica sit, aut partialis uteri inflammatio, completa vero si inflammatio maxima sit.

3. Ab hac turgentia penitus dependet uteri dolor qui tendit, producit, convellit, atque fibras nerveas comprimit, quæ sunt doloris sedes; arteriarum pulsi interdum ita illas secutiunt, ut dolorem augeant, valde, ac lancinantem reddant, cum in iis circumstantiis minima de causa uterum extrinsecus prementis ad nervos usque pressio pertingat; nihil mirum igitur si uterus tunc adeo sensibilis experiatur.

4. Hujusmodi dolor prout alicui parti imi ventris propinquus est, vel aliqua communicatio datur cum inflammata uteri parte id vasorum ligamentorum, vel peritonei nexu fiat, ægræ ad hanc vel illam partem ipsum referunt, quare sæpissime de lumborum dolore conqueruntur, si inflammatio posticam uteri partem afficiat; de umbilico dolenti, si anticam; pubes vero, anusque dolent, cum uteri collum inflammatio aggrediatur antè, vel postè; inguina tandem atque femora laborant cum latera ad originem præsertim tertium ligamentorum labefactentur.

5. Calor atque rubor inflammationis sunt indivisibiles comites seu infartus consequutiones præcipuæ, quo uberius enim cruor sponte calidus, coccineusque ad aliquam partem affluit, eo calor ejusdem, ruborque intenditur; utrumque vero augeat arteriarum creber pulsus, quin inflammata parte sanguinem quasiat.

6. Febrem etiam comitem habere solet uteri inflammatio, ea si præcedat, inflammationem gignit, gignitur illa interdum ab eadem inflammationis causa; at præter hos casus inflammationi facile succedit, nam sola circuli intermissio, in hoc morbo obvia, febrem inducit, citra alias causas a quibus ori-ri valeret.

7. Raro hujusmodi febris capitis dolore, quinimo graviore experta est, nam cruror rarefactus, qui segniter per iliacas arterias turgentis uteri ergo compressus transibit, uberius in superiores aortæ truncos evehitur, ac proinde in cerebri plexum, quod gravedinem, atque dolorosam distensionem parere potest erit.

8. Quandoque sopore, aut *Coma somnolento* ægræ laborant, quod crebrius accidit si illæ plethorice sint, aut sanguine donentur spissiori, vel febris æstu nimis expanso; dehinc si sanguis a tumente utero, iliacisque compressis, superius magna ex parte evehitur cerebrum infarciat.

9. Interdum continenti corripuntur pervigilio modo sanguis inops sit, fluidior, minusque rarefcat, tum uteri volumen minus tumefaciat, arteriasque iliacas comprimat, aut ejusdem dolor intensior spiritus in cerebro commoveat, fibrasque tendat.

10. Delirium crebre in utroque casu adest rationibus alias explicandis in *Capitis Morborum pertractatione*; in priori enim casu *Coma somnolentum*, sit *Coma vigil*; in altero casu *Pervigilium* ad Delirium accedit, quandoque vero ex eo *Phrenitis* oritur.

11. Lingua arefcit tunc, febris, & calidi expirati æris causa, eoque magis infarcito capite, atque cerebro, pallato calorem communicatur, qui magis magisque linguam exsiccat, quod tamen in linguæ centro crebrius apparet, ubi causæ illæ omnes exsiccentes vehementius agunt, minusque ea pars fruitur salivæ beneficio.

12. Lingua in inflammatione non solum arida observatur, verum visciditate quadam oblitata a mucoso humore a glandulis gingivarum, atque linguæ ipsius secreto, ibique a febre inspissato; idem mucus interdum mora, aut medicamentorum assumptione nigrescit.

13. Uteri inflammatio dum partibus propinquis sensim sensimque communicatur, nova teterrima scenomena producit, idcirco si collum anterius afficiat inflammatio tunc, vel phlogosis saltem, per vaginam reptat, atque urethram, quare ægræ difficillime, aut guttatim mingunt, maximumque inter mingendum dolorem urentem perferunt; hujusmodi Stranguria, atque Dysuria ab acrimonia quandoque, aut calore oriri possunt, quem urina intra vesicam inflammationis causa acquirit, vel a sympathica constrictione sphincteris vesicæ &c.

14. Quando postica uteri pars, aut ejusdem collum inflammatione corripitur, rectum proximum intestinum pariter inflammatur, ut faeces interceptantur, aut cum dolore excernantur; id parere poterit excrementorum constipatio, vel *Sphincteris ani sympathica* craspatione phlogosis ergo.

15. Ea quæ dicta sunt, ostendunt matricem cum pluribus partibus relationem habere sympathicam, quam fusius videbimus postremo hujusce libri capite ubi de *hysterico morbo*, quare sympathiæ legibus, quæ in utero eveniunt scenomena, ceteris partibus diversis communicata ea ratione, quam superius explicavimus convulsiones excitabant plus minusque validas, atque continentes; huic causæ referre debemus convulsivam constrictionem, quæ motum cordis retardat, atque liberam ipsius dilatationem implicat, ut pulsus qui in statu febrili magni, vividique explicati reperiri deberent, exigui, duri, profundi in inflammatione uteri appareant, ut in ceteris imi ventris viscerum inflammationibus, quod non parum concurrit ad animi deliquia producenda, quibus crebre tunc ægræ sunt obnoxie.

16. Cum in hoc statu ab arteriarum atque cordis pulsibus sanguis debiliter, & exigua copia impellatur ut difficulter ad extremitates pertingat, ideoque pedes, manus, vultusque frigescent, etiam si uterus inflammatus sit, & propinque partes abdominis calcant; hujusmodi externum frigus interno fervore conjunctum

Et tum exigui, & profundi pulsi eam febris speciem constituunt, quæ viscerum inflammationem solet comitari & græco nomine *Febris Lypyria* appellatur.

17. Sympathicis interdum commotionibus, quæ alias diversas partes aggrediuntur, Singultus referuntur, Cardialgia, Cordis anxietas, Nausea, aut Vomitus, quæ in uteri inflammatione ægræ vexant; singultum atque cardialgiam gignit convulsio superioris orificii ventriculi; nauseam vero atque vomitum contractiones pylori atque totius visceris.

18. Similibus de causis utri inflammatio læcessit anteriorem duræ matris partem, atque Pericranium ubi frontem, & orbita intus obtegit quod circumscriptum capitis dolore inducit, quem in *Sincipite*, & *Oculorum radicibus* ægræ sentiunt ut caput introrsum trahi sibi suadeant.

19. Iisdem causis tribuuntur tendinum in manibus subfultus; motus convulsi musculorum maxillæ inferioris; qui dentium stridorem producant; motus convulsi diaphragmatis, qui respirationem perturbant, & visum, vel stertum involuntarium movent; verum laryngis, atque pharyngis convulsiones, quæ tum respirationem, cum deglutionem intercludunt; tandem ceterarum partium omnium convulsivæ commotiones, quæ ægras magnopere infestant; at huiusmodi motus inordinatos infra speciatim examinabimus *Capite XIII.*, ubi *De hysterico morbo*, ad quem attinent, erimus locuturi.

## §. V.

### *Diagnosis.*

I. **F**acile erit utri inflammationem detegere atque ab aliis morbis distinguere, qui cum ea aliquam affinitatem habent.

1. Ipsa uteri syrrhum, Erysipella aut veram gestationem emulatur, si voluminis augmentum tantum respiciamus; ab iis tamen clare distat dolore, calore, atque febre, quæ in illis morbis defunt, verum sollicito agresso, & incremento quibus huiusmodi inflammatio adoritur ab iisdem differt qui lente procedunt.

2. Vesicæ, aut recti intestini inflammatio illa videtur si a dolore, calore, aut febre iudicaretur, quæ in omnibus inflammationibus adsunt, distinguitur tamen per doloris sedem, quæ in iis speciatim cuique parti respondet, & extensionem intumescentiæ quæ major est in matricis inflammatione; per externum partium genitalium statum ut vaginæ præsertim, & uteri orificii, quæ tunc labefactantur valde; tandem secum excretio, aut mictus sat manifestant inflammationis indolem; in vesicæ enim, aut uteri inflammatione minime vel cum extremo dolore feces excernuntur, citra gravem molestiam vero in altera inflammationis specie.

II. Signa vero extant certissima quibus variz uteri inflammationis species determinantur.

1. Symptomatum violentia morbi gradus dignoscitur, idcirco tantum phlogosis aderit, quando dolor, tumor, durities, atque febris modice vexabunt, contra maxima inflammatio habebitur cum ea omnia sevjora supervenerint.

2. Extensionem, atque sedem morbi addiscimus per subsequenti indicia.

Si dolor pubi respondeat, ac difficulter ægræ aut dolenter mingant, anterior uteri pars, circa collum, inflammatione laborabit.

Si ossi sacro dolor respondeat, atque moleste feces expellant ægræ, posterior ocelli pars morbo afficietur.

Si lumbi doleant, uteri fundus inflammatione periclitabitur; si umbilicus, anterior pars egrotabit.

Si in-

Si inguinum aut finorum alterutrum labefaciatur, latera ibi propinqua uteri inflammatione laborabunt.

Si dolor vaginæ respondeat, & digito intromisso orificium uteri durum, renitens, aut urens perfertitur, ibi inflammationem existere fateberis.

Si dolor tandem, tensio, resiliencia totum uteri volumen occupent, atque tumor maximus sit, nullum superest dubium matricem per totum sui affici ambitum, etiamsi id inaequaliter interdum fiat.

3. Specialis patebit inflammationis indoles circumstantiarum concomitantium naturam perferutando.

Uteri enim inflammatio phlegmonosa erit, cum tumor, tensio, dolor, calor, atque febris grandiores fiant.

Erysipelatosa cum dolor, sensibilitas, calor seivissime infestent, etiamsi tumor exiguus, aut modicus sit.

Oedematosa vere quando tumor magnus, & mollis appareat, dolor tamen, sensus, calor, atque febris leviores sint.

Syrphosa tandem cum tumor resiliens citra multum calorem, dolorem, aut febrein existat.

III. Nihil interest plerumque causas hujus inflammationis detegere, verum si id utile videatur multiplici methodo certiores fieri possumus:

Temperamentum investigando sanguineum, plethoricum, aut biliosum &c.

Statum uteri antecedentem examinando laxatum, aut labefactatum in laborioso partu, infartibus obnoxiosum, & obstructionibus plenum, syrrhosum, exoriatum, aut ulcere deturpatum.

Circumstantias perpendendo in quibus morbus supervenit, in catameniorum, aut loechiorum fluxu, vel in eorum suppressione, vel post abortum, aut laboriosum, difficilem, atque diuturniorem partum.

Historiam denique percontando eorum quæ inflammationem præcesserunt, vitæ nempe regimen, excessus caloris, aut frigoris repentinos quibus se exposuerunt, ictus, aliæve lesiones quas uterus passus est.

## §. VI.

### *Prognosis.*

1. **P**artis internæ inflammatio nervæ & sensibilis qualis uterus est perniciofa plerumque, & lethalis evadit.

II. Idcirco noxa quam comitem habet hujusmodi inflammatio multiplici circumstantiarum ratione variare poterit, quas indicare satagam.

1. Pro diverso inflammatorii infartus gradu; quare inflammatio proprie dicta, seu phlegmone quod majorem infartum supponit phlogosi, periculiosior est, quam levior affluxus gignit.

2. Pro inflammationis extensione; quando ea penitus uterum, aut ejusdem maximam partem occupet parum spei supererit; prognosis tamen mitior institui poterit si inflammatio modicam partem adoriatur, inferiorem præsertim, collum uteri nempe ubi remedia commodius applicantur, & consecutionibus inflammationis facilius mederi quimus.

3. Pro diversa accidentium vehementia; tunc aliqua enim valetudinis recuperandæ spes refulget, si ea scenomena pauca, & leviora sint; at lethalis penè morbus evaserit si violentioribus tunc egrè sint obnoxie doloribus, atque continuis commotionibus, quibus addantur pervigilium, delirium, vel sopor, verum egrè sepe deliquant.

4. Pro febris indole, quæ si modica sit, nullis vel paucis exacerbationibus comi-



comitata, minus pernicioſa evadet; major aderit periculum ſi febris ardens ſit & diutinis vehementioribus exacerbationibus conſociata; tandem maximum damnum minatur, quando pulſi ardeantur, extrema frigefcunt & febris lypyria ſit.

5. Pro diverſo uteri ſtatu; ideoque ea mitior erit inflammatio, quæ ſanum aggreditur uterum, contra vero lethalis ſi labefactatam, erroſam, ulceribus aut ſciſſuris deturpatam, obſtructam, aut ſyrrhoſam matricem infeſtet, vel ſi aborti, aut diutini, & laborioſi partus conſequens ſit.

6. Pro diverſa tandem inflammationis indole; quare maximum erit pertimeſcendum detrimentum ſi ea eryſipilatoſa ſit; modicum ſi phlegmonoſa; minimum tandem ſi œdematoſa aut ſyrrhoſa appareat.

III. Quatuplici diverſa ratione huiusmodi inflammatio ſinem habet.

1. Reſolutione primum dum, cruor vaſa ſanguifera infarcitens aut lymphatica, vulgare recuperat circuitum; hæc via ſalubrior eſt & integram valetudinem reſtituit præſertim ſi retardatus ſanguis penitus reſolvatur; reſolutio plerumque ſeptimo, aut decimo accidit morbi die quod facilius ſperare licebit dum inflammatio mitior ſit, parum doloroſa, aut extenſa, earque magis phlogofiſm, aut œdema, quam phlegmone & eryſipela æmuletur, paucam vero febrem abſque gravioribus exacerbationibus conjunctam habeat, urinæ, aut ſecum excretionem non impediatur, verum a morbi initio medicis auxiliis, venæ ſectionibus poſtiſſimum non fuerit deſtituta.

2. Gangræna, quæ plerumque lethalis eſt ut ſequenti capite demonſtrabimus, tetrica valde exoritur quando inflammatio eryſipilatoſa eſt, aut phlegmonoſa, magna, doloroſa, extenſa atque urentem febrem crebris exacerbationibus copulatam comitem habet; vel uterum aggreditur jam ægrotantem, excoriatum, ſyrrhoſum, ulcerofum, atque a difficili partu lacellitum, neglectis idonea occaſione medicinz ſubſidiis; tempus quo gangræna aggredi ſolet intra quartum eſt & decimum aut duodecimum diem, ab altiori nempe inflammationis gradu ad certa reſolutionis vel ſuppurationis (non confeſcituræ tamen) indicia perſiſtens.

3. Suppuratione etiam morbus judicatur; ea naturam ſanguinis ſtagnantis pervertit qui vaſa aut cellularem uteri tunicam replet, ipſumque in pus convertit quod abceſſum aut apoſtema gignit intra uteri ſubſtantiam, periculoſum valde atque moleſtum, ut infra videbimus; illa tunc erit ſuperventura quando morbi circumſtantie mediæ ſint inter eas quæ reſolutionem, atque illas quæ gangrænam poſcunt; ſuppuratione enim erit expectanda quando inflammatio magna ſit non maxima tamen, phlegmonoſa ſed non eryſipilatoſa, cum febre conjuncta non tamen ardenti aut lypyria; ſi ea matricem perturbet, aut ſanam, aut parum infirmam; verum morbum ab initio ſatis ſubijcere, etiamſi non diligentiffime, medici ſatagiſſent, niſi poſt diutinum tempus retardatus ſanguis attenuabitur, atque ſolvetur ita ut in pus abeat, quare ſuppuratione plerumque niſi ſeptimo die apparebit; interdum etiam duodecimo, aut decimo quarto ſolum manifeſtabitur.

4. Syrrho, aut ſyrrhoſa duritie, quæ pertinacem morbum in utero relinquit curatu difficillimum, & tetricis conſecutionibus obnoxium de quibus inferius locuturi erimus; nedum ſyrrhus inflammationi ſuccedit niſi prius obſtructiones, glandulæ, tubercula, aut ſyrrhoſiſmores præceſſerint, qui inflammationem induxerunt, aut ipſam magnopere auxerint, iſdem de cauſis, quæ morbum produxerunt, quæ tandem manifeſte ſunt poſtquam reſolutio inflammationem diſſipaverit.

## §. VII.

*Curatio.*

**T**Res potissimum indicationes implere nostrum erit in uteri inflammatione subigenda.

1. Affluxum sistere cruoris vasa insarcientis; peractum jam infartum imminuere; atque ea methodo inflammationis progressus interciperi, eorumque violentiam compescere.

2. Fibras relaxare uteri contractas ut minus ramificationes capillarium vasorum constringant, neve magis sanguinis circulationem retardent.

3. Dolorem sedare qui phenomena ea intendit, atque potissimum in causa est contractionis aut tethismi fibrarum matricis.

1. Prima earum indicationum gravissima est, atque magis morbi valetudinem fovet; eam brachii venæ sectione pluries & cito repetita implemus donec ægræ vires permiserint, uberius, initio morbi præsertim, sanguinem extrahendo.

Haud facile est determinare numerum venæ sectionum aut extrahendi sanguinis copiam in hoc casu magis idoneam, cum id pro morbi gradu, ægrotantium viribus, atque temperamento variare soleat, generice tamen duobus prioribus diebus sex, septem, aut octo venæ sectiones institui possunt, quorum tres, quaterve priores quatuor cucurbitulas singulæ æquent.

Neque pulsuum exiguitas, neque extremorum frigus in inflammatione uteri obvium quod plerumque febrem lypyriam constituit minime phlebotomiæ usum interdicare potis erit, modo aliunde morbi occasio ipsum postulaverit; in eo casu tamen mitiora cordialia qualia superius proposuimus opportunissima sunt levioribus narcoticis remixta ad pulsuum suscitandum, atque doloris intensitatem compescendam, quæ morbum pertinaciorem reddit.

Veteres in uteri inflammatione cucurbitulis, frictionibus, vinculis utebantur, quæ venæ sectionibus substituebant, at hujusmodi remedia futilitatis causa hodie obsoleverunt; frictiones interdum permitti possunt, modo circa artus superiores instituantur; vel si ægræ laxæ nimis appareant, scapulis, aut mammis possunt cucurbitulæ applicari; vincula tamen nocua evadunt, penitusque contemnenda videntur.

II. Multiplici methodo secunda absolvitur indicatio, alterutram eligendo pro circumstantiarum ratione, vel utrasque successive tentando.

1. Potus uberrimus demulcentis, atque refrigerantis pthiasæ ex leviori perfectæ decoctione radicum Althææ, Nymphææ, vel ex jure pullorum simplici, additis etiam contusis amygdalis; emulsiones locum habent dilutiores ex seminibus frigidis coctæ, & per linteum percolatæ, syrupus hordeaceus cum tepenti aqua, aut citrea potione simul quasatus.

2. Oleum usuvenit amygdalarum dulcium sine igne paratum & syrupis remixtum Bismalvæ, Pavaveris rubri, aut Citri; ejusdem morbi initio tres, vel sex uncias æquabit, cum dimidio syrupi plerumque; quandoque mane exhibetur per duas vices cum decoctione quadam laxante si alvum ciere oporteat, interdum repetitis vicibus per integrum diem.

3. Frequenter clysteria adhibentur refrigerantia, annodyna ex decoctionibus radicum Althææ, Nymphææ; foliorum Malvæ, Violarum, Lactucæ, Solani; florum Malvæ, Violarum, Verbasci; seminum Lini, Papaveris albi, quibus adduntur uncia, vel duplex uncia olei rosati, aut amygdalarum dulcium sine igne parati.

Alia denique consurgunt etiam ex decoctionibus Omasi, Puli & sero lactis vel

vel ex emulsionibus coctis, & percolatis addendo unciam semis syrûpi Papat-  
veris albi, aut unam Nymphææ.

4. Injectiones vero vaginæ aut uteri profunt, quæ de causa decoctiones su-  
muntur foliorum Bismalvæ, Nymphææ, Malvæ, Brancæ-urcinæ, Solani &c.,  
aut lac Caprinum ebutyratum cum anatina aquæ rosarum quantitate copulatum,  
vel serum depuratum, in quo infundatur croci parum, aut Laudanigrani dimi-  
dium, tandem mucilagines ex feminibus Lini, Psilli cum aqua rosarum extractæ  
addito tertio albuminis ovi bene quassati.

Si injectiones solum vaginam intrent, infirmæ experiuntur virtutis, citoque re-  
fluunt; efficaciores itaque evaserint, modo uteri collum inflammatione afficiatur  
cujus ostium sit partium turgentia obsectum, at si hujusmodi ostium patu-  
lum sit ut siphonis tubulus intromitti queat; uteri cavum injectione irorare magis  
saluberrimum erit, ut necessarium levamen prestat; verum multa requiritur pe-  
ritia ne canaliculo aut vehementiori injectioni impulsu, uterus ledatur.

5. Cataplasmata pubi, aut regioni hypogastricæ applicata, valde conveniunt  
ex pulpa confecta, plantarum emollientium, quales sunt Malva, Althæa, Bran-  
ca-urcina, Portulaca, Lactuca, Solanum, Hyusciamus, quibus additur mica pa-  
nis, lac; solani, aut hyusciami succus excoctus, aut oriza lacte cocta, vel Lini  
semina, quæ omnia additione pauci olei rosati diluuntur.

6. Fomenta demulcentia cum saturatori decoctione stirpium dulcificantium  
nuper indicatarum, vel cum lacte repenti, quæ pubi, aut regioni hypogastricæ  
apposita cataplasmatibus vices gerunt, modo uteri sensus maximus sit, neve æ-  
græ cataplasmatibus pressione valeant sustinere.

7. Embrocationes, quæ interdum fomentationibus substituuntur modo in-  
flammatio scilicet appareat, aut fomenta ægræ fastidiant, illæ oleo amygdala-  
rum dulcium rosato, patrantur, addito etiam paucio unguento Althææ, aut Ace-  
to; interdum sat erit linteam apponere cerato Galeni oblitum.

8. Pessaria tandem ex pulpa plantarum emollientium confecta, quæ proposui-  
mus ad cataplasmata subiigenda. Hujusmodi pulpa linteolo obtegatur, quæ in  
mulierum vagina intromittitur; filiabus vero vulvæ tantum sub cataplasmatibus for-  
ma apponitur.

III. Ut tertiam impleamus indicationem necesse erit:

1. Topica relaxantia, & annodyna exhibere, quæ nuper proposuimus eorum-  
que usum continenter servare usque dum pars affecta laxetur, eaque laxata do-  
lor imminuatur.

2. Narcotica etiam usuyeniunt modo simplex partium relaxatio impar sit  
morbum levare; narcotica usitiora in hoc casu decoctiones sunt capitum pa-  
paveris albi, ejusdem syrupus, aut Diacodii, Laudanum, Tinctura Annodyna,  
pillulæ Cinoglossæ &c., quæ pthifanis, clysteribus, injectionibus &c., superaddun-  
tur, aut secundum exhibentur; verum nisi exigua dosi propinantur, quarta aut  
quinta quæque, hora tali pacto ut doloris vehementia compescatur absque quo ægræ  
sopore afficiantur; patet enim dum ægræ stupidæ sunt morbi causa inopportuna  
esse hujusmodi remedia.

*Cautela generales, quæ hujus inflammationis medellam respiciunt.*

I. Valde necessarium videtur quod ægræ continenter lectulo detineantur ita-  
pra dorsum quiescentes, & divaricatis cruribus nonnihil genibus inflexis pulvino-  
rum etiam auxilio ut in hoc statu uterus persistat magis idoneo; optimum tunc  
erit consilium calcitras crinibus repletas potiusquam lanugine ipsis subtus pone-  
re, verum tum corium marocchino dictum quod crebre mutare oportebit, ne re-  
nes nimis caleant, interdum ceratum Galeni aceto confectum, & supra lin-

*Afruch de Morbis Mulierum,*

M

teum

teum extensum renibus applicabimus, tandem ipsis silentium, & animi tranquillitatem commendabimus pro valetudine recuperanda necessarissimam.

2. Agrotantes alere necesse erit decoctionibus levioribus vituli, pulli, vel ex simplici aqua pullorum; saluberrimum pariter erit cum iis simul ebullire plantas refrigerantes Lactucæ, Endivix, Boraginis, Oxalidis, aut nodulum seminum Mellonis mundatorum, & confusorum, modo illæ emulsione non imbibantur supra fulmentum seminum frigidiorum transfabendo; etiamsi exquisita hujusmodi dicta videatur, in ea tamen erit persistendum per quatuor aut quinque dies morbi initio, postquamquod modo opus requirat, decoctiones saturiores perfici poterunt ex majori pulli, aut vituli copia, bovillam carnem interdicendo, donec resolutio inita sit, verum prudentis Medici erit primis saltem diebus orizarum cremorem, tantum addere, de cetero nihil immutando.

3. Urinas ciere curabimus per refrigerantia ac antiphlogistica remedia diurescem promoventia, quæ febris ardorem atque inflammationis compescere valeant, hujusmodi sunt nitrum depuratum, SalPrunellæ, aut sedativum Hombergi ad drachmam semis pro quovis phisicæ cenesoro, abstinendum tamen erit a calidis diureticis, quæ febrem aut inflammationem augent.

4. Quando pulsi debiles sunt, levioribus cordialibus revivificabuntur, quæ aliqualem madorem excitent, atque partium constrictionem subducant; hujus tenus videtur potio ex aquis composita Card. Bened., Scabiosæ, Ulmarix, quibus addi poterit drachma una confectiois Hyacinthi, aut Alkermes, verum unum vel duo coclearia aquæ florum aurantiorum, aut Cinnamomi hordeaceæ & si cui libuerit guttæ nonnullæ addi poterunt Tincturæ Annodynæ, modo alia narcotica non adhibeantur; verum guttæ aliquot Tincturæ Lilliorum, vel grana nonnulla Salis Volatili Viperarum; caute tamen ea urentia Cordialia propinare fas erit, ne febrem aut inflammationem augeant, atque nocua potius quam utilia evadant.

5. Primis transatis diebus modo vasa depleta fuerint idoneis venæ sectionibus, verum imminuatur inflammationis dolor, primasias blande expiare oportebit apozematibus plantarum demulcentium, & emollientium Boraginis videlicet, Lactucæ, Endivix, Cicorii, addita uncia una Mannæ, aut Pulveris Cassiæ, pro singulis vicibus ter quaterve, in die tertia quaque ora repetitis, vel haustum fiat ex Cassia soluta in duplici, aut triplici cratere feri lactis depurati; hujusmodi leviora laxantia tollunt, vel saltem imminuunt inflammationis exacerbationes, quæ maximum prænunciant detrimentum, atque novum uteri infartum.

6. Si cognoveris ex imminuta tensione aut sensibilitate hypogastri resolutionem incepisse, resolventia tunc leviora poterunt adhiberi, quæ ei faveant, quæ de causa injectionibus, aut cataplasmatibus erunt superaddenda semina Fenigræci, aut folia Artemisix, Matricariæ, Pulegi cum ceteris herbis emollientibus, aut floribus Cammomelli, & Melliloti ebullita.

7. Quando resolutio jam perfecta, vel saltem valde inchoata videatur per aliquot dies decocta duo, seu apozemata quotidie mane videlicet, & vespere fumant ægræ ex foliis ebullitis confecta Scolopendræ, Pimpinellæ, Agrimonix, Fragariæ, cuique addendo drachmas semis Salis admirabilis Glauberi, verum ægras validius purgare oportebit decoctione Tamarindorum, Sale Végétable, Cassia, Manna, additis etiam aliquibus fennæ glomis, si opus requirat.

8. Tandem si album, aut rubrum effluvium superveniat statu, vel decremento inflammationis, nefas erit eo mederi, imò lætaberis quod iis natura conatibus uterum depleat, modo post resolutionem non persistat, tunc enim ipsa remediis superius in hoc morbi genere propositis sistere oportebit.

*Praxis a nonnullis Auctoribus propofita, infirma tamen, vel fufpecta.*

I. Medici diu inter fe difcreparunt circa venam in uteri inflammatione fecandam magis idoneam; Galenus (*a*) clare, duplici loco admonet eam ex *Po-  
phite* feindere vel faltem ex *Malleolo* potius quam ex *Cubito*, circa quod a fe ipfo aberrare videtur cum identidem contrarium (*b*) doceat; (*c*); Oribafius; Pau-  
lus (*d*) Aegineta, & Aetius (*e*) una brachium fecare iubent, tandem Avicenna  
(*f*) & Auctorum catervam, qui poft eum fcripferunt, excepto (D. Arnaud de Vil-  
leneuve) (*g*), Galeni affecta, opiniones conciliarunt initio morbi cubitum,  
& fine pedem incidendo.

Hodie Medici circa hoc in unum conveniunt; autumant enim prius venam  
cubiti effe incidendam, quæ utilitates complectitur revulfionis, & evacuationis,  
excipitur ea tantum inflammationis fpecies, quæ a lochiorum aut menftruorum  
fuppreffione dependet, ut iis aliqua ex parte adhuc fluentibus pedum venæ fe-  
ctione fpes fuperfit ipfa revocandi, quare ea fectione incaffum adhibita, perfif-  
fente nempe fuppreffione, ad brachii incisionem erit deveniendum, ut efficacius  
ab utero infarciens fanguis revelatur.

II. Quandoque animofe præfcribunt in uteri inflammatione frictions, vincu-  
la, aut cucurbitule leves, vel fcarificata, difcrepant tamen ubi fint apponenda;  
(*b*) alii fuperius brachiis, fcapulis, dorfo, aut mammis applicant, alii inferius  
coxis, cruribus, aut pubi apponunt.

Nunc pene exoluerunt huiusmodi remedia, quæ ægras nimis vexant, & venæ  
fectionibus valde infirmiores funt, at fi fententiam explanare noftrum foret  
juxta circulationis leges, vincula primo proferiberemus cuique parti applicita  
valde nocua, frictionum vero, & cucurbitarum refpectu earum actionem fimilem  
effe oftendimus, ac de venæ fectionibus dictum eft.

III. Galenus (*i*) contendit ægras tunc fomnum capere, faluberriimum effe,  
cum illud inflammationem intendere credat; huic fententiæ certo quoddam  
modo (*k*) Hippocrates interdum adhæret; nil mirum ergo fi iis auctoritari-  
bus fuffulti plures Medici (*l*) eam amplexi fint; non defunt tamen alii plures  
(*m*) qui narcoticorum ufum strenue defendunt, quod communiter hodie re-  
ceptum eft; ea nihilominus interdicere necesse erit quando inflammatio fopo-  
rem inducat ubi fruſtranea videntur; utiliter potius exhiberi poterunt dum ægræ  
gravi, & acutiori dolore cruciantur, difficulter quiefcunt, vel mente aberrare  
incipiunt, aut delirio furenti laborare.

IV. Avicenna (*n*) vomitum excitare fuadet quare, plures hoc (*o*) Medici  
com-

M 2

com-

- (*a*) De curandi ratione per venæ fectionem Cap. 18. Method. Medend. Lib. XIII. Cap. 11.  
(*b*) Lib. II. ad Glaucum Cap. 2. & 4. (*c*) Synopses, Lib. IX. Cap. 50.  
(*d*) De re medica. Lib. I. Cap. 64. (*e*) Terrabibi. 4. Seru. 4. Cap. 83.  
(*f*) Lib. III. Feu. 21. Traſt. 4. Cap. 12. (*g*) Practic. Medic. Lib. II. Cap. 11.  
(*h*) Aetius ubi fupra. J. N. Varandæus. De Morbis Mulierum, Lib. I. Cap. 7. Viſtor Trincavellius.  
De Partu Curanda particulæ. hum. corp. affectus. Lib. II. Cap. 14. Daniel Sennertus, Lib. IV. Part. I.  
Seſt. 2. Cap. 13. Guilj. Rodicetus, Method. Curandi Morb. Lib. III. Cap. 72. Diony. Fontanus,  
Pract. Lib. III. Cap. 26. Rodericus a Castro, De Morb. Mulierum Lib. II. Cap. 17. Barthol. Pederleis,  
Univerſ. Medis. Lib. XIII. Seſt. 8. Cap. 16.  
(*i*) Comment. IV. in Seſt. 4. Text. 17. Lib. VI. Epidemior. Comment. in Aphorism. 2. Lib. II.  
(*k*) Epidemior. Lib. VI. Seſt. 4. Text. 22. De riſus anti. ut Lib. VI.  
(*l*) Avicenna ubi fupra. Valerius de Taranta, Philoſ. Lib. VI. Cap. 14. Rodericus a Castro, ubi fu-  
pra. Petrus Foreſius, Obſerv. Lib. XXV. II. Obſervat. 11. 42. 43. Lud. Mercatus. De Morb. Mulierum  
Lib. II. Cap. 17. Hier. Mercatus, De Morbis Mulierum Lib. XIV. Cap. 18. Jean El-baul, Des Malen-  
dies des Femmes Liv. II. Chap. 14. Lazare Pe, Des Maladies des Femmes Lib. II. Chap. 23.  
(*m*) Johannes Varandæus, ubi fupra. Dan. Sennertus, ubi fupra. Lazar. Riveſius, Prax. Medic.  
Lib. XV. Cap. 7. (*n*) Lib. III. Feu. 21. Traſt. 4. Cap. 12.  
(*o*) Bern. Goronius, Lulu Partientia VII. Cap. 14. Dion. Fontanus ubi fupra. Val. de Taranta  
ubi fupra. Lud. Mercatus ubi fupra. Viſt. Trincavellius ubi fupra. Rodericus a Castro ubi fupra.

commendantur remedium quasi revulsivum, ac proinde valde salubre; id tamen merito contemnerunt (p) Medici alii plures creduli minus, & proveciores, at hujusmodi praxim tunc temporis amplecti fas erat citra noxam, nam emetica quibus veteres utebantur parum, vel nihil vomitum excitabant, in præfentiarum vero nostra validiora sunt, antimonialia præsertim, quæ maximas succussiones concitando tum inflammationem cum uteri dolorem augere valerent.

V. Paulus Æginetta (q), prohibet tribus prioribus diebus ægrasclere, quod profectus est Aricenna (r), & alii multi (s), quorum tamen plerique ab ea sententia recesserunt; certum enim est exquisitam dietam, in acutis morbis convenire, quod omnes Medici defendunt, imo quandoque sola pthiana eas substinere oportet initio saltem morbi, ex eo tamen arbitror universalem legem sancire nequi, verum cum sapienti Medico (t) suspicor hanc Pauli opinionem non ab experientia, sed a præoccupatione methodici sistematis in quærebatur fuisse desumptam; circa hanc rem Clerc. consulto, *Hist. de le Medecine Liv. 4. Sect. 1. Chap. 7. & Gorreum, Definit. Medic. in voce d'expect.*

VI. Nonnulli (u) Auctores in uteri inflammatione iniectiones annodynas laudaverunt in vesica intromissas potius quam utero; illuc enim diutius ille morantes utiliores evadunt, præsertim si inflammatio collum uteri occupet, verum in iis circumstantiis ipsas difficiliter adhiberi poterimus; nam inflammatio vesicæ collo communicata impedit quominus siphonis tubulus apponatur procul acerbiori dolore, quare hodie hac de causa, vel pudoris ergo hujusmodi remedium pene obsolevit; at si eo uti libuerit prius intestina clysteribus expiare oportebit, ut dilatationi vesicæ majus spatium relinquatur, animadvertendo tandem, ne uno eodemque tempore simul uterum, vesicam, & intestina injectentur, quod partem affectam fortassis nimis premeret.

VII. Plures Medici (x) interdum applicabant animosæ pubi, aut vulvæ frigida topica, aut aceto parata, itaque cum ea ardorem nonnihil inflammationis confecerent, latabantur valde ægræ; at levis hujusmodi utilitas praxim hanc minime debet confirmare, quæ nocuas consecutiones præstat; ea enim medendi ratio sanguinem inspissat, ipsumque intra vasa retardat capillaria, circa quæ immediate agit, resolutionem impedit, atque gangrænam haud infrequenter, supurationem, aut syrhum inducit; quamobrem jugiter anteponenda sunt utilitates persistentes palliatio levamini, incerto plerumque, verum tepentia tantum, & relaxantia remedia erunt apponenda.

VIII. Olim topica adstringentia, & repellentia communiter recepta erant, ex bolo, composita sanguine Draconis, Terra Sigillata, Gallis, Balsamis, Corticibus Granatorum, Coriaria, Santalis, & Saccharo Saturni &c.; at hujusmodi remedia hodierna die suspecta, valde, & perniciose experiuntur, quia fibras erodunt atque lacescunt partis affectæ, verum vasa capillaria constringendo circulationem sanguinis implicant, quod inflammationem auget, resolutionem retardat, & gangrænam, supurationem, aut syrhum frequenter inducit.

IX. Clinici nonnulli (y) quandoque docuerunt in uteri inflammatione subsecuens balneum valde prodesse, quod latine *insejuss* sonat, pro filiabus præfertim

(p) Varandus, ubi supra. Scennetus, ubi supra. Riverius, ubi supra.

(q) Ubi supra. (r) Ubi supra.

(s) Donat. Anton. ab Alconari. *De Medendo humani corporis affectibus*. Valec. de Taranta ubi supra. Dionysius Fontanus ubi supra.

(t) Petr. Salvo Diverius. *Amuletis*. in Donat. Anton. ab Alconari Cap. 106.

(u) Jeen. Liebaux, ubi supra. Lixare De ubi supra.

(x) Gordonius, Fontanus, & Casiro, Rondeletius ubi supra.

(y) Valesc. de Taranta, Bernard. Gordonius, Dion. Fontanus ubi supra, Jacob. Prime-ossus. *De Morb. Mulier.*

sertim quibus neque injectiones intromittere, neque pessaria apponere facile est, illud paratur ex decoctione emollienti, & annodyna qualis pro fomentis adhibetur, at hujusmodi praxis inconcinna experitur; nam vel hujusmodi decoctio magis frigescit quam madida pars, & tunc remedium eisdem nocuus effectus afferret quam topica frigida applicita, vel calefcit valde, & tunc augetur inflammatio ad humectatam partem sanguinem trahendo, ut in pediluvii, aut pedum venarum sectionibus evenire compertum est.

X. Jonstonus (2) subsequens remedium valde commendat, quod inflammationem uteri sistere potius esse autumat. Putatur, ait, inflammationem uteri proprietate quadam sistere; fit enim ex decoctione Serpilli cum aqua chalybeata confecta, qua spongiz imbibuntur exque extrinsecus uteri regioni applicantur; videtur enim Jonstonum ab aliis auctoribus hanc opinionem desumpsisse, eumque valde credulum fuisse; hoc remedium enim quod serpilli ergo resolvit, calybeataque aquare ratione valde constipat, ideoque morbi decremento potius locum habere potest, quando progressam jam resolutionem fovere fas erit; verum nocua valde experiri poterit morbi initio, ut Jonstoni verba suadent.

## C A P U T II.

## De Gangrena, seu uteri sphacelo.

## §. I.

## Descriptio, &amp; Differentia.

**G**enerice gangrena, & sphacelum, duo species sunt, corruptionis, & macerationis, in quibus pars ægrotans livida, aut nigra fieri solet, caloris atque sensus non parum amittit, vel iis quandoque prorsus orbatur, neque vixit amplius circulationis sanguinis lymphæ, aut spirituum animalium favor.

Hujusmodi corruptionis species, sane nihil inter se, nisi gradu, differunt; modo aliquis reliquus sit sensus aut calor, verum pars affecta livida tantum nondum nigerrima appareat, atque sanguis lymphæ, vel spiritus animales, etiam si imperfecte aliqualem circulum fervent, morbus Gangrenæ tantum appellatur; Sphacelum vero dicitur quando pars corporis ægrotans calore penitus atque sensu orbetur, nigerrima appareat, & sanguinis, lymphæ, vel spirituum animalium circuitus interceptatur.

Præter ea distinguitur gangrena in humidam, in qua pars macerata multum pus icoremque per ulceris marginem effundit; & in siccam in qua pars corrupta indurefcit, cornea fit, sanas partes simul agglutinat, magis quam in statu naturali; hujusmodi differentia magis sensibilis fit, quo magis gangrena ad sphacelum accedit.

Cum utraque morbi species omnes partes humani corporis æque aggredi possit, ideoque neque uterus, & propinque partes, vagina nempe, vulva liberæ evadunt; hæc erit hujusmodi capitis materies.

Observatione didicimus necdum vagina, aut vulva alterutra morbi specie corripi nisi tribus subsequentibus casibus.

1. In vehementiori harum partium inflammatione, & id plerumque nisi in violentiori morbi statu supervenire solet post tertium videlicet, aut quartum morbi diem, ad septimum usque aut octavum.

Afruch de Morbis Mulierum.

M. 3.

2. In

(1) Joh. Jonstonus, Idea universa Medie. practie, Lib. X. Tit. II. Cap. 2. Artic. 4.

2. In descensu uteri grandiori quando corpus uteri foras labitur, aut maxima vaginæ pars, verum in hoc statu prolapsa pars diu persistat, eaque de causa comprimatur valde, atque constringatur.

3. in ulceribus phagedenicis, quæ intimam uteri, atque vaginæ faciem rodunt, quod pariter evenit in scissuris, excoriationibus ejusdem partis deleterig indolis plerumque, quæ uteri internum profunde incidunt.

Communiter gangræna, quæ in priori, aut postremo casu supervenit, humida est; contra vero, fixa in secundo casu expertur.

Quand æque ipsa omnem uterum aggreditur sed raro, quandoque ejusdem partem aliquam, at plerumque collum aut orificium quod a parte inferiori contractata originem ducit.

Interdum morbus cuaque versum uteri crassitudinem penitus aggreditur, raro externam faciem tantum occupat, frequentius tamen internam superficiem infestat.

Tandem modo solam matricem afficit, modo vaginam, atque vulvam, citra uterum; at haud infrequenter utrumque, collum nempe uteri, & fundum vaginæ offendit.

Cujusque indolis sint gangræna, aut sphacelum, qualemcumque partem uteri afficiant, vel quibuscumque circumstantiis conitentur, symptomata consecutura semper eadem experiuntur: pulsus exiguus est, frequens, atque profundus, ægræ vero oripilationibus, tremoribus atque universæ cutis convulsivis succutionibus sine causa manifesta laborant, eo præsertim tempore quo parum vel nihil doloris in utero sentiunt; repente tunc corporis cum animi maxima debilitate corrumpuntur, ut frequenter delinquant, extremitates frigeant, atque difficillime calciant; generice ægræ spirantium habitum referunt procul extrinseca causa cum morbus intus uterum tantum infestet; at persistente morbo fetens, atque cadavericum effluviolum tandem morbi naturam declarat, modo adhuc ancipites hæremus.

## §. II.

### *Causæ.*

**E**xplicavi gangrænam, atque sphaceli theoriam in meo Tractatu Tumorum, atque in eo ostendi.

1. *Vitam, aut vitalitatis* statum in partibus omnibus pendere a continenti successione vibrationum vasorum omnium quæ illas componunt, arteriis nempe sunt, & venæ, vasa lymphatica, nervi &c., quod præsertim pertinet ad arteriosorum vasorum contractiones, quæ magis sensibiles sunt iis ceterorum vasorum, atque, ut ita digam, ea in motum cient.

2. Ea de causa status macerationis, aut mortis earum partium gangræna videlicet aut sphacelum nisi a quiete earum contractionum originem ducit, præsertim vasorum arteriosorum, quæ per partem affectam repunt, ut in gangræna vasa vix contremiscant, in sphacelo penitus quiescant.

3. Observationes denique ratione omnino congruentes ostendunt, tres præcipuas adesse causas, quæ vasorum arteriosorum contractiones imminuunt, vel impediunt omnino ut gangræna aut sphacelum nascantur.

*Prior* est: Maxima vasorum capillarum plenitudo atque ramificationum arteriosarum, quæ cum tonica & violentiori tensione afficiantur, nequeunt amplius referari, ideoque inertes existunt.

*Alteræ* abolitio est roboris tunicarum eorum vasorum, quæ contrahi remittunt levioris compressionis, ergo aut plethoræ supervenientis.

*Ter-*



*Tertia.* Laceratio est extremitatum capillarum, ceterorumque vasorum animalis partes componentium, quæ cum erosa, concisa, vel aliquo modo labefacta sint nequeunt amplius alternas vulgares contractiones peragere.

Hujusmodi generalis theoria omnem specialem complectitur legem gangræne uteri, aut sphaceli, ideoque consequitur, quod eam utero applicando

1. Gangranam aut sphacelum nisi ab alterutra trium earum causarum oriri posse, eæque tres causæ causas omnes complecti, quæ speciales omnes uteri gangrænas producunt.

2. Prima earum causarum gangrænam, aut sphacelum inducit inflammationis uteri proprium quando maxima sit & dolorem inducat, vel si perperam repellentibus, aut adstringentibus reprimatur, aut pro resolutione fovenda cito nimis resolutiva validiora adhibeantur, tandem quando segnitè resolvatur, aut superseretur quod priorem casum constituit.

3. Secunda earum causarum gangranam aut sphacelum inducit post uteri, aut vaginæ descensum supervenientem, quando prolapsa pars irritationi, aut frigori exponitur; vel violentiores constrictiones patitur, quæ in syrrium degenerant; vel lymphæ repletur, ejus constrictionis ergo retenta, usque dum naturalem elastikum amittat, & ecce secundum casum.

4. Tertia denique earum causarum eam gangrænam aut sphaceli speciem facit, quæ ab ulceribus, aut scissuris phagedænicis vel ulceroso cancro internum uterum rodente dependet, præsertim si hujusmodi ulcera, aut carcinomata maligna sint, ichorosa, aut purulento sero oblinita, qui uteri substantiam pervadit, atque humectat ita ut tandem ejusdem contextum destruat; id tertium casum constituit.

### §. III.

#### *Differentiarum explicatio.*

I. *Differentia.* Gangræna duplici ratione adoriatur vel quando uterus naturalis suo loco existit ut in priori, aut postremo casu inflammationis aut ulcerationis præcedentis ergo; vel quando extra naturalem positum locatur, ut in secundo oedematis causa in uteri descensu supervenientis.

II. *Differentia.* Matricis gangræna vel incipiens vel confirmata esse poterit videlicet simplex gangræna, vel sphacelum; gangræna incipiens dicitur, quando vasorum contractiones quamvis imminutæ valde aliqua ex parte tamen adhuc subsistant; cum causæ gangrænam inducentes debiliores sint vel nuper incipiant; vel sanum uterum infestent, qui eam actioni strenue resistat; confirmata appellatur modo penitus fibrarum oscillationes in affecta parte supprimantur; ex eo quod causæ validius agent, a longo tempore, vel matricem labefactatam perturbent, oedematosam, ulcerosam, & impressionibus iis omnibus magis obnoxiam.

III. *Differentia.* Gangræna omne uteri corpus afficit vel partem aliquam; totum uterum (quod raro evenit) deturpat, quando causæ producentes integram matricem occupant, vel ab aliqua parte incipientes magnosque extenduntur; verum aliqua pars uteri afficitur quando ibi tantum causæ morbosæ agant eaque extendi impediuntur.

IV. *Differentia.* Partialis gangræna diversas uteri portiones aggredi valet secundum nempe, latera, anteriorem vel posteriorem partem, collum &c., id dependet a specialibus causis, quæ actionem suam ad hanc potius quam illam partem dirigunt; plerumque illa uteri orificium occupat, quod acriori magis expostum est fluenti latici, & excoctionibus, aut scissuris in laborioso partu ubiis, ceterisque gangræne causis.

V. *Differentia*. Gangrana externam uteri superficiem laedit quando ab ejusdem descensu dependet, quia tunc externa facies aeris impressionibus, atque aliis causis magis exponitur, quæ uteri contextum pervertere potest sunt; omnem crassitudinem uteri occupat cum ab universali inflammatione, aut œdemate illa procedat; crebrius tamen internam superficiem perturbat, quæ causis gangranam inducentibus magis est obnoxia, ut de uteri ostio ostendimus.

VI. *Differentia*. Uteri gangræna in primo & secundo casu plerumque *humida* est, & inflammationi aut ulceribus succedit, quia inflammata pars tunc pus, spumamque gignit; *sicca* vero quando in secundo casu eam uteri descensus producit, nam aeris contactus, tum indusii confrictio ejusdem externam faciem exsiccant, atque indurefcunt ita, ut exchara gangranosa ei magis adhæreat, atque difficilius separari sinat.

## §. I V.

### *Symptomata.*

1. **C**alor affectæ partis valde imminuitur, ramificationum plerarumque articularum contractionibus labefactatis, aut subactis, vel quod sanguis parum, aut nihil per eas circumvehatur, ut maxima ex parte, vel penitus calore tum ipse, cum infirma pars orbetur.

Ea de causa prout imminuuntur numero sese contraentes arteriosæ ramificationes, aut labefectantur earum oscillationes, calor etiam imminui debet in ratione majoris, vel minoris earumdem labefactionis; verum calorem omnino deficere in sphacelo, ubi absolute tum eorum vasorum constrictiones, cum ceterarum ramificationum prorsus demuntur.

2. Sensus pariter imminuitur quia nervorum vibrationes, quæ cursum spirituum promovere solent debilitantur valde, aut desinunt in plerisque eorum filamentis quod affluxum & refluxum spirituum retardat, aut penitus impedit, ideoque minime per affectam partem cerebro sensuum impressiones communicantur, aut valde imbecilliter.

Consequitur sensum in hoc morbo imminui in ratione numeri staminum nervorum quorum vibrationes imminutæ sunt, vel in ratione augmenti immutationis vibrationum earum, abiit vero ille omnino in sphacelo, omni nervorum contractione tunc sublata.

3. Partis illius tensio pariter imminuitur, quia sanguis ibi affluens, articularum contractionibus sublatis, inspissatur, suamque serositatem effundit, quæ expansa pervadit, atque relaxat articularum tunicas, ceterasque fibras, ut ex solidæ partes impares evadant naturalem gradum tensionis substinere.

Quare molities aut *flaciditas* laborantis partis in gangræna augeri debet prout numerus tunicarum articularum, aut fibrarum tendinearum laxatarum crescit vel in ratione augmenti laxitudinis; verum in sphacelo in quo tum fibræ, cum vasorum tunicæ maximum attingunt laxitudinis gradum, flaciditas etiam maxima haberi debet.

4. Pars infirma livida fit quia sanguis mora inspissatur, atque nigro colore inficitur per omnes articularum ramificationes superiori indicata ratione labefactatas, verum diversa puncta nigerrima in hac parte remissa iis portionibus, quæ naturalem colorem conservant, partem fuscam reddit, seu melius dicam lividam.

Hac de causa gangræmata pars plus, minusve nigrescit prout sanguis affluit, vel nigrescit intra majorem numerum articularum ramificationum, denique ipsa

ista prorsus nigerrima apparebit in sphacelo, in quo sanguis undique, & maximo gradu nigerrimus fit.

5. Pulsus in hoc morbo exiguus frequens durus atque profundus reperitur, eoque magis in sphacelo, quod duplici de causa oriri potest, vel quod purulentis seroflatis, & corrodentis pars aliqua sanguinem inficiat, eumque inspisset atque circulationem cohibendo pulsum ita leges pervertat; vel quod obtusus dolor in gangræna, aut sphacelo obuius circumpositæ sanæ carni communicetur ut sympathicæ lege convulsivæ constrictiones fibrarum muscularium cordis excitet, quæ hujus visceris dilatationem naturalem impedian, verum frequentiores, atque validiores contractiones suscitent, quæ pulsum exiguitatem, frequentiam, duritiem &c. inducere potis erunt.

6. Extremitates in gangræna & sphacelo frigescent, eoque magis quo pulsi exiguiore sunt, nam in pulsum exiguitate minus sanguinis a corde ceteras partes versus longinquas præsertim impellitur, quare corporis extremitates minus calefactæ facile frigescent, eoque citius vel facilius prout aeris frigidi impressionibus correpta pars exponatur.

7. Virium defectio pariter pulsum exiguitatis consequens est multiplici de causa; etenim ex una parte in parvo pulsu minus sanguinis ad cerebrum evehitur, minus ex hoc spirituum fecernitur, minusque eorum cerebrum partibus communicat propinquis; ex alia parte articularum cerebralium pulsi, & meningum contractiones, spirituum animalium debilis impulsus ergo; imbecilliores fiunt, ideoque tum copia, cum celeritate spirituum in nervos irruentium simul imminuta, etiam musculorum contractiones, atque vires valde imminuuntur in composita ratione imminutionis copiarum, & celeritatis spirituum animalium.

8. Frequentiora deliquia quibus sunt tunc ægræ obnoxia tum a pulsum parvitate, cum virium deficientia oriri possunt, quæ leviori de causa, aut animi pathemate augentur ita ut syncopem inducant; hæc omnia gignere potest etiam obtusus partis affectus dolor sanas vicinas partes infestans, qui corpus perturbat.

9. Inæquales horrores, aut rigores convulsivi, quibus repente corripiuntur ægræ, duplici pariter de causa oriri possunt, ut in pulsum exiguitate, aut deliquiis explicandis enuntiavimus; videlicet vel quod serum purulentum; atque causticum a parte affecta resuens sanguinem denset, quod horrores inducat; vel quod obtusa impressiones progredientis morbi identidem per omnes cutis contextum, omnesque cutaneos musculos sympathicas contractiones excitent, quæ hujusmodi scenomena producant a Latinis *horrores* & *rigores* nuncupata.

Apparet enim pulsum exiguitatem, deliquia, rigores &c. duplici causæ me referre, qualitatè videlicet humoris, aut seroflatis, quæ sanguinem inficit atque condensat; verum indoli obtusarum impressionum, quæ in affecta parte excitantur, atque hujusmodi scenomena, cognitis legibus sympathicæ commotionis, inducunt; at posteriori causæ magis adhærerem, nam ea scenomena nedium validiora sunt, nisi gangræna majores progressus faciat, vel nervosas partes & sensibiliores afficiat, quod minime deduci potest ex eo quod major deleteria indolis humoris copia in sanguinem irrumpat, quod falsum est; verum facilius explicatur, si supponamus eas impressiones vividiores sensibiliores fieri, quod certissimum experitur.

10. Aeris seroflitas, quam stagnans sanguis, atque inspissatus suppeditat, sibi per uteri spungiosam substantiam pandit viam, at cum erumpi impediatur a tunicarum eorum actioni contextu; ideo expandi debet sub ampullarum forma, hydathides initio referentium, quæ tamen increfcendo luteo sero repleri, rubro, aut nigerrimo reperiens, prout hujusmodi seroflitas pura fuerit, aut sanguine plus minusve infecta.

11. Tandem hujusmodi serum acre, causticum tunicam quæ ipsum amplectitur rodere debet, & substantiam uteri ipsam, quæ in pus converti debet; at si gangræna humida sit a parte affecta ichor, atque foetidum pus cadaverosum orietur.

## §. V.

## Diagnosis.

I. Quæque gangræne species habet propria diagnostica signa.

1. Gangrænam quæ inflammationem subsequitur tunc adesse fatebitur quando dolor, calor, tensio, postquam in inflammata parte ad summum gradum pertingerunt repente abeant, ut desperam ægræ sibi suadeant valetudinem recuërassè, de qua tamen tristari debent medici, quorum suspicio augebitur prout pulsus debiliores fient, extremitates magis frigescent, illæ vero rigoribus & lythymisiis magis erunt obnoxie; tandem de gangræne existentia ipsi certiores fieri poterunt, a fenomenorum eorum augmento, & foetido fluenti latice.

2. Gangræna quæ ab ulceribus uteri originem dæcit diversimode progreditur, facile tamen erit eam detegere; tunc enim purulentum effluuium quod ulcera suspèdant desistit, vel saltem imminuitur dum affecta pars inflammatur quod dolorem, calorem aut tensionem auget; hujusmodi augmentum certissimum præbet instantis gangræne judicium; merito enim gangrænam jam perfectam esse suspicari licebit, modo ea fenomenena repente desinant, aut imminuantur, cum maxima pulsuum debilitate rigoribus aut lythymisiis citra causam manifestam supervenientibus; tandem morbus confirmatur & symptomata illa perseveraverint, atque purulentum effluuium cum foetenti odore reverterit.

3. Gangræna quæ uteri descensui succedit duplicis est speciei; plerumque inflammationem subsequitur quam uteri descensus inducit, ideoque per signa illa innotebit quæ sunt gangræne inflammationem consequuturæ communia, quamvis jam oculis inspicere possit; quandoque oedemati uteri succedit & tunc lente, segnitèque progreditur; verum cum facile pars affecta oculis subiciatur, facile etiam erit illa cognoscere nigredinis, mollitiæ, & insensibilitatis ergo.

4. Tactu æque ac visu *speculo uteri* adhibito judicare tunc possumus de vulvæ, vaginæ, aut uteri orificii gangræna, aut sphacelo, a quacunque causa procedant.

II. Variæ gangræne species in utero obviæ facile distinguuntur

1. Quando uterus præter naturam locetur a livore, mollitiæ, insensibilitate, aut frigore affectæ partis judicamus an morbus gangræne vel sphaceli nomen mereatur; hujusmodi indicia neque tuta, neque facilia sunt utero naturaliter constituto, at morbi diuturnitas, mollitiæ gradus & regionis hypogastricæ amissus sensus, tum effluviis qualitates satis morbi indolem pandere potis erunt.

2. Extensionem, atque locum in utero affectum visu & tactu perspicimus si uteri descensui ipse succedat; si hujusmodi descensus absit ex antecedenti notione extensionis, aut positus inflammationis vel ulceris quæ eam indaxerunt facile dignosci poterit.

3. Quando uterus extra naturalem positum reperies, verum spumam, ichoremque affectam partem effundere videbis, tunc gangrænam humidam esse fateberis; siccam vero si affecta pars arescat; verum utero naturaliter locato difficillime speciem gangræne detegere fas erit, nisi foetidi fluentis laticis nec ne indoles aliquod indicium præbeat.

## III. Cau-

III. Causarum tandem indago satis evidens est ut circa eam cunctari frustra-  
neum videatur; gangræna enim a duplici causa oriri solet inflammatione nem-  
pe, aut exulceratione, quam *calidam* veteres appellavere; vel ab tædemate aut  
laxitate, quam *frigidam* nuncuparunt, ergo difficile erit circa eas profus di-  
stinctas causas medicum decipi.

## §. VI.

*Prognosis.*

**G**angræna uterum infestat naturaliter locatum vel citra naturam positum ut  
in utero descensu observavimus.

1. Gangræna uterum aggrediens in naturali statu positum lethalis est & meri-  
to quidem, nam cui rationi fidendum est affectam partem remediis fovere pos-  
se, nam si qua fortuito illuc attingerint cito erunt refluura; validiora vero  
impendi nefas erit qualia sunt excharotica; tandem gangrænam secare unicum  
extremum remedium impossibile est; hujusmodi prognosis plerumque constans  
est, nullamque vel paucas exceptiones sinit; non desunt tamen auctorum ob-  
servationes, quæ declarant gangrænosam partem a sana separatam fuisse agro-  
tantes dein perfecte convalescere, verum hujusmodi observationes pleræque sal-  
tem nisi partiales uteri gangrænas respiciebant; nonnullæ tamen adsunt, quæ u-  
niversalem gangrænam abraam fuisse defendunt; optimum est concilium eas  
traditiones animadvertisse ut valetudinis spe interdum agras sustineamus, at-  
tamen cum paucæ sine minime valebunt sanctam indicatam prognosim demere,  
quare in hoc casu tuto asserere possumus, quod ea *rara non sint artis* &c.;  
itaque si quid spei resurgat id nisi in superficiali gangræna sibi suadere lice-  
bit, vel parum extensa, aut vagina vel circa uteri ostium locata, quam pro-  
dlexerant leviora fœnomena in utero bene constituto, & subiecto vivido, ju-  
vene & optimo temperamento donato.

2. Detrimentum quod gangræna affert minus erit si vaginam tantum occupa-  
verit, minus etiam si vulvam cum iis partibus remedia facile apponantur, quæ  
ad uterum usque non pertingunt; verum scarificationum auxilium pudendorum  
saltem respectu facile usuveniet, quod affectam partem abradet; nihilominus  
nedum lætari debemus de vaginæ aut vulvæ gangræna, quæ adhuc insensibilis  
est neque penitus unquam, aut tuto extirpari quimus.

3. Aliqua spes superest modo gangræna prolapsa utero superveniat, nam,  
præter topica remedia, partem affectam secare licebit, quod feliciter haud in-  
frequenter evenisse observationibus constat, ut infra observabimus cum de uteri  
descensu erimus locuturi.

## §. VII.

*Curatio.*

**Q**uamvis lethalis plerumque videatur hujusmodi morbi prognosis; servum ta-  
men erit curationem præterire; nihil sane magis perterret, quam omnem  
felicitis eventum spem abesse; at quoties medici est diuturnas curationes pie  
patienterque inire, etiam si laboris futilitatem cognoscant; gangræna uteri præbet  
novam hujus virtutis exercenda occasionem, quæ tamen cito medio levat.

Generice medendi ratio in hac gangræne specie nihil distat ab ea quæ in  
ceteris gangrænis requiritur, etiam si partis affectæ nobilitas, atque morbi po-  
situs

sic nonnihil magis implicet, idcirco quinque erunt indicationes proponendæ ut in ceteris aliarum partium gangranis.

*Prima indicatio* eo collineat ut causerum vim minuamus, quæ gangrenam inducunt plenitudinem nempe vasorum sanguineorum, quæ tunicarum oscillationes impediunt; vel laxitudinem lymphaticorum, quæ claterium amittunt; aut utrorumque lacerationem acris humoris causa, quod omnem vibrationem demit.

Itaque 1. Modo gangræna interna sit atque uterum seculum naturam locatum infestet, unica superest via per quam triplicis illius causæ actionem minuamus; videlicet sanguinem extrahere ut eussdem circuitus renouetur; verum cruoris, atque lymphæ vel acriorum humorum plethoram imminuere quæ affectam partem infarcit; quam ob rem modo gangrenam a præcedenti inflammatione consecuturam suscipiemur, venæ sectiones reiterare nostrum erit usque dum pulsû, & agrotantium vires permiserint; neque in eo præcipiti casu pulsuum aut virium debilitatem magni faciemus, modo ii debilissimi, aut vires maxime prostratæ non videantur.

At 2. Si gangræna extrinsecus appareat, utrumque lædat prolapsum, aut vulvam, vaginam, vel uteri orificium deturpet, ut *speculi uteri* auxilio facile conspiciatur, venæ sectionibus jungi debet scarificationum auxilium, ut pars aliqua sanguinis, lymphæ, aut acriorum humorum ibi exuberantium dematur, verum libera restituatur vasorum oscillatio, si qua adhuc superfit, per quam priorem *vitalitate* ipsa recuperet; ex sacificationes plus minusve profundæ, aut uberius fiant in ratione gradus, aut extensionis gangrænæ; generice ut omnem utilitatem præstent vivam usque carnem scindere necesse erit donec ægræ conquærantur, atque sanguis liquidus, ruber, & calidus fluat.

*Secunda indicatio* postulat quod vasorum robur restituamus, si quod recuperare potis sint, postquam superioribus auxiliis vasa depleta fuerint; hac de causa remedia spirituosa usveniunt, & stimulantia, quæ valeant vividiores succutiones excitare in affecta parte, cujus sensus pene abolitus videtur, ideoque escharotica ipsa præscribi licebit.

1. Ecce vobis ostendam remedia, quæ uteri gangræna affecti summa gracilitas in diversis circumstantiis impendi sinit.

1. Si gangræna intus uteri cavitatem deturpet, injectiones commendant ex decoctione tepenti patratæ foliorum Absynthii, Matricariæ, Artemisiz, Aristolochiæ, Pulegii, Meliloti, Camommelli, aut Scordii, quibus addi poterit aqua Calcisimplex, aut Sale Ammoniaco imbuta, vel Unguentum ægyptiacum, Collyrium Lamfranci, spiritus Theriacalis, Tinctura Myrrhæ aut aqua vitæ Camphorata & Sale Ammoniaco saturata; eorum remediorum dosi gradui, & vehementiæ morbi respondet; at cum hic urgeat melius erit excessu nonnihil quam defectu peccare; interdum modo ea parum agant injectionibus permisceri aquam phagedenicam limpidam necesse erit vel saturatiorem si opus requirat.

2. Si gangræna extrinsecus offendat, utrum nempe prolapsum, aut vulvam lædat, eadem decoctio adhibetur simili ratione parata, verum cinerum lixivio ebullita, aut additis drachmis duabus vini meraci; ut efficacior evadat, fomentis more tunc usvenit, quo gangrenosam partem sœvent aut affectam vulvam; possunt etiam linteola ea madida explicari.

3. Tandem si gangræna alterutrum latus vaginæ aggrediatur torundæ species parantur modicæ: vincitæ, & eadecoctione saturatæ, quæ pessariarum more vagina intromittuntur.

In singulis iis casibus nunquam injectiones sunt reiciendæ, fomenta, aut pessaria prout morbi status postulerit, aut partis sensibilitas vel agrotantium patientia permiserint.

H. In

II. In externa gangræna efficaciora reliqua sunt auxilia, minime prætermittenda.

Hujusmodi sunt 1. Cataplasmata, aut pessaria laboranti parti applicita; veteres cataplasmata farinacea tantum adhibebant ex Orobi, fabarum, aut hordei pulveribus confecta, & oximelle ebullita, quibus interdum addebant lupulorum farinam, Aloes, aut Myrrham, quæ virtutem earum intenderet; hodie simpliciora sed validiora efformantur ex subero, Myrrha, & Sal Ammoniaco rite pulverisato, & idonea dosi parco melle subacto ad pulmenti consistentiam, addito etiam Unguento Ægyptiaco si opus videatur.

2. Escharoticorum applicatio parti affectæ aut melius scarificationibus jam patratæ hic locum habet; veteres rotulas adhibebant Andronii, Polidæ, Musæ, Passionis, aut Asphydeli quorum compositiones apud Galenum extant a quo nostri veteres Pharmacopœe eas didicerunt paucis mutatis; at ea remedia prorsus obsoleverunt, neque amplius in pharmacopœis referuntur, quibus remedia tutiora substituerunt atque usitata ejus census prostant Precipitatum rubrum ægyptiaco remixtum, supra pulvinum extensum; aqua Pagedenica diluta, vel saturata, quæ affectam partem humectant; vel quod efficacius agit Mercurii vivi solutio, aqua fortis peracta, quæ leviter gangræna irroratur; nihilotamen caute incedendum est circa validiorum horum escharoticorum usum tum ut effectus ipsorum dirigamus, cum impressiones compescamus quæ dolorem excitare valent acutiorum, verum ægras insensibilissimis convulsionibus lacefcere si ipse nemis augeatur.

Tertia indicatio erit escharæ separationem promovere aut gangræna, quam si incassum tentabimus superfluitis ulceris consolidationem. strenue promovere nostrum erit.

Escharotica nunquam sunt prætermittenda nisi certiores fieri possimus gangrænam non amplius progredi, quod tuto dignoscitur in externa gangræna circuli rubri ergo, eam circumscribentis, aut purulentis humiditatis, quæ ab hoc margine separatur, quod tantum conjecturari licebit in interna gangræna a cessatione, vel saltem terribiorum gangrænae symptomorum imminutione.

Tunc in externa gangræna escharam tondere forficum acie, verum partem oblinire ter, quaterve in die cum butyro recenti, lactis cremore, albo ovorum quassato, aut oleo rosato necesse erit; denique si suppuratio circa gangrænae limbos oriri incipiat pulvilli suppurantibus mitioribus cum ovi lacteo obducti applicito, donec detergo ulcere materies separetur.

At cum gangræna interna sit, injectiones tantum introrogari poterit. butyro, lactis cremore, oleo rosato, aut leniori suppurante confecta, naturæ effluvia ratione habita, aut symptomatis quæ escharam jam separari prænunciant.

Modo eschara jam prolapsa videatur, superstes, ulcus consolidare nostrum erit, quod difficilius erit in interna, quam externa uteri gangræna, injectionis enim similibus remediis imbutæ tantum adhiberi poterunt; hanc tamen medendi rationem in utroque casu pluries in die renovabimus injectiones præsertim, circa quod caput proximum pervolvito, in quo ulcers hujusmodi curandi methodus exhibetur.

Quarta indicatio. Erit motum cordis sustinere atque liberam promovere circulationem sanguinis cordialium auxilio; efficaciora tamen aut nimis callescentia minime amplectenda videntur, quæ sanguinis velocitatem intendunt, ac proinde febrem, inflammationem, atque infartum affectæ partis augent, & gangrænam ipsam; verum tuto mitiora exhiberi poterunt quæ actione sua potius quam solida lacefcere ipsa leniter emolliunt; hujusmodi sunt potiones cordiales ex aquis distillatis C. B., Melissæ, Scabiosæ, Scordii, Vlmariæ paratæ; electuaria Hyacinthina, Alkermes, Theriacæ, Antimonium diaphoreticum; oculi can-

sancrorum; aqua florum aurantiorum aut Cynammoni hordeaceæ &c. syrupus cariophylli eorum nonnulla congrua dosi pro circumstantiarum ratione di-  
simul copulando.

Hujus remedii coctlear aut uncia semis quarta quoque hora ægris propinatur dosim augendo aut vices repetendo, si casus urgeat efficaciora addendo Lili-  
um nempe Sal volatile C. C. aut viperarum idonea dosi, neque sunt con-  
temnendæ guttæ flavæ aut albæ sic dictæ *Ducis la Motte*, etiam si revera species  
sint aquæ fortis imperfecte edulcoratæ.

*Possremis indicatio* postulat ablationem partis gangrenatæ, incassum ceteris adhi-  
bitis remediis; ea præsertim potissimum locum habent in prolapsu utero inti-  
mius gangræna sedato cui aliter moderi spes desit, idem quandoque usuvenit  
in simplici uteri descensu citra gangrenam quando pro aucta crassitudine reda-  
ctio impediatur, non desunt exempla in capite *De uteri descensu* enuntianda ubi  
hujus amputationis methodus fusius explicabitur; eadem extirpatio tutius pera-  
gitur dum vulva gangræna deturpatur, cujus rei observationem reperies apud Vie-  
rum (\*) at ea prius frustra atque impossibilis evadit tum in vaginæ, cum  
uteri naturali modo locati maceratione

Tandem in uteri gangræne amputatione subsequentes animadversiones erunt  
sedulo perpendende.

1. Jura leviora exhibere in gangræne saltem progressu necesse erit, quod si  
morbus consistat, brodia carnis saturata aut orizæ cremore, vel luteo ovorum  
inperspata erunt exhibenda.

2. Alvum quotidie laxare oportebit clysteriis emollientibus.

3. Ægras ita locare fas erit ut ventris altior positus puris fluxum per vagi-  
nam expediat; hæc methodus minus necessaria videtur dum uterus injectionibus  
irroratur, quæ ibi persistere debent.

4. Ægras subinde leniter purgare oportebit modo gangræna desistat aut  
eiusdem maxima pars avulsa sit; leniora tamen purgantia erunt præscribenda  
ex uncia, & semis Mannæ, vel duplici uncia Mannæ, aut Cassiæ in grandiori  
cyatho feri, aut decoctionis Althææ solutæ.

### *Remedia proposita adversus uteri Gangrenam, quibus tute uti potest.*

Paucis ab hinc annis per totam Europam invaluit adversus gangrenam speci-  
fica corticis Peruviani efficacia; primam circa hanc rem observationem Chi-  
rurgus Anglus ostendit nomine (M. Rutschvort in Northampton); anno  
1715. ipsa instituta fuit in iis gangrænis quæ a febribus intermittentibus origi-  
nem, aut progressum ducebant, ut in iis tantum circumstantiis ille hoc  
pharmacum præscriberet, in quibus solum fortasse utiliter usuvenit.

At paullo post Medici Londinenses experientiis comprobare tentarunt illam in  
omni gangræna a causa externa orta convenire, febrem ea, vel non intermit-  
tentem, aut continentem comitem haberet; nonnullæ eorum animadversiones  
reperiunt in *transactionibus Anglicanis* anno 1732.; specimen vero confirmatæ  
hujus observationis in versione cum notis hujus voluminis legitur D. Bremond.

Denum publici juris facta hujusmodi observatio Scoti novis experientiis ipsam  
illustrarunt quod constat ex *Observationibus Medicis Societatis Edimburgensis*  
Tom. II. Art. XXXIV. Tom. III. Art. V. & VI., & Tom. IV. Art. X., quare  
non

(\*) Observatio. Medicar. Lib. I.



non solum Anglorum inventa confirmarunt, verum Chinæ Chinæ in omni tum ab externa, cum interna causa nata gangræna ampliarentur.

Hujus rei felix eventus apud Alemanos transitum fecit, quare D. Heisterus, Universitatis Helmstadiensis Publicus Medicinæ Professor celeberrimus, remedium non inutiliter in duplici casu tentavit, ejus observationes naturæ curiosis communicavit quæ Volumine quinto *Observ.* 156. pag. 320. referuntur.

Liceat hic mihi animadvertere D. Tacconum Celeb. Medic. Bon. haud paucam sibi laudem promeruisse qui hujusmodi experientias utiliter reiteravit, verum de iis loculentissimum libellum nuper conscripsit.

Abramus Vaterus Medicinæ Professor Vittembergenfis dissertationem scripsit *de efficacia admiranda chinæ chinæ ad gangrænam sistendam in Anglia observata*, plures tradidit observationes, quæ tamen minus fide dignæ sunt.

Apparet etiam apud Gallos & Parisienses præsertim non defuisse qui hujus remediî virtutem tentare non maluissent, at eventus conceptæ spei, & Anglicis observationibus non respondit. D. Georgius enim Christoforus De Tharding Professor Medicus in Rostock, verum Regis Daniæ Medicus parvi faciebat hujus remediî efficaciam quam animosè adversus gangrænam ceteri jactabant, ut in suis Thesibus apparet quas Rostock defendit an. 1746. atque Celebr. Hallerus in Colectione Thesum Medicinalium inseruit Tom. VI. *De corticis chinæ efficacia in gangræna & sphacelo adhuc dubia*.

Ea tamen minime sufficere suadeo ad rejiciendum pharmaci usum adversus gangrænam; procul enim audaciæ nota nemo contentionem definire audebit, verum caute incedendum erit illum sedulo perscrutando antequam animosè amplectamur, secus enim maxima præoccupatio recentiorum remediorum materiæ medicæ incertitudinem potius augere, quam explanare potis esset.

Nihilo tamen minus cum hujus pulveris usus nullum detrimentum inferat fas erit remedium tentare in desperatis præsertim casibus internæ gangræne, ubi cetera remedia, topica præsertim, frustranea videntur, qua de causa methodum referam pro circumstantiis diversis qua in Anglia hujusmodi remedium exhibebatur.

Corticis Peruviani enim exhibitio tum in Anglia, cum in Scotia gangrænam adversus nihil differt ab ea quæ in febribus intermittentibus obvia est, præscribunt enim semel bis in die, vel quarta quoque hora si opus requiratur ad dosim interdum scrupuli unius, crebrius tamen ad drachmam semis, scrupulos duos, aut drachmam; autumo poroæque in substantia vel in decoctione eandem utilitatem asserre modo dosi servetur, haud inutiliter etiam prosecuturi erimus Chirurgi Londinensis monitum Joannis Scription, cujus rei libellum in translationibus Anglicanis extat an. 1732, ipse docet; resinam, aut extractum pulveris loco, & minori dosi esse exhibendum, verum in hoc casu saltem præcellere, vel saltem extractum testatur methodo confectum D. de la Garraye, nam putat Chinæ Chinæ virtutem magis servare quam cetera extracta.

De cetero supervacaneum censeo animadvertere Chinæ Chinæ usum minime implicare exhibitionem ceterorum remediorum adversus hunc morbum usitatorum; effectus enim Chinæ Chinæ adhuc valde incertus est, & gangræne exitus valde funestus, ut imprudenter in ea nimiscunctemur, veteris usitatoribus neglectis remediis, & temporis diuturnitate confirmatis.

## C A P U T III.

*De Aposthemate, seu uteri abscessu.*

## §. I.

*Descriptio, & Differentiæ.*

I. **Q**uando uteri infartus inflammatorius impar sit uteri gangrænam inducere; vel quia ipse nondum vasorum oscillationes penitus intercipiat, vel cause eum producentes ita violenter agant, ut integram resolutionem implicent, tunc humor in utero redundans in pus degenerabit, quod in aliqua parte congestum aposthema, aut abscessum gignere potis erit.

Dum ea peragitur humorum corruptio in inflammata parte inflammationis scenomena valde incrementum calor, rubor, dolor, tensio, febris &c., imo rigores crebri, breves, irregulares superveniunt.

Ea scenomena suppuratione perfecta, & aposthemate aut abscessu confirmato imminuuntur, verum neglecto morbo exacerbationes citius duplicantur, & in diem vehementiores fiunt, quæ in sudorem colliquativum, & lentam febrem desinunt, ægræ dein emaciantur, pallent, arescunt, urinas turbidas purulentas minungunt, colliquativo ventris fluxu laborant, aut anasarca, modo pus sibi viam non pandat, aut hanc ipsi non aperiuntur exeunti.

Suppurationis prænuncia, modo citius, modo serius apparent plerumque tamen intra sextum, aut septimum, & undecimum aut duodecimum inflammationis diem occurrunt.

II. Eadem accidentia, vel saltem valde similia citra aliquam præcedentem inflammationem interdum eveniunt; in hoc casu ægræ statim tumorem, tensionem, calorem in utero sentiunt, quæ mitiora sane experiuntur quam in inflammatione, ita valida tamen persistentiæ saltem causa, ut sedulam attentionem mereantur.

Interdum ea symptomata deservescunt, ita ut morbum abire credamus, at paullo post horores revertunt a lenta febre persecutari, quæ semel, vel pluries in die recrudescit; iis de causis ægræ macie corripui incipiunt, pulsus turbantur, & febriles evadunt, dolor, tensio, calor, atque tumor renovantur aliquam uteri partem respicientes, quæ in suppurationem vergit.

Annalogia cum morbis pectoris præsertim, & cadaverum inspectione deducitur a tuberculis morbum incipere in substantia tunicae uteri locatis, quæ in diem augentur, augentque scenomena illa omnia valde teterrima.

III. Igitur duo erunt species aposthematis aut abscessus uteri, quæ cause producentis ergo inter se differunt, altera inflammationi succedit, & phlegmonosa appellatur, altera tuberculis quam tuberculosam dicunt, veteres eas non latebat quibus prima erat *calidum*, altera *frigidum* aposthema.

Ceteræ differentię quæ hæc pauca sunt a præcipuis morbi circumstantiis derivantur.

Ideoque morbi gradus respectu, *abscessus fons* dicitur dum vehementiora sunt symptomata, *factus* dum mitiora apparent.

Positus morbi ratione abscessus, fundi, lateris aut colli uteri dicitur anticus, vel posticus, tum vaginæ aut vulvæ.

Distinguitur extensionis ergo in magnum, profundum, vel exiguum, aut superficialem.

Vc-

Verum modo simplex appellatur abscessus si unica cavitate pus coacervetur; cellulosus vero si per plures anfractus invicem communicantes sanies pervaget.

Tandem vel non complicatus quando simplex est abscessus, vel complicatus si cancro, aut syrrho copuletur.

## §. II.

*Causæ.*

Cum abscessus inflammatorius, & tuberculosus inter se differant, ideoque duplicem postulerint explicationem;

1. Inflammatorii abscessus respectu jam in Tractatu de Tumoribus ubi de suppuratione locuti sumus quæ illum producit, ostendimus,

1. Ex quatuor partibus consari sanguinem ex rubra nempe seu globulosa; ex lymphatica gelatinosa seu melius fibrosa, ex lymphatica tenuiori; denique ex serosa; ex iis elementis lymphæ gelatinosa, & tenuior in pus converti possunt, vel prior solummodo.

2. Quare in omni inflammatione, quæ in suppurationem vergit, necessum erit quod rubram partem, serum, atque lympham tenuiorem, vel absorbeant vasa venosa, vel evaporatio earum maximam partem demat, gelatinosa tantum superfluit in pus reversura.

3. Hujusmodi gelatina ut in saniem se convertat plures mutationes subire debet, videlicet, 1. Quod liquida persistat etiam frigidata, cum antea glaciæ more inspissaretur. 2. Quod aqua saponis modo se solvat, cum prius insolubilis experiretur. 3. Quod salsa, acris, corrodens fiat, etiamsi prius insipida, & dulcis esset. 4. Quod ex inodora situm redolet. 5. Verum opaca cinerea fiat etiamsi antea clara, alba, lactea appareret. 6. Tandem aqua specificæ gravior evadat cum antea levior foret. Hæc totidem conditiones sunt, quæ a pure distinguunt naturalem gelatinosam lympham.

4. Omnes denique hujusmodi mutationes quæ necessarissimæ sunt ut lymphæ illa in pus convertatur per successivam vasorum turgentium oscillationem accidunt, quæ jugiter quassando, succutiendo, aut subjigendo gelatinosas moleculas facile eas alterationes inducit quas intimius perscrutari supervacaneum cenfeo.

Generalior hujusmodi Theoria sufficit ad explicandam specialem abscessus uteri generationem, nam evidens est.

1. Aut vasa in inflammata uteri parte rubram, serosamque substantiam ibi stagnantem per resolutionem haurire, aut per evaporationem expellere.

2. Verum mora gelatinosam lympham a vasorum pressione alterationes omnes subire necessarias ad pus gignendum.

3. Hujusmodi methamorphosis sanguinis in pus nedum accidit in ea inflammatione, quæ in gangrænam definit, nam citius quam par est oscillationes vasorum tunc abeunt, antequam suppurationem inducant; Item in inflammatione, quæ per resolutionem tollitur, nam in eo casu sanguinis circulus restitutus oscillationibus arteriarum non fit ocnoxius quæ valeant ipsum vitare.

4. Verum gignitur in ea tantum inflammationis specie quæ neque in gangrænam neque in resolutionem definit; nam in confluentia horum casuum ex una parte oscillationes diu persistunt, ex altera sanguis morans earundem actioni expositus tandem in pus converti debet.

5. Ea nunquam cis diem sextum neque transdecimum solet supervenire; non cis sextum, quod tempus requiritur ut arteriarum vibrationes valeant sanguinem

*Afruch de Morbis Mulierum.*

N

in sa-

in saniem mutare, neque trans decimum quia oscillationes quæ per decem dies continuatè impares fuerunt ad suppurationem gignendam, modo validiores non fiant, minime valebunt citra hoc tempus eam generare.

6. Tandem suppuratio citius, aut ferius procircumstantialiarum, aut subjectorum diversitate erit superventura. 1. In ratione nifus, & frequentia majoris, vel minoris oscillationum turgentium vasorum sanguine in eodem statu persistente. 2. Prout sanguis plus minusve dispositus sit ut in pus converti sinat, in eodem gradu oscillationibus persistentibus. 3. Prout ambæ hæ causæ simul concurrant, videlicet tum in ratione nifus, & frequentia oscillationum, cum dispositionis sanguinis.

11. Abscessus tuberculosi respectu omnis ejusdem theoria a tribus potissimum subsequentiis causis dependet: 1. Qualia sint hujusmodi tubercula quæ abscessum inducunt? 2. Quomodo ea in utero efformantur? 3. Qua de causa suppurentur?

*Questio prima.* Tubercula generice grana sunt glandulosa, dura, firma, compacta, alba, levigata tunica obsecta fortiter adhærenti, spherulam, aut spheroidem plerumque referunt, at crassitudo eorum, & numerus in singulis casibus, & subjectis variare solet; interdum ea pisum adæquant, vel exiguiora sunt parvi facienda; interdum nucem, aut ovum columbi magnitudine non superant; quandoque quamvis exigua tamen confertissima sunt; quandoque pauciora apparent, verum crassiora valde, & ampla.

Structuræ partium cognitio, ubi tubercula communiter efformantur, ostendit tres species tuberculorum distingui; 1. Ea quæ in exiguis glandulis coagmantur, quæ per omnes partes incedunt, & sunt potissima causa segnitiei circulantis lymphæ. 2. Illa vero quæ efformantur intra nodos venarum lymphaticarum capillarium, videlicet in confluentia valvularum sygmoidarum, ubi venæ sunt per intervalla intersectæ. 3. Tubercula quæ originem habent in glandulis cuique parti propriis, ut bronchiales in pulmone, & intestinales in intestinis.

Quare ut in viam revertamur, tubercula de quibus agitur uteri propria a triplici loco oriri possunt. 1. Intra exiguas lymphaticas glandulas ibi locatas. 2. Intra nodos ramificationum capillarium venarum lymphaticarum quæ per uteri tunicam repunt. 3. Intra vasa lactea uteri propria quorum structuram atque usum breviter explicavimus in *Cap. I. Lib. I.*

*Questio secunda.* Cum tubercula semper necessariæ consecutiones sint turgentia glandularum, aut venarum lymphaticarum, vel vasorum lacteorum, ideoque necesse erit lympham affluere in iis glandulis, aut venis in primo & secundo casu, aut in postremo lac vasa vermicularia infarcire.

Tunc enim lymphæ, aut lacteis uteri liquor nequit intra propria receptacula cumulari nisi hac triplici de causa: 1. Vel quod spissiores sint quam in statu naturali, ut circumvehi impendantur. 2. Vel quod angustiores sint anfractus per quos libere transire nequeant. 3. Vel quia ambæ hæ causæ simul concurrant ad hanc æconomia animalis partem pervertendam.

Fusus infra examinabimus hujusmodi tres causas cum de syrrhis verba faciemus, sat erit enim hic animadvertere. 1. Priorem causam videlicet lymphæ spissitudinem, aut lactis uterini oriri, 1. Ab usu viliorum alimentorum, quæ crassiores chyllum suppeditant. 2. Ab eorum incompleta digestionem, etiam optimorum quæ non bene subactum chyllum præstant. 3. Ab admixtione somitis venerici, strumosi, aut scorbutici &c. quæ sanguinem inspissat. 4. A repentino frigore quod casu fortuito uterum infestat, ibique circulates humores condensat.

2. Verum alteram causam, videlicet canalium occlusionem per quos lymphæ, atque uterinum lac transire solent, ab erethismo pendere, aut convulsiva crispatione quæ fibras uteri lacerat feminis virulenti ergo, quod communicaverint albus fluor, & acer, aut usus injectionum stimularum, & corrodentium, ictus, aut

aut collisio uteri, vehementiora animi pathemata ira, latitiae, aut mororis &c praefertim menstribus fluentibus, aut Lochiis.

3. Tertium denique casum, connubium nempe duorum priorum procedere, a specialium causarum utrinque affinitate quae hanc copulam gignit; consequitur enim 1. Numerum tuberculorum ab extensione causarum producentium originem ducere; idcirco prout magis lymphæ, aut lac uterinum inspissabuntur; fibræ matricis crispabuntur; verum quo magis lymphæ, aut lactei humoris in propria receptacula detinebitur, confertiora erunt tubercula, & contra in oppositis circumstantiis.

2. Magnitudinem tuberculorum facere facilem dilatationem glandularum, venarum, aut turgentium vasorum, verum nifum quo eo lymphæ, aut lac impelluntur; ideo quo magis dilatabilia erunt organa illa, eo grandiora fieri tubercula videbit, ac contrarium eveniet, si oppositæ causæ agant.

3. Duritiam tuberculorum a gradu spissitudinis pendere lymphæ, aut lactis uterini, ideo quo citius, ac validius si humores inspissabuntur, eo tubercula erunt compactiora, & contra in opposito casu.

4. Tandem tubercula quantumvis dura apparuerint, compactiora semper erunt in circumferentia, quam in centro; humor enim qui tuberculi internum parietem lambit, primus est qui retardatur, atque inspissatur; contra vero qui centrum occupat liquidior est, serius detinetur.

*Tertia Questio* tubercula matricis aequæ ac ceterarum partium crebre in suppurationem vergunt; hæc corruptio in cenno plerumque incipit tuberculi, ubi vidimus materiem fluidiorem esse, ideoque magis dispositam ad hanc mutationem suscipiendam:

Etenim nisi violentioribus contractionibus arteriarum, circumpositarum hujusmodi suppuratio tribui potest; evidens porro est auctum vasorum pulsum agitare, quasiare, succutere, sensim sensimque retentam lympham in pus convertere, ut in inflammatione partis crassioris sanguinis lymphaticæ evenire observavimus.

Et iis consequitur nedum tubercula suppurari nisi, inflammationis ergo, aliquis propinquæ partis arteriæ validius commoveantur; vel ictu, contusione, aut frigore pars afficiatur infirma; intemperanter vescantur cibis acrioribus, spirituosioribus, calefacientibus; denique pervigilio, animi pathemate, exercitio nimio, solventium abusu &c. crucientur quæ una similem effectum præstant.

Nihilominus enim, etiamsi suppuratio tuberculosa & inflammatoria haud levem affinitatem habeant, in utroque tamen casu pus diversæ indolis reperitur; quod inflammatio suppeditat album est, spissum, æquale; quod vero gignunt tubercula serosum, cinereum, inæquale, & grumosum &c. itaque illud ex gelatinosa sanguinis lymphæ magis corruptibile efformatur; hoc ex vulgari lymphæ producit, aut peculiari humore haud facile ex mutationi prono; alterum denique promovent propinqui arteriarum pulsi, & validiores; alterum imbecilliores, atque distantes.

Qualitati etiam materiæ in tuberculis detentæ, atque inertię causarum suppurantium segnitiam tribuunt, quæ tubercula marcescunt; interdum incepta suppuratio in aliquo tuberculo diu citra sensibilem augmentum persistit; attamen augetur tandem, ichor tumescit, rarefcit, tuberculum inflatur, emollitur, receptaculum gignitur aut *cystis*, aut si major tuberculosis abscessus.

Quod de uno tuberculo dictum est, idem de pluribus in aliqua parte locatis dicendum erit; nam causæ æque agentes, eosdem prorsus in hac mutatione effectus præstant, hæc de causa unius tuberculi putrescentia ceterorum præsentem aut proximam suppuracionem indicabit, pro diversâ causarum applicatione, & suppurantis materiæ qualitate.

## §. III.

*Symptomata.*

1. **D**um abscessus producitur, ichor in parte affecta rarefcere debet, ibique nerveas lacefcere fibrillas, vasa capillaria comprimere, sanguinis cursum sistere, pulsum arteriarum intendere; iisque de causis tensionem, dolorem, atque calorem augere.

2. At abscessu jam confecto ea symptomata iminuuntur, vel quod pus non amplius rarefcatur, aut minus; vel quod inducta a suppuratione continui solutio vasa, fibrasque laxet.

3. Dum pus in abscessu congeritur, ejusdem pars non exigua a vasis hauritur sanguineis, & lymphaticis propinquis, quæ illum in sanguinem devehunt; hujusmodi inquinamentum tunc lentam febrem inducere debet pro ratione salium quibus saturatur, quæ humores solvunt, crebrioresque excitant cordis, & arteriarum contractiones.

4. Ea puris transfusio augeri potest per causas accidentales, pervigilium nempe, dolorem, corporis aut animi commotionem, remediorum applicationem, aut partium vibrationem &c. tuncque sanie magna copia transducta condensabit sanguinem serius ea nondum perfecte remixtum, quod rigores plus minusve frequentes excitabit, sensibiles, aut regulares, prout pus illud citius, vel serius aut uberius cruorem deturpabit.

5. Cum intimius ichoris flocci sanguinem penetraverint, horrores imminuentur, febris explicabitur, quia libere tunc salia agent adversus cor, atque arterias; ex eo procedunt febriles accessus quæ rigoribus succedunt, plus minusve diutini pro copia, aut qualitate puris producentis, qui, humoribus solutis, in sudorem colliquativum desinunt.

6. Ex antea dictis deducitur abscessum, matricis præsertim, jugiter febrem lentam inducere, persistentem usque dum pus effluit, quam comitantur exacerbationes irregulares, rigores, & consequuntur sudores colliquativi; huic febri enim, & sanguinis solutioni macies tribuuntur, consumptio & agrotantium excidium.

7. Quando pus quo sanguis inquinatur uberrimum fit nimis, atque spissum ut difficillime, aut imperfecte solvatur, ejusdem flocci, aut guttæ aliquot urinosam ferositatem deturpant, & per renes separantur, ut lotium turbidum, fætidum, atque purulentum appareat.

8. Ea scenomena magis conspicua sunt in inflammatorio, quam tuberculoso abscessu, quia in illo pus undique effunditur, in hoc a circumpositis membranis impeditur, nisi ipsæ disrumpantur.

9. Pus in abscessu collectum uteri continenter tunicas erodendo tandem vel per vaginam anteriorem aliquam sibi pandit viam, vel multiplicem posterius; modo enim velicam aut rectum penetrando per lotium, aut alvum materies separabitur; modo, circa rectam teretium ligamentorum serpendo, aut latera vaginæ, suguina aut pudenda infarciat; modo in abdominis cavitate collectum erumpi impeditur. Hujusmodi exeuntis puris semitæ diversæ a vario abscessus posita dependent; quando abscessus internam uteri faciem deturpat (quod crebrius evenit) intra ipsum disrumpitur; exterius vero erumpit dum externam faciem matricis lædit; in postremo casu prout abscessus uteri supradictis partibus propinquus erit, eo conciso, hanc vel illam ichor infestando sibi viam aperiet, peritonæum interdum perfodiendo.

## §. IV.

## §. IV.

*Diagnosis.*

I. *Diagnosis morbi.* Omnem inflammationem plerumque suspicari licebit in abscessum vergere, modo decimo, aut duodecimo morbi die inditia perfectæ resolutionis non appareant; verum uterus doleat, atque durus, & tensus persistat.

Signa pene certissima erunt instantis abscessus quando loco resolutionis, doloris, tensionis, atque caloris augmentum, aut febris exacerbatio appareant sine causa manifesta.

Tandem nullum superest dubium uteri abscessus, quando persistant in hac parte tumor, pondus, & abscessus dolor, tum lenta febris, exacerbationibus obnoxia, quam rigores precedunt, & sudores subsequuntur, qui ægras labefactando marasimum inducunt.

Signa hujusmodi abscessus qui a tuberculo suppurato procedit, valde incerta sunt: initio enim morbi illum nihil prænunciat, levior tantum suspicio adest modo tuberculum increseat, nam ægra tunc circa uterum constanti tensione, atque dolore cruciantur; tandem certiores fieri incipimus tuberculum intra uterum substantiam referari, nam tunc ipsi expansum eadem scenomena producit, quæ abscessus inflammatorius induxerat etiam si tunc mixtiora appareant.

II. *Diagnosis specierum morbi*

1. Abscessus vel *fiens* dicitur & augmento doloris, caloris, tensionis uteri, atque febris exacerbatione ipse innotescit; vel abscessus *falsus* appellatur & scenomenorum imminutione, febre lenta, rigoribus, exacerbationibus atque sudoribus colliquativis qui marasimum progignunt dignosci solet.

2. De abscessus positu judicamus a positu majoris doloris, atque resistentiæ quam ægra perferunt.

3. Eiusdem extensio a tensionis, doloris extensione, & tumoris volumine cognoscitur.

III. *Diagnosis causarum.* Certi esse possumus abscessum *phlegmosum* esse modo inflammationi uteri succedat, cujus resolutio vel nullo modo, vel imperfecte fieri potuit; progressus hujusmodi abscessus plerumque facile patescunt.

*Tuberculosum* vero abscessum sine precedenti inflammatione evenire solet, ejusque incrementum segne est & symptomata eo valde mixtiora sunt.

## §. V.

*Prognosis.*

Abscessus uteri morbus valde periculosus est; vel ille durus, compactus existat; vel disrumpitur sit.

1. In primo casu: 1. Pus qui in abscessum irruipit insensibiliter sanguinem inficit, ibique persistens febrem lentam quæ ægram minatur inducit in consumptionem, aut hydorem definitum.

2. Si pus in abscessu valde viscum sit parietes indurefcit, qui callosi fiunt, & temporis diuturnitate carcinomatosi.

3. Si pus vero liquidum & acerrimum sit sensim sensimque destruit solidas partes, & matricem lædit ita ut uterus in corruptionem, aut gangranam vergat.

In Secundo casu ignoramus quæ ex parte abscessus disrumpitur sit: 1. Si in

*Abruch de Morbis Mulierum.*

N 3

abdo-

abdominis cavitate resisteretur pus ibi collectum, atque expansum gangrænam certissime induxerit.

2. Si intra vesicam, aut rectum rumpatur pus affluere poterit, ut diutius egræ vitam gerant febre lenta tandem morituræ.

3. Nonnulli spei aderit si abscessus inguina, aut vulvæ labia infestet, nam facilem furi viam parare poterimus ulcusque detergere, quod tamen plerumque impossibile est consolidare.

4. Tandem abscessus plerumque intra uterum resisterat, quod etiam si minus periculosum evadat, ulcus relinquit scetidum, & curatu difficillimum, cujus consecutiones valde lethales sunt ut capitulo subsequenti ostendemus.

II. Detrimentum uteri abscessus etiam si maximum sit, variat tamen diversis circumstantiis.

1. Pro magnitudine abscessus, qui si modicus sit, & exiguus, minus periculosus evadit, & contra.

2. Pro ejusdem positu, nam qui vulvam infestat minus nocuus quam ille qui vaginam lædit; & qui vaginam offendit minus periculosus est quam si uterum lædat.

3. Pro ipsius natura, nam tuberculosus phlegmonoso mitior est.

4. Pro abscessus specie, nam simplex complicato minus, calloso nempe, syrrhoso, aut carcinomatoso lethalis experitur.

5. Pro uteri statu, nam abscessus qui per accidens uterum fœdat de cetero bene constitutum, minus insensus evadit quam si matricem deturparet ægram, tumidam, aut laxatam.

6. Pro ægotantis constitutione, aut ætate, ideoque abscessus magis noxius evadit in subjectis infirmis, cacheticis, aut in senibus quam in sanis mulieribus juvenibus, & bene constitutis.

## §. VI.

### Curatio.

**I**N duplici casu nostrum erit abscessum pertractare ægotantis uteri; vel quando suppuratio fit; vel suppuratione perfecta.

1. Suppuratione persistente, seu melius increscente, sat erit calorem, dolorem, tensionem partis affectæ, atque febrem ipsam compescere ut inflammationis progressus, atque abscessus consecuturi extensio inhibeatur.

Hæc de Causa 1. Cubiti venam incidere fas erit, idque reiterare prout ægotantium vires permiserint.

2. Optimum erit consilium reiterare remedia laxantia humectantia, & anodyna, quæ partem affectam laceant, eaque præscribendo sub injectionum, pessarium cataplasmatum, aut sutorum forma ut Capitulo præcedenti exposuimus.

3. Exquisitam diutam jubeto ex jure vituli aut pullorum, modo ægotantium imbecillitas majorem nutritionem non poscat.

4. Alvum clysteriis laxare fas erit; verum si morbi violentia sinat, leviora apozemata convenire possunt ex Manna, aut Cassia confecta.

5. Tandem si dolores acutiores sint modico narcoticorum usu obtundere illos poterimus quarta vel sexta quaque hora tantum ipsa exhibendo.

II. Perfecta vero suppuratione, & confirmato abscessu exituro furi semitam parare oportebit, ut citius ipso evacuato minus affectæ partis contextum destruat.

1. Si abscessus vulvæ labia deturpet, facile est ipsum phlebotomo secare inferio-



seriorem partem versus, ut puris effluvium promptius eveniat ulcusque facilius detergatur.

2. Si abscessus latera vaginæ foedat, pariter phlebothomo indici digito applicato manus dexteræ illum scindere necesse erit, vel speculo uteri adhibito vaginam dilatare ut illum tuto etiam scalpelli falcati ope aperiri queat.

3. At si abscessus uterum ladat tunc eum aperire conabimur, commotiones excitando, quæ valide uterum fucutiant; huiusmodi sunt sternutatio, vomitus, thussis, nifus in excernendis fœcibus &c. quare ægras admonere oportet ut validius tussiant, verum errhina, emetica, clysteria, irritantia, stimulantia, & suppositoria, quæ intestina laceſcunt frequenter adhibeant.

Errhinorum respectu sufficient plerumque Nicotiana, Salvia, Bethonica aut pulvis radices Iridis Florentinæ; verum si pulveres huiusmodi debilius agant addi poterit parum Piperis longi, aut rotundi, Pyrethri, Veratri, aut Euphorbi, sedulo circa eorum dosim morbi gradui ratione habita.

Emeticorum ergo usitatiora sunt tartarum emeticum solubile ad grana tria vel quatuor, modo methodo Parisina præparetur; etiam si & Itali ipsum egregie patrare potis sint; verum optimum censetur vinum emeticum ad unciam aut drachmas decem; Ipecacuanha etiam usuvenit ad grana circiter 25. aut 30. si aliqua indicatio illum poscat; emetica antimonialia efficaciora tandem præscribuntur ad duo vel quatuor grana, si vulgaria inefficacia experiantur, quod tamen rarissimum est.

Ut clysteria irritantia evadant, adduntur plerumque vulgari decoctioni duæ vel tres uncie mellis Mercurialis, vel sex drachmæ, aut uncia Diaphenici, vel *biere-picre* aut uncie duæ vini emethici.

Tandem suppositoria componuntur ex duabus vel tribus uncis mellis cocti cum drachma salis gemmæ, aut communis; verum si illa efficaciora malueris addito drachmam *biere-picre*, aut scrupulum semis diagridii; vel trochiscorum althandal.

## C A P U T IV.

### De uteri ulcere.

#### §. I.

##### Diagnosis.

**U**teri ulcus, ceterarum ulcerum more, solutio est continui, seu scissura faciei internæ matricis vetustior, quæ pus, aut purulentam saniem effundit.

Phænomena quæ præcedunt, aut symptomata concomitantia, vel consequentia indicant interdum huiusmodi scissuras profundiores esse, intra uteri tunicas, ejusdemque substantiam locatas; interdum superficiales excoitationes referentes.

Cadaverum inspectio eam, circa istiusmodi ulceris species, sententiam confirmavit, ostenditque illas ab aphthis haud absmiles esse confertis plus minusve, quibus uterus scatet, interdum verum rhagadia, aut incisiones referre profundiores, quæ matricis cavitatem sulcant.

In omnibus iis ulcerum speciebus pus, ichorve ex utero profluit quod agrotantium indusium inficit; illa vero sanies plus, minusve uberrima est, aut acris, spissa quandoque ut verum pus repræsentet; interdum liquidior seu melius

parulentum serum emulatur. Colore etiam variat modo alba, cinerea; modo flava, aut viridis pro circumstantiarum diversitate apparet; tandem huiusmodi morbus dolorem initio comitem habet qui in progressu acutior fieri solet, atque lancinans; hic modo dextrorsum, modo sinistrorsum lumbos, clunes, inguina, aut femora torquet.

## §. II.

*Causæ.*

**H**ujusce ulceris affinitas cum ceteris ulceribus quorum origo facis perspicua est, demonstrat ea a tribus potissimum causis oriri; 1. ab abscessu, aut aposthemate præcedente, in utero disrupta; 2. ab erosione sensim sensimque nata circa internam faciem matricis, nullo antecedenti abscessu; 3. ab ulcere quod cavum uteri deturpat, & in fistulam degenerat, ex omnes causæ singillatim explicabuntur.

I. Abscessus uteri de quo superiori capite locuti sumus, modo aperiatur, ulcus fit pus effundens; verum cum ille cavitatem efformet intra uteri tunicas, hinc ortum sinuosum evadit, quod per uteri substantiam flexuose reptat.

Vidimus jam præcedenti capite abscessum duplicis generis esse, alterum *Phlegmonosum* quem gignit inflammatio, aut suppuratum Phlegmone; *tuberculosum* alterum seu *scatomatosum* a tuberculo procedentem, aut cystico tumore, quod duplicem etiam ulceris speciem in utero inducit.

II. Erosio faciei uteri internæ altera causa est valde obvia ulceris quæ diversimode oriri potest; etenim vel

1. Illam faciunt fluores albi, acres, vetustiores qui matricem laxant, & excoriant, vel

2. Foetus, molæ, aut placenta putrescentis retentio, vel

3. Iniectiones acres, corroderentes, aut stypticæ, quas nonnulli Chirurgorum imprudenter præscribunt adversus uteri descensum, aut album fluorem, vel

4. Coitus cum viro venerea lue laborante; vel

5. Acrimonia menstrui sanguinis, lymphæ, aut lactei humoris, quæ albos fluores inducit, præsertim si ii humores viri admixtione scorbutici; strumosi, aut venerei, tum sanguis ipse inquinentur.

III. Raro tunc uterus vulneratur, crebre tamen diversa ratione excoriari potest.

1. Ictu unguinum imperiti obstetricantis in laborioso partu

2. Instrumentis perperam adhibitis in extractione fœtus mortui, aut capitis in utero superfœtitis.

3. Violentiori secundinarum extractione valde cum utero cohærentium, quæ ejus aliquam partem secus exportent.

4. Turpi methodo quam nonnullæ adhibent vulnere sæpe causa.

## §. III.

*Differentiæ.*

**S**i rite perpendamus quæ adhuc dicta sunt, verum ea animadvertamus quæ in plerisque ulceribus observantur, facile innotebit plures dari diversitates in uteri ulceribus.

I. Idcirco *causæ proximæ* respectu illud ulcus producentis; vel cum gignit abscessus uteri, vel erosio sensim aucta; vel scissura ejusdem internæ faciei.

II. *Causæ*

II. *Causæ remotæ* ergo; modo ulcus a viru procedit venereo in sanguine diu latitante, aut nuper per copulam in utero introducto; modo a scorbutico fonte, aut strumoso dependet, quo inficitur cruor; quare eorum respectu ulcera venerea, strumosa, aut scorbutica dicuntur, verum citra hujusmodi causas, ulcera simplicia appellantur.

III. *Positum* ergo, quem ulcus occupat, modo ipsum fundum, latera uteri dextrorsum, aut sinistrorsum, superius, aut inferius; modo orificium matricis deturpat; quod fundum tamen infestat uti verum uteri ulcus consideratur.

IV. *Qualitatis* ratione ulceris illius; dum ipsius margo mollis est *Simplex* dicitur & *Benignum*; dum ejusdem ora dura, renitens reperitur syrrhus appellatur; quandoque syrrhosa labia dolentia fiunt, & lancinantia, & tunc ulcus *carcinomatosum* dicunt, & quasi cancer consideratur.

V. *Reptandi* modo; nam vel ulcera tantum internam superficiem uteri late deturpant, & *Superficialia*, seu *Erysipelatosa* vocantur; vel illa profunde rodunt substantiam & *Cava*, *Profunda* appellantur, quæ in *Sinum* aut *Fistulam* degenerant.

VI. *Communicationis* ratione quam cum partibus habent propinquis; nam ulceris materies interdum modo per rectum; modo pervescam sibi pandit viam, ut in ulceribus profundis vaginæ evenit; præsertim vero in lateralibus uteri, quæ circa teretia ligamenta serpendo per alterutrum inguinum patefciunt.

## §. IV.

### *Symptomata.*

I. **I**N omnibus uteri ulceribus pus continenter effluit quod ulcus supeditat; post abscessum illud valde uberrimum stillat, spissum conspicitur, a laudabile pure haud absumile; at evacuato abscessu effluviū fit abundans minus, & serosum magis.

II. In ulceribus quæ ab erosionem aut scissuris procedunt virus stillans, initio morbi saltem, post erosionem præsertim, parum abundat, ut vix ipsum ægræ animadvertant; at, ulcere aucto, fluxus augetur; in hoc casu pus plerumque serosum, lymphaticum, granulofum apparet, ut difficillime de ipsius qualitate judicare possimus; tandem ulcere increfcente uberius funditur, latex facilius dignoscitur.

III. Cum ulcus initio plerumque exiguum spatium occupet, ac de cetero uteri conditio eadem persistat, idcirco catamenia periodice ut in statu naturali erumpunt, si dolorem excipias, quem interdum ægræ perferunt menstruo fluente phlegmonosi infartus ergo, quo tunc afficitur ulceris margo; quandoque fluxus menstruus diu perdurat dum ulcus segniter progreditur desistit tandem quando uterus pene omnis ulcere sedatur.

IV. Ulcere aucto sæpe ipsam exigua corrodit vascula sanguinea, arteriosa, aut venosa, hincque fluens cruor pure remixtus sanguineum, vel saniosum saltem reddit effluviū plus minusve pro diversa crassitudine, aut turgencia eorum vasorum; interdum concisa vasa modo grandiora sunt, aut arteriosa hæmorrhagiam inducunt, aliamve sanguinis jacturam periculosam valde.

V. Pus illud quandoque mite admodum est, neque situm redolet, neque vaginam, aut vulvam lædit; at sæpissime acre est, foetens, corrodens ut in transitu phlogoses, & excoriationes producat; hujusmodi differentias faciunt qualitas sanguinis, quæ ceteris paribus cum pure una est, & mora plus minus diutina in utero viri, quod ibi persistens maxime corrumpitur in calefacto præsertim utero.

## VI. Ner-

VI. Nervi qui perulcus transeunt puris irritationi sunt obnoxii, quæ dolorem excitabit in uteri ulceribus obviuum.

VII. Huiusmodi dolor levis est, parumque sensibilis quando ulceris labia inflammata non sint, pus mite, & parum corrodens experiat, verum minus sensibilem uteri partem ulcus occupet, quæ fundus est, vel alterutrum latus; acutior contra dolor perferitur in inflammato ulcere pure acriore infecto, aut circa collum, vel orificium uteri locato.

VIII. Dolor variat etiam pro diversa ulceris conditione, si illud syrrhosum fuerit, nullam, vel leviorē impressionem pus excitabit, deque eo parum vel nihil conquerebuntur ægræ, tamen vivissimum ipse dolorem perferent si syrrhosum in carcinomatosum ulcus degeneret ut infra Cap. De cancro explicabimus.

IX. Quando pus mite est, libere fluat, verum tenuiore ægræ limpha donetur, ulcus nunquam syrrhosum fit; contra vero accidit si illud acre sit fibræque erodat, verum in ulceris cavo detentum valeat tum labia ejusdem sedare, cum lymphæ cursum interceptare, vel denique hæc limpha naturaliter spissa sit, viscida & ad statum disposita; hæc de causa plerumque ulcera neglecta, aut imperfecte deterfa in syrrhum convertuntur.

X. Ægræ diversis partibus referunt dolorem quem perferunt pro diversoulceris positæ; ipsum renibus, seu melius inferioribus lumbis, aut ossi sacro respondere sibi suadent, si ulcus uteri fundum infestet; clunium alterutro si alterutrum latus laboret; ano aut vesicæ quando ulcus matricis orificium, aut vaginæ fundum afficiat; inguini tandem, aut interiori coxæ ubi rotunda inferuntur ligamenta per aponeurosim expansa, quando ad originem ligamentorum eorum oritur ulcus.

XI. Dum ulcere anterior colli aut orifici matricis, vel vaginæ pars deturpatur, tunc phlogosis, atque calor vesicæ collo communicatus mingendi frequentiam excitat cum ardore tamen, & stranguria in ratione causeproducentis majori vel minori, ad dejectiones libere per alvum succedunt; contra vero quando postica colli uteri pars, aut fundi vaginæ eo morbo laborat phlogosis tunc propinquo recto communicatur quæ dolentem tenesmum inducit præsertim si sæces duræ sint, facile tamen mingunt; hæmorrhoides nihilo secius superveniunt.

XII. Haud infrequenter vesica, & rectum majorem relationem habent cum ulcere illo, nam si fistulosum sit, antè fundum versus uteri aut vaginæ locatum, vesicam perforabit, ut urina per vaginam exeat; simili ratione dum posterius rectum versus pus sibi pandit viam, sæces liquidiores, præsertim per vulvam, stillabunt.

XIII. Ulceris sinus undique indurefcit ut uteri volumen augeatur; hoc augmentum ulceris progressus rationem sequitur; in simplicibus ulceribus in quibus margines naturalem flexibilitatem servant, uterus etiam tumens, mollis persistit; at durus fit atque resistens dum ulcus syrrhosum evadit.

XIV. In omni uteri ulcere difficulter mulieres cum viro coeunt, huiusmodi incommodum tamen non semper unum est; initio enim morbi præsertim si illud a scissuris proveniat minus molestiæ induxerit; minus si fundus, aut latera uteri laborent; multum vero incommodi aderit, si vaginæ fundus, aut matricis orificium sœdo ulcero laboraverint.

XV. In ulceris aggressu nulla vel pauca febris adest, at illa lenta sensim sensimque supervenit puris admixtionis ergo, cui ægræ dolores non parum favent, horrores & rigores duplicantur aut imminuuntur pro vetustate, & profunditate ulceris, pro copia aut acrimonia puris in sœdum ulcus irrupentis, pro vividis cruciatibus plus minusve crebris.

XVI.

XVI. Tandem ægræ ab hac febre consumptæ marasmo corripiebuntur, pedum œdemate in die crescente, diarrhœa vero colliquativa crebro laborabunt.

XVII. Pleraque eorum scenomenorum dolor saltem qui partibus diversis respondet ægras perturbant, etiamsi leviter in omni tumore aut tensione partis allicujus uteri quamvis ulcere expertis; cavendum enim est, ne hujusmodi levioribus molestiis contemptis, ulcus succedat.

## §. V.

*Diagnosis.*

**D** *agnosis ulceris uteri* ut in ceteris morbis per gradus innotescit.

I. Agitur statim de ulceris existentia inquirenda quæ cito apparebit.

1. Per doloris sedem, quem mulieres persentiunt; partem cui ipsum referunt, & augmentum ejusdem prope menstrua.

2. Idem ostendit purulentum effluvium quo indusum quotidie inficitur; interdum difficillime distinguitur ab alvo fluore qui simul fluat, vel acer sit; patet tamen a dolore quo hic caret, verum aucto ulcere, dolore, & tumore uteri, ab odore, colore, ceterisque proprietatibus fluentis laticis facile innotebit secundum lactitans ulcus.

De cetero de iis tantum ulceribus dubitare poterimus quæ a scissuris, aut excoriationibus originem ducunt, quæ lente procedunt; verum si ea abscessus disruptus producat, antecedentia scenomena satis indolem morbi declarabunt.

II. Cum certiones facti simus de ulceris existentia, quam citissime detegere necessum erit proximam illud producentem causam.

1. Evidens est quod pus dum copiose derepente exit, id a præcedenti suppurata inflammatione derivare, hujusmodi ulceris causa potissima.

2. At si ulcus tacite, insensibiliter procedat, pus vero sensim sensimque erumpat internæ uteri faciei erosionem, aut, scissuram ipsum inducere cognoveris; erosioni tribuitur si qua ex causis corrosionum nuper Articulo *De causis* enunciatis antecessa fuerit; scissuris vero referri debet cum nulla appareat erosionis causa, verum uterum lacinatum fuisse suspicetur.

III. Alterum est investigare remotas causas, quare ægrotantium statum percontari oportebit ut si quid adsit luis celticæ, scorbuti, aut strummarum seminum inotescat; si ægræ cachexia laborent, quæ ulcus confirmare potis sit, tandem iis continentibus causis deficientibus morbi origo accidentalibus tribuitur supra recensitis.

IV. Reliquum est variam indolem ulceris determinare.

1. Positus ergo quem occupat, quod simplici tactu præsertim cum uterus tumeat facile dignoscitur, partium notione quibus ægræ dolorem referunt, quæ lumbi sunt, os sacrum, inguina &c., tandem tutius digitorum introductione cognoscitur an ulcus uteri orificium aut fundum vaginæ sedabit.

2. Ulceris naturam perpendenti patebit illud phlegmonosum esse quando uterus caleat, atque doleat, febris adsit non exigua, spissumque pus erumpat; œdematosum si modicus calor sit, atque dolor, modica febris & serosum pus; syrrhosum tandem quando uterus dolore sit expertus, durus, renitens, modo extrinsecus, modo intrinsecus digito ipsum tangendo.

3. Communicationum ulceris respectu cum ceteris propinquis partibus apparebit cum vesica ulcus communicare, aut cum intestino, si per alterutrum hytum pus effugiat; vel urina aut faeces per vaginam exeant.

## §. VI.

## §. VI.

*Prognosis.*

I. **U**teri ulcus semper valde periculosum est. 1. Quia in partibus locatur internis quibus difficillime remedia applicantur detergentia, & consolidantia, 2. Sensibilioribus, nervis refertissimis quod gravem dolorem teterinaque scenomena inducit, 3. Quia deleteria sanguis materie inquinatur, qui in ulcere deponitur.

II. Hujusmodi morbus mulieribus qui eo cruciantur valde molestus evadit operationum ergo, quibus subijci debent; merito vero impudicæ penam luunt vitæ transactæ; at pudicæ omni comiseratione dignæ sunt, quibus fortuito hec eveniunt calamitates.

III. Ut rite prognosim instituamus ulcus distinguere debemus quod abscessui repente succedit ab eo quod lente procedit ab erosione; aut scissuris ortum.

IV. Illud quod patefactus abscessus progignit multum puris effundit, maximumque terrorem incutit, at eo semel evacuato, modo absint antecedentes causæ, fluxus, ceteraque scenomena imminuuntur.

V. Quando puris fluentis copia in diem subducitur, verum persistens fluor albus sit, spissus, aqualis, neque fetens, neve corrodens; quando ægræ parum vel nihil doloris perferant, uterus flexibilis sit, non durus, non resistens, ægra nulla, vel pauca quæ in diem abeat febæ laborent; denique si consumptione deficiente illæ pinguescant, tunc multum spei superest valetudinis recuperandæ; contra vero si ea omnia in deterius ruant.

VI. Generice ulcera hujusmodi felices sunt eventus quando mulieres aggre-diuntur bene constitutas, optimæ crasis sanguinis donatas; quando uterus pariter bene constitutus sit, neque syrrhosus, neque obstructus aut laxatus, qui naturalem elaterium servet; verum abscessus aut inflammatio ab accidentali causa proveniant nullo supposito vitio antecedente sanguinis, aut matricis; tandem ulcera exigua sint; at contrarium eveniet in circumstantiis oppositis.

VII. Segniora ulcera quæ ab erosione sensim efformantur; ut de iis rite pronunciemus, distingui debent in *instantia* videlicet nondum incepta; in *incipientia* quando nonnihil serositatis purulentæ jam effundunt; in *confirmata* quando multum puris stillat cum substantiæ maxima jactura.

VIII. Modo ulcere instante idoneis remediis cito occuramus diu continuatis, verum ægræ optimo donentur temperamento, medica, etiam si molesta ferant auxilia felicem valetudinem sperare licebit.

IX. Ulcere vero semel incepto, ac fluente latice jam purulento facto prognosim valde incerta est, convalescunt interdum ægræ si optimo præditæ sint temperamento, morbus levior sit, remedia prompta adhibeant infra proponenda; at sapissime pereunt, pro infirma uteri conditione, deleteria sanguinis indole propria indocilitate, aut animi vexationibus quibus tunc sunt obnoxie.

X. Ulcus confirmatum lethale est, non desunt tamen exempla hujusmodi sanati ulceris; at ea valde rara sunt ut valeant prognosim infirmare functam.

XI. Addi poterunt quæ infra exponemus, quæ nonnullas differentias faciunt circa specialem ulcerum prognosim instituendam, quare

1. Ulcus quod uterum sædat, magis nocuum evadit ceteris paribus eo quod vaginam deturpat, & quod orificium lædit magis eo quod substantiam ipsam uteri infestat.

2. Idcirco ulcera phlegmonosa quorum labia inflammata sint syrrhosa, aut carcinomatosa lethalia sunt.

3. Pa-

3. Pariter desperata erunt quæ vesicam aut rectum invadunt.

XII. Interest animadvertere venerea ulcera Mercurii frictionibus plerumque convalescere, modo tamen feminium Gallicum sola causa eorumdem sit, verum simplex ulcus nuperrimum, parum, profundum existat citra callum, cancrum aut læsionem partium propin quarum.

XIII. Generice lethalia sunt. 1. Ulcera uteri fistulosa phagedænica quæ pus acre, fetidum, uberrimum cum dolore suppeditant.

2. Vetsustiora quæ febrem lentam conjunctam habent, marasimum, œdema, sudorem nocturnum aut fluxum ventris colliquativum.

3. Carcinomatosa denique omnia facta, vel instantia quæ dolor sævissimus prænunciat.

XIV. Experientia didicimus ulcera quæ cito progrediuntur magis dolorosa experiri & inferna in mulieribus adhuc menstruantibus, quam in iis defecturis: hanc differentiam gignit affluxus in utero sanguinis qui in illis redundat in his deficit.

## §. VI.

### Curatio.

**A** Pud clinicos tres ulcerum species enumerantur *simplex nempe, venereum, & carcinomatofum*; hic de duabus prioribus locuturi erimus tantum, carcinomatofum vero in Cap. De uteri cancro considerabimus.

Eas species medendi ratio diversas methodos postulat, quas in diversis articulis singillatim explicabimus. 1. Primo generaliora remedia exponemus in singulis uteri ulceribus idonea. 2. Qualem medelam poscat instans ulcus quod creber dolor uteri prænunciat cum hæmorrhagia aut albo fluore conjunctus, 3. Tutiorem methodum proponemus pertractandi hujusmodi ulcera modo simplicia sint modo confirmata. 4. Quomodo pertractari debeant ulcera venerea vel suspecta ostendemus. 5. Curationem palliativam demonstrabimus modo eradicativam non liceat sperare. 6. Tandem remedia nonnulla indicabimus ab auctoribus proposita adversus omnes uteri ulcerum species commendata.

### *Medendi ratio, & remedia generaliora circa omnes uteri ulcerum species.*

In omnibus ulceribus dæ potissimum indicationes proponuntur, altera est præoccupare plethoræ, aut doloris augmentum in ulcerata parte, ne morbus augeatur; altera est corrigere deleteriam indolem sanguinis, quæ ulcus induxit, aut produxit.

1. Ut priorem impleamus 1. ægras admonere necesse est, ut ab omni exercitio se abstineant, verum longo bisseilio decumbant; minima enim corporis commotio premendo, aut uterum succutiendo infartum augeat, quem doloris, atque fluoris augmentum perbelle declarat.

2. Si venter nonnihil obstructus reperiatur, quod raro accidit, decumbentibus ægris illum clysteribus tepentis acque laxare opus erit, quæ sæcum ita expulsiorem promoveant, conatusque impedian, qui matricem lacerant.

3. Eadem de causa cubili a conjuge distincto quiescere debent a quo consilio putarem semel tantum desistere velle mulieres de propria valetudine fatigatas.

4. Vitam ipsæ gerant sobriam, & methodicam, primum ne augeatur sanguis

nis

nis copia, quæ nimis uteri vasa tumefaceret; *alterum* ut alimenta possent facili digestionis, dulciora, acrimonia orbata, & boni succi quæ optimum chylum suppedient, & edulcorare sanguinem potis sint; quare vesci debent jusculis, orizarum cremore, vermiculata massa, surfurcula; hordeo perlato, aut succo lentium cum brodio excoctis; parum ipsæ carniū comedant, solummodo alas pulorum, aut lepulosos sumendo, a vino vero se abstineant, caise, aut quovis minutalium irritantium genere.

5. Demum animi pathemata omnia removeant quæ sanguinem valeant comovere; hujusmodi sunt mæror, vexatio, ira, vel pervigilium, quod cum valde callefaciunt.

11. Huic regimini addi poterunt remedia quæ cruoris redundantiam imminuunt, atque humorum acrimoniam obtundunt latitantem.

1. Venam igitur cubiti incidere oportebit, non solum ut vitiatorum humorum aliqua pars dematur, verum tumida uteri vasa depleantur, id crebre vel raro reiterando prout dolor, affluxus, aut profluvium plus minusve postulerint.

2. Aëras purgare identidem necessum erit non modo ut ventriculum, primasque vias saburis expiemus, verum sanguinem repurgemus; mitiora itaque purgantia usuveniet Manna videlicet, Cassia, Sal de *duobus*, Rhabarbarum addita pauca Senna, si ægrotantium temperamentum sinat.

3. Sanguinem etiam diluere fas erit laxantibus, & refrigerantibus remediis, id præstant serum lactis depuratum, aut succo plantarum edulcorantium remixtum; apozemata, aut jura iisdem plantis confecta, Cichorea nempe, Boragine, Lactuca; at si tempestas permittat, efficaciores erunt aquæ minerales frigida; illæ de *Forges* admodum profunt ad fontem haustæ, minus vero exportatæ; iis substituuntur aliæ de *Selter*, *Spa*, *Caranfack*, ipsas aqua communi copulando si valida nimis experiantur.

4. Eo collineant balnea, aut semibalnea tepentia ad uteri æstum compescendum; hujusmodi remedium valde utile est quo idonea tempestate crebre uti debent, modo profluvii copia non obsit.

5. Hac methodo diluta sanguinis massa ipsum edulcorare nostrum erit lacte caprino, aut asinino, alterutrum seligendo quod magis ventriculus patiat; ante lactis assumptionem primas vias tamen expiabimus, semel illum in die mane, aut bis mane, & vespere exhibendo; tandem cum vel simplex hauriendo vel duplici uncia aquæ secundæ calcis copulatum, aut æqua dosi succi depurati Fummariz vel Acrimoniz.

6. Modo ventriculus sinat lac etiam vaccinum usuveniet cum tertia parte decoctionis Chinæ radicis, cum pro eventu bis, vel ter in die præscribendo, vel pro integro nutrimento, si stomachus ipsum non renuat.

7. Cauterium tandem apponere alterutro cruri non contemno, ut sanguinis inquinamentum per hanc partem effugiat; & ipse merito in animum induco hujusmodi remedium haud utilissimum esse, verum neque frustraneum evadit, quod sat erit ut ipsum in hoc morbo adhibeamus, in quo paucissima medicina præstat auxilia.



*Methodus idonea in instantibus ulceribus, qua prænunciant continentes, aut crebri uteri dolores, vel anomalum cruoris, aut albi fluxus effluuium.*

His status ulcus respicit quod segniter per erosionem aut excoriationem efformatur; modo tamen ægræ cito sapientem Medicum consulant, lethalis morbi valetudinem sperare licebit, verum per unicum, aut duplicem annum ipsæ medenti obediunt.

1. Regimen primo exacte observare debent tum circa qualitatem, cum circa copiam ciborum, ut nuper admonuimus.

2. Continenter vero animi affectus debent temperare, a vigiliis desistere, & clysterum abusu, verum idoneo positu quiescere, immo lectulo, aut bisseilio detineri pene decumbendo, ne sedentes uterum comprimant.

3. Verum penitus a connubio cum viro diu abstinere

4. Semibalneæ tepentia mane jejuno stomacho, & vespere ante cœnam tunc præscribere debemus, in quibus per horam persistant.

5. Identidem denique ipsas lenientibus purgare convenerit superius indicatis, Iac asinum, aut caprinum pro stomachi præscribendo, semel, vel bis quotidie hauritum; iis vaccinum etiam valde commune substitui potest, si ipsum perfecte digerant, at in hoc casu optimum censeo ipsum remitteri decoctione Hederæ terrestri, aut Graminis.

6. Valde utile experitur ægras penitus lacte alere, duplex poculum lactis asinini mane & vespere exhibendo, totidemque vaccini loco prandi & cœnæ, vel vaccinum tantum quater in die præscribendo; hujusmodi tentamina tamen prudenter inire debemus.

7. Pro circumstantiarum diversitate unica vel duplex uncia quotidie aquæ secundæ calcis addi poterit, vel duplex uncia succi depurati Nasturci, aut decoctionis Hederæ terrestri.

8. Si stomachus omne lactis genus respuat, serum lactis quotidie simili methodo substituamus probe depuratum, vel duplex dosis decoctionis, ex pullo, vitulo, nonnullis cancris, aut ranis confectæ; modo vero tempestas sinat pro vulgari potu hauriant ægræ aquas de *Forges* aut *Spa* parum aquæ communis addendo si opus requiratur; verum si hujusmodi aquæ desint substitui poterit levior decoctio, Orixæ, aut Graminis, in qua Verbaci pugilli aliquot infusi sint.

9. Cubiti venæ sectio quæ in hac morbi specie plerumque utilior evadit institui potest; si dolores crebri, & vividiores sint bis terve in die Venam incidere fas erit ut ipsi compescantur; iis vero subactis, singulis mensibus sufficiet hujusmodi remedium reiterare ad novem uncias, octavo, aut nono die ante catameniorum regressum.

10. In iis casibus utiliter adhibui grana duodecim Cascharillæ, interdum totidem tartati martialis remixta, sub forma bolarii parum ante prandium propinata; alterum horum remedium tonicum est, valet uteri claterium sustinere ab affluxu sanguinis labefactum; alterum modice aperit, atque sensim sensimque infartum imminuit.

*Tutior methodus, & efficacior adversus uteri ulcus simplex sed confirmatum.*

Confirmato jam ulcere animadversionibus sedulo consulere necessum erit primo Articulo enunciatis, generalliorem rationem ulcus medendi propositam amplectendo

Atendo; videlicet illum detergere, carnis productionem fovere, verum cicatricem consolidare; totidem indicationes in uteri ulceribus aut vaginæ implere nostrum erit iisdem remediis in utroque casu adhibitis; at cum aliqua adsit differentia in eorum exhibitione, ideoque singillatim de iis nunc tractabimus.

1. Ad ea fœda uteri ulcera detergenda plures adhibentur rationes pro majori, vel minori deleteria morbi indole.

Varia externa remedia usuveniunt interius copulata, quæ Articulo primoproposui, videlicet. 1. Apozemata aut decoctiones ex Folii Acrimoniz, Pimpinellæ, Argentinz, Alkimilæ, Bugulæ, Saniculæ, Virgæ Aureæ & Mille folii, idoneas tres aut quatuor earum plantarum seligendo.

2. Decoctiones sub pthisanæ forma ex Chinæ radice in taleolas divisa, aut Salsaparilla confectæ; verum si opus requirat Guayaci raspati pauco, quarum quotidie unum, vel duplex poculum exhibetur, modo ægræ pinguiori, & pichuoso donentur temperamento, febris absit, & illæ dolore sint expertes.

3. Injectiones denique intromittuntur idoneo siphone adhibito caniculo oblongo instructo, in extrema sui parte globuloso, & foraminulis pertuso.

Plerumque iis injectionibus cedit serum lactis cum saccharo rosato, vel decoctio hordei cum melle rosato, aut decoctio Artemisiz, Matricariæ, Marubii, Hyperici, Apii, &c. vel radicum Aristolochiæ, aut Iridis cum melle simul; verum si ulcus maxime salsum conspiciatur quod ab affluenti pure sanioso, & fœtido innotebit, iis additur lixivium fermentorum, aut utilius parum Tincturæ, Myrrhæ, Unguenti Ægyptiaci, aut Collyrii Lanfranci modica primum dosi, pro opere aucta.

4. Magnopere verum intererit quod ex injectiones cavum uteri invadant ubi ulcus locatur, ideoque obstericans id peragere debet qui canaliculum uteri ostio valeat aptare, quod tentare ægris, aut assidentibus nefas erit, modo diutina observatione non edoceantur.

5. Vapores etiam per fellam familiaricam in utero recepti aliquem usum habent, etiamsi inutiles evadant absque tubuli auxilio qui ad orificium usque illos perducant, verum pro hoc scopo tepentes tantum decoctiones adhibeantur ne uterum lædant.

II. Dum uterus mollis reperitur, flexibilis, atque pene indolens; pus vero inops effluit, & laudabile remedia leviter detergentia tantum conveniunt, quæ ulceris fundum mudent donec labia resolvantur, & caro regeneretur; hac ratione secundam implere indicationem poterimus; hujus census remedia sunt.

1. Injectiones ex decoctionibus hordei foliorum Artemisiz, Centauri minoris cum pauco melle.

2. Injectiones aquarum thermalium sulphurearum, quales sunt illæ de Barrege, d' Aix la Chapella, aut Aix in Sabaudia.

3. Suffumigia, aut vapores decoctionum, vel aquarum earum quæ modo superius indicato in utero recipiuntur.

5. Per os vero balsama sumuntur videlicet Coppai, Canadense, Meccæ alterutrum eorum seligendo ad quatuor vel quinque guttas cum saccharo depurato comixtum, aut syrupo Capillarium; iis substitui possunt grana quindecim, aut viginti Terrebynthinæ Venetæ, cum ovi luteo.

III. Si unquam summo naturæ beneficio scenomena omnia desistant, puris effluviū abeat, aut lymphaticum tantum persistat, tunculus sensim sensimque consolidare fas erit, quo pacto tertiam indicationem implebimus.

Huic scopo enim favent. 1. Balsama supradicta quibus junguntur trochisci Gordonii, Sanguinis Draconis, Myrrhæ, Mastix, Sal sedativum Hombergi, Gummi Tacamacha, duo vel tria seligendo, & sub pillularum forma octo grana singulorum exhibendo.

2. Injectionum usum protrahere ex aquis thermalibus sulphureis proficuum erit aliquibus additis coctlearibus aquæ secundæ calcis, vel decoctionis sanguinis Draconis, aut terræ Japonicæ.

3. Earum aquarum defectu substitui poterit decoctio radicis Consolidæ majoris, Bistortæ; foliorum Plantaginis, Bursæ Pastoris, Argentinæ, Pillofellæ aut Brunellæ &c., iis additis quæ superius enunciamus.

4. Sequentium rotularum summus quandoque tubuli auxilio in utero recipitur; hujusmodi rotulæ constanter ex Myrrha, Mastice, Gummi Tacamacha, Ladano, Thure iis omnibus simul tritis, & anatina parte commixtis, verum guttis aliquibus Terrebyntinæ, aut Resinæ subactis, animadvertendum est quod ea suffumigia, quæ primo nimis calefunt, tepentia tantum ad uterum pertingant, quæ de causa paucæ rotulæ supra prunas pene extinctas superimponentur, removendo nonnihil tubulum.

5. Exhibebuntur quotidie unum, vel duplex poculum decoctionis Chinæ radicis, aut Lenticæ ad unciam ebulliti cum quatuor circiter sextertiis aquæ communis ad tertiam consumptionem.

6. Quamvis diutinum nimis videatur hujusmodi regimen, ægræ tamen ipsum observare debebunt, ut Articulo primo enunciamus, in eo persistendo post valetudinem diu.

IV. In ulceribus vaginæ qualemcumque partem occupent, fundum aut latera infestent, eandem methodum prosecuturi erimus, videlicet triplicem statum distinguendo deterfionis ulceris, regenerationis carnis, & cicatrificationis, eadem continenter remedia prescribendo.

1. Injectiones quæ impendi debent pro singulo stadio eadem constanter sunt, quas intra vaginam ducere facile erit; curabimus enim ut ægræ dorso decumbant, caput inferius deprimant, clunes vero elevent ut remedia diu in utero detineantur; quod pariter satagere debemus ipsum injectando.

2. Suffumigia vero usuveniunt per siphonem introducta, quod facillimum erit patrare.

3. Præter ea in ulceribus hujusmodi semibalneæ utilia evadunt in quibus clunes tantum insunduntur, quare Latini illa *inseffus* appellaverunt, huic fini cedunt decoctiones idoneæ, & ulceris gradui appropriatæ, quæ valde profunt in ulceribus vaginæ, quæ hac methodo facile quæquæ versus detergantur.

4. Denique vaginæ ulcera pertractare possunt quasi externa forent, initio pulvinum oblitum apponendo digerentis simplicis, aut Tinctura Myrrhæ copulati; verum pulvinum Balsamo Arcei tantum, aut digerenti remixto obliniendo; denique sicci pulvini, vel aqua secunda calcis imbuti usuveniunt Terrebynthina inspersi pulverisata; tandem omnia quæ vaginæ introducuntur filo necti necesse erit ut facile extrahi possint.

### *Methodus curandi ulcera uteri Venerea.*

Modo cognoscamus uteri ulcus a lue Venerea penitus derivare, omne studium impendere nostrum erit ut efficaciter virum subijciamus quod morbum produxerat; hic supervacaneum foret de illo speciatim pertractare, librum enim pervolvite qui de hac materia fusius disserit; sufficit animadvertiones nonnullas addere quæ speciatim hunc morbum resiciunt.

1. Primo ægram cubiti vix sectione viribus, & pulsui accommodata disponere, verum ipsam purgare superallatis lenientibus necessum erit.

II. Imposterum balnea tepentia semel vel bis quotidie per decem, aut quindecim dies continuata utilia experta sunt, verum intra balneum, aut ex eore-

*Afruch de Morbis Mulierum.*

O

duci

duci dosim exhibere fas erit seri depurati, aut jus vizuli vel puli cum herbis refrigerantibus coctum.

III. Sed si morbus urgeat ejusdem progressus sistere frictionibus mercurialibus tentabimus, adhuc persistendo in balneorum usu.

IV. Experientia didicimus, Mercurium sanguinis circulationem accelerare, atque pondus augere, verum utraque ratione internis ulceribus nocuum evadere, praesertim si ea in partibus delicatioribus locata sint. Id pluries experti sumus in hoc morbo affectis qui luis celticæ causa phthisici facti sunt, etiamsi in iis ratio suadeat frictiones convenire; verum etsi eorum nonnullos quandoque convalescere videamus, tamen observavimus plerumque Mercurium pulmonem ledere in iis etiam qui feliciter convaluerunt; ex animadversiones mensuram præbent medendi rationis ulcerum venereorum uteri respectu, docentque frisiones paulatim initio saltem esse instituendas.

V. Iis rationibus adductis intervalla inter unam & alteram junctionem tres saltem dies æquare debent; pro singula vero frictione unguentidrachma fas erit ex anatina parte Mercurii extincti, & Suillæ adipe confecti, paulatim immo hujusmodi unguenti demere debemus quo interius vaginam fricemus; in progressu, effectus Mercurii perpendendo, frisiones crebriores fieri poterunt, dosim etiam unguenti adaugendo summa tamen cautione.

VI. Ut optatum frisiones effectum præstent pro integra curatione sex unguenti unciaz impendi debent, procul interruptione, aut purgatione intermedia, ex quibus patet hanc medendi methodum quatuor, vel quinque menses perdurare.

VII. Per omne id tempus ægotantem alere oportebit ea methodo quam in hoc morbo medicis præscribere mos est, modo lac pro integro nutrimento adhibere aliqua de causa impediatur; verum usuveniunt remedia a nobis articulo præcedenti proposita diu continuata donec ulcus perbelle detersum, atque cicatrizatum videatur.

### *Curatio palliativa ulcerum uteri incurabilium.*

In hoc casu omnis diligentia impenditur ad graves dolores mitigandos, terribissimaque sænomena compescenda, quæ ægris superveniunt, vel ea saltem mitigare modo morbi vehementia, quandoque imminuta id tentare sinat.

1. Hac de causa præcipuum erit dolorem ab ulcere ortum moderare cui levioribus venæ sectionibus, quæ vasa uteri depleant, imminuantque phlogosim, aut sensibilitatem, occurremus.

2. Tunc carniarum usum interdicare necesse erit ægotantes lacte tantum nutriendo, vel jusculis, aut farinaceis alimentis ex leviori jure insipido confectis.

3. Si favores exurgant dolores narcotica modica dosi quarta quoque hora exhibere conabimur, qualia sunt granum semis ladani aqua callida solutum, aut duodecim vel quindecim guttæ Tincturæ annodynæ augendo, at imminuendo remedii quantitatem pro doloris gradu, aut pharmaci effectui.

4. Injectiones tunc a nonnullis adhibentur ex succo Plantaginis, Portulacæ, sedi majoris ad unciam unam & semis, aut duplicem unciam singulorum in quibus dilui poterit parum Amylli calce non remixti; eandem indicationem implet succus Solani *Morella* dicti aut trium vel quatuor unciarum dosim, postquam in mortario plumbeo dia ipsum tritum fuerit.

5. Iis injectionibus interdum adjungitur syrupus Papaveri albi, Ladanum aqua solutum, aut Tinctura annodyna, dosim modificando in ratione quantitatis ejusdem remedii per os sumpti.

6. Tan-

6. Tandem femibalnea præscribi poterunt ex decoctionibus earumdem plantarum confecta, hortando ægras ut aptiori spongia hujusmodi decoctiones intimius quam fieri potest intromittant, at id fusius Cap. De cancro examina-  
bimus.

7. Crebre eveniunt, in desperatis præsertim ulceribus, lethales hæmorrhagiæ, quas sistere superioribus venæ sectionibus necesse erit, verum pthisanam exhibendo ex decoctione perfectam radicis Consolidæ majoris, ad gratam aciditatem usque superaffundendo 55. aut 56. guttas aque Rabelli pro singulo cænoporo, addita etiam uncia Syrupi Plantaginis, aut Capillarium; si morbus urgeat integrum sextarium exhiberi poterit pthisanæ illius in plures partes divisum; at si mitior ægritudo videatur, fatis erit unicum fumere cyathum pro singulo die.

8. Si vehementia, aut pertinacia hæmorrhagiæ periclitentur ægræ, utrum tunc eadem pthisana irrorare conveniet leviter tepenti, ipsas ita locando ut injectiones illuc diu persistant.

*Remedia nonnulla proposita adversus uteri ulcera.*

Ulceræ matricis incommoda sunt quorum effectus admodum conspicui sunt, atque medendi ratio omnibus patula nimis, ut difficillime decipi possint Medici novas mirificas medendi rationes instituendo; mihi tria subsequutura remedia tantum innotuerunt, quæ aliquam attentionem mereantur.

I. (a) Felix Platerus Rauracus testatur succum urticæ urina infantis remixtum mirifice ulcera uteri sanasse: *succus urticae cum urina pueri mixtus mirifice abluendo injectus ulcera uteri sanat*; at de hac observatione valde dubito, verum ille innocuus saltem experitur.

II. (b) Bellostus magni nominis Chirurgus pene certum remedium proposuit in omni uteri ulcere, hoc est decoctio foliorum nucum pauco saccharo remixta, qua lintum imbibitur ulceri apponendum; hac de causa injectiones usuvenirent ex eadem decoctione paratæ & uteri ulceribus applicatæ, quæ sane nihil nocerent; per os simul sumi poterit aqua destillata nucum earumdem, modo ejusdem diuretica virtus non læderet, cum sciamus ægras plerumque cruciari inter mingendum.

III. Johanns Liebaut Doctor Medicus Facultatis Parisiensis libellum composuit latine conscriptum Seculo XIV. sub eo Titulo *Traictatus de Morbis Mulierum* ab operibus desumptum Johanns Marinelli Medici de eadem materia pertractantibus; animadvertit hic (c) suffumigia aut injectiones quæ in ulceribus uteri instituuntur, Auripigmento flavo, vel citreo, aut Sublimato corrosivo actuari, circa quod fideliter a Lazaro Pe (d) prosecutus est, qui Marinelli opus Gallice vertit: at, eorum medicorum pace, hujusmodi praxim valde infensam judico, neve unquam adhiberem Auripigmentum dum uterum injectare vellem, cum illud revera Arsenicum sit, etiam si vero Arsenico mitius, aut Corrosivo.

(a) Praelex Lib. XXX. Cap. 14. Tom. II. pag. 375. (b) Pag. 16. in sua Chirurg.

(c) De la santé, secondité, & Maladies des Femmes. Chap. XIX. & XX.

(d) Traité des Maladies des Femmes, & Remèdes d'elles, Liv. II. Chap. 19. & 20.

## C A P U T V.

## De uteri Syrrho.

## §. I.

## Descriptio, &amp; Differentia.

**S**YRRHUS genus tumoris est quatuor essentialibus characteribus a ceteris tumoribus distinctus, durus est, renitens, indolens; verum sensim sensimque per *congestionem* augetur; tandem colorem naturalem partis affectæ non pervertit; signa tria priora valde conspicua sunt in hujusmodi tumoribus, qui uterum agrediuntur, at haud facile est quantum cognoscere indicium procul visu latitans; conjecturis enim fidendum est, & cadaverum sectionibus quæ satis illum declarant.

Vidimus in Tractatu *Tumorum*, & *Ulcera* syrrhos omnibus corporis partibus, glandulosis præsertim communes esse, quare facile patebit matricem præsertim iis esse obnoxiam, quod observationes etiam confirmant.

Dum syrrhus omnem uteri volumen occupat *totalis* aut *universalis* appellatur; verum si aliquam partem tantum ut plerumque evenit, *partialis* dicitur; in utero pars affecta variat sæpissime; modo enim fundum, modo orificium, modo latera destrorsum, aut sinistrorsum, modo anticam, modo posticam uteri partem syrrhus deturpat; at hujusmodi differentie parvi faciendæ sunt, qui nihil naturam morbi immutant, tantum ab iis distingui debent syrrhi vaginæ, vulvæ, aut alutri labiorum, non causarum respectu, quæ eadem sunt, sed curandi methodi quæ diversa est, cum topica his applicare queamus, non vero uteri syrrhis.

Maxima vero differentia a gradu resistantiæ, aut indolentiæ desumitur; quando syrrhus admodum durus, resistens valde, indolens etiam sub maxima pressione reperitur, syrrhus *perfectus* dicitur, vel, ut alibi diximus, *legitimus* aut *exquisitus*; contra vero *imperfectus*, *illegitimus*, aut *incipiens* appellatur, quando imperfecte resistit, aliquem sensum servet saltem dum manu præmitur.

Syrrhus plerumque ab œdemate, aut inflammatione circumscribitur, quare *œdematosus*, aut *phlegmonosus* appellatur; secus enim *simplex* dicitur si œdema aut inflammatio absint.

In utero syrrhi circumferentia facile distinguitur modo corpus uteri, fundum, aut latera afficiat, tuncque syrrhus *circumscriptus* dicitur; difficilior tamen innotescit ejusdem extensio si collum uteri deturpet, cum tumoris maxima pars tunc ossi pubis subjaceat, ideoque tunc *non circumscriptus* nuncupatur.

Tandem syrrhus legitimus, & perfectus, verum interdum spurius, aut imperfectus tument atque dolent, aut lincinationibus plus minusve crebris sunt obnoxii, ideoque tunc carcinomatosi fiunt, & in cancrum degenerant, ut infra Cap. De uteri cancro enunciabimus.

## §. II.

## Causa.

**S**yrrium uteri nisi aliquis circulantium humorum gignere valet, aut eorum qui separantur, morantur, cumulantur, aut inspissantur in aliqua parte, donec in tumorem durum resistentem concrecant; itaque nisi duo humores in utero circulant, lymphæ nempe atque sanguis; humor vero lacteus de quo in Libro præcedenti locuti sumus unicus secernitur intra speciales vesiculas pro usibus illuc explicatis; syrrii ergo incrementum vel sanguinis congestioni, vel lymphæ congeriei tribuendum videtur, vel denique lacteo humori in suis receptaculis collecto, atque inspissato.

At evidens est id sanguinis infartui minime tribui posse, 1. Quia hujusmodi cumulus quotidie calorem producit, quo syrrius expers est, 2. Quia ejusdem congestio citra ruborem numquam fit qui in syrrio deest naturali tantum calore servato, 3. Verum quia sanguinis collectio cito pergit per modum *fluxionis*; syrrius vero sensum sensimque ingrandescit per modum *congestionis*; idcirco iis rebus omnibus rite perscrutatis uteri syrrius nisi a lymphæ affluentis intra propria vasa inspissatæ maxima congerie oriri potest, quæ syrrium *lymphaticum* generat; cumulus vero lactei seu uterini humoris in propriis vesiculis detenti, atque condensati syrrium *lacticosum* gignit; denique a lymphæ simul, & lactei humoris affluxu syrrius *lacteo-lymphaticus* oriri debet, qui crebrius uterum infestat.

Iis explicatis, superest causas explanare quæ lymphæ aut lactis uterini infartum inducunt: hæ duplicis sunt speciei; aliz universales *efficientes* dictæ, quæ illos humores constipant, ut in utero concrecant; aliz speciales seu *occasionales*, quæ ad uterum spissos humores dirigunt.

Causæ generales quæ lympham figunt ex omnes sunt spissitudini sanguinis communes, videlicet copia alimentorum valde nutrientium, & eorum qualitas vitiosa, aut crassitudo.

Vitia digestionis plerumque consecutiones sunt intemperantiæ, & inordinatæ vitæ regiminis, a quibus sanguis chylum recipit imperfecte subactum, atque valde densum.

Animi longa, & sæviora pathemata, quæ sanguinis cursum retardando illum inspissant.

Tandem delesteriam cuoris inquinamentum quo sanguis inficitur, Celticum nempe, scorbuticum, aut strummosum.

At hujusmodi generales causæ nedum valent syrrium uteri producere nisi locales, aut occasionales lympham lacteamque humorem eo devehant; inter hæc recensentur,

1. Spissitudo, quam uteri, & propinquarum partium lymphæ acquirit, incoitum viro lue venerea correpto.

2. Iniectiones gelidæ nimis, aut adstringentes, quæ interdum imprudenter uterum ad dolorem inflammationis cohibendum, atque uteri claterium substinendum, aut resolutionem promovendam.

3. Subita restrictio uteri, frigoris externi ergo, dum agræ perperam, mensibus, aut lochiis fluentibus, aqua frigida pedes luunt.

4. Atonia uteri vel naturalis ut in labefactis laxisque subjectis; vel ea quæ collisioni hujus partis, abortui, aut laborioso partui succedit, in quibus circumstantiis magnopere viscus distenditur.

5. Obstructiones denique inveteratæ, quæ lymphæ circulum, atque lactis uterini

*Astruc de Morbis Mulierum.*

O 3

riai

rini expansionem prohibent; hujusmodi in iis crebre sunt, quæ dum impuberet erant pallore laborarunt, incomplete vero menstruarunt, aut mensium suppressionibus fuerunt obnoxie, ut superiori libro perspicimus.

Connubium nonnullarum earum causarum lympham congerit, lacteumque uteri succum, seu simplicem redundantiam inducit, quæ in diem aucta uterum constipat, vel id eveniat, quod liquidiorum partem affectæ partis calor dissipet; vel articularum proximarum contractiones exprimant, spissiori superfice; quæ de causa syrrhi congestio insensibiliter, segniterque pergit, ut tumorem diu ignoremus, nisi ipsum dira prænuntient phenomena.

### §. III.

#### *Differentiarum explicatio.*

I. Interdum sola lymphæ inspissatur, quæ vasa lymphatica infarcit per uteri substantiam reptantia, eaque syrrhum efformat, qui *lymphaticus* appellatur; si idem eveniat, a lacteo uteri succo intra vermicularia detento *lacteum* syrrhum oriri videbis; verum si utrumque coacervetur hinc natus syrrhus *lymphatico-lacteus* vocari solet in utero magis obvius.

II. Quando lymphæ, atque lacteus humor omnem uteri ambitum obstruant aliqua accidentali de causa, quæ tamen totum uterum afficiat, *syrrhus totalis* nuncupatur, raro id evenit, tamen fidæ observationes illum ostenderunt.

Contra vero syrrhus ille *partialis* dicitur, dum partem uteri aliquam ipse occupat, speciali de causa, quæ illuc tantum lympham, aut uterinum laticem congerit; hujusmodi species diversas partes deturpat, modo fundum, collum, aut latera; modo sinistrorsum aut dextrorsum; modo anteriùs aut posterius pro diversa vitæ sede, quæ syrrhi generationi locum præbuit; quandoque syrrhi uteri nomine insignitur ille vaginæ, vulvæ, vel pudendorum ut jam admodum.

III. Si lymphæ, aut lac uterinum, quæ syrrhum efformant, valde spissæ sint, verum lente ille procedat, tumor durus, resistens, atque indolens apparebit, ut *perfecti*, aut *legitimi* syrrhi nomen mereatur, quia ii humores compactiorem tumorem efformabunt, qui in diem indurescet, dum continenter calori partis affectæ, & articularum pulsibus subjicitur.

Contra vero si ii humores liquidiores existant, tumor celerius fiat, syrrhus durus minus, & sensibilis magis apparebit, isque *spurius*, aut *imperfectus* appellabitur, tum quia ii humores minus densi molliorem efformabunt tumorem, tum quia hic tumor per breve temporis spatium calori, atque articularum pulsibus expositus fuit, ut tenuiores moleculæ ab iis causis, neque dissipatæ, neque expulsi fuerint.

IV. Syrrhus hujusmodi nunquam trans uterum pergit, ideoque jugiter *circumscriptus* erit, totalis sit, vel partialis; verum ejusdem margines haud facile erit determinare si orificium uteri syrrhus deturpaverit, cum tunc ossi pubi subjiciatur, modo per vaginæ hyatum eum perferutari nequimus.

V. Syrrhus uteri dum majorem extensionem acquirit hujus partis sanguinea, aut lymphatica vasa distendit, aut sui volumine comprimit; modo causæ inferiores sint, lymphatica tantum vasa graciliora convellent ut lymphæ in syrrho reata oedema producat, seu *adematousum* syrrhum; verum si ex causæ validioribus sint, sanguinea vasa etiam contorquebunt in propinquis partibus locata, quare sanguine retento inflammatio oritur quæ syrrhum *phlegmosum* inducit.

VI. Syrrhus imperfectus, aut pseudo-syrrhus interdum resolvitur quia nondum coacervata materies indurescit, verum fibræ non parum elaterii servant; de-



demum syrrhus perfectus, aut legitimus nunquam resolvitur tum duritiei coacturati humoris, cum fibrarum inertium: ergo, quæ nullo modo resolutionem fovere possunt.

VII. Syrrhus legitimus sæpe in cancrum degenerat rationibus infra exponendis *Cap. De uteri cancro*; syrrhus vero imperfectus huic minus est obnoxius, interdum potius in supurationem vergit, quæ abscessum producit, deleteriz indolis, in ulcus syrrhosum definiturum.

## §. IV.

*Symptomata.*

I. Syrrhus uteri perfectus indolens, est neque colorem, aut calorem partis affectæ immutat, ut in *Tractatu Tumorum*, & *Ulcera* syrrhi respectu generice ostendimus; iisdem de causis syrrhus sanguinis, aut lymphæ circulum non intercept, ut diu agræ interdum sine noxa illum perferant.

II. At modo ipse majorem volumen acquirit uterum gravat ut inferius ipsum trahat, quæ de causa agræ moleste incedunt, aut pedibus stant, autumant enim agræ tunc uterum jam prolabi.

III. Difficillime etiam decumbunt circa unam, vel alterum latus, modo syrrhus totalis sit, quia tunc uterus ad alterutram partem trahitur ut ipsis dorso tantum decumbere fas sit.

IV. Contra vero dum syrrhus partialis gignitur, citra incommodum dorso, vel in affecta parte jacent, non vero sanam partem versus decumbunt, in qua lancinantem dolorem perferunt.

V. Interdum syrrhus hujusmodi catamenia minime implicat, quæ vulgarem periodum conservant, modo sufficiens uteri pars, aut lacteorum vasorum numerus compressione expers sit, atque leges menstruationis, quales *Lib. I. Cap. II.* descripsimus, libere exerceantur; at contra dum interiorum uteri pene omnem ambitum volumen syrrhi auctum comprimit, menses sistunt, vel factem inordinatæ fluunt, tum copię, cum periodorum respectu.

VI. Interdum in hoc statu lethales hæmorrhagiæ superveniunt; neminem latet confirmatos syrrhos varicibus innumeris scatere, quare si alterutra disrumpatur hæmorrhagiam induxerit, plus minusve uberrimam, atque diutinam, pro diversa venæ concisæ amplitudine, aut difficili oclusione.

VII. Syrrhi uteri confirmati, plerumque albos fluores lymphaticos comites habent, nam vasa sanguinea, & uteri lymphatica, & tumore compressa tenuiorem lympham per tunicarum hyatus effugere solent.

VIII. Dum syrrhus modicus persistit neque mensium periodum impedit, aut albos fluores inducit, vel leviores tantum, mulieres sætum concipere, gerere, feliciterque parere potis sunt, quod certissimæ observationes ostendunt; at contrarium evenit modo syrrhus amplius existat, omnem uteri capacitatem occupet, catamenia perturbet, album fluorem inducat, ut fusius *Cap. De sterilitate* observabimus.

IX. Idem syrrhus ad certum gradum auctus iliacas venas premit, quæ ab extremitatibus inferioribus sanguinem revehunt, ejusdemque ordinis lymphaticas venas reduces, quare difficulter refluyendo sanguinis, atque lymphæ serositatem deponunt, quæ pedum, crurum &c., aut genitalium cedema gignit.

X. Eademque de causa, sanguinis circulo intercepto, tum in hac parte cum in ceteris abdominis visceribus, uteri Hydrops, & Ascitis ipsa producuntur, etiam postremo morbum magis viscerum infartus, quam syrrhus inducat.

## §. V.

*Diagnos.*

I. **H**Aud facile erit morbi initio syrrhum cognoscere latitantem, ægræ ipsæ nullam molestiam perferunt, nullum possunt auxilium; ille crescit tamen, conspicuus fit, magnopere vexat, tum exterius abdomen premendo facile circumscribitur, verum pondus syrrhi existentiam declarat; interdum juvat digitum per vaginam ad uterum usque intromittere, imo modo syrrhus exiguus sit, manu exterius hypogastro applicare, ut resistentiam tutius, & volumen tumoris conspiciamus.

II. Quamvis hujusmodi signa satis syrrhum designent, ipsum tamen quandoque cum hydropse, gestatione, aut mola confundunt, ideoque indicia discernere necesse erit, per quæ ab his syrrhus differt; verum cum hydropis aut molæ indolem non cognoscamus, id percutari hic supervacaneum censeo, quare lectorem eo mittimus ubi de iis morbis speciatim diserturi erimus.

III. Species etiam syrrhi diversas detegere nostrum erit, ut de singulis rite prognosim instituamus, quod tamen facile obtineretur.

1. Modo enim pressioni tumor nonnihil cedat, & aliqualem ægræ dolorem perferant, syrrhus *spurius* aut *imperfectus* aderit.

2. *Perfectus* vero, aut *legitimus* cum indolens sit, atque resistens.

3. Hypogastrium premendo, matricem versus præferim, facile dignoscitur an syrrhus *partialis* sit, vel *totalis*; modo *partialis* sit ejusdem positis innotebit, simili ratione inum ventrem examinando, neve fundum, aut alterutrum latus occupet; qui vero uteri collum infestat; digito patescit.

4. Denique syrrhus *phlegmonosus* erit quando ægræ de calore, atque dolore conquirebuntur, cum pulsu crebro & elato; *œdematosus* vero quando citra dolorem, calorem, atque febrem copiosum stillet lymphaticum effluvium.

5. Vaginæ tandem, vulvæ, aut pudendorum syrrhi oculis satis subjiciuntur, ut de eorum volumine, atque indole facile certiores fieri possimus.

## §. VI.

*Prognos.*

I. **G**enerice syrrhus teterrimus morbus est, & curatu difficillimus quod præfertim de eo intelligendum est, qui uterum deturpat, ubi topica remedia neutiquam applicantur, universalia vero vix pertingunt.

II. Syrrhus *perfectus* incurabilis est, cum neque resolvi, neque supurari queat, quæ duplex est sed unica medendi ratio.

III. In syrrho *imperfecto* aliqua superest valetudinis spes, cum morbi saltem initio, vel resolvi possit ut observationes docent; vel sponte ipse in suppurationem, aut abscessum desinat; prima admodum salubris via est, sed rara; altera frequens, sed periculosa magis, cum in abscessum, aut ulcus degeneret plerumque noxium valde, & periculosum.

IV. Uteri syrrhus ut ceteri aliarum partium facile in cancerum degenerat, rationibus infra Cap. de Cancro enunciandis; hujusmodi methamorphosis magis periculosa evadit in iis mulieribus, quæ biliose, aut atrabiliari donantur temperamento, quam in iis quæ sanguineo, aut pituitoso donatæ sunt; magis in illis, quæ animi passionibus, aut vigiliis defatigantur, quam in iis, quæ tranquillam vitam ducunt; verum illa nocua magis in vetustiori, quam in recenti; in

ti ; in imperfecto quam in perfecto ; in ampliori quam in exiguo tumore experitur.

V. Non inutile erit animadvertere lactinosum syrrium lymphatico facilius solvi, nam lymphatici humores modo resolvantur per longos amphiactūs, circumvchi debent antequam in circulum revertant ; lactinosi vero facile per vermicularium hyatus in utero patulos excernuntur ; idem prænunciabimus de syrrio vaginæ, aut vulvæ, qui ab iis parum distant.

## §. VII.

### Curatio.

EX anteaftis apparet duplicem esse syrrii medendi rationem, altera palliativa videtur in incurabili syrrio, perfecto nempe, & vetustiori ; altera eradicatoria, fortassis, in syrrio recenti imperfecto, minus extenso, qui mulieres infectat de cetero bene constitutas, & temperamento sanguineo, aut pituitoso donatas, in quibus menstruus fluxus adhuc persistit.

Quare primum. I. Methodum curativam in iis circumstantiis obviæ explicabimus.

II. Palliativam medendi rationem enunciabimus, quæ potissima est in vetustiori, & perfecto syrrio, qui mulieres vexat cachecticas, & temperamento præditas atrabiliari, aut bilioso menstruis orbatas.

III. Cautelas proponemus necessarissimas quando syrrium in cancerum vergere suspicemur.

IV. Tandem remedia nonnulla demonstrabimus aduersus uteri syrrium commendata.

### Methodus curativa.

Dum Medicis auxiliis tumorem durum, syrrium nempe resolvere conamur, statim nostrum erit : 1. Massam humorum attenuare, fluidioremque reddere ut materies ipsa relaxetur in tumorem detenta : 2. Partis affectæ tensionem imminuere ut facilius sanies subacta excernatur : 3. Hanc aperientibus & solventibus efficacioribus alcolizare : 4. Tandem partium elaterium substinere ut collecta materies a vividioribus fibrarum oscillationibus citius exprimatur, syrriusque resolvatur.

Quatuor huiusmodi indicationes subsequutura remedia implent ; quæ validiora experta sunt.

I. Sanguis atque lympa subsequenter attenuantur pharmacis, videlicet,

1. Decoctionibus, aut apozematis confectis ex

Radicebus Cichoreæ  
Eryngii  
Anonidis  
Brusci  
Asparagi &c.

} ab ʒj ad ʒjss.

Foliis Agrimonie  
Pimpinellæ  
Fumariæ  
Nasturci aquatici

} a pug.j ad pug.j.ß.

in qui-

Tartarum vitriolatum ) a gr. xxx. ad xxxvj.  
Arcanum duplicatum ) ad 3j.  
Sal Glauberi ) ad 3j.  
Terra folliata Tartari ) ad 3ß.  
Tartarum martiale ) a ʒj. ab 3ß.  
Flores martiales ) a gr. xij. ad gr. xxiv.

Perfici possunt ex iis radicibus, atque foliis decoctiones cum pullo simul, aut carne vitulina ebollitæ; vel apozemata simplicia, addito etiam syrupo V. radicum aperientium

2. Serum lactis vaccinum, aut caprinum coagulo paratum, & per cartam bibulam deparatum optimum censetur, pro singula vice super affundendo uncias tres succi depurati Chærophylli, Nasturcii fontani, Fumariz &c., in iis solvendo aliquod ex salibus aperientibus superiori Articulo indicatis.

3. Lac pariter asininum prodest modo sanguis acris sit semel saltem in die sumptum, verum afellam seligendo a partu recentem quæ bonæ crasis lac, ferumque suppeditet.

4. Aquæ minerales ferruginæ exhiberi poterunt modo tempestas permittat, inter quas mitiores, & magis idoneas seligito quas diu valeant ægræ perferre.

II. Uno eodemque tempore tumorem emollire, & tensionem tollere debemus, quod obtinetur sequentia remedia exhibendo tum exterius applicita, cum intus sumpta, videlicet,

1. Apozemata, & decoctiones laxantes, verum cetera remedia superius propo-  
sita modo nondum adhibita sint.

2. Balnea, & semibalnea aquæ purissimæ, vel decoctionum plantarum emol-  
lientium, quales sunt.

Bisfalsa  
Parietaria  
Nimphaa  
Branca-Ursina  
Violæ &c.

Ad libitum balnea præscribi possunt mane aut vespere, procul tamen a prædicio,  
in quibus per horæ spatium persistere debent ægræ.

3. Cataplasmata usuveniunt parata

Ex pulpa Cæpæ  
Lilii

Vel Foliis Oxalidis  
Althææ  
Malvæ

ceterarumque plantarum de quibus locuti sumus, sub cineres illas coquendo, iis  
pulpam copulando per cribrum transectam, oleum liliorum, aut micilaginem  
seminum Psylli.

4. Fomenta regioni hypogastricæ applicita, & injectiones ex decoctionibus  
tepentibus earundem plantarum confectæ in utero introductæ.

5. Cly-

5. Clysteria ex eadem decoctione , & oleo amigdalorum dulcium parata : sane hujusmodi remedia, balnea nempe, cataplasmata &c. debilitate syrrium utri destruant ; verum cum intimius partem affectam pervadant sat erit ut eorundem usum non contemnemus.

III. Postquam ea remedia precessa sint per idoneum temporis spatium, materiam in syrrio detentam solvere curabimus.

1. Ufu opiatorum , bolorum , aut pillularum solventium ex marte compositarum videlicet

Crocus Martis aperiens ) ad gr. xx.

Tartarum Martis solubile ) ad gr. xxx. vel xxxvj.

Flores Martis ) ab gr. xij. ad xvij.

Ethiops Martialis leniter aperiens a gr. xx. ad xy.

vel, quæ ex Mercurio parantur nempe

Ethiops mineralis per deflagrationem paratus, vel Ethiops confectus, Mercurium vivum quassando cum sufficienti quantitate resinæ alicujus, Peruvianæ præsertim &c. donec nigrescat, dosis hujus remedi a xy. ad xx. gr. consistit.

ex salibus solventibus, & aperientibus, qualia sunt )

Sal admirabile Glauberi

Arcanum duplicatum

Terra folliata Tartari

} a gr. xxv. ad xxx. pro singula vice.

ex pulvere

Afellorum recentium ) a gr. xy. ad xxv.

ex gummis aperientibus, videlicet

Gummi Ammoniacum

Sagapenum

Galbanum

Oppoponax

} a gr. vij. ad viij.

ex trium, vel quatuor eorum delectu oppiata, boli, aut pillulæ conficiantur ; quæ modicæ dosis syrri alicujus aperientis, ut quinque radicum, additione mane jeuno stomacho sumuntur, superbibendo simplicem decoctionem, interdum ex herbis aperientibus propositis alteratam.

2. Applicantur cataplasmata ex pulpa radicum excoctarum confecta nempe.

Brioniz

Cucumeris silvestris

Gladioli

Ebuli &c.

his pulpis jungitur oleum lauri, anisorum & inde cataplasmata efformantur regioni

gioni hypogastricæ apponenda ubi syrrhus uteri prominet; vel syrrhis ipsa vagina aut vulvæ, identidem reiterata.

3. Emplastrorum respectu solventium Cicuta, Nicotiana, Galbanum, Manus Dei, aut Diabochanum usveniunt, simplicia, vel cum emplastro mucilagineo, aut melliloti remixti parti affectæ simul applicata.

Merito suspicor tamen hujusmodi externa remedia parum, vel nihil utilitatis asferre; at in graviore morbo nihil prætereundum videtur.

4. Remedia solventia exhibendo nuper proposita intererit.

Primum ægram phlebotomizare, præsertim cum menses suppressi sint, aut intercepti, quod ab uteri calore dignoscitur; Alterum leviora purgantia præscribere ad humores evacuandos idonea, bilem præsertim, quam remedia prius attenuarunt, modo tamen, cui non libeat purgantia pillulis, aut bolis solventibus addere; Tertium tandem erit diluentia, & humectantia solventibus copulare, ut calefactionem syrrhi cohibeamus; quandoque etiam per intervalla a solventibus desistere dum refrigerantibus uterum humidamus.

IV. Tandem modo imminuamus, atque emolliamus syrrhosum tumorem remedia convenire poterunt, quæ uteri elaterium sustinent, atque oscillationem solidorum restituant, hujusmodi sunt:

1. Injectiones tepentes aquarum thermalium *de Barrege, de Balaruc, Bourbon, Aix-la Chapelle* &c. per aliquod tempus uteri cavitate detentæ.

2. Suffumigia per cellam familiaricam recepta aquarum earum thermalium, aut pulverum, gummi, *Hederæ, Juniperi, Myrrhæ* &c., quæ super prunas funduntur terrebynthina remixta; verum suffumigia ex combustis silicibus aceto extinctis, quæ Galenus admodum laudat; curandum tamen erit ne ea calidiora sint, utrumque lædant.

### *Methodus palliativa.*

Quando syrrhi natura, & morbi gradus valetudinis spem eludunt, palliativam tantum medellam amplecti fas erit, quæ eo collineat ut morbi progressus retardemus, sævioraque symptomata nonnihil compescamus; hujusmodi indicationes sequentium remediorum usu implebuntur.

Etenim 1. remedia omnia solventia, diluentia, humectantia superiori articulo proposita priori indicationi satisficient, addi poterit etiam aliquis aperiens ad modicam dosim modo sanguinis spissitudo illum postulaverit.

Vulgaris methodus est hyeme apozemata, atque decoctiones humectantes & diluentes exhibere; vere & autumnus vero lactis serum, vel si sanguinis acrimonia poscat asinum; tandem æstate aquæ ferruginæ mitiores & balnea, aut semibalnea tepentia præscribere solemus plus minusve in his remediis insistentem prout opus requirat.

2. Purgantur ægræ identidem lenioribus ecoproticis, quæ nequeant intestina irritare, aut inflammare nimis.

3. Interdum cubitum secamus modicam quantitatem sanguinis extrahendo, id tantum instituendo quando pulsus turgeant, atque syrrhus doleat, quod in iis mulieribus præsertim locum habet in quibus menses suppressi sunt, aut ætate amissi.

4. Ægræ hortantur ut vehementiora corporis exercitia effugiant, vel prope-rahdo, vel saltando, aut colloquendo, neve vigilent, diu animi pathemate crucientur, aut matrimonii usu frequentiori commoveantur.

5. Eadem de causa necesse erit ventrem remediis continenter expiare, ne in excernendis facibus laborent, verum sedulo curare ne rheumaticis affectibus

stibus corripiantur, vel si hi superveniant bechicis & narcoticis illos compescere, ne syrrhus inter tuſſiendum intendatur.

6. Ab inſectionibus, & ſuffumigiis erit deſiſtendum, ne ſyrrhus calleſcat, vel ſi nonnulla adhibeantur dulciſcantia ſint ad uterum luendum tantum inſtituta, modo albus, & acris ſfluor exſitat.

7. Tandem ſobriæ vitæ, & methodicæ regimen erit præſcribendum, jufcula tantum, cliſſas, & aſatas carnes permittendo, ſalicis omnibus, aromatatis, mineraliis interdicendo, vinum etiam modo tamen pauxillum haurire non velint.

*Regimen, cui ſtudere oportet, ne ſyrrhus in cancerum degeneret.*

1. Penitus ſolventium uſum in hoc caſu contemnere debemus diluentia tantum, & humectantia amplectendo, ſerum lactis præſertim pro ordinario potu exhibendo.

2. Simul noſtrum erit brachium incidere ſemel bis & amplius prout morbus exigit.

3. Narcotica etiam initio morbi conveniunt, ad dolorem mitigandum, quem ægræ perſentiunt; hujusmodi ſunt ſyrupus Diacodii, Tinctura anodyna, aut Laudanum idonea doſi propinatum.

4. Tandem ægras per aliquot dies decoctionibus, aut brodis ſuſtinere neceſſum erit, vel ſolo orizarum cremore.

*Remedia ſpecifica, adverſus uteri Syrrhum.*

I. Cum aliunde edoſti ſimus Mercurialium fricctionum uſum, aut præparationes Mercuriales ganglia, & exoſtoſes ſcindere, idcirco autumarunt nonnulli eadem remedia ſyrrhos, ac proinde illos uteri ſolvere potis eſſe; at experientia oſtendit actionem Mercurii, ejuſdemque præparationum niſi ſyrrhoſos tumores, aut ſyrrhos reſolvere a lue venerea natos; in hoc caſu optima cenſentur hujusmodi remedia, tuto exhibenda in uteri ſyrrho, imo exempla ad hoc excitant; at neutiquam ſalubrem effectum vidi, aut valde incertum dum ea adhibita ſunt adverſus vulgares ſyrrhos, citra Celticam luem, ſupervenientes.

Itaque animadvertendum eſt tumores venereos interdum minime reſolvi mercurialium auxilio, hæc ſutilia evadunt modo tumores maximum gradum duriæ adepti ſint; non deſunt exempla exoſtoſum, glandularum inguinum, gangliorum, quæ etiam ſi a Celtica cauſa originem agnoſcant, modo vetuſtiora ſint minime cedunt Mercurii exhibitioni; eadem de cauſa ſuſpicari licebit quandoque ſyrrhos uteri etiam ſi venereos incaſſum remediis Mercurialibus tentatos diu in eodem ſtatu perſiſtere poſſe.

De cetero modo certiores ſumus de indole venerea hujusmodi ſyrrhi, cui fricctionibus mederi judicemus, methodum proſequi poterimus ſuperius p. 209. & 210. indicatam, dum rationem ulcerum venerearum uteri medendi expoſuimus.

II. Jaçant nonnulli pro ſyrrho uteri ſanando *Belladonam*, aut *Solanum maritimum*, verum etiam *Cicutam*, æque cancerum adverſus utiliſſimas eſſe, ac proinde magnopere ſolventes credunt; cancer enim numquam convaleſcere poſteſt, niſi humor in eo retentus ſolvatur, ut reſolutio aut ſuppuratio perfici poſſit, quod efficacioribus ſolventibus tantum obtinetur; videbimus ſubſequenti capite, quanti exiſtimanda ſint hujusmodi remedia ad curandum cancerum, quare etiam adverſus ſyrrhos quanti pendeant tunc judicabimus.

III. Apud Gallos omnes conveniunt in omnibus ſyrrhis, uteri præſertim, aquas *de Barrege* in Pireneis ſcaturientes mirificis virtutibus prælitæ valde proficiuas experiri; hic minime in dubium revocabimus earundem virtutem detergentem, atque cicatrizantem adverſus fiſtulas inveteratas, aut ulcera fixa; tum adverſus

ſus

fus ossium cariem paralyſim, rheumatifmos, aut nervorum reſolutionem; verum ipſarum proprietatem emolliendi, atque ſolvendi frigidos tumores, & ſyrrhoſos ipſos magnificio, circa quod ceteris omnibus facile præcellere defendam.

Huiusmodi aquæ fibras laxant, atque membranas ſyrrhoſæ partis; reſtituant, atque ſubſolunt earum ſyſtalticum elaterium; ſpiſſum humorem liquant, ideoque hac ratione ſimul reſolutionem promonent, ac ſuppuracionem impediunt, quod citra ullum detrimentum peragitur, neque morbus intenditur, neve cancer inducitur; adhibentur huiusmodi aquæ multiplici ratione interius, exterius, per embrochacionem, aut per injeccionem; applicantur regioni hypogaſtrica ipſarum ſedimenta ſi unquam adpſci queamus cum ipſa exigua copia decidunt; verum cum morbus pertinax ſit, & ſegne videatur aquarum earum auxilium, diu earum uſum continuare fas erit, identidem deſiſtendo, ut ægras purgemus, & magis magisque venæ ſectionibus, iterum ſi opus requirat, aquarum aſſumptioni præparemus.

## C A P U T V I.

### *De Pſeudo-Syrrho, ſeu Steatmate, & Sarcomate uteri.*

**I**N utero coagmentantur ut in ceteris corporis partibus ſteatomata, & ſarcomata, tumorum ſpecies a ſyrrho valde natura diſtitz, quæ tamen illum reſerunt externi habitus reſpectu, initio morbi ſaltem, ut facile ægrotantes, & medicos decipiant, quare eos tumores *pſeudo-syrrhos* vocant qui cum a ſyrrho vero diſſerant tum prognofis cum medendi rationis ergo ſingillarum eorum naturam explicare in duplici Articulo curabimus.

## A R T I C U L U S P R I M U S.

### *De Steatmate, & tumoribus uteri membrana incluſis, ſive Cyſticis.*

#### §. I.

#### *Deſcriptio, & Differentia.*

**S**teatoma tumoris ſpecies eſt membrana involuti ut cyſtis nomen mereatur; huius receptaculi cavum humore ſpiſſo, diverſimode colorato turget, qui interdum viſcoſus eſt, albus, ſalitus, a ſebo haud abſimilis, quem Græci *Steatoma* dicunt, quaſi tumor *ſebateus* dicerent; ſi humor ille minus ſpiſſus appareat, luteus, granulofus ut Mellem referat *Melliceris* appellatur quod Græce ſignificat tumorem ex *Melle* repletum; ſi liquidior tandem, & albidior fiat ut Papparium repræſentet, *Atheroma* vocatur quaſi tumor *Pappario* repletus.

Obſervavimus jam ſuperius in Tractatu *Tumorum & Ulcerum*, huiusmodi tumores initio exiguos eſſe, qui in diem ſenſim ſenſimque crescendo maximum volumen acquirunt, ut deſormes interdum fiant.

Quandoque unicam ipſos cavitatem continere, plures interdum.

Eos plerumque folliculum gignere duplici lamina inſtructum, ut internus nucleus concentricus ſit, inſulatus vel levi pedunculo partibus cohærens.

Eos tumores plerumque ſuapte natura colore & dolore expertes eſſe citra naturalis



ralis caloris mutationem, inflammationi tamen obnoxios quandoque, ac proinde calori, dolori, &c.

Crebro post inflammationem in abscessum, aut aposthema ipsum degenerare soedo pure repletum, quod innotescit tumore disrupto, atque fluente latice.

Tandem illos facile in syrrhum, aut cancrum converti posse.

Ea omnia quæ de cysticis tumoribus in genere exposuimus, iis uteri pariter conveniunt; animadvertendum solummodo videtur hujusmodi tumores modo extrinsecus uterum sedare, modo intra tunicas locari, crebrius internam faciem lædere, & duplici sacculo contineri.

Iis tumoribus interdum vagina circa ostium, aut fundum, tum vulva, vel pudenda laborant.

## §. II.

*Causæ.*

**S**Cimus illos tumores efformari ab humoris alicujus in propriis vasis retenti congerie, quæ folliculos sensim sensimque distendit.

Quando in ceteris partibus id contingat lymphæ tantum congestionem tribuitur, ut alibi vidimus; verum uteri respectu a duplici humoris genere illud oriri potest; a lymphæ nempe lymphaticis venis coacervata; vel a lacte uterino in propriis receptaculis cummulato.

Utrumque tamen nisi tribus de causis tumorem cysticum inducere valet;

1. Quando lymphæ detinetur, & lac uterinum expandi cohibetur.

1. Ab infatu qui plus minusve vasa lymphatica, aut vermicularium orificia tegit; hæc eveniunt a subitaneo frigore quod fluentibus præsertim mentibus aut lochis uterum offendit.

2. A compressione quæ vasa nonnulla lymphatica, aut vermicularium ostia occludit; id juvenibus accidit mulieribus, aut statura humilibus, quæ grandiorum sætum gestarunt, vel laboriosum partum passi sunt in quo sætum transversim sibi pandit viam; compressitque alterutrum valde uteri latus.

III. Quando hi humores etsi stagnantes aliqualem tamen fluiditatem servant, quæ syrrhi ortum tamen non impediunt.

III. Quando lymphæ, aut lac uterinum libere in vasa lymphatica, & vermicularia irrumpunt, eaque tumefaciunt ut cysticos producant tumores.

Ex iis notionibus consequuntur:

1. Membranaceum sacculum, qui tumorem complectitur, tunicam esse lymphaticorum, aut cellulam lacteorum vasorum ab affluenti lymphæ extensam, atque dilatatam.

2. Hanc dilatationem augeri interdum, ut ampliorem tumorem deformem ipsa inducat.

3. In ratione tumoris incrementi circumpositam membranam indurescere, lymphæ nutrientis ergo, nimia ibi copia persistentis.

4. Modo unicam cavitatem tumorem præferre dum unicum dilatatur lymphaticum vas, aut lacteum receptaculum.

5. Modo pluribus confilari loculamentis, quæ a multis extensis cellulis, dilatatisque vasis originem ducunt.

6. Hujusmodi vasa lymphatica, aut lactea receptacula, quæ suprà intimam uteri tunicam reperiunt, hanc dilatare dum expanduntur, quare tumores hi duplici obducuntur techa *interiori* una sibi propria, altera *exteriori* ab interna nata matriæ membrana.

7. Densitatem stagnantis humoris a lymphæ, aut lactis uterini spissitudine derivata-

— rivare , plerumque tamen tumoris pertinacia segnitiam illam plus , minusve inducere .

8. Coloris varietatem humoris illius ab eadem spissitudine interdum oriri ; crebrius tamen a deleteria sanguinis admodum bilioli indole .

9. Cysticos uteri tumores æque , ac ceteros aliarum partium inflammari posse , exulcerari , in syrrium degenerare , aut cancrum compressionum , contusionum , irritationum , aut excoriationum causa .

10. Tandem vaginæ etiam atque vulvæ fundum his tumoribus scdari , qui in omnibus cum illis uteri conveniunt .

### §. III.

#### *Symptomata .*

I. **M**Orbi initio nondum tumorem animadvertunt ægræ , eo tamen in diem incrementum venter tumet , & ipse in suspicionem incidunt calamitatis subsecuturæ .

II. Pondus , quod augetur quotidie animi ambaginem confirmat , eoque magis cum nullum gestationis certum indicium appareat .

III. Doloze interdum obtuso cruciantur ægræ qui eas valde perterrit , isque ab ampliato tumore , & inertia laceratarum tunicarum dependet .

IV. Dum maximus tumor sit eam partem versus venter , labitur qua ægræ decumbunt ; commodius enim dorso jacent .

V. In exiguo tumore menses periodice revertunt ; abeunt vero si pro magnitudine ipse maximam partem uteri occupet .

VI. Catameniorum loco , lymphaticum erumpit effluviū a tumoris compressione elicitum ; hujusmodi latex interdum pus emulatur .

VII. Tumores cystici plerumque lata basi utero valde adhærent ; quandoque tamen exiguo coherent pedunculo ; iis tamen disruptis difficillime modo grandiores sint expelluntur , plerumque pro molis expulsi ipsos habent , quod veram implicat molæ ideam .

VIII. Quando ii vaginam , aut vulvam deturpant eadem non solum incommoda asserunt , verum cum marito connubium impediunt , ut ægræ , & obitetrices ipsæ uteri descensus illos esse putent .

### §. IV.

#### *Diagnosis .*

**O**stendimus jam cysticos tumores uteri , atque vaginæ initio morbi nedum sensibiles fieri ; at dum eos animadvertere incipimus facile cum aliis pluribus morbis confundimus , cum quibus summam affinitatem habent .

1. Hujusmodi ambiguitates tamen neutiquam inflammationem respiciunt , cum hæc ab iis prorsus vivo a pressione nato dolore , calore , atque febre distinguatur ; verum illa ad acutos morbos , isti ad chronicos pertineant .

II. Facile tamen cum uteri syrrio , hydropo , aut gestatione illos permiscet ; videbimus infra signa iis morbis propria ; sat erit enim hic ea enunciare , quæ hujusmodi tumores a syrrio distinguunt : ea sunt

1. Syrrhum resistentem magis , atque durum cysticis tumoribus experiri .

2. Ipsum angulosum plerumque , esse inæqualem ; cysticum vero tumorem rotundum , magisque extensum .

3. Illum denique teterrima scenomena inducere atque mulieres labefactare ; nullum tamen eas cystico tumore correptas incommodum perferre.

## §. V.

*Prognosis.*

**C**ysticus uteri tumor sane raris incommodus est, modo vero mulieres aggrediatur, pertinax valde est ad mortem usque perdurans.

1. Nunquam convalescunt, præsertim cum grandiores sunt, nam impossibile est spissum, atque uberrimum illum solvere laticem duplici techa duriori obtectum; experientia enim innotuit externos cysticos tumores quos *lupias* dicunt incalsum emplastris resolventibus tentare; eoque magis igitur difficile erit illos uteri sanare, quibus nefas est remedia apponere.

2. Hujusmodi difficultas quæ genericè omnibus hujus speciei tumoribus convenit, magni facienda saltem est eorum tumorum ergo, qui majorem amplitudinem præferunt, atque spissiori turgent latice qualia steatoma, & ateroma sunt.

3. Plerumque persistendo internis efficacioribus remediis, aut resolventibus injectionibus ut tumor resolvatur, suppurationem imperfectam obtinemus, quæ abscessum anomalum inducit materie nempe repletum granulosa & putrescente, quæ minime verum pus videtur.

4. Interdum hujusmodi incommodum evenit etiam non excitatum.

Quando mulieres quæ iis tumoribus laborant supra ventrem cadunt, vel istibus, aut confusionibus labefactantur.

Quando lentæ febri sunt obnoxie, quæ humores, cruoremque sensum sensumque solvit.

Tandem quando in iis circumstantiis concipiunt, quod abortum facit.

5. Quoties ii tumores in suppurationem vergunt, abscessum in uterum efformant nocuum valde, in ulcere fistuloso plerumque abiturum, quod febris lenta comitatur.

6. Etiam si insensu videantur iidem vaginæ tumores, minus tamen periculi conjunctum habent, nam vel erosione, vel amputatione facile tunc extirpantur.

## §. VI.

*Curatio.*

**I**N cysticis illis tumoribus qui externas partes aggrediuntur, interne adhibentur solventia, externe emplastra resolventia applicantur, in hac methodo persistendo donec illi humiles persistant, neque infirmam partem deforment; tamen plerumque, iis frustra adhibitis auxiliis, necessum erit ferro, aut caustico tumores conscindere.

Ex iis inferre possumus quantum spei supersit uteri tumores sanandi quos nefas est abraderè, neve cujusve generis emplastra apponere; tantum nonnulla minus efficacia solventia exhibere fas est, qua de causa facile patebit palliativam tantum methodum inire posse, quæ nisi morbum demat, progressus tamen retardat.

Dux indicationes hic proponuntur, altera est sanguinem attenuare, atque liberam in utero circulationem sollicitare ne tumoris infartus quam maxime augeatur; hanc implebimus

*Astruch de Morbis Mulierum.*

P

1. Fre-

1. Frequenti usu decoctionum, aut apozematum diluentium, & humectantium quales superius proposuimus in ulceris hujus visceris curatione.

2. Verum usu seri lactis depurati, cui addi poterunt uncie aliquot succi depurati Chærophylli, aut Nasturti fontani; possumus etiam si opus sit decoctionibus, aut sero aperientia nonnulla copulare, qualia sunt Sal de duobus, martis Riverii, Tartarum Martiale Solubile, Terra folliata Tartari quæ diluentium virtutem augere potis erunt.

3. Ufuevit etiam lac asininum recens ubi sanguinis acrimoniam adesse suspicemur.

4. Aquæ ferrugineæ modica dosi, atque idonea tempestate sumptæ profunt aliquo præsertim sale purganti remixtæ.

5. Brachii venæ sectio interdum repetita admodum utilis evadit, continenter pulsibus ratione habita; verum necessariissima videtur quando dolor, aut calor uteri ægras infestet.

6. Balnea, & semibalnea tepentia usuveniunt in quibus decoctiones, apozemata, aut serum exhiberi potest.

7. Tandem ægras leviter purgare identidem ecoprotica repetendo, quæ non solum primas vias expient, verum sanguinem repurgent.

Altera indicatio erit uterum luere, atque mundare a sordibus ibi affluentibus quas ii tumores devehunt, & sub effluviis lymphatici, aut purulenti specie erumpunt; ea de causa injectiones tantum adhibere fas erit ex decoctionibus Hordei, Absinthii, & Artemisiæ peractæ, quibus Mel Narbonensis addi poterit; Aquas Thermales etiam sulphureas, injectare oportebit guttas aliquas superaffundendo Balsami Commendatoris de Perne; suffumigia denique quæ aquæ illæ exhalant utilia experta sunt, modo uterum tubuli auxilio intrent.

Eorum tumorum respectu qui vaginam, aut vulvam lædunt, facilius, tutiusque sanantur, quia emplastra apponi possunt, ino si opus requirat caustico destrui, aut ferro rescindi; verum earum operationum fusiorem explicationem Articulo sequenti exponam, ubi de vaginæ Sarcomate vulgo Scatotate locuturi erimus.

## ARTICULUS II.

### De uteri Sarcomate.

#### §. I.

#### Descriptio.

UTERUS æque, vagina, aut vulva rotundis tumoribus citra ullam cavitatem indolentibus, mollibus, cedentibus corripui possunt; tamen neque color, neve calor partium affectarum immutatur; hujusmodi tumores primum exigui sunt, atque insensibiles, at in diem increcendo infantis caput interdum adæquant; at eorum progressus etiamsi certissimi sint inæquali velocitate procedunt:

Illi omnibus corporis partibus communes sunt, omnem corporis ambitum deformare possunt, omnesque cavitates lædere, nares videlicet, œsophagum, aut intestina, idcirco nil mirum si simili morbo uterus laboret, aut vagina.

Dum hujusmodi tumores a morte aut amputatione scinduntur nullam cavitatem ipsos referre observamus, quinimo interfecatione coagmentantur tendinearum, aut membranacearum aponcurosum, quarum intervalla pinguedinosa materic

terie vulgari febo magis spissa, atque fibrosa replentur, ibique nervi & vasa sanguinea arteriosa & venosa valde tamen distincta distribuuntur.

Idem tumores sarcomata nuncupantur quod carneam excrescentiam significat etiam si sebacei tumoris nomen rationabilius mereantur, cum ipsos oriri cognoscamus ab expansione, atque intumescencia partis alicujus membranz cellularis aut aliposæ.

Etiam si indolentes plerumque & molles ii tumores existant, nihilo tamen minus quandoque in quibusdam circumstantiis inflammari possunt, exulcerari, aut in abscessum, syrrium aut carcinoma degenerare, totidem diversos morbos producendo.

Quæ de sarcomate in genere dicta sunt, perbellè uteri sarcomati conveniunt, quod a ceteris positu tantum differt.

## §. II.

*Causæ.*

**M**odo suadeamus sarcoma con crescere a nulla humoris congestione sed ab exuberanti nutritione cellularis uteri internæ, ejusque nimia crassitudine, ut excrescentiam referat internam faciem uteri deturpantem; reliquum erit causas detegere quæ hanc in utero nimiam nutritionem suppetant.

Hanc tres causæ potissimæ sunt inducere tantum.

*Prior.* Prominentia est portiunculæ alicujus internæ faciei uteri, vel id ab icu unguinum obstetricium eveniat, quæ leviter uterum excoriet, vel ab erosionè guttarum nonnullarum rodentium albi fluoris, vel ab aliqua insecti feminis guttula; tunc emollita illa internæ uteri tunicæ parte suppet posita cellularis ab intima membrana minus pressa nutrientem lympham uberius recipiet, quæ sarcomati occasionem præbet in diem aucturo.

*Secunda.* Crispatio videtur aut erethismus partis alicujus illius cellularis membranz ab irritatione orta guttarum nonnullarum spissi atque acerrimi laticis albi fluoris veterrimi, vel ab aliqua venerei viri superafusa guttula, aut ab injectionibus stipticis, aut irritantibus; illa crispatio lymphatica vasa constringendo lympham sistit atque sarcoma tali pacto efformat.

*Tertia.* Ab imminutione procedit elaterii partis alicujus ejusdem membranz, quod oriri poterit vel a distentione nimia hujus partis, quam in difficili, & laborioso partu passæ fuerint ægræ; vel a laxitudine ab albo stagnanti fluore inducitur; in hoc casu lymphæ a vasis, aut tunicis imbecillibus minus impulsæ in ea labefactata parte persistet, eamque confertim nutriendo sarcoma pariet.

Sarcomatum respectu, quæ vaginam, aut vulvæ gravant, easdem prorsus ipsæ causas agnoscunt; harum partium tamen speciales sunt titilamenta, quæ ipsæ, vel ab aliis fieri solent.

## §. III.

*Symptomata.*

**I.** Orbi aggressu hujusmodi tumores exigui sunt, neque pisum crassitudine superant, continuatione tamen agentium earum causarum sensim sensimque augentur.

**II.** Eorum incrementum plus minusve promptum videtur prout arteriæ, quæ

ad sarcoma hñmorem devehunt ampliores, plus minusve sunt aut turgentes, quæ videlicet majorem, vel minorem lymphæ nutritis copiam suppeditant ibi stagnaturam.

III. Ea sarcomata plus minusve dura apparent prout nutriendi lymphæ plus minusve spissa est, aut matricem aggreditur calentem plus minusve aut humidam.

IV. Hi tumores indolentes fiunt, vel adipis sensum tantum retinent, sebacei enim tumores paucissimis nervis staminibus scatent.

V. Sarcomata quandoque crasso sed brevi pedunculo matriæ adhærent, quandoque longiori, & graciliori appendice, cum ea cohærent, quod a majore vel minori portione illius membranæ cellularis extensæ procedit.

VI. Dum sarcoma lato sed brevi pedunculo adhæret, difficiliter divellitur; facilis tamen si longiori & graciliori appendice cohæreat; tunc hujusmodi sarcoma expellunt ægræ cum majore molæ molestia; verum interdum ideam pervertunt veræ molæ cognoscendæ.

VII. Quando uteri sarcomata ampliora facta sunt pondus ægræ perferunt, atque molestiam quam postremis gestationis mensibus solent perferre.

VIII. Tunc pari ratione ac in gravidis mulieres magno sarcomate graves pedem œdemate laborant atque vulvæ, compressionis ergo, cruralium venarum, quæ sanguinem revolvunt.

IX. Quando sarcomata exigua sunt, catamena plerumque periodice restituntur, cum pars maxima faciei uteri internæ libera sit, verum vasa sanguinea, & venosæ appendices tumescere, produci, atque referari possint, quantum menstruat postulat; contra vero amplificato nimis tumore intusque utero compressio vasa minime referantur atque menses desistunt.

X. Nihilominus tunc temporis ab utero erumpit lymphaticum effluvium plus minusve uberrimum vel ab interna uteri facie procedat, vel a tumore ipso segni lymphæ turgentis.

XI. Quando hujusmodi tumor icui, contusioni vel casui sit obnoxius, aut manu imperiti obstetricantis, vel solventibus nimis emplastris laceratur; inflammatur ille facile, dolet tunc, aut in abscessum vergit, vel in durum syrrhum & carcinomatofum degenerat.

#### §. IV.

##### Diagnosis.

**S**arcoma cum ceteris hujus partis tumoribus confundi potest cum syrrho videlicet, cystico tumore; steatomate, hydrope, tympanitide, aut gestatione.

I. Distinguitur a syrrho majori æqualitate, atque rotunditate, minori vero durtie, atque resistentia; verum sarcoma eo minus sanitatem pervertit.

II. Haud facile tamen a cystico tumore steatomatofoso præsertim distinguitur cum extrinsecus eadem signa ambo præferant; at ea distinctio parvi faciendâ videtur, cum una sit tum prognos, cum medendi ratio.

III. Hydropis vero respectu, tympanitidis, aut gestationis eo mittimus lectorem ubi speciatim de iis morbis pertractabimus.

IV. Sarcomata vero vulvæ aut vaginæ speculi uteri auxilio facile conspiciuntur; a vaginæ tamen descensu interdum decipimur.

#### §. V.

## §. V.

*Prognosis.*

**I** Hujusmodi morbus incurabilis sane est, idcirco neque speranda, neque tentanda erit resolutio, cum tumor non a spisso congesto humore solubile derivet, at a nimia partium nutritione, atque aucta crassitudine, quam in partibus internis nefas erit amputare.

II. Etiam si sarcomata incurabilia sint, ea tamen diu citra gravem noxam ægræ ferunt, cum neque dolorem, calorem, febrem, aliamve functionum læsionem afferant.

III. Temporis diuturnitate tamen nonnulla superveniunt incommoda, pondus videlicet quod in hypogastrio perferunt, properandi difficultas, quam tumoris volumen parit; lymphaticum effluvium acre interdum, quod distractio uteri gignit.

IV. Cum sarcomata pinguedinis mollitiem servent diu in hoc statu sine mutatione persistunt, eoque magis cum ab externis læsionibus tuta sint, ut raro grave damnum ipsa inferant.

V. Vidimus jam illas interdum inflammari, exulcerari, atque in syrrium vel cancerum degenerare, ideoque ea tunc aderunt pericula iis morbis propria, raro tamen hujusmodi mutationes succedunt.

VI. Si vagina aut vulva hoc corripiantur incomodo una cum affectu utero prognosis est, in hoc casu tamen superest ferro aut caustico tumorem rescindi posse.

## §. VI.

*Curatio.*

**I** N incurabili morbo palliativa tantum methodus reliqua est, duplex tamen *que* incrementum tumoris retardat, & *que* subsequutura levat incommoda.

I. Priorem indicationem implebimus sanguinis circulum promovendo, ejus fluiditatem conservando, ne copiosius in tumorem quam par est cruor irrumpat, lymphæ vero nutrientis stasim a tumore removendo.

1. Hac de causa adhibentur ea circiter remedia quæ in syrri palliativa curatione proposuimus, videlicet decoctiones, & apozemata humectantia atque diluentia, serum lactis depuratum vel succo imbutum, plantarum aperientium, aquæ mitiores ferrugineæ, idonea tempestate propinatae modo pedum œdema hydroperem non prænunciet; verum lac asininum recens dum sanguis acer videtur.

2. Possunt etiam iis remediis aperientia nonnulla mitiora copulari, videlicet opiata aperientia, & leviter solventia, modo nimiam sanguinis spissitudinem suspicemur.

3. Tandem venæ sectiones reiterare, & alium ciere interdum convenit si mensum suppressio præsens sit, & ægræ juvenes sint, brachium incidere ter quaterve intra annum fas erit, totidemque purgare, verum transacto quinquagesimo quinto ætatis anno minus sanguinis extrahere debemus in purgatione persistendo.

II. Duo potissima hujus sarcomatis incommoda sunt. 1. Pondus quod ægras infestat hypogastrium versus. 2. Hædum atque continens acre quandoque profluvium.

Priori molestiæ medetur tenuis venter subcingendo fibulis si opus sit connexis. Secundam vero implemus indicationem, ægras hortando ut sæpe leviori de-

*Astruch de Morbis Mulierum.*

P 3

coctione

coctione cherophyli cum aceto Lithargiri ope dulcificato &c. partem abluant; verum injectiones non inutiles sunt Althææ modo nondum parvum sit uteri ostium; identidem semibalneâ conducunt tepentia.

III. Si disrupto pedunculo fluctuans sarcoma uteri orificio se præbeat, eam methodum adhibere necesse erit, quam in molæ extractione infra proponemus, id tamen raro evenit.

IV. Sarcomatis respectu vaginæ, aut vulvæ illum ferro modo tumor magnus appareat, vel caustico destrui debet modo exiguus sit, & feminas obesas lædat.

V. In primo casu valde olim implicabantur, dum vicini iniquo loco tumorem tentabant, at nuper tutiora instrumenta inventa sunt, quibus facile id peragitur, etiamsi vinculum frustraneum videatur, nam vasa sanguinea ibi confluentia vel pauca sunt, vel exigua, ut amputatio absque hæmorrhagiæ metu institui sinant, vel levis sanguinis jactura superveniat facile pulvis aqua aluminosa imbutis sistenda; amputatione vero confecta superstes ulcus vulgari methodo pertractatur.

Si vero caustica amplectamur antequam usveniant vaginæ, atque vulvæ circumpositas partes emplastro mucilagineo, aut pulvis aqua Bisfalyæ saturatis defendere oportebit, orificium præsertim uteri tuendo; his cautelis adhibitis caustica applicantur, qualia sunt lapis causticus, trochisci minii aut sublimati corrosivi in Codice Parisiensi descripti, aut filamenta de Vigo jugiter summa cautione atque cunctatione incedendo.

## C A P U T VII.

### De uteri Cancro.

#### §. I.

##### Descriptio.

**C**ancer generice ut intra tractatu *Tumorum & Ulcerum* demonstravimus, Tumor est durus resistens dolens atque lancinans, vel ut melius dicam, Cancer syrrhus est dolore abreptus, quare facile erit canceri uterini naturam cognoscere, cum a ceteris solo posito differat. Ut causas cognoscamus per quas syrrhus in cancerum degenerat, sedulo mutationes examinare oportebit, quæ in syrrho eveniunt.

1. Syrrhus facile dolore, & lancinationibus plus minusve molestiis corripiatur præsertim cum ruditer contrectetur.

2. Tumet ille atque oclerius crescit, ingrandescit, formam immutat, & inqualiter acuminatus & angulosus fit.

3. Eorum angulorum nonnulli in diem acutiores fiunt, & membrana quæ illos obteggit tenditur magis, magisque levigata apparet, atque rubra.

4. Hujusmodi mutationes in externis syrrhis facile oculis subjiciuntur, innotescunt pariter in uteri cancro manum hypogastrico apponendo, aut digitum in vaginam intromittendo, cujus ope colli uteri statum, atque continuos syrrhi progressus distingui quimus.

5. Sunt hi anguli qui majori dolore perciti, atque lancinationibus ibi centrum morbi existere ostendunt.

In hoc casu utericancer, æque ii ac ceterarum partium canceri confirmati dicuntur, & oculis.

6. Tandem hujusmodi membrana postquam maximam tensionem passâ erit, disruptitur ut ulcus hinc ortum centrum usque canceri versus pervadat, a quo ichorosa serositas erit continenter fluxura.

7. Tunc



7. Tunc canceri margines sine causa manifesta aperiuntur magnofere, ut cancer *apertus* appelletur.

8. Dolores atque lincinationes quotidie augentur, ulcusque magis panditur, ut cancer pro vero pure foedissimam saniem effundat.

9. Ex canceri limine carunculae molles spongiosae continenter germinant, quae cito putrescunt, atque in diem regenerantur.

10. Partes cum utero adhaerentes aut propinque canceri scenomenis participes fiunt; vagina enim per quam latex illud defluit, lacescitur, inflammatur, aut ulcere deturatur; pro diverso canceri positi dolores renibus intestinis, aut lateribus respondent; interdum dejectiones, aut mictus difficulter, & dolenter fiunt, modo inflammatione recto aut vesicae communicetur.

11. Tandem iis morbis omnibus febris lenta superadditur, cujus exacerbationes plus minusve crebrae fiunt, aut diutinae pro diversa canceri magnitudine, humoris effluentis acrimonia, aut dolore plus, minusve intenso, vel sanguinis vitio plus minusve deleterio.

Ut superius *Capite V.* observavimus vaginam atque vulvam similibus morbis foedari posse, neminem latebit.

### §. I I.

#### *Differentiae.*

1. **C**ancer *incipiens* est quando syrrhus obtusum dolorem asserre, atque lancinantem incipit, citra tumoris augmentum; *confirmatus* dicitur quando crebrius laniat, aut in diem deformis fit.

2. Uterque *occultus* appellatur, antequam disrumpatur, *patulus* vero seu *ulcerosus* modo referari incipiat.

3. *Malignus* tumor est dum acerbissimis doloribus saevisque copulatur scenomenis; *benignus* cum ea mitiora appareant.

4. Tandem cancer aut a causa *interna* procedit, a vitio nempe sanguinis procul ulla vel leviori tantum externa labe; aut *ab aeterna causa* derivat modo pulsus compressus, aut contusus fuerit tumor.

### §. III.

#### *Causae.*

**C**ommunis est sententia cancerum generari ab acri humore, & corrodente, qui syrrhum exulcerat, & in hoc morbo obvia inducit symptomata; verum haud facile est tali pacto originem huius laticis explicare in tumore duro, compacto, indolente, eoque difficilius est explanare, etiam concessio illo latitante humore, qua ratione intumescat, aut formam variet syrrhus dum in cancerum degenerat; tandem per difficillimum erit in ea sententia obversionem laboriorum canceri, & citissimam, citra causam manifestam, exulcerationem demonstrare.

Proposui circa hanc rem in *Tractatu Tumorum, & Ulcerum* cogitatum meum, verum ut clarius incedamus animadvertere oportet:

1. Syrrhum uteri tumorem esse sensum sensumque genitum a congestione lymphae, aut lactis uterini spissi, quassati & indurati, qui valent durum resistenter tumorem gignere.

2. Hunc ita coagmentatum inaequaliter tumesceri, extendi, rarefcere prout plus minusve premitur, quod intumescencia, & inaequalitas tumoris confirmant.

3. Membranam cancrum obtegentem corpusque syrrihi nisi a summa distractione, atque expansione disrumpi ubi praesertim maxima sit distentio.

4. Cancrum semel apertum a sola rarefientia, & distractionis continuatione magis magisque reserari.

His perpensis facile innotebit materiam syrrihosam summum gradum rarefientia suscipere potis esse, huic enim tribuere debere intumescentiam, quae interdum in syrriho conspicitur per quam in cancrum immutatur.

Hæc facultas syrrihosæ materiei tributa pluribus exemplis confirmatur; hac de causa Gypsum tumet una & indurefcit dum aqua emollitur; limatura chalybis urina & Albio remixta duram massam efformat tumentem; verum metallorum atque salium solutiones vegetantium more arbores loculentissimas efformant.

Hoc principio sancito furest tantum pro methamorphoseos explicatione causam in syrriho detegere illius rarefientia, quæ cancrum inducit.

Hujusmodi causa nisi caloris in syrriho lactitantis augmentum esse potest, quod syrrihosam materiam expandit; id triplici ratione oriri potest, dum syrrihus constanter in cancrum degenerat.

*Primo* id evenit quando naturalis sanguinis calor angetur febris causa vel ciborum acrimia salugineorum, aut calefacientium abusu, vel pervigiliis, exercitiis nimii, aut animi patematum ratione.

*Secundo* quando calor in syrrihum intenditur a specialiori causa videlicet uteri inflammatione, abusu solventium remedium, coitu nimio, gestatione, laborioso partu aut abortu.

*Tertio* tandem irruptio nimia in syrriho sanguinis universalis plethoræ & febris ergo, vel crebra nimis contractatione tumoris, balnearum calefacientium abusu, irritatione albi fluoris, compressione tandem, aut ictu.

## §. IV.

### *Symptomata.*

I. **S**yrrihus in cancrum degenerans, quam maxime ingrandescit rarefientia ergo quam alterutra causarum propositarum producit.

II. Hujusmodi expansio non una est in omni syrrihi ambitu, vel quod materia undique haud disposita sit, vel inæqualiter rarefientia causæ obnoxia, quæ de causa protuberantia, & anguli producantur, qui syrrihum defformant.

III. Eadem syrrihosæ massæ rarefientia nervorum ibi reptantium dolorosam distractionem inducere valet, quæ lancinantes cruciatus gignit in incipienti aut confirmato cancro obvios, qui totidem signa sunt canceri pathognomonica.

IV. Si vero dolores qui affectam partem laniant propinquis partibus nervorum propagatione communicantur.

V. Denum a maxima materiei illius expansione membrana cancrum obtegens, & cancrum ipse disrumpuntur, eam partem versus, quæ magis tumet.

VI. Eadem de causa os canceri quod initio exiguum erat laborum intumescientia ergo, ampliat valde atque in diem extorsum obvertitur.

VII. Simili ratione caro fungosa continenter ab ulceris ore germinat, vegetabilium more increfcens, quæ cito decidit a novis ejusdem census carunculis restituta.

VIII. Margines canceri tumet, dilatantur, conscinduntur, itemque ibi reptantia sanguinea vasa arteriosa, aut venosa, disrumpunt, ut hæmorrhagias inducant plus minusve aberrimas pro concili vasis magnitudine aut genere diverso, arterioso, aut venoso.

IX. A cancro humor erumpens primum lymphaticus est, verum ichorosus fit, tan-

tandem saniosus, & purulentus evadit, male olet plerumque carnis spungiosæ ergo ipso remixta.

X. Cancro vero progrediente febris lenta adoritur cum pervigilio, depravato gustu, atque marasmo superventuro; tandem modo ægræ dolore non deficiant anasarca plerumque, aut hydrope abdominis pereunt.

XI. Partes omnes propinquæ labefactantur plus minusve pro diverso morbi in utero positi, interdum enim dolor recto communicatus, aut vesicæ intumescen-  
tiam inducit.

## §. V.

*Diagnosis.*

I. **C**ancri existentia experientiis comprobatur innumeris.

1. Succedit quotidie cancer manifesto syrrho, eumque dolores prænu-  
nciant lancinantes, qui comitantur intumescen-  
tiam cancerum specificè indi-  
cantem.

2. Dignoscitur vero a mutationibus syrrhoso cancro supervenientibus, quæ  
tunc eveniunt quando tumor ille in cancerum erit desiturus.

3. Certiores magis fieri possumus modo cancer, ut crebrius accidit, collum  
uteri deturpet, nam tactu canceri inæqualitatem, & variationes inspicere pos-  
sunt.

II. Facile pariter erit modo canceri existentia innotescat status diversos mor-  
bi detegere; etenim cum omne desit effluvium cancerum occultum esse fateberis;  
verum si dolores lancinantes vehementiores sint, atque pertinaciores illum con-  
firmatum esse credes; & contra si ii mitiores appareant, tandem illum dis-  
ruptum esse cognoveris modo latex successive erumpat, lymphaticus, ichoro-  
sus, saniosus, purulentus, atque male olens.

III. Valde intererit ad prognosin instituendam benignum cancerum a mali-  
gno distinguere, quod facile tamen obtinebitur, cancer enim benignus erit,  
quando mitis dolor parum, vel raro laniet, fluens materies serosa, & inodo-  
ra existat, quod indicat nondum vel segniter rarefcere, verum parum, aut ni-  
hil spungiosæ carnis germinare, quæ ferocitatem illam valeat deturpare.

Cancer vero malignus gravissimo dolore vix tolerabile, vivisque, & crebris  
lancinationibus corripitur, materies vero ex utero erumpens foetidissimo odore  
pollet, quod indicat tumoris volumen stendi, atque deformari continuo, verum  
latitantem fomitem a fungosa carne in cancro uberius germinanti valde cor-  
rumpi.

IV. Tandem perspectis iis, quæ canceri generationem, aut antecedentem egre-  
conditionem, aut sanguinis constitutionem respiciunt, facile judicare poterim-  
us, an accidentali causâ, & externæ, viro præsertim celtico, aut sanguinis  
labi sit tribuendus.

## §. VI.

*Prognosis.*

**G**enerice omnis cancer incurabilis est modo rescindi nequeat, nam, mini-  
me vulgares rationes impendi possunt, quæ ceteros tumores sanant, reso-  
lutionem nempe, aut curationem excitando, ex quibus consequitur uteri can-  
cerum prorsus insanabilem esse, quia amputari nefas est.

Verum iis finî deteriores sunt valde celerius, nam in parte locati sunt ca-  
lida

lida magis, & vasorum sanguineorum repleta, quæ canceri materiam calefaciendo tumorem cito tumefaciunt, atque expandunt, morbumque magnopere intendunt.

Non desunt tamen exempla canceri a venerea causa nati frictionibus hydrargiri sanati, at hæc rara sunt, neque magni facienda, modo cancer exiguus, incipiens, atque benignus, de cetero bene constitutam mulierem non aggrediatur.

Nostrum erit igitur in uteri cancro palliatiuæ modelæ tantum consulere; idæoque prognosis eo collineat, ut cognoscamus circumstantias in quibus facilius morbi progressus retardare atque mitigare poterimus.

Sperare enim licebit eas indicationes implere posse modo cancer adhuc integer sit, parum doleat, parumque figura mutatus sit, atque benignam naturam præferat, verum agram de cetero bene constitutam, & mensibus donatam adoriatur.

Contra vero merito desesperabimus si cancer ulcerosus valde sit, ut ægræ vitam minetur, quod pertinescendum videtur, quando dolor affectam partem valde laniat, cancer deformior fiat, hæmorrhagias inducat, malignum se præferat, tandem infirmas, aut mensibus orbatas mulieres invadat.

## §. VII.

### Curatio.

**C**uratio canceri palliatiua, quam solummodo amplecti licebit quatuor potissimum indicationes complectitur, videlicet

I. Imminuere, & retardare internis remediis morbi progressus.

II. Huic externis pariter remediis consulere.

III. Dolorum sedare vehementiam.

IV. Hæmorrhagias tandem sistere superventuras.

I. Primæ enim indicationi satisfacimus subsequentiurn internorum remedium usu.

1. Regimen exactum præscribendo iusculis tantum, farinaceis præsertim ægras nutriendo, usum carniurn, vini interdicens, vel exigua copia ipsis permittendo, omne corporis exercitium prohibendo, verum ut diu lectulo, aut biselio decubant curando, neve nutriendis nimis cibos, qui multum sanguinis gi-gnant, ipsæ commedant.

2. Præter ea auxilia sollicitos esse debemus ut ægræ identidem de secundo, aut tertio mense brachium incidere sinant, præsertim si imperfecte mensuris gaudeant, aut orbatæ sint; huiusmodi auxilium in hoc casu inter efficaciora recensetur.

3. Ægras pariter surgare necesse erit lenientibus tamen, quæ neque calefaciant aut lacescant: id præstant Polipodius, Tamarindus, Cassia, Rheum, aut Sal vegetabile.

4. Neque prætereundum erit, decoctiones temperantes, & refrigerantes exhibere, serum depuratum, & chalybeatum, lac asinum, aut caprinum, vel vaccinum etiam idonea tempestate propinatum semel vel bis in die; aut pro integro nutrimento si stomachus ferat.

5. Necessum erit æstivo tempore aquas ferrugineas miiores exhibere quales sunt illæ de Forger modica doli, sed continuo sumptæ.

II. Utiliter secundam indicationem implemus sequentibus externis remediis, videlicet

1. Balnea, & semibalnea ex aqua fluviatilis tepentis vel ex decoctione Mal-

re, Althææ, Brancæ urcinæ &c., in iis agras per integram saltem horam decinendo.

His auxiliis addi poterit feri lactis aut aquarum mineralium potatio; in primo casu balnea, atque semibalnea mane jejuno stomacho usurveniant ex lavacro exentibus serum aut lac exhibendo, in altero casu aquæ minerales mane propinquantur balnea vero ante prandium præscribuntur.

2. Uteri iniectiones ex succo aut decoctione *Solani Morelle disti* patrantur aut *Sedi*; Conteruntur hujusmodi succi aut decoctiones in plumbeo mortario, usque dum liquor densus, spissusque evadat, imo additur interdum parum Saturni combusti, modo dolores vividiores sint, vel faccarum Saturni exigua dosi iis remiscetur.

3. Iniectioni pariter possunt decoctiones ranarum viridium, cancerorum fluvialium aut marinorum, limacum, vel lumbricorum terrestrium in plumbeo mortario contritorum, iis copulando nonnihil pulveris eorum animalium, vel etiam buffonum excicatorum, modo vero doloravissimus fiat trochisci addi poterunt, albi Rhafis, aut Syrrupus Papaveri albi vel Diacodii.

III. Unica via dolores efficaciter compescendi videtur narcotica exhibere, quæ nunquam agris interdicere debemus, modo ipsæ non abutantur, tutiora igitur hujus census remedia, atque in nostro casu magis idonea ea sunt quæ opium suppeditat; videlicet Laudanum solidum aut aqua solutum, Tinctura Annodina Sydenamii juxta Codicem Parisinum vel Italicum Bononiensem parata, ea non solum intrinsicè exhibentur, verum iniectionibus superius allatis permiscuntur; dosi vero eorum remedium pro cruciatuum vehementia, aut ægotantium viribus variare solet; salubrius tamen est crebre ea remedia exigua dosi exhibere, quam raro largiori propinare.

IV. In uteri cancro hæmorrhagiam sistimus frequenter superventuras pro potu quotidiano pthisanam exhibendo ex decoctione confecta radicis *Consolidæ* majoris guttis 57. aqua *Rhabelii* ad gratam aciditatem remixta, quæ vero dulcificatur cum uncia syrrupi *Capillarium*, aut *Ribefiorum*; at cum hujusmodi remedium segniter agat, statim utero iniectione facerit succo *Plantaginis* aut *Bursæ pastoris* alumen vel thus addendo, vel salubrius pthisanam adhibendo supra descriptam.

Animadvertendum est cancrum uteri orificium, vaginam, aut vulvam ledentem temperare ejusque fœnomena compescere externis posse remediis in externo cancro usitatoribus; hujusmodi sunt pulvini illa decoctione imbuti, & vulgaribus absorbentibus conspersi videlicet plumbo Mercurio copulato, pulvis enim usurvenit anatina parte remixtus pulveris *Antimonii* crudi, aut *antiethico Poterii*, vel utilius fomenta ex foliis *Cicutæ* sacculo inclusis, & aqua fotis profunt, quæ affectæ parti applicantur, ut infra speciali capite ostendimus.

Interdum spongiosas carnes rodere necesse erit pulvino balsamo chalybis saturato applicando in Tractu *Tumorum*, & *Ulcera*, (a) indicato, quod sæpius ablundo quantum opus requirat edulcorari poterit; identidem vitulinæ carnis frustula applicantur, quæ dolorem atque inflammationem leniant, animadvertendum tamen est hujusmodi topica filo necti cera inducto, ut facile extrahi possint.

Tandem si indicia aut validæ conjecturæ habeantur quæ cancrum uteri venereum prænunciant statim agras mercurialibus frictionibus aggredi debemus, postquam vulgari methodo dispositæ fuerint; hic tamen cautelas reiterare fas erit quas in venereis uteri ulceribus enunciamus, videlicet exigua dosi & longis interpositis intervallis frictiones instituere, ne sanguinem nimis commoveant, aut

aut materiz carcinomatofæ intumefcentiam, atque expansionem augeant, neve morbi progressus intendant.

*Remedia propofita adverfus uteri Cancrum.*

I. In cancro æque ac in uteri fyrrho atque ulcere mercuriales friftiones adhibita fuerunt æquo tamen fruftraneo eventu; modo cancer a celtica lue dependeat, fape hujufmodi remedia levamen afferunt etiamfi neque conflantem, neve completam valetudinem inducant; at fi nullum optimum effedum præftent dum cancer celtica lue expers, a vulgari caufa procedit, fuperius Caput IV. & V. pervolvere oportebit ube de *Ulceræ & Syrrho uteri* diffeminus.

Dominus Andreas Elia Buchenerus cum perperam perferutatus fit indolem, & caufas canceri, ideo deceptus eft in fuis thefibus *De Medicamentorum Mercurialium ufu in cancro* quas *Halle* defendit 1755 in quibus jactat specificam virtutem *Mercurialium præparationum* & *Mercurii dulcis* præfertim adverfus fœdum Cancrum.

Sufpicor fimul fe valde decepiſſe Dominum Philippum Fridericum Gmelin Tubingæ Medicinæ Profeſſorem, qui hanc ſententiam amplexus eſt, atque nimis obſervationem extollit Antonii Ribeirii Sanchez, a generali propoſitione decerptam ejuſdem diſſertationis, quæ ſub Titulo legitur: *Specifica methodus recentiorum cancerum curandi* Tubingæ impreſſa Anno 1757., & ab Hallero inſerta in collectione theſium medicinalium Tom. VI.

D. Sanchez magni nominis Medicus qui ſumma cum laude in Moſcovia medicinam exercuit, communicavit Fratri D. Gmelini cancerum narium ulceratum ad os uſque penetrantem medicum quemdam ſuaſu ſuo curaviſſe ea methodo quam ipſe impendere ſolebat; hujufmodi medendi ratio eſt grana quatuor ſublimati corroſivi in unciiis 48. ſolvere ſpiritus vini, verum ejuſdem ſolutionis mane, & vespere unciam ægris exhibendo; omitto remedia nonnulla, externa fomenta videlicet, atque linimenta, quibus uſus eſt, ſed morbum moderare, non tolerare ipſa potis ſunt.

Eam obſervationem non contendo, verum autumo cancerum ſublimato corroſivo ſanatum venerem ſuiſſe; Sanchez ipſe animadvertit ſublimatum corroſivum ita adhibitum luem venerem ſubjigere, immo aſſerit ſæpiſſime idem expetum eſſe, nil mirum ergo ſi cancerum ſubjiciat a celtica lue derivatum; at Dominus Gmelinus perperam deduxit ſublimatum corroſivum in omni cancro ſpecificum remedium præſtare: obſervationes enim Domini Storck de quibus infra loquuturi erimus plane oſtenderunt caſu 1., & 9. hujus remedii inefficaciam in cancro a vulgari caufa orto.

De cetero Domini Sanchez remedium idem eſt, quod Boheravius(a) in Chemiz ſuis elementis deſcripſit, atque Celeberrimus Vanſvieten Publici Juris fecit.

Hoc remedium Pariſienſes jamdudum cognoverant ut in animadverſionibus enunciavi, quæ in tertia Editione Tractatus *Morborum* (b) *Veneræorum* reperiuntur; verum, quod mirum eſt, illud jam pridem Siberii cognoscebant; extat enim in Bibliotheca Germanica, Hiſtoria morum Oſtiakorum, quam tradidit Joannis Bernardus Muller Capitanus Sveckus, qui dum per longum tempus in iis regionibus apud Oſtiackes Syberiz populos captivus fuit, obſervavit adverſus luem venerem Oſtiackis moſ eſſe comedere ſublimatum corroſivum in brodio avenæ potquam quod quotidie acetii poculum hauriebant.

Concludimus igitur Mercurium ejuſdemque præparationes mederi interdum

venc-

(a) Chym. Part. III. Proceſſu CXCVIII. (b) Pag. CXXVI.

venereo cancro, non vero ceteros ab aliis causis ortos; verum etfi hujusmodi remedium adhibere conveniat, fritiones potius quam per os assumptionem commendarem, *vid. Lib. II. Cap. IV. §. IV.* ubi sublimatum corrosivum exhibere valde periculosum esse, & futile plerumque demonstravi.

II. Haftenus exposita satis confirmant nos specificis adversum cancerum remediis carere, nisi hujus sensus sit cancri amputatio, quæ in uteri cancro institui nefas est; nihilominus magnopere medicos commendabo qui omne studium impendunt, & necessaria experimenta instituunt ad hujusmodi auxilia investiganda; sane quæ ipsi proposuerunt ex plantis valde suspectis, aut nocuis decrepta sunt; at modo veri sint optimi effectus, quos experti sunt, eorum observationes percrutari non inutile censeo.

Inter has plantas, quæ primum nostræ indagini sese offert est *Bella-donna*, alias *solanum furiosum*, aut *solanum melanoserasos*, quem *Linus atropa* appellat.

Usque adhuc pro venenosa habuerunt hujusmodi plantam, cujus nocuus effectus testantur *Johannes (c)* Schenkius, qui plurium medicorum circa eam opiniones congestit; verum *Simon de (d)* Paullis, *Jannis Jacobus (e)* VVepfferus, *Amatus (f)* Lusitanus & nuper *Joannis Sebastianus*, atque *Albretius (g)* Professor Coburgi qui de ea pertractarunt.

Nihilo tamen minus *D. Michael Albertus* Medicinæ Professor contrarium defendere curavit Halæ anno 1739. in Theſibus *De Bella-donna tanquam specifico in cancro præsertim occulto*; nondum eas ad manus pervenerunt meas, quare me latet quibus rationibus sententiam sustineat; honorem tamen primus sibi promeritus est ostendisse *Bella-donnam* intus sumptam adversus cancerum, utilem evadere; nam jandudum *(b)* extrinsecus ad dolorem mitigandum tum foliis, cum succo depurato utebantur.

*Dominus Tiberius Lambergenus* Groningæ Professor secundus fuit qui *Bella-donna* illustravit; feminam enim anno 1745. præ manibus habuit, quam vulgari ratione curandi incaſsum tentata amicorum *(i)* consilio *Bella-donnam* experiri ausus est, cum a pluribus medicis ejus virtutem prædicare audiret ad syrthos subjiandos, verum cum de remedii nocua facultate valde dubitaret primum in se ipso periculum facere maluit, postquamquod de ejusdem innocua virtute certior factus, ægrotanti exhibuit; hujus rei veram historiam tradidit in Prælectione inaugurali habita, & impressa Groningæ anno 1754. sub titulo *Leſio inauguralis sistens Ephemericidem perſanati Carcinomatis*, quam *D. Hallærus* inseruit in sua collectione Theſium Medicinalium *Tom. II.* ejusdem specimen vobis ostendam.

Infundit ipse per integram noctem, lenioris ignis auxilio, scrupulum foliorum exsiccatum *Bella-donne* in ea aquæ quantitate, quæ decem æquet cyathos, unum quotidie exhibendo atque dosim augendo ad unum & semis, vel duplicem poculum hujusmodi infusionis quam dimidiatim mane, & vespere propinabat; diu tamen in hujus remedii usu non perſtitit scæmenorum ergo supervenientium perterritus.

Eam methodum quinque menses proſecutus est, videlicet a die 24. Januarii 1745. usque ad diem 11. Junii ejusdem anni, quo tempore ægra sumpterat infusum sex drachmarum Solani allata ratione paratum.

Plu-

(c) Lib. VII. De Venenis ex plantis Observ. 104.

(d) In quadripartito Botanico.

(e) In Tractatu de Cicutæ aquatica.

(f) Cent. IV. Cases. 98.

(g) In Commento. Norbergico. Ann. 1731. pag. 312. Et Ann. 1732. pag. 121.

(h) Vid. Gendron's Recherches sur la Cautère pag. 137.

(i) Frideric. VVinter, Professor Medicinæ Leipsicæ.

Plures tamen variationes observarunt, sæpe enim morbus in deterius vertit, antequam ægra perfecte convalesceret; usus hujus remedii nullum detrimentum attulit præter levem vertiginem, aliqualem tumulentiam, atque oris & gutturis siccitatem, quæ nisi theiformis potum sinebat, at ea sœnomena tandem desisterant, etiamsi paulo post a nova remedii assumptione reverterent, ut nunquam perfecte assuesceret, quod Medico obstitit quin dosim augetet.

Quamquam facultatem sanandi cancerum a D. Lambergio *Bella-donna* tributam unica videatur experientia sustulit, attamen plures nostratum excitavit, ut periculum facerent; me vero effectus latet, at eorum silentium suadet illos fuisse, fortassis non decepti essent si Buchenerii superius recensitam thesim percuratati fuissent, ubi ille, qui anno a Lambergio scripsit, ostendit Solanum ab aliis laudatum nondum perfecte, aut tuto adversus cancerum facere, ait enim (k) *Neque a multis ad hoc usus eximie laudatum Solanum furiosum secure, atque certo furiosum Carcinoma semper refrænavit.*

In iis circumstantiis prudentia docet a simili remedio abstinere, usque dum experientia optimos confirmet effectus, eoque magis cum Lambergius ipse observasset molesta incommoda, etiamsi leviora evenisse, quæ tamen visum interdum debebant.

Autumo idem judicare debere de *Phytolacca* Turneforti *Solanum magnum Virginianum Parkinsoni* dicta, quam non (l) inutiliter experti sunt in nova provincia Eboracensi Americæ, & quam defendit Trillerus etiam anno 1752. Vitembergæ in suis thesibus, *De noctiva canceri inveterati extirpatione demonstrata.*

III. Aliam nuperrime plantam proposuerunt adversus eundem morbum *Cicutam* (m) nempe terrestrem, ab aquatica prorsus diversam.

Hanc pariter pro veneno olim Medici omnes habuerunt ut de *Bella-donna* animadvertimus; nihilofecius (n) Hyppocrates eam intus exhibebat in uteri morbis, Galenus (o) vero ejusdem semina, atque folia decoctionibus, & compositionibus permiscebat, quas laudare, atque præscribere pluries consuevit.

Præ (p) aliis quamdam compositionem extollunt Apollodoro tributam, quam Heraclidus Tarentinus ad dolores, & vapores hystericos mitigandos commendabat, eam non exigua dosi intrabat succus Cicutæ, cujus formulam hic ostendam.

#### R. Succi Cicutæ, Hyoscyami ana. ʒ iv.

*Castorei, Piperis albi, Costi, Myrrhe, Opii, ana. ʒ j.*

*Hec levigata, additis duobus passis Cyathis in Sole commiscebitur, donec inspissentur, & inde configes*

*Pastillos ad Fabæ Græcæ magnitudinem. Dato cum Vini Cyathis duobus.*

Rajus vero suo tempore asseruit Medicum quemdam (q) Anglum nomine *Borvle* in febribus malignis, & quartanis Cicutæ radicem ad scrupulum sub pulveris specie exhibuisse, dein Paulus Rencamus Medicus Blesensis in suis (r) observationibus tradidit in jecuris obstructione infusum vinum exhibuisse,

(k) 6. XXXIII. (l) Rudolph. Augustin Vogel, in der Medicinischen Bibliothek, Elsehande p. 849.

(m) Cellus De re medica Lib. VI. Cap. 17. Dioscorides De re medica Lib. IV. Cap. 79. & Alex. phar. Cap. 11. Galenus, De simplic. Medicam. Facultas Lib. III. Cap. 18. Actuus, Tetral. IV. Serm. I. Cap. 61. Paulus Faguetta, Lib. V. Cap. 41. Et cætera recentiorum Medicorum.

(n) De usu Mollibri.

(o) De compos. medicamentor. secundum locos Lib. VII. Cap. 2. 3. 5. Lib. IX. Cap. 4. & Lib. X. Cap. 1. (p) De antidotis. Lib. II. Cap. 11.

(q) Hist. Plantar. Lib. IX. Cap. 8. (r) Observat. 3. & 4.



se, primum cum duplici scrupulo Cicutæ radicis exsiccatæ, verum drachma duplici summo cum fructu.

At hujusmodi auctoritates pauci pendebant; adhuc enim subsistebat Cicutæ contemptus, nisi celeberrimus Storck Vindobonæ Medicus animose primum in seipso, verum in ægotantibus Cicutam (f) expertus esset, ut in sua prima dissertatione ostendit sub Titulo *Libellus, quo demonstratur Cicutam, non solum usu interno tutissime exhiberi, sed & esse remedium valde utile in multis morbis, qui hucusque curari impossibiles dicebantur*.

At quod ei summam laudem præstitit prudens regimen fuit, quo in difficilimis circumstantiis eam caute subministravit; diligentia qua experimentorum effectus clarissimis medicis communicavit; verum candor quo compositionem, atque ejusdem eventus publici juris fecit.

Nihil est ea compositione simplicius, Cicutæ enim recenter collectæ succum exprimit, & per balneum arenæ sensim sensimque inspissat, ne comburatur cavendo; modo extracti consistentiam aquaverit succus ab igne removet, & eocopulando pulvim foliorum exsiccatum ejusdem stirpis pillulas efformat, quæ duplicem granum pendeant.

Idem auctor primum unicam earum pillularum mane jejuno stomacho exhibere, alteram vespere tentavit; verum dosim auxit; in diem pillularum numerum crescendo; statim effectus vix sensibiles obtinuit, in progressu vero magis patebant; interdum a duplici mense convalescerent ægræ, interdum post majus temporis spatium pro diverso morbi gradu, & ægotantium constitutione.

Ejusdem sententia publico communicata non unica fulcitur observatione, sed pluribus quas ipse reiteravit experiētiis, in diversis ægorum circumstantiis; in illis videlicet, qui cancro occulto, aut aperto laborabant sinum, aut vultum aggrediente; in iis qui glandulis, aut strummis syrrhosis, vel Epatis syrrhis cruciabantur, & quod mirum est suffusione correpti erant; hoc remedium valetudinem donavit, leniter resolvendo, vel in cancro laudabilem suppurationem excitando; tentamina fecit coram medicis celeberrimis, qui eventus testes candidi fuerunt; tandem medicis pluribus, & Chirurgis idem communicavit, ut experientias in propriis ægotantibus renovarent, quarum optimos effectus plane recognoverunt; hæc omnia in superius allata dissertatione extant, quæ animose, libenterque fatetur; quot enim mysterium facerent de hoc præstantissimo remedio neve publici juris facere respuerent nulla ratione habita ægotantium utilitati, qui eorum silentio sanitatem recuperare impedirentur.

Quare nil mirum si candidæ D. Storcki observationes multum spei induxerant iis, qui primum ipsius libellum pervolverunt; statim ac hujus remedii specimen apparuit ipsum tentare plures satagerunt, usque adhuc tamen eventus conceptæ spei perfecte non respondit, dolores tamen canceri valde mitigabantur, & volumen tumoris imminuebatur, quod majoris utilitatis spem sublinebat; magni faciendum enim est, neminem gravi ullo incommodo correptos fuisse ab ejusdem remedii ad triginta usque grana quotidie propinati usu.

Quamobrem nedum Cicutæ exhibitionem contemno Storcki methodo propinata putarem enim prudentis medici esse in propositis casibus posse, atque debere remedium experiri; simili enim ratione de recentioribus remediis ac de novis consuetudinibus frui debemus; videlicet neque primos amplecti, neque postremos esse, qui eorum confirmatis utilitatibus gaudere velimus.

Præter eas enunciatas pillulas alia nonnulla Auctor remedia a Cicutâ desum-

(f) Sæpius fortasse D. Gmelini qui in Praefatione thesauri quas an. 1757. de cancro defendere curavit, ut supra enucleavimus, indicavit eam fructu cum intrinsecus tum extrinsecus Cicutam exhibuisse: Sic ait ille, *Cientia Atropa . . . . interne & externe applicata multum levaminis acquiritur*.

pumpfit intusque exhibuit 1. videlicet pulverem radicis ejusdem plantæ Gummi Tragachanta in pillulas subactas, ejusdem tamen usus majorem postulat diligentiam cum radix foliis efficacior experiatur 2. Extractum ex saturatori decoctione confectum foliorum Cicutæ, quod minus agit, quam succus ille, at largiori dosi exhiberi quit; adhibentur etiam folia extrinsecus partem fovendo in cancro præsertim aperto, aut dolente; faculus itaque iis repletur foliis concisis cancro tepidus apponendus postquam leviter expressus fuerit; alvum etiam purgantibus ciet, modo opus requirat.

Reliquum vero est Cicutæ virtutem in omni regionem non unam esse; certum enim est majori virtute pollere in calidis regionibus ut in Occitania, & Provincia quam apud nos; in Italia vero & Hispania quam in Gallia, quod animadvertere debent ii, qui in iis Regionibus eam præscribere velent, at cum Lutetiz climas parum distet a Viennensi putarem eadem tentamina hic institui posse, simili dosi remedium propinando; revera enim qui primum apud nos remedium tentarunt eandem prorsus rationem, atque dosim prosecuti sunt, citra ullum funestum affectum. ( \* )

## C A P U T VIII.

### *De uteri Hydropæ.*

#### §. I.

#### *Descriptio, & Differentia.*

**U**teri hydrops est aquæ, aut serositatis lymphaticæ congestio in cavitate matricis, quæ tamen non una ratione semper colligitur, interdum enim ubertim aquæ in uterum irrumpunt & *Ascitis* gignitur, quæ uter æmulatur apud Græcos *Ἀσцитίς*; interdum exiguas vesiculas implent communi, vel multiplici pedunculo uteri internæ faciei adhærentes, & *hydrops hydatodes* dicitur a Græco vocabulo *ἤδραϊς*.

In hac duplici hydropis specie similia sænomena apparent; initio enim vix morbus sentitur, sensim vero sensimque uterus inflatur, rotundus fit, gravis, & ponderosus, pressioni tamen cedit, & aliquale robur servat necessarium elaterium restituendi pote, tandem in summo morbi statu ægra neque incedere neque decumbere facile possunt.

Quantumvis similes hæc duæ species inter se videantur, causæ tamen producetes diversæ sunt, quas singillatim explicare integerit.

#### §. II.

#### *Causæ hydropis cum Ascite.*

**C**um Ascitica hydrops matricis lymphæ congeriei potissimum tribuatur evidens est eam ab ambobus subsequenter scænomenis produci; alterum est ira uteri cavitate serositatis illius stillicidium supra statum naturalem uberimum; alterum uteri orificii oclusio, quæ affluentis lymphæ per vaginam eruptionem impedit.

#### I. Pri-

(\*) Apud nos D. Storck experientia sex ab hinc mensibus instituta sunt in lisdem morbis atque eadem methodo quam ipse ostendit; verum etiam nondum tristes effectus a Cicutæ assumptione coniecta sũt, tamen usque adhuc spei conceptæ certatus non respondit.

I. *Primum* duplici ratione evenire potest:

Vel dum lymphæ per hyatus tunicarum sanguineorum vasorum, aut lymphaticorum quibus uterus scater sibi pandit viam:

Vel dum vesiculas lacteas pervadit per intimam uteri faciem reptantes.

Exenim I. Theoretice satis demonstratum est nunquam in aliqua cavitatē lympham stillare nisi aliquod obstaculum sanguinis, aut lymphæ circulationi officiat, quod cogat illos humores in propria vasa irrumpere, eorumque tunicas extendere, atque poros dilatare, ut sibi quoad tenuiorem saltem partem, sternat viam.

Consequitur enim in hoc casu adesse debere in uteri cavo obstacula quædam quæ hosce effectus pariant; hujusmodi sunt syrthi, aut syrthosa tubercula, steatomata, sarcomata, molæ &c.

Obstructiones veterrimæ cellularum lactearum ab amissione, vel suppressione menstruum, satis indicatæ.

Intumescencia repentina earum cellularum a spissitudine lactis uterini orta, quam gignit externum frigus, subitus terror, aut gravis mæmor, quibus menstruo tempore obnoxie fuerunt ægræ.

2. Verum serosam lympham trans lacteas vesiculas effundi nequire nisi in triplici casu.

Quando orificia vesicularum earum laxa valde sint, aut aperta, ut in diutino albo fluore.

Quando lacteus secretus liquor fluidior sit, quod in iis evenit, quæ pituituoso donantur temperamento.

Quando utraq; causa simul agat, quod in albo vetustiori fluore accidit.

II. *Alterum* occlusionis uteri orificii respectu, nisi ab alterutra subsequen-  
tium causarum obturari potest:

Vel a cumulatæ segni mucilaginosa materie, quæ ostium illud obtegit;

Vel a compressionē, syrthi aut callositatis ergo, in laborioso partu nata, quæ orificium matricis premit.

Tandem a contractionē hujus claustrī, convulsivæ crispationis ergo, ut sæpe in hysterico morbo evenire solet.

Quæ adhuc dicta sunt confirmantur cadaverum inspectione mulierum emortuorum; quare statueri licebit modo in iis casibus hydrops non superveniat, neque citra hos evenire posse.

His explicitis concluditur,

1. Hydropem asciticam mulieres frequenter aggredi quæ matricem syrthosam, callosam, obstructionibus infartam habent, quæ mensibus suppressis laborant, vel illos jamdudum amiserunt.

2. Illas vero ledere, quæ albo lymphatico, aut lacteo fluore uberrimo valde, & vetusto corripiuntur.

3. Illas denique infestare, quæ de repente mensibus, aut lochiis orbatæ fuerunt frigoris, mæroris, aut latitiæ inopinatæ causâ.

4. Necesse enim esse plerumque aliquam ex indicatis causis concurrere, quæ orificium uteri obtegit, quod etiam crebre, non semper tamen evenit.

5. Aquas in utero collectas, quas effundunt vasa sanguinea, aut lymphatica per tunicarum hyatus, claras, & translucidas apparere plus minusve luteas, aut acres pro diversâ acrimoniæ, aut bilis copia, quibus sanguis saturatur.

6. Verum si hujusmodi aquæ a lacteis vesiculis procedant quasi per cribrum erumpent albæ, lacticinose, serum non depuratum æmulantes apparebunt, ut (a) Zacutus observasse asserit, quæ qualitates plus minusve conspicuæ erunt pro majori, vel minori tenuitate lactis uterini.

*Astruc de Morbis Mulierum.*

Q

7. In

(a) Prax, admira. Lib. III. Observat. 133.

7. In hoc postremo casu hujusmodi aquæ calori uteri obnoxie facile putrescent, & turbidæ, saniosæ atque foetidæ evadent, præsertim si vasa nonnulla sanguinea guttas aliquot sanguinis effundant, quod sæpe evenire scimus Schenkii (b) observatione.

8. Menses supremi debent tum in hydropse ascitica quæ a Syrrho, steatoma-te, sarcomate, mola, aut vetustiori obstructione, cum in ea quæ a latitudine procedit lactearum cellularum, quæ, inflari impeditur, nequeunt venosas appendices tumefacere ut catamenia producant.

Nihilo secius (c) Medicus quidam in suis observationibus tradidit mulierem hydropse uteri laborantem menstruis perfecte donatam fuisse; at ille observationis suæ rationem præbuit, animadvertendo in hoc casu menses non ab utero, sed a vaginæ fundo derivasse.

9. Facile enim declaratur Fernelii (d) observatio qui testatur mulierem hujusmodi morbo correptam singulis mensibus menstruo tempore aquas per uterum evacuas-se, ut septem aut octo pelvis imple-ret, postquam quod menses apparebant, & desistebant ut in naturali statu, hydropse revertente prope mensium efflu-vium, eadem constanti methodo; quare suspicari licebit in hac muliere nondum to-tum uteri ambitum hydropse affectum fuisse, verum supervenientibus mensibus, uterum illam sollicitasse ut obstacula ad orificium locata suis contractionibus su-peraret, catameniis vero desinentibus orificium denuo sese contrixisse, atque hydropsem sese restituisse, usque dum mensium eruptio reverteret.

10. Tandem in gestatione quando sanguinis circulus in interna uteri facie magnopere implicatur (voluminis ergo, aut ponderis fœtus) effusio facile fieri potest serosæ lymphæ intra parietes uteri, & membranas, ut experientia con-firmat; hujusmodi aquæ enim in partu primæ erumpunt statim ac uterus refe-ratur, easque facile obstetrices cognoscunt, & *Aquas Syloestres* vocant; inter-dum ibi maxima copia hujusmodi colliguntur aquæ ut veram hydropsem in male affectis mulieribus præsertim inducant, quæ ægras & assidentes perterrit, at feliciter evanescit partus initio, imo ipsum fovet, modo parturientes non sint valde imbecilles.

## §. III.

### *Causæ Hydropis cum hydatidibus.*

IN hac hydropis specie uteri cavitas undique innumeris vesiculis, aut hyda-tidibus repletur ex graciliori tunica contextis, & lymphatica serositate tur-gidis; modo hydatides illæ racemi more communi pediculo plures simul ute-ro adhærent; modo seorsim propriis pediculis cum utero nectuntur; mo-do invicem connexæ per uterum fluctuant. Earum magnitudo intra gra-num miliaecum, & ovum Columbinum, aut Gallinaceum persistit; contenta lymphæ limpidæ est, & diaphana, quæ leni calore modo inspissatur, modo in auras avolat; interdum tamen liquore turgente densa, sanioso, aut purulento, qui hydatides ipsas plerumque rodit.

Actius (a) observationem hujus hydropis posteris communicavit quam Medici diu percuratari neglexerunt; tandem cadaverum sectiones in hac re satis eos docue-runt merito hujusmodi hydropem recenseri inter uteri hydropes &c.

Omnis difficultas reducitur ad explicandam vesicularum earum generationem, circa

(b) *Observation Medicinal*, Lib. IV. Observ. 220.

(c) Marcellus Donatus, *Medic. histor. mirabil*, Lib. IV. Cap. 25.

(d) *Partholog*, Lib. VI. Cap. 15.

(a) *Medicing contracts* *Tetrabibl*, IV. *Serm*. IV. Cap. 70.

circa quod Tractatum (b) nostrum *De Tumoribus*, & *Ulceribus* pervolvere necesse erit, ubi animadvertimus valde implicitos fuisse, qui olim lymphæ existentiam, & uteri structuram atque vasorum distributionem haud cognoscebant, quod *Actii*, & *Fernelii* exemplis confirmatur; at nuperrimæ anatomicorum disquisitiones magnopere rem declararunt.

Demonstravi enim in eo Tractatu has hydatides gigni a dilatatis areolis intra vasa lymphatica, & valvulas Sigmoidæas, aut semilunares locatis, cum hujusmodi exigua spatia circa vasorum lymphaticorum longitudinem innumera; sive, ut & multissima vasa lymphatica; ideoque nil mirum si in hac tunica maxima copia hydatidum nasciscatur, ut omnis cavitas uteri quandoque repleatur.

Hujusmodi hydatides racemi more communi pedunculo coacervantur cum ab eadem parte inflari inceperint; seorsum vero intumescunt, quando a diversis uteri partibus originem duxerint.

Pediculi, qui hujusmodi racemos cum utero nectunt exuvia sunt internæ tunicæ hydatidum concisæ, dum intumebant; ii vero qui invicem vesiculas jungunt reliquæ sunt ipsorum lymphaticorum vasorum; quare interdum vesiculæ fluctuantes reperiuntur, quæ increpando laniarunt pedunculos qui ipsas utero, aut ceteris hydatidibus jungebant.

Hydatidum magnitudo variare solet pro diverso earum incremento; earumdem cavitas modo liquore limido repletur, qui vera lymphæ est, ignis vi, dum sponte pissior est, indurefcens, verum in auras avolans modo liquidior existat.

Tandem calor uteri illum liquorem pervertit atque corrumpit, præsertim cum heterogeneis moleculis saturetur, ut turbidus, furulentus, foetidus evadat, & vesiculas ipsas putrefaciat.

Supereft causas determinare quæ potis sint in lymphatica vasa stagnantem lympham congerere, quæ interstitia illa nodorum vasorum dilatando hydatides producat.

Evidens enim erit hujusmodi causas easdem esse, quæ Articulo præcedenti in hydropæ ascitica sanguinis congestionem induxerunt, hoc solummodo discrimine, quod in eo casu ad sistendam sanguinis circulationem validiores causæ requirebantur, verum ad lymphæ segnem cursum intercipiendum, ejusque vasa comprimenda leviores sufficiunt.

Itaque ea quæ dicta sunt superiori Articulo circa causas sanguinem sistentes, de lymphæ hic stagnati dicendum videtur, videlicet

1. Syrrhos, ulcera, steatomata, & sarcomata, molæ &c. hujus morbi causas plerumque esse, quare illos affectus plerumque hydatides comitari etiam si crebrius ab iis ascitis procedat.

2. Verum repentina cellularum lactearum turgentia quæ scenomenis succedit superius indicatis, quæque dum modica sit solam intumescentiam inducit, quæ tantum lymphæ cursum intercipit, atque hujusmodi hydropem gignit cum impar sit ascitici inducere.

De cetero in hac hydropis specie uteri orificium plerumque obturatur ut in asciti iisdem de causis evenit; interdum tamen referari debet, si hydatides erumpant, quæ neque utero neve vaginæ adhærebant.

## §. IV.

*Symptomata.*

1. IN utraque hydropis specie uterus tumet, atque in diem in ratione augmenti gravior fit, continenter tamen sphericus persistit, & compressioni facile cedit.

2. Quando uteri volumen maximum fit, ægræ difficillime incedunt, neque decumbere facile possunt, distentionis ergo, quam uterus ad utramque partem fatitur.

3. Ambæ species mensium suppressionem comitem habent, quæ vel a causis obviis procedere poterit, quæ menses sistere solent, vel a distentione uteri, quæ productionem appendicum venosarum impediunt, quæ menstruationem gignere deberent; tandem a continenti infartu cellularum lactearum, quæ vasa venosa periodice comprimere impedit, quod in menstruationis negotio necessarissimum est.

4. Sterilitas consequens est necessarium hujus morbi tum quia uteri os obdustum sperma neutiquam introumitti potest, cum etiam si per uteri orificium introumitteretur, minime potis esset contextum substantiæ uteri valde compactæ penetrare.

5. Volumen uteri valde auctum comprimit reduces internas venas a vulva aut venis illiacis prodeuntes, quæ ab extremitatibus inferioribus sanguinem reuehant, quare consistens in iis partibus cruor serositatem deponit, & œdema producit.

6. In hydropse ascitica dum ab una parte uteri pulsatur ad oppositam partem manui applicatæ pulsus respondet quod scœnomenon improprie fluctuatio dicitur, quod melius Gallice sonat *contre-coup*; & Græco idiomate *ἀντιπῦσις*; hujusmodi reactio a continuatione dependet aquæ columnæ, quæ ad alteram partem uteri protenditur; deest hujusmodi effectus in hydatidibus, quia aquæ columna a vesicularum, aut hydatidum interpositione motus communicationem ad alteram partem intercludit.

## §. V.

*Diagnosis.*

FACILE est distinguere eas uteri species a ceteris abdominis intumescentiis.

1. Ab inflammatione ubi dolor, calor, & febris ipsa adsunt, quibus hydrops expers est.

2. A syrtho in quo uterus inæqualis durus resistens apparet; in hydropse vero rotundus, æqualis, & uniformis conspicitur, & facile compressioni cedit.

3. A steatomate, & sarcomata; nam in omnibus uteri tumoribus uterus pressionem magis resistit, quam in hydropse, verum in hac pulsando ad alterutram partem reactio minime persentitur.

4. A tympanitide cum neque reactio illa in tympanitide innotescat, verum sonus audiatur pathognomonicum tympanitidis tantum indicium.

5. Ab hydropse imi ventris, quia dum hujusmodi morbus uterum lædit facile circumscribitur; non vero in totali imi ventris hydropse, quæ undique ventrem tumefacit.

6. Tandem ascitica hydrops ab æquæ hydatidibus scætat reactione pulsationis distinguitur, quæ in postrema specie abest.

7. Dia-

7. *Diagnosis respectu fenomenorum quæ hydropem a mola; aut gestatione distinguunt, optimum censuimus eo mittere lectorem ubi de iis morbis speciatim acturi erimus.*

## §. VI.

*Prognosis.*

I. **U**teri hydrops curatu difficilis est, nam aquæ spissis atque compactis membranis includuntur, quæ refluxum valde implicant. Neminem latet eam imi ventris hydropis speciem quam *saccatam* appellant ubi aquæ intra peritonei duplicaturam congeruntur haud facile curare posse; ex iis de uteri hydropse facile iudicium asserre quimus.

II. Huiusmodi morbus valde periculosus experitur causarum respectu quæ illum inducunt; huiusmodi enim sunt plerumque vitia in uteri substantia locata, quæ vix destrui, aut corrigi possunt, atque continenter morbi restorationem minantur, modo paullulum ægræ convalescant.

III. Eadem hydropis species maximum detrimentum affert consecutionum ergo, quæ plus minusve uteri substantiam lædunt, aut cedema artum inferiorum inducunt, vel febrem tandem ipsam, aut marasimum producunt.

IV. Experientia enim didicimus uteri hydropem morbum difficilem, periculosum, & lethalem plerumque experiri.

V. Tandem quæ hydatidibus scatet ascitica periculosior evadit, tum quia serositas in vesiculis detenta difficilius resedit, cum etiam curationis ergo quia pauciora adversus hydarides auxilia medicina præstat, quam ad ascitum subijciendam, ut infra videbimus.

## §. VII.

*Curatio.*

**I**N uteri hydropis curatione duo præsertim veniunt perpendenda; alterum aquas tutiori via evacuare; alterum robur restituere substantiæ uteri atque vitia corrigere, quæ effusioni serositatis occasionem præbent, ideoque morbi regressum præoccupare.

Triplici ratione prima absolvitur indicatio.

I. Urinarias vias aperiendo. II. Alium ciendo. III. Aut aquis per vaginam ipsam semitam parando.

I. Ad urinas provocandas eadem diuretica usuveniunt, quæ in abdominis hydropse obvia sunt, videlicet,

1. Decoctiones, & apozemata ex plantis diureticis, quæ concinno ordine proponemus, quales sunt;

*Radices*

Eryngium  
Asparagus  
Bruscus  
Anonis  
Aristolochia  
Rubia Tinctorum  
Apium  
Petrofelinum  
Vincetoxicum

} ad ℥j.

TUM

*Radices.*

Enula Campana  
Asarum  
Ebulus  
Iris nostras

} ad ℥ss.

*Folia*

Calamintha  
Apium  
Marubium  
Hyssopus  
Angelica  
Nasturtium Aquaticum  
Cherophyllum  
Foeniculum

} a m.j. ad m.j.℥.

*Fructus*

Solanum vesicarium  
Alkekengi

} in decoct. a ℥j. ad ℥j.℥.

*Bacca*

Rhamnus catharticus  
Juniperus

} a baccis vj. ad x. vel xij. pro decoct.  
} ad m. ℥. pro decoct.

*Cortices*

Caparis  
Fraxinus  
Sambucus  
Tamariscus

} ad ℥ss.

Flo-



## - Flores.

Genista  
Sambucus  
Epulus

} aliquot pugilli.

Ex quatuor, vel quinque earum plantarum pro libitu selectis ex decoctiones aut apozemata conficiuntur, quæ viginti, aut viginti quinque tritis æsellis fuperaffunduntur, Salia aperientia nonnulla addendo, qualia sunt

Tartarum Martiale Solubile  
Sal Tartari  
- - de duobus  
- - Martis Riverii  
Terra foliata Tartari &c.

æque idonea dosi per plures consecutivos dies semel vel bis propinando.

2. Secundo succi depurati prodesse solent, qualis est, Succus Chærophylii ad quatuor unciarum dosim, cui additur drachma Salis de Duobus, aut semis Tertæ foliatæ Tartari.

Verum Succus radicis Gladioli ad duplicem unciam, cum uncia & semis manæ dulcificatus prodest.

3. Lixivia ex cineribus parata

Corticum fabarum  
Surculorum Genistæ  
Ligni Juniperi  
Sarmentorum Vitis viniferæ

Tres, vel quatuor drachmæ hujusmodi cineris cribratæ aquæ cyatho, aut decoctione Millepedum diluuntur, verum omnia perfecte commiscendo, postquam cineres fundum petierint, liquore versato, per tres, aut quatuor vices, tres uncias, quaterve quotidie cum anatina parte Melis, aut Vini albi propinantur.

4. Bolis conficiendis cedunt

Ethiops Martialis, aut Flores Martiales ad gr. x. vel xv.

Pulvis Afellorum ad gr. xv. aut xx.

Sal Tartari ad gr. viij.

Gummi Ammoniacum ad gr. vj. vel vij. cum syrupo quinque radicum omnia commiscendo.

Præscribitur pariter sub forma bolari, pulvis Baffonum exsiccatorum ad gr. xiv. aut xv. cum sufficiente quantitate confectionis Hyacinthinæ subactus.

Magnificæ etiam Boracem pulverisatum ad drachmam semis, duodecim granis Croci Orientalis remixtum, & cum succo Sabinæ subactum, at de eo experientiam me lateat.

II. Modo hujusmodi medendi methodus frustranea videatur, hydragoga purgantia

gantia adhibentur, quæ per alvum aquas expellant, inter quæ tutiora atque magis commendata sunt

1. Jalapa f. p. a gr. xxx. ad l.  
Resina Jalapæ a gr. x. ad xviiiij.  
Diagridium a gr. x. ad xv. aut xx.

quæ idoneo syrupo sub pillularum forma subiguntur.

Dosis horum remedium pro ægrotantium viribus, effectu quem præstant, aut numero exhibitionum diriguntur.

2. Pillulæ sequentes ab Hoffmanno proponuntur præstantissimæ, atque tutissimæ.

- R. Rad. Vincetox. pulveratæ. gr. viij.  
Scille exsiccatæ, & pulveratæ gr. v.  
Nirri purificati, vel Cryst. miner. pulver. gr. x.  
M. cum f. q. Syrupi de Rhamno cathartico. f. Bolus pro una dosi.

3. Pillulæ hydragogæ Bontii secundum codicem Parisiensem confectæ a gr. xij. ad xv. aut xvij. optimum effectum præstant.

4. Vinum scilliticum a ʒ β. ad ʒ j. sæpe propinatum prodest.

5. Syrupus Rhamni Cathartici pariter multum levaminis præstat ab ʒ β. ad ʒ j. vel ʒ j. haustus, & quodam alio purgante remixtum.

6. Tandem Gummi Gutta utiliter adhibetur a gr. x. ad xv. aut xvj. in mortario marmoreo cum viginti quatuor granis Crystalli mineralis contrita & in pinguedinoso jure tepenti diluta.

Eorum remediis nonnulla stomachum laceffunt, & vomitum excitant, quod compescitur facile superbibendo peculum pinguedinosi juris vituli ebulliti.

III. Incastrum denique hujusmodi auxiliis tentatis, reliquum est orificium uteri relaxare, ut facile aquæ per hanc viam exitum inveniant, vel in extremo casu intromitti poterit pertusus canaliculus qui certam lymphæ exeunti semitam parat.

Hæc de causa usuveniunt:

1. Injections vaginæ ex decoctionibus emollientibus Malvæ, Althææ, Brancæ urcinæ additis mucilaginis seminum Lini, Psylli, admonendo ægras ut idoneo posita decumbant, quo diu valeant illas in utero retinere.

2. Suffumigia per sellam familiaricam recepta, modo tubuli ope ad uterum pertingant, utilissima evadunt.

3. Intromissio spongiæ, aut pulvini filo nexi, & mucilaginis imbæti seminum Lini, aut Psylli ad uteri usque orificium protracti, bis in die restituti non parum juvat.

4. Modo suspicemur orificium uteri satis laxatum fuisse paulatim uterum succutitur, ut aquæ proprio pondere adiutæ, valeant sibi pandere viam, qua de causa vomitum, aut sterutationem excitare fas erit ægras admonendo ut crebre faciant, vel saltem scalæ junctis pedibus descendant; verum clysteria stimulantia intromitti debent, ut acria pessaria quæ intestina, atque vaginam laceffant, tandem obstetrici jubere, ut digito intromisso si liceat uteri ostium aperiat, quod interdum evenit.

5. Postquamquod, inutiliter his omnibus artis subsidiis adhibitis, potissimum erit vagum specillum perforatum, in extrema parte globulo instructum intromittere, quod

quod cum facile obtineatur in urethra viri valde reflexa, facilius in uteri orificio obtinebitur, quod directe pergit.

6. Hac instrumenti introductione peracta aquæ penitus evacuabuntur; modo translucida appareant, tubulum removere poterimus; at si turbida, saniosa aut foetida erumpant instrumenti illius auxilio, injectiones impellentur ex decoctione hordei, melle rosato, aut decoctione radicis Aristolochiæ confectæ, usque dum interna uteri facies perbelle deterfa videatur.

7. Cujusve generis sint erumpentes aquæ, per aliquot dies injectiones patrari debebunt, cum aquis thermalibus, quæ uteri elaterium substineant, atque orificium patulum conservent. Aquæ illæ de *Barege* præstantiores videntur, at earum defectu substitui poterunt illæ de *Bourbon*, *Balaruc*, aut *Plumbieres*.

8. Tandem uno eodemque tempore causis consulere debemus, quæ hydropem produxerunt, videlicet obstructions tollere aperiendis remediis, quæ priori hydropis curationis Articulo proposuimus; verum cetera vitia compescere idoneis remediis iis præsertim quæ menses revocare potis sint suppressos, emenagoga seligendo *Cap. IV. Lib. I.* indicata.

IV. Hydropis respectu quam hydatides faciunt; parum vel nihil juvat in ea morbi specie specillum uteri orificio apponere, cum aquæ in specialibus vesiculis detineantur, verum si earum nonnullæ disrumpantur, parum utilitatis afferant ratione habita innumeris quæ clausæ supersunt; itaque cum me lateat rationem expellendi; aut conscindendi hydatides, pro incurabili hujusmodi species habenda est; rarissimo tamen mulieres aggreditur, vel si unquam, experientia docuit eam diu perferre posse ægræ citra gravem noxam.

## C A P U T I X.

### *De uteri Tympanitide.*

#### §. I.

##### *Descriptio.*

**E**Venit quandoque uterum inflari, tumesceri, atque resiliere ut in vulgari hydropæ citra pondus aut dolorem, in hoc casu minime a pulsu ratio sentitur, quam *Antitypiam* dicunt vel fluctuationem appellant in ascite obviam, tamen pulsando *tympani* sonitus oritur, qui nomen huic morbo *tympanitidis* præbuit.

Tunc menses deficiunt quorum suppressio tumori uteri conjuncta ægras frequenter decepit, ut fortè esse graves sibi suaderent, & obstetrices ipsas in auxilium vocarent; at a magno flatu sicco quandoque, quandoque a seroso, aut a sanioso effluvio profecuto omnis gestationis suspicio evanuit.

Hujusmodi est *vera tympanitis* quæ *continens* etiam appellatur; eam esse constat, aeris retenti congeriem in uteri cavitate interdum humoribus non remixtam, interdum latice quodam copulata in explosione pariter fluxuro; rarus est morbus, neque multæ observationes illum confirmant.

Et affinis videtur & magis obvia affectio illa quæ nonnullas mulieres de cetero bene constitutas aggreditur, quæ dum truncum anteriùs inclinant aut uterum comprimunt status expellunt; at ita minori cum impetu exeunt, neve ulum comitem habent fluxorem, quare *tympanitis vaga* appellatur.

Cum tympanitidis hujusmodi species inter se non parum differant eas sejun-

ctim

Sim examinabimus; imposterum distincto articulo locuturi erimus de uteri intumescencia, quæ plerumque partum consequitur male curatum.

## ARTICULUS PRIMUS.

### *De Tympanitide vera seu persistenti.*

#### §. I.

#### *Causæ.*

**P**erlongum foret omnia referre quæ medici veteres excogitati sunt ad hanc flatuum collectionem explicandam, quæ uterum in tympanitide replet, verum inutile evaderet ea enunciare cum prorsus futilia videantur; satis erit animadvertere continentem tympanitidem numquam aggredi nisi in confluentia amborum subsequens causam.

1. Quando post partum matricis parietes imperfecte coarctantur, neque uteri cavitatem imminuunt tensæ, & compactæ persistendo etiam utero evacuato, quem externus aer cito replet.

2. Quando in eodem statu orificium uteri perfecte obturatur ut exitum aeris in uteri cavitatem detenti penitus intercludat.

Primum parvi faciunt ægræ huiusmodi expansionem, quæ pro necessaria gestationis consecutione habent, quam uterus nonnihil tumens relinquit; verum medici, & obstetrices a prima mensium eruptione ipsam evanescere sibi suadent.

At aliquot mensibus transactis citra ullam catameniorum eruptionem; dum sedulo magis morbum perscrutantur, & regionem hypogastricam conspiciunt rotundam, tumidam, atque tensam, facile sibi suadeant mulieres sæctum gerere, quod præsertim facile credunt, quæ infantes parere maxime cupiunt.

Quam ob rem pro morbi explicatione reliquum est duplicem conditionem fancire, quæ una illum producit.

Quare I. Certum est uteri parietes nisi subsequenti duplici de causa compactos, at tensos persistere, ut vacuum cavitatem efforment; *primum* enim dum parietes ii phlogosi laborant, quæ turgentiz vasorum ergo impedit quo minus coarctari possint; *alterum* dum ipsi convulsione imperfecta, aut erethismo corripuntur ut eundem pene effectum inducant; duplex huiusmodi uteri status consequitur plerumque difficilem, & laboriosum partum in quo uterus multum pulsus sit, atque diu vehementioribus succutionibus obnoxiosus fuit.

II. Evidens pariter est uteri orificium minime sub lochiorum sine coarctationi in eo duplici statu parietum indicato, phlogosis ergo quæ ei communicatur.

III. Tandem certissimæ observationes ostendunt veram tympanitidem mulieres plerumque aggredi, quæ dum mensibus gaudebant, externo frigori, & inopinato se exposuerunt; facile enim est in hoc casu perspicere aerem in dilatato utero insinuari, ejusdemque cavum replere, postquam quod, de repente obturato uteri orificio, aerem ibi commorari, modo ostium non referetur, quod raro evenit,

Ex iis consequitur: 1. Veram uteri tympanitidem plerumque partum, aut abortum consequi.

2. Ipsamque nisi post laboriosum, difficilem, dolorosum partum apparere, quando uterus valde labefactatus, atque laceratus fuerit.

3. Interdum etiam modo ægræ subito frigori se exponant, aut menstruo tempore, ubertosis catameniiis fluentibus, pedes aqua frigida luant, eodem corripit incommodo; at in hoc casu rara vel levis si unquam tympanitis apparet; ea omnia experientia, atque observationes confirmant.

## §. II.

*Symptomata.*

1. **V**era tympanitis, ut hydropem facere observavimus, corporis incessui officit, impeditque quominus ægræ antierius truncum valeant inclinare, morbus tamen cum a retento aere tantum procedat, dolore, calore, atque pondere expers evadit.

2. Egræ itaque ad utramque partem libere decumbere poterunt citra ullam a pondere noxam.

3. Dum aer in utero retentus internos parietes comprimit, lactæ vesiculæ, & appendices venosæ inflari aut dilatarî remittunt ut in menstruationis negotio necessum esse *Lib. I. Cap. II.* vidimus, qua de causa menses abire debent.

4. Interdum in hoc morbi stadio nihil ex utero erumpit, neque ulla serositas effluit, nondum sanguinis, aut lymphæ circulo intercepto; neque ex lacteis vesiculis obductis ullus stillat liquor, quare tunc tympanitidem *secam* appellant a solo aere in utero congesto derivatam; huiusmodi tympanitides plures auctores infra indicati (a) observant.

5. Interdum vasa sanguinea, & lymphatica sanguine, & lymphæ affluentiturgida nimis, forositate aliquam effundunt, aut lactæ cellulæ imperfecte obturatz uterinum lac suppeditant: in hoc casu tympanitis *humida* appellatur, eaque non a solo aere, sed a lymphaticis, & lacticinosis humoribus originem ducit, qui modo translucidi, modo turbidi cum aere simul ab utero exeunt; hujus tympanitidis species infra alii nonnulli Auctores (b) præferunt.

6. Egræ impares evadunt factum concipere, nam persistente tympanitide uterî officium perbelle obturatur; interdum etiam jam sanato morbo diu steriles persistunt, cum non exiguum temporis spatium requiratur antequam interna uterî facies a *seca* tympanitide arescens emolliatur; totidemque temporis antequam arescat postquam ab umida tympanitide nimis laxata fuerit.

7. In utraque tympanitidis specie supressi menstrui ergo ægræ quamplurimis paloris, atque gestationis scœnomenis sunt obnoxie, quod non parum augeat in iis conceptionis suspensionem.

8. In vera tympanitide uterus perbelle rotundus fit, quam configurationem sane suscipere debet modo quacumque versus ab incluso aere prematur; pulsibus vero tympani modo perfecte respondet; tandem volumen augetur, aut immittitur prout ægræ plus minusve calefiunt, aut frigescent; calor enim detentum aerem rarefacit, frigus ipsum condensat.

Usque adhuc expositæ tympanitidis descriptioni unum tantum obijcitur, videlicet tympanitidem interdum maximum volumen adipisci, quod a modico aere post partum intromisso minime oriri posse arbitror.

De

(a) Valescus de Taranta, *Philos. Lib. VI. Cap. 15.* Matthæus de Gradibus, *Comment. in Novum Rhaph. Cap. De Mela.* Thadæus Ducas, *Lib. Miscellanorum Cap. 8.* Rembertus Dodonæus, *Observat. Medicinal. 49.* Mauritius Cordus, *Comment. 3. in Lib. I. De Mulieribus Hippocratis*, Philippus Morcheetæus, *Decad. V. Observat. 4.* Ambrosius Paré, *Liv. XXV. Cap. 34.* Philippus Salmuthus, *Cent. II. Observ. 57.* Reinerus Solander, *in Consil. Medicinal.*

(b) Alexander Benediclus, *De curandis morbis, Lib. XXV. Christophorus a Vega, Ars. Medend. Lib. III. Sess. 10, Cap. 31.* Laurentius Joubertus, *Cap. 13. De urinis.*

De eo tamen: 1. Incertum exemplum afferunt; unicam enim veram tympanitidem mihi liquit observare, ubi uterus magnitudinem superabat a tertio, vel quarto mense gestantis uteri; volumen sane interdum variat, verum nisi a rarefcentia, aut densitate aeris id procedit prout, calori, aut frigori se subjiciunt ægre.

2. Si unquam enim hujusmodi tympanitides appareant id humidam potius respicit cum hydropse ascite copulatam, tuncque maximum uteri volumen aquarum copię tribuitur, non aeris quantitati, quæ in ea cavitate minime augeri quit.

### §. III.

#### *Diagnosis.*

I. **V**era tympanitis, atque persistens uteri voluminis ergo ceteras hujus partitis intumescencias emulatur, syrrium nempe, steatoma, sarcoma, hydropem, gestationem, molam &c. ab iis tamen differt multiplici ratione, ut infra facile cognoscemus.

1. A syrrio differt qui tumor inæqualis est, angulosus, durus, resistens; ipsa vero rotunda, æqualis, mollis apparet atque pressioni facile cedit.

2. Steatoma vero, atque sarcoma etiam si syrrio molliora sint, tympanitide tamen compactiora sunt; verum pondere suo hypogastrum gravant non vero tympanitis.

3. Hydrops ascitica distinguitur fluctuatione, quæ pulsando cognoscitur, & in tympanitide deest; tympanitis vero sonum edit, nullum tamen hydrops, quod postremum signum sat erit, ut tympanitis a syrrio steatomate, & sarcomate facile distinguatur.

4. Signa vero diagnostica quæ hujusmodi morbum a gestatione, aut mola distinguunt speciatim venient perpendenda, ubi de mola, aut gestatione disputari erimus.

II. Opportunum videretur ad perfectam diagnosis instituendam, siccam ab humida tympanitide distinguere, at id neque facile est, neque valde necessarium videtur tum ad prognosim cum curationem rite instituendum.

### §. IV.

#### *Prognosis.*

1. **C**um tympanitis constans obstaculum ad uteri orificium locatum supponat, quod aeris regressum impediat; patet enim idem officere seminis introductioni, quare sterilitas erit consequutura.

2. In sicca tympanitide aer qui uterum inflat parietes exsiccet, & callosas reddit; in humida vero affluens serositas faciem uteri internam nimis humidat, ut interdum putrefaciat; quare veterime tympanitides vel labefactant matricem, vel fecunditati officiant, post valetudinem etiam obtentam.

3. Nihilo secius mulieres interdum procui graviore incomodo morbum diu perferre valent, vel saltem ipsum facilius quam hydropem perferunt, quod præsertim de sicca tympanitide intelligendum est.

4. Itaque valetudinem quam citissime sollicitare nostrum erit non jam resolvendo cum aer nequeat per hiatus vasorum resorberi, sed orificium uteri referendo, ut aer facile per hanc viam exeat.

5. Interdum casu fortuito ventrem comprimendo, aut truncum inclinando obstaculum citra uteri collum locatum superatur, quandoque etiam obstetrices putati

putati partus ergo advocatæ ostium digitis (a) aperuerunt; at ea non sunt magni faciendâ; morbo enim recognito ei efficaciter mederi oportebit.

## §. V.

*Curatio.*

Cum certissimum sit aerem in utero detentum resorberi non posse, aut dissipari resolutionis methodo, ideo sutilia evadunt resolventia, aperientia, diuretica, & carminativa, quæ veteribus mos erat exhibere; idcirco aeri exituro semitam per uteri orificium parare necesse erit, tres subsequentes indicationes implendo, postquam vitia uteri dempta fuerint quæ morbum producerant.

Prima enim indicatio erit relaxare, & emollire orificium uteri, quod obtinetur, ut in hydropis curatione ostendimus, præscribendo,

1. Semibalneæ tepentia ex decoctione radicum, & foliorum Bismalvæ, Malvæ, Brancæ urcinæ, verum ægras hortando ut eas decoctiones spongiæ subtilioris auxilio intromittant vaginæ ostio.

2. Injectiones tepentes secundum locum habent, ex eadem decoctione patratæ, cui addi poterit mucilago seminum Lini, aut Psylli idoneo positu decumbendo ægræ.

3. Suffumigia per fellam familiaricam in vagina recepta tubili ope ex vapore tepenti ejusdem decoctionis.

4. Tandem efficaciora experiuntur, atque minus molesta pessaria ex vetustiori tela confecta arde involuta, cujus extremitas mollior sit, & fibrillis laciniata ne uteri orificium offendar, verum ex illa decoctione imbuntur, vel si lubet simplici mucilagine seminum Lini, aut Psylli; pessariorum loco usuveniunt pulvini filamentorum filo connexi, qui eodem liquore imbuti vaginæ fundo, aut uteri collo applicantur.

II. Secunda, quæ nobis se præbet indicatio est orificium uteri dilatare modo satis emollitus videatur, id obtinetur valde ægras fucutiendo.

1. Necesse enim est erit eas ad vomitum aut sternutationem excitare; irritantibus clysteribus intestina lacerare, aut vaginam pessariis acrioribus stimulare, quæ uteri etiam contractiones sollicitent, saltusque jubere; tandem obstrictrici præcipere, ut digito intra vaginam intromisso leniter collum uteri agitent, aut secutiant, quantum necessarium videtur ad ejusdem aperitionem.

2. Modo prima vice effectum non obtineamus emollientium usum reiterare, ter quaterve fas erit, at hujusmodi methodus, quæ in uteri hydrope utilis plerumque evadit, in uteri tympanitide frustranea experitur, quia acris minus commoveretur secutionum impulsu, quam aqua in hydropico utero detenta.

## III. In-

(a) Valescus de Taranta, Philonii Lib. VI. Cap. 15. Matthæus de Gradibus, in Comment. ad Caput de Vula idem refert de uxore sua.

Cui addi possunt sequentia Catrina a Jalone Patensi composita Libell. de Partu Cap. 2.

*Venter cum summisset Acciolla  
Septem mensibus & novem diebus,  
Cupissetque luen parum dolere,  
Accioli jubet illius obstrictricem,  
Quartæ fasciolas & apparari,  
Sperato puerum eductura parit,  
Nix inter medias manus ministra,  
Jam poplite, traxitque levatæ,  
Lumina inq̃uissimè quater pedit.*

III. Incaustum iis auxiliis adhibitis tertiam indicationem implere oportebit, aeri femitam parando, specillum cavum introducendo, iis constanter cautelis adhibitis, quas præcedenti articulo animadvertimus.

IV. Postquamquod modo solus aer explosus fuerit, tubuli illius auxilio uterum injectabimus, cum decoctione Radicis Althææ ad emolliendam intus matricem aeris mora arefactam; si vero saniosus liquor turbidus, spissusque cum aere simul exitus fuerit, injectiones parabuntur ex aqua hordei & melle rosato ad uterum detergendum; verum cum decoctione radicis Aristolochiæ si aquæ scetidæ fuerint.

Hac ratione agræ valetudinem recuperabunt; si lubeat regressum præoccupare morbi, & uteri morbosam dispositionem corrigere, serum lactis depuratum, apoemata, aut decoctiones amaras, aquas ferrugineas, balnea, & semibalneæ exhibere oportebit in pessarium emollientium usu persistendo, quæ flexibilitatem conservent, atque occlusionem orificii impendant.

## ARTICULUS II.

### *De Tympanitide vaga.*

#### §. I.

##### *Causæ.*

**T**ympanitis, quæ vaga appellatur communis est morbus, quem tamen nonnullæ mulieres interdum fateri verentur, adoritur ipsa in confluentia ambarum subsequens causarum.

1. A tensione nempe & rigiditate parietum uteri, qui invicem remoti ampliorem spatium relinquunt.

2. A tensione seu rigiditate marginis orificii matricis, quæ impedit quominus complete occludi queat.

Ambæ hujusmodi causæ neminem latebit valde affines esse, ipsæ plerumque procedunt a naturali calore, aut siccitate, crebrius tamen a suppressione, aut laboriosa menstruatione, quam confirmat vasorum plethora, quæ tensionem, & rigiditatem parietum, aut orificii illius inducit.

In hoc casu uteri orificium oscitans externum aerem in sua cavitate facile recipit, qui ibi moratur usque dum parietes appropinquantur corporis contorsionis aut ventris compressionis ergo, quæ valeant protinus, aut per vices illum expellere, aut, desistente corporis succussione uterus denuo aere repleatur, nisi in similibus circumstantiis erupturo; idcirco uterus tunc perbellè æmulatur follim, qui aerem una expellere, & recuperare facile scimus.

#### §. II.

##### *Diagnosis, Prognosis, & Curatio.*

**D**iagnosis. Hujusmodi morbum haud facile erit cum ceteris uteri morbis confundere; agras enim sedulo percontando cito innotebit.

Prognosis. Plures mulieres patienter hanc ægritudinem sustinent, cum nulum plerumque grave incommodum perferant, quod remedia poscat, mihi videtur tamen generationi hujusmodi morbum officere, tum quia uterus arefcens per-



pervertit spermatis virtutem , cum etiam quia semen per uteri orificium refluit antequam mulier concipiat :

*Curatio.* Quotiescumque de hoc morbo agatur alterutram subsequendum medendi rationum prosequi debemus.

I. Si ille enim a mensium suppressione procedat eos revocare necesse erit aperientium , & emenagogorum exhibitione , quæ Lib. I. Caput IV. exposuimus.

II. Contra vero si a tensione, calore, aut siccitate uteri spontanea originem agnoscat, remedia humectantia , & refrigerantia tum intrinsecus, cum extrinsecus adhiberi poterunt pluribus sane recessita.

### A R T I C U L U S III.

#### *De uteri expansione parietum augmento .*

**D**antur nonnullæ mulieres in quibus uterus inflatur a tunicarum crassitudine, etiamsi tumore uterus expers sit, aut alio externo corpore in sua cavitate detento.

Hujusmodi phenomenon partus plerumque consequens est; scimus enim in gestatione membranas uteri valde a vasorum intumescencia inspissari, at ea crassitudo post partum evanescit cum lochia subsecutura vasa depleant , & membranz proinde proprii elateri auxilio paulatim ad naturalem crassitudinem revertant.

Nihilominus solæ naturæ non est opus relinquendum, puerperarum enim abdomen obstetrices & assidentes solent pressione coarctare.

Ex iis enim concluditur facile posse uteri membranas crassiores quam par est persistere, utrumque tumentem.

1. Quando menstrua, vel cito desistant, vel per intervalla, aut exigua copia erumpant.

2. Quando juvenes parturientes & inexpertæ pati nequeant post partum tenias, quæ ventrem vinciant.

3. Quando mulieres delicatiori donatæ contextu necessario membranz illo careant robore, atque difficiliter exuberans sanguinis exprimatur.

4. Tandem quando ætate constitutz erunt , ut membranz flexibilitate deficiant, ad uteri occlusionem necessariam.

In omnibus iis casibus suadendum est facile posse a partu membranas illas inflari , ut experientia confirmat.

Quandoque evenit mensium ubertatem quæ partui succedit , novos partus , aut lochia hujusmodi intumescenz mederi; at modo frustraneum hoc evadat auxilium amplum abdomen patienter ferre necesse erit , modo aperientia emenogoga , balnea , aut semibalnea , vel aquæ thermales levamen non afferant, quod raro sperandum erit.

## CAPUT X.

## De uteri descensu.

## §. I.

## Descriptio, &amp; Differentia.

**I**N naturali statu uterus centrum pelvis occupat, fundus paulum ossa illei superat, collum circa ossa pubis inferius nonnihil locatur, in hoc casu collum posterius rectum respicit, anterieus vero vesicæ adhæret, reliquum uteri corpus lateraliter propinquis partibus a simplici cellulari contextu nectitur; tandem cum vaginæ fundo continuatur, imo ejusdem collum ab ipsa vagina circumcingitur ita, ut nonnihil porrigatur.

Hujusmodi positus tamen citra morbum in diversis subjectis variare potest, at hujusmodi varietates in sanitatis statu lævissimæ sunt, eæque nisi in triplici subsequenti casu, crebrius præsertim in duobus posterioribus eveniunt, ut agrotantium, & medicorum attentionem possint.

*Primo.* Id accidit quando uterus nonnihil labitur ut prope vulvam conspiciatur; hujusmodi status *incipiens descensus* dicitur, quem nulla fœnomena consequuntur graviora, & plures mulieres infestat, quæ multos infantes pepererunt; eumque respiciemus quasi vulgarem uteri statum, ubi a statu naturali nonnihil deflectit.

*Secundo.* Quando uterus in medio vaginæ se profert ad ejusdem usque orificium, cum tunc dolor aggrediatur, pluresque lædantur functiones, ideoque verus morbus gignitur qui *incompletus uteri descensus* appellabitur.

Tandem *tertio* venit perpendendum ulteriorem descensum, qui vaginæ orificium aperit, ut uterus extra vulvam interdum se prodat circa fœmora; tunc sane uteri *descensus completus* existit: singuli hi casus gravem sane morbum constituunt, tunc ægræ pondus, atque tumorem in affecta parte perferunt, difficultas incedunt, vel pedibus stant; in posterioribus duobus crebre mingunt, moleste tamen; difficulter faeces excernunt; tandem penitus tum matrimonii usus cum conceptio impeditur.

## §. II.

## Causæ.

**V**eteres medici autumabant uterum quatuor ligamentis sustineri, duo lata cum lumbis connexa, terretia vero ligamenta, quæ a lateribus destrorsum, & sinistrorsum originem habent, alterum nexum facere; ipsa enim postquam per annulos muscutorum abdominis transierunt, inferi utroque inguine.

Autumabant simul lata ligamenta fulcra esse matricis, quæ descensum impedirent; terretia vero in hypogastrici centro uterum decinere ne ad alterutram partem deflecteret.

Quare fanciebant nunquam uterum prolabi nisi lata disrumperentur ligamenta, aut relaxarentur valde, & terretia valde labefactarentur.

At nova anatomicorum inventa satis ostendunt hujus theoriæ futilitatem; lata enim ligamenta ab expansione procedunt Peritonæi, quæ extrinsecus obtegunt uteri fundum, & lumbis nectitur, ubi mesenterium ipsum adhæret; idcirco mem-

membranam laxam ipsa amulantur, quæ minus valet matricem sustinere; ligamentorum vero terretium respectu præter positum qui rei nostræ minime favet, potius ipsa matricem deprimerent; denique ex laxiori contextu arteriarum, & venarum simul coalitarum coagmentantur, ut, hac etiam de causa, minus foveant, utri firmitatem, ne alterutram partem versus desleat, mediumque hypogastri teneat, quod tamen raro evenit.

Ex iis enim deducitur uterum a vaginæ fundo sustineri, & intra ipsam porrigi digiti transversi dimidium; corpus vero uteri pro magnitudine impediri longius incedere; consequitur enim nisi a majori vaginæ distensione, vel facili dilatabilitate matricem prolabi propriæ gravitatis etiam auxilio, vel alia accidentali de causa; idcirco ad faciendam veram descensus uteri theoriam duo veniunt perpendenda, *alterum* est causas pandere quæ vaginæ fundum dilatare valent, ut uteri corpus facile recipiat; *alterum* accidentales determinare causas quæ potius sint uterum in vaginam impellere, ejusque resistentiam superare.

I. Ad primum quod attinet certum est vaginam nisi tribus subsequen-  
de causis dilatari.

1. Vel a naturali conformatione, quæ in diversis subjectis diversa est, ut diversam magnitudinem membra referunt.

2. Grandioris sætus hydropici, hydrocephali, deformis ergo, qui duplicatus erumpit &c. atque vaginam magnopere distrahit.

3. A laborioso partu in quo obstetrix imperita plerumque manu, aut ungue, in extrahendo sætu, aut placenta vaginam dilatavit.

At vaginæ fundum citra ullam distractionem sponte laxum, aut emollium interdum reperiri potest, ut uteri descensum promoveat, quod in duplici casu contingit.

1. Quando ægræ graciliori temperamento donatæ sunt, aut partium elaterium amiserunt, eademque pollem natura vaginæ tunicæ, facile dilatabiles, & fibris muscularibus laxioribus scatentes.

2. Quando fundus vaginæ jamdiu lymphaticæ serositate fœdatur, quæ ab utero stillat, ut in albo fluori continenti & veterrimo oriri solet.

II. Quæ adhuc dicta sunt circa causas uteri descensus rationibus non solum, verum observationibus fulciuntur sectionum cadaverum earum, quæ ab hoc morbo discesserunt; at facile cognoscitur eas rationes nondum potius esse ad hujusmodi descensum producendum, modo alia de causa uterus inferius non impellatur; sane ejusdem pondus constans causa est ejus depressionis, imo citra maximam vaginæ distensionem satis erit ut uterus inferius quam par est decidat, nunquam tamen nisi efficaciores superaddantur causæ, quæ obstacula superent, verum descensum parere poterit.

Innumera sunt hujusmodi causæ sancitæ experienciis, & exemplis intestino-  
rum confirmatæ, ut de Epiploæ prolapsu in homine evenit, hujusmodi sunt

1. Tussis crebra, atque vehemens in pertinaciori rheumatismo, aut asmatico affectu.

2. Sternutatio nimia, quæ consequatur cerebri rheuma, aut ab usu nimio Nicotianæ excitetur.

3. Vomendi conatus qui necessario post epulam concitatur.

4. Ponderis sublevandi nifus.

5. Disenteria, & teneſmi diuturnioris pruritus.

6. Casus interdum, præsertim dum venter labefactatur, aut ictibus læditur.

7. Magna vocis elatio, atque ululatus doloris, aut sævioris animi pathematis ergo concitatus.

Animadvertendum est causarum enunciatarum respectu, quod cum superafflante

Astruc de Morbis Mulierum.

R

vagi-

vaginæ conditiones non sufficerent ad descensum uteri producendum, nisi altera de causa uterus prolaberetur, tamen neque hujusmodi posteriores causæ pares essent nisi vaginæ dilatabilitas simul concurreret, quare a duplici causarum genere descensum oriri constat.

## §. III.

*Symptomata.*

I. **I**n uteri descensu positus sine figuræ mutatione immutatur; collum primo vaginam intrat, inde uteri corpus, quod ab obversa vagina circumcingitur.

II. Agravæ morbi initio parum molestiæ perferunt cum modica sit distractio, tum uteri cum vaginæ; utrumque, augetur in ratione depressioris descensus, & tunc in eadem ratione pondus, atque dolor aggrediuntur sæviores necne.

III. Quo magis uterus deprimitur, eo difficilius gravæ incedunt, etiam si proferendo caveant ne coxis uterum lædant.

IV. Quamvis descensus incompletus fiat, quando uterus ad orificium vaginæ tantum pertingit; vesica tamen comprimitur a propinquo uteri collo ut gravæ crebrius, & moleste mingant, compressæ urethræ causa.

V. Fæces pariter difficilius excernunt, quando collum transversim locatum rectum comprimat.

VI. In hoc statu menses persistunt, cum nulla ratione intus uterus lædatur; at cum sanguis compressionis ergo difficilius evehatur, atque revehatur, ideoque menses plerumque in continentes degenerant, aut hæmorrhagiam lethalem interdum inducunt.

VII. Hujusmodi morbum comitantur albi fluores serosi, quia sanguis dum uteri vasa replet finit lymphæ eruptionem, quæ plus minusve uberrima apparet in ratione majoris, vel minoris descensus.

VIII. In completo descensu vesica crebre labitur & ipsa, quod confirmat unica (a) Ruyschii observatio; imo collum interdum cum utero decidi posse ostendit Enricus de Heers (b).

IX. Observavimus jam sanguinem difficilem a prolapsu utero devehiri in completo præsertim descensu, quod de lymphæ pariter intelligendum erit: nil mirum ergo si in hoc statu uteri volumen augeatur; hujusmodi intumescencia de repente fit, & inflammationem interdum gignit, in gangrænam destutam; modo serius intumescat, syrrhus pertimescendus est, & cancer quandoque.

X. Tandem in uteri completo descensu lotium ab urethra erumpens per totum uteri ambitum disperditur, ut superficiei ulcerosam excoriationem inducat, & ulcera ipsa quæ in gangrænam sæpissime desinunt.

## §. IV.

(a) Theſaurus Anſtom. VIII. num. 103.

(b) Obſervat. Medie. Obſervat. 25.

## §. IV.

*Diagnosis.*

**H**Aud facile est uteri descensum ut jam admonuimus cum ceteris vaginæ ex-  
crescentiis, aut productionibus confundere, vel cum uteri obversione,  
quæ satis extra orificium intra vaginam conspicua sit.

Patebunt signa, quæ excrescentias, & productiones vaginæ ostendunt *Ca-  
pite sequenti*, ubi hujusmodi species explicabuntur; ibique obversionis causæ ap-  
parebunt, & rationes distinguendi uteri descensum, qui eos comitatur mor-  
bos, a legitimo descensu.

In præsentiarum posteriorem descensum speciem determinare sufficiet; signa  
ejusdem præcipua sunt uterum antèrius graciliorem esse quam posterius; leviga-  
tum, firmum, & vasis sanguineis magis interspersum; rima transversim instru-  
ctum, ubi menstruus stillat sanguis, modo mulieres adhuc menstruus donentur;  
tandem corpus uteri circumvestiri, ut digito facile cognoscitur, a propinqua  
vagina.

## §. V.

*Prognosis.*

**U**T rite prognosim instituamus diversos uteri status animadvertere neces-  
se erit.

1. Modo descensus incipiens videatur, videlicet, dum uterus parum prolapsus  
sit, levis morbus est, periculo vacat, ut nullo adhibito pessario, uteri re-  
stitutionem facile sperare liceat.

2. Quando descensus jam confirmatus sit, sed incompletus modo uterus  
trans vaginæ orificium non decidat, facile reduci poterit, at pessarium ute-  
ro apponere necessum erit, modo ægræ non malant diu decumbere, interdum  
tamen & decumbentibus ægris orbiculus locum habet.

3. At si completus fiat descensus, videlicet uterus penitus intra vulvam de-  
cidat, vel quod deterius est, extra vulvam prolabatur, modo cito medici auxi-  
lium ægræ poscant facile restituitur, neque interest tunc, quod ægræ diu lectu-  
lo detineantur, apponere, sat erit orbiculum quod novum prolapsum impediat.

4. Tandem si ægræ valde desides sint, neque prolapsæ utero nullum reme-  
dium ferant, inflantur, indurescit, ut reduci amplius nequeat; tunc facile uteri  
superficies exulceratur ab acre superaffuso lotio; hujusmodi exulcerationem  
consequitur gangræna, quæ celerrimos progressus ostendit, cui sola uteri am-  
putatione reliquum est mederi.

5. Idem patrare necessum erit modo prolapsus uteris in syrrhum, aut can-  
cium degeneret, quod tamen raro contingit: non desunt tamen exempla a me-  
dicis tradita; hujusmodi operationes valde periculose experiuntur, atque ple-  
rumque funestum habent eventum, ideoque nisi in evidenti mortis periculo sunt  
amplectendæ, imo conveniunt modo nulla superstit medendi ratio, verum (a).  
auctores fide dignissimi amputationem uteri commendant.

R 2

6. Con-

(a.) Actius; *Tetrabibi IV. Serm. II. Cap. 76.* Paulus Aegineta, *lib. III. Cap. 72. Op. Lib. V. Cap. 2.* Berengarius Carpus, in *Isstoge anatomica.* Marcus Gasterius, *Prætic. Cap. de vitro matris.* Anton. Beniveni, *Observat. Anatomical. Observat. IX.* Christophorus a Vega, *Comment. ad Aphorism. lib. VIII.* Ambroise Paré, *Livre XXIV. Ch. 48.*

6. Consequitur uteri descensum nedum lethalem morbum esse, modo uterum reduci possit; non desunt enim innumerae mulieres, quae diu absque gravi periculo illum perferunt.

7. Certum tamen est molestum evadere uteri descensum, atque menses sistere, flores albos gignere, conceptionem implicare, & desides mulieres reddere.

8. Generice facilius convalescunt aegrae modo recenti, & incompleto uteri descensu laborent, quam si veterrimo & completo; facilius vero juvenes, quam aetate constitutae, aut cachecticae.

9. Completus descensus quando uterus restitui nequeat, plerumque successive in inflammationem, exulcerationem, gangraenam, syrrhum, & cancrum degenerat, multum periculi conjunctum habet, & mortem ipsam frequenter inducit.

## §. VII.

### Curatio.

**R**atio medendi uteri descensus una constanter est, variat tamen pro diverso morbi gradu.

1. Si uterus nondum prolapsus sit, solummodo inferius nonnihil porrigatur, magis quam in statu naturali, adstringentium usu, quae valeant fundum vaginae constipare ut magis descendenti matrici resistere, non parum morbi progressus intercludit.

Ea diversimode adhibentur.

1. Vel injectiones vaginae tres quaterve in die reiterantur, ex decoctione confectae

Radicum Tormentillae  
Bistortae  
Consolidae majoris

Florum Burz Pastoris  
Verbenae  
Equiseti  
Mille-Folii

Rosarum Rubrarum  
Damascenarum

vel si decoctio fieri velit efficacior constatur ipsa ex

Corticibus Malicorii  
Balaufti  
Nucibus Cupressi  
Capsulis Glandium

Ex tribus, vel quatuor eorum simplicium selectis cum aqua communi, vel vino albo, aut aqua de *Marschal* decoctio illa conficitur, quae tepida intromittitur, modo aegra idoneo positu decumbant.

2. Fomenta impendi possunt, quae applicantur spongiae auxilio eadem decoctione imbutae, idque tutior est, & efficacior methodus, nam remedia diu perdurant in affecta parte.

3. Suf-

3. Suffumigia methodo pluries descripta in utero recepta valde prosunt, verum quæ efficaciora experta sunt consueuntur ex

Thure  
Myrrha  
Mastice  
Sandaraca  
Rosæ rubris

subtiliter friatis & super prunas affusis per ore quadrantem.

Valde pariter commendantur pro eodem scopo cutim anguillarum fumo exsiccatarum, at suspirio hujusmodi remedium parvi pendere.

4. Uno eodemque tempore intus exhibentur aliquot cyathi infusionis florum Salviæ, & foliorum Argentinæ, vel decoctionis Terræ Japonicæ, vel quod utilius experitur decoctionis Chinæ, & Salsæ-parillæ radicis.

Boli etiam præscribi possunt ex Catechu, Mastice, Sanguine Draconis, Cascarilla, cum syrupo subacta rosarum exsiccatarum, aut itecadis; etiam si interna remedia in hoc morbo parum levaminis afferat.

5. Modo tempestas idonea sit, aquæ thermæles usuveniunt quæ elaterium vaginæ sublineant; per iniectionem, ipsæ embrocationem, aut balneum extrinsecus adhibentur; intrinsecus etiam exhibentur; vel persellam familiaricam earundem vapores in utero recipiuntur.

6. Hypogastrô vero & renibus applicatur emplastrum contra rupturam vel emplastrum Mad. *Fouquier*; non quia valide agant, verum ne ægræ exanimemus iis remediis indulgendum videtur.

7. Tandem si uteri descensus progrediatur, & ægræ magis desides fiant, doloremque in utero persentiant uteri orbiculum statim applicare oportebit, qui tutior est remedium adversus morbi progressum; sequenti articulo methodum ostendemus, quæ impendi debet.

II. Si uterus intra vaginam ad orificium usque descendat, incuriæ patientis aut nifus præcipitis ergo, descensus incompletus sit nostrumque videtur statim iterum ad naturalem statum reducere.

1. Hac de causa inversa ratione decumbant ægræ ut venter coxis inferius locetur; verum digitis pinguedine oblititis leviter uterus reponitur; vel pessarii ope filo nexi, & althææ decoctione imbuti uterus reducitur.

2. Plerumque facilis est hujusmodi operatio, quam interdum ægræ ipsæ patrant; postquamquod crura denuo jungi fas erit, in eodem positu diu persistendo donec omne novi prolapsus periculum absit.

3. Interea orbiculus paratur ovalis ex subero confectus, lato foramine pertusus, ut menses erumpere valeant, ex una parte convexus, ex altera laxiter concavus.

4. Hujus instrumenti amplitudo respondere debet vaginæ latitudini, & divaricationi femorum; focus enim inutile evaderet pro exiguitate, vel nocuum pro longitudine.

5. Modo aptiorem formam adeptus sit hujusmodi orbiculus cera alba, terebinthina Veneta, & Mastice oblititur ut levigatus fiat, neve pudenda lædat.

6. Orbiculus ita paratus oleo, aut butyro recenti inungitur ut facilius per longum vaginæ introducatur usque dum uterum pertingat; obvertitur tunc ut horizontali positu persistat, ea ratione ut convessa pars uterum respiciat.

7. Hac ratione instrumentum nunquam prolabi poterit, neque uterus quod ipsum sustentat; neque vesicam, aut rectum comprimere quia in sua latitudine majori angustia donatur; foraminis vero ergo in medio locati menses

*Astruc de Morbis Mulierum.*

R 3

flue-

fluere poterunt, atque jugata vino uti, imo concipere persistente orbiculo quem partus tantum occasione removeri debet.

8. Modo uterinus orbiculus rite fabricatus sileo facile ægræ assuescunt, at valde molestus evadit modo imperfecte elaboratus fuerit; si brevior sit, quam par est, fundo vaginæ fluctuantem decidit; si longior vaginam nimis distendit; si latior premit rectum aut vesicam.

9. Modo ille idoneo loco appositus sit ægræ tuto & facile incedere poterunt citra aliud quodvis remedium; itaque sat erit exigua spongia decoctione adstringenti imbuta interdum partem humectare, etiam si difficillime coarctari possit vagina continenter ab orbiculo illo distensa.

III. Si uteri descensus completus sit extra vaginæ orificium protensus, ut prope pudenda conspiciatur, statim reductionem tentare debemus antequam intumescat.

Ut id facilius obtineatur urinas ciere, vel siringa evacuare, tum intestina clysteribus expiare primum oportebit; verum uterum fovere tepenti decoctione Althææ, aut mucilagine seminum lini; postea methodo superius allata reponitur, quod plerumque obtinetur modo cito occurramus.

At si sero medicus superveniat, atque uterus grandior & compatiior reperitur in cassum reductione prudenter tentata, sequentia auxilia præscribi necessum erit: & primum;

1. Bis brachium incidere, decem, aut duodecim uncias extrahendo sanguinis.

2. Uterum fovere cum decoctione emollienti radices Althææ, Cephæ, Liliorum, & foliorum Malvæ, Althææ, Brancæ Ursinæ &c. eaque lineum imbuiere utero pluries apponendum.

3. Cataplasmata etiam applicantur ex mica panis & lacte confecta, vel emollientia cataplasmata cum pulpa parata earumdem plantarum, & oleo liliorum, vel amigdalorum dulcium.

4. Semibalneæ tepentia interdum usuveniunt ex iisdem decoctionibus, in quibus per unicum, vel duplicem horam ægræ detineri debent.

5. Tandem dum ægræ remediis hujusmodi subjiciuntur lectulo quiescere debent, supra dorsum decumbendo, elevatis clunibus ut facilius sanguis ab utero revehatur.

Modo iis remediis voluminis imminutionem obtineamus vel majorem saltem molliem, denuo reductionem tentare prudenter fas erit.

Si id contingat ægræ jam convaluerint, at cum in ea operatione multum uterus passurus sit, adhuc per plures dies decumbere ægræ debent idoneo posito lectulo persistendo; venæ sectio tunc convenit semel vel bis instituta; tum emollientia fomenta hypogastrio applicita; & rectum vitæ regimen.

Tandem, si dolor & calor uteri, aut vaginæ abierit, orbiculum tutius erit intrmittere primum exiguum, verum idoneum ut paulatim assuescant.

IV. Si uterus inflatus valde atque durus appareat, ut reduci nequeat, ægram sane commiserare debemus in hoc teterrimo casu; verum cum morbus incurabilis evadat palliativa medendi ratio institui necesse erit, quæ molestas consecutiones levet, & uterum tueatur ab urinæ acrimonia, aut superventuro ulcere.

Id obtinebitur uterum crebre ablundo cum decoctione radices Bismalvæ, aut Hordei, vel ipsum obtegendo cerato Galeni, aut tela cerusa oblinita; leviores fissuræ soventur decoctione radices aristolochiæ, aut unguento Stracis induuntur frequentibus etiam fomentis quantum fieri potest impeditur compressio uteri, aut syrrhus, at plerumque incassum iis adhibitis cautelis ulcere & gangræna sædatur, aut syrrho, vel carcinomate; tunc enim jam ægræ in faucibus Orci videntur, ideoque uterum amputare licebit, quod tamen plerumque infelicem habet eventum; sufficit tamen, quod interdum amputatio utilis

exper-



experta sit, ut in extremo casu præsertim in juvene, ut bene constituto subiecto, tentari queat.

Cum raro id patrari contingat supervacaneum censeo fusius operationem explicare, fat erit animadvertere.

7. Debere vinculo prope vulvam uterum circumcingi matricem extra producendo nonnihil, modo syrrhosa appareat.

2. Cavere ne vesicam tunc simul vinciamus, quod obtinebitur vesicam tepenti aqua inieclando.

3. Verum uterum supra vinculum falcato cultro secare.

4. Omni diligentia, atque artis majori scrutinio pro diversis morbi circumstantiis ulceri mederi nostrum erit; modo vero vinculum decisum fuerit, & ulcus cicatrificationi proximum, reponere interius debemus vaginæ reliquias in vulva superstities.

## C A P U T XL

*De morbis, qui uteri descensum respiciunt.*

Hujusmodi sunt sarcomata, aut carnez vaginæ excrescentiæ, sive productiones portionis alicujus internæ ejusdem tunicæ; atque uteri obversio, quæ ut fusius explicentur plures distincti Articuli institui debent.

## A R T I C U L U S P R I M U S.

*De sarcomate, aut carnea vaginæ excrescentia, ac de productione, aut prolapsu partis alicujus intimæ vaginæ membrane.*

Quæ adhuc dicta sunt, in postremo capite, circa uteri descensum, observationibus perbelle confirmantur.

Mirum sane est medicos plures (a) infra recensitos in dubium revocasse matricis descensum, eumque pro sarcomate, Vaginæ excrescentia, aut productione habuisse.

Eriam si hujusmodi morbus non raro eveniat, nunquam vidisse credendum est, qui illum contendunt; facile enim est prolapsum uterum distinguere a firmitate, volumine, figura, atque collo, vel rostro lævigato, paucis vasculis scatente, rima vero instructo, a qua menses periodice prodeunt modo ægræ ipsum reduci renuant, vel pro magnitudine restitui nequeat; demum si matricem amputare necessum fuerit cruciatus, & instans Gangræna morbi naturam aperiet, sectumque corpus uterum fuisse ostendet.

Pareus (a) circa hoc certior factus est, nam disecto mulieris cujusdam utero quæ ab amputatione etiam convaluit, verum cum audiret paucos post menses a Pleuritis necatam fuisse ipsam disecuit, observavitque matricis loco corpus callosum adesse quod ostium vaginæ obturabat.

Interdum accidunt vaginæ descensus, aut morbi qui hoc nomine insigniuntur, totidemque species constituunt ab uteri descensu diversas, ut infra apparebit tum causarum, cum medellæ respectu.

(a) Job. Meckeren, *Observat. Chirurg.* Cap. 51. Henricus à Roonhuyzen, *Observat. Pars. I. Observat.* 2. Theodoras Kerkrinzus, *Species anat.* *Observat.* 19. Johannes Van-Hoene, *Microscop. Vols II. Pars. 1. & 12.* 46) Lib. XXIV. Cap. 48.

## §. I.

*Descriptio descensus Vagine.*

**N**Entiquam integra descendit Vagina, quod impossibile est sed ejusdem pars aliqua, seu melius tunicæ internæ portio, quare merito Vaginæ, *productio* potius dici debet.

Hujusmodi productiones inter se multiplices de causa valde differunt.

1. Vel ratione indolis descensus nam modo sarcomata sunt, aut carnez escrescentiæ interius adherentes; modo *fungi* in aliqua Vaginæ parte locati; modo plicarum innumerum transversalium quibus Vagina scatet processus videntur.

2. Qualitatum respectu, quando molles sunt illæ productiones, flacidæ, spongiosæ varicibus interspersæ quæ Lymphaticum, saniosum, aut cruentum effluviū sinunt; quando compactæ, atque firmæ; quando collosæ, & fibrhosæ apparent.

3. Crassitudinis, & longitudinis ergo, nam modo graciles sunt, & fluantes; modo grandiores ut Vaginam replcant; aliæ longiores sunt ut extra vulvam quandoque porigantur; modo breviores ut vix ad orificiū Vaginæ pertingant.

4. Tandem adhesionum respectu; etenim vel fundum; vel latera; vel orificiū Vaginæ lædunt, lata, aut angusta basi.

## §. I L

*Causæ.*

**E**Rgo vaginæ descensus tres complectitur, classes pro diversa quam præfert natura, 1. Sarcoma nempe, 2. Fungum, 3. Vel simplicem productionem interioris vaginæ tunicæ, quæ totidem causas recognoscere debent.

I. Ad sarcomata quod attinet ipsa eadem de causa crescunt, ac in cæteris partibus nata sunt, ut in Tractatu, de *Tumoribus*, & *Ulcerebus*, vidimus Lib. V. Cap. VI. sat erit hic enunciare in vagina hujusmodi tumores a cancerum myxomatosis nonnullis originem ducere acrimonie albi fluoris, aut luis Venereæ ergo.

II. Fungi autem ab ulceribus incomplete deterfis, quæ spongiosam carnem producant nascuntur; ulcera vero illa producant plerumque, albus fluor, luis venerea, aut titilamenta nimia facta, vel permixta.

III. Simples vaginæ productiones nimis vaginæ distentioni tribuuntur quam graciliores præsertim passæ sunt in laborioso, difficili, aut crebro partu; post fetus enim expulsionem tunica muscularis facile constringitur, nervæ tamen difficiliter consistuntur, pluresque plicas gignit quarum alterutra a lymphæ nutritionis ubertate facile producitur; eademque causa internam recti tunicam in infantibus quandoque producendo putatam prolapsam inducit.

His explicitis facilius differentias earum productionum sanciantur.

1. Modo enim fundum, latera, aut orificiū vaginæ ipsæ lædunt pro diversa parte quam causæ producentes aggressæ fuerint; adhesiones simul latiores, vel angustiores apparebunt, prout ampliorem, vel arctiorem infestaverint partes.

2. Si illæ protuberantiæ sarcomatosæ sint compatiore observabuntur; molliores vero si productiones simplices sint vaginæ; at omnes duriores una fieri tractu temporis, collosæ, & fibrhosæ etiam cum adstringentia cito nimis adhi-

beant.

beantur, quæ illas exsiccent; vel extra vulvam protensæ aeris actionem diu passæ sint, quod præsertim timendum est de sarcomatosi processibus.

3. Sarcomata sicca sunt nullamque humiditatem effundunt; aliquam vero serositatem effugere sinunt productiones vaginæ; denique ex fungis saniosus, & cruentus stillabit latex.

4. Tandem huiusmodi excrescentiæ longiores vel breviores erunt; crassiores vel graciliores prout causæ validiores aut diuturniores existent.

### §. III.

#### *Symptomata.*

1. **V**aginæ descensus dum exigui sunt neque dolorem, neque pondus, neve distractionem pariunt, tum parum infectant modo non extendantur, & vaginam, atque vicinas partes comprimant, quod in sarcomate præsertim oriri solet.

2. Incommodi valde experiuntur ipsi pro molestiis, quas inferunt; vel quia serum aut saniem effundunt; vel menses, aut fluores albos intercipiunt, quamquam ægræ sæpe abluantur.

3. Implicant, vel saltem molestum reddunt matrimonii usum, ejusque scopo officiant.

4. Si utero graves fiant, quod facile evenit, difficulter pariunt.

5. Tandem huiusmodi protuberantiæ temporis diuturnitate syrrhoæ plerumque evadunt, vel in cancrum degenerant, quod præsertim sarcomata respicit.

### §. IV.

#### *Diagnosis.*

**V**aginæ descensus modo grandiores fiant, ut supra admonuimus cum uteri descensu facile confundi possunt, omnis tamen difficultas evanuerit modo animadvertere velimus:

1. Vaginæ descensum longum, flexile corpus repræsentare, vel a fungis, vela vaginæ productione ipsum dependeat; uteri vero prolapsum corpus præferre rotundum, crassum, ovum referens, levigatum, & rimâ instructum.

2. Sarcomata denique plerumque ampliora esse, ut interdum volumen uteri referat, inæqualia, & angulosa; uteri corpus verum acuminautum apparere, ut pirum perbellè repræsentet, quæ est vera uteri imago.

3. Digito intramisso facili productionum earum adhesionem deteguntur, etiam si fundum vaginæ deturparent; uterus vero prolapsus utrinque insulatus apparet, & digito circumscribitur.

4. Tandem uteri descensus modo reductionem obtineamus ibidem persistit, nisi a vehementiori nisu denuo prolabatur; vaginæ vero productiones etiam si digitis restituantur iis remotis statim decidunt.

### §. V.

## §. V.

*Prognosis.*

1 **V**aginæ excreſcentiæ, aut plicarum productiones moleſtæ plerumque evadunt, pluraque incomoda inducunt, quibus vexantur ægræ, ut diffi-  
cilius munera connubii implere valeant.

2. Modicum tamen periculum conjunctum habent, eaſque diu ægræ perſerunt, imo crebre ipſas non animadvertunt niſi ſanguinis jaſturam inducant.

3. Nihilofecius illas neſas eſſet negligere neceſſaria remedia omittendo dum grandiores, calloſæ, ſyrrhoſæ, aut ſpongioſæ ſunt, vel cruentum eſſluyium, aut hæmorrhagiam inducunt.

4. Hujusmodi ſollicitudo neceſſariſſima videtur, quando excreſcentiæ extra vulvam producuntur, nam aeris contactus & induſſi friſtio cito illas ſyrrhoſas redit; ſæpe etiam carcinomatoſæ evadunt.

5. Generice tutior methodus eſt hujusmodi morbum ſtatim cum ægras ipſe adhoritur idoneis compeſcere remediis, nam ei tunc temporis facilius eſt, tutiusque mederi.

## §. VI.

*Curatio.*

**I**N hoc morbo medendi ratio pro natura ſpeciei morbi diverſa variare ſolet.

1. Si excreſcentiæ vaginam occupaverint inutile eſt reſolutionem, aut exciſi-  
cationem tentare reſolventibus, aut adſtringentibus, nam eorum remediorum uſu durities intenditur; ſalubrius erit eſcharoticis excreſcentias abradere, aut for-  
bice conſcindere.

1. Eſcharotica diuturniora evadunt modo excreſcentiæ grandiores ſint, aut calloſæ; verum interdum ſanæ propinquæ partes lædi poſſunt; tandem ea re-  
media dolorem, & inflammationem vaginæ plerumque inducunt.

2. Amplecti igitur potius debemus amputationem; olim difficillime pediculū vinciebantur antequam conſcinderentur, neque tamen ipſis facile erat perfecte protuberantias extirpare; nunc ſimpliciorẽ methodum inventi ſunt, at in no-  
ſtro caſu vincula fruſtranea videntur, nam gravis hæmorrhagiæ periculum abeſt, ut torundæ ſufficiant aqua aluminofa imbutæ ad cruoris jaſturam ſiſtendam.

3. Poſſe enim modo poſitum morbi cognoscamus ipſum extirpari, hac de  
cauſa ſiniſtræ manus ad pediculum uſque indice digito intromiſſo longiori for-  
bice circa digitum introducitur, eo pediculo comprehenſo ſollicite omnis ſcin-  
ditur protuberantia,

4. Poſſumus levem ſanguinis jaſturam permittere, at ſiccis filamentis, quibus  
vagina repletur, facile citoque cruentum ſiſtitur eſſluyium; ſi id non ſufficiat  
torundæ aqua aluminofa, aut ſtiptica imbutæ intromittuntur; poſtero die deci-  
dunt filamenta, & ulcus vulgari digerenti pauco balſamo Arcei remixto per-  
tractatur, ut hac methodo facile convaleſcat; neceſſum tamen erit perſeru-  
tari an nulla calloſitas circa pediculum ſuperſit, in quo caſu illa deſtrui de-  
bet pulvinos applicando unguento bruno oblinitis, aut ſolutione lapidis corro-  
ſivi imbutos tuendo ſanas partes ſiccis filamentis.

5. Donec hujusmodi medendi ratio completa videatur dorſo tantum continuo  
ægræ decumbere debent, hoc regimen ſollicite obſervando; verum modo hanc opera-  
tionem

tionem nulla febris consequatur majori nutritioni erit indulgendum; tandem jam convalescentibus ægris vaginam injectare fas erit decoctione, hordei radicis Aristolochiæ, Melle Rosato, vel salubrius, Aquis Thermalibus de *Plumbier Bourbon*, & *Barege*.

6. De cetero cum suspicemur a lue Gallica morbum derivare, frictiones mercuriales usuveniunt idonea methodo institutæ inunctionem protrahendo ad medium medellæ cursum.

II. Si ægritudo simplex lassitudo, aut productio sit plicæ cujusdam, aut portionis internæ vaginæ tunicæ, nostrum erit tunc laxatam partem exsiccare, atque ad naturalem statum reducere.

Id implebimus exsiccantia adstringentia, & stiptica remedia adhibendo, quæ duplici ratione præscribi possunt exhibendo, vel

1. Decoctiones quibus etiam imbibuntur pessaria linteo involuta; aut gracioliores spongiæ quæ affectæ parti apponuntur; plantæ quæ decoctionibus cedunt plerumque sunt

Corraria  
Nux Cupressi  
Gallæ  
Cortices granatorum  
Flores granatorum  
  
Folia Myrthi  
Equiseti  
Bursæ Pastoris  
Plantaginis  
Pilosellæ &c.

ebulliendo earum stirpium tres, vel quatuor, cum aqua de *Forge*, de *Marschal*, aut duplici drachma vini albi.

2. Suffumigia per sellam familiaricam recepta locum habent parata exsequentibus pharmacis, quæ sunt

Thus  
Mastix  
Ladanum  
Rosæ exsiccatæ  
Sandaraca

eorum duo, vel tres seligendo quæ anatina dosi simul permiscuntur, & supra prunas inspergantur, quorum vapores per aptum tubulum intra vaginam recipiuntur.

3. Animadvertendum est hujusmodi productiones evanescere in iis, quæ utero graves sunt, modo in hoc statu nonnihil progrediantur; nam uterus tunc in pelvi regrediens aucti voluminis ergo vaginam producit, omnesque plicas tollit; at morbus post partum cito, scilicetque revertit.

4. Si pro crassitudine hujusmodi productiones incommode magnopere evadant, vel in syrrhum, aut ulcum degenerent, statim ipsas secare oportebit propositam methodum prosequendo, quam circa excrescentiæ amputationem proposuimus.

## ARTICULUS II.

*De uteri obversione, in eo prolapsus statu.*

**I**nterdum uteri fundus obversus vaginæ orificio se præbet, videlicet reflectitur, cucurbitam referens, exitque secum uterum trahendo, ut tumorem rotundum grandiozem efformet, quem sæpe pro vulgari uteri descensu habent de quo superiori Capitulo locuti sumus.

Hæc calamitas plerumque partui succedit imprudentiæ ergo obstetricis, quæ placentam violenter nimis abraferat, secum fundum uteri obvertendo; vel quod crebrius accidit convulsivæ constrictionis causa, quæ uterum succutiendo in laborioso partu fundum exterius propellint, ut in violentiori collica sæpe evenit ubi alterum intestinum alterum intrare solet.

Hujusmodi morbi status dolorem sekvissimum comitem habet, quem subsequuntur inflammatio, gangræna, & mors ipsa, modo cito non occurramus uterum prolapsum reducendo; id sufficeret ad distinguendum descensum ab uteri obversione; hæc in partu tantum evenit, ille interdum puerperii consequens est, verum citra partum etiam succedit; obversio lethalis plerumque est modo cito ei non medeamur, descensus minus periculosus evadit, segniusque agit, at hujusmodi diversæ species descensus subsequentibus signis facilius deteguntur.

1. In uteri obversione, quasi cucurbita se præbet extrorsum, in descensu vero naturalem positum plerumque respicit, atque nulla obversio apparet.

2. In ea pariter rotundum corpus se offert, extrinsecus pulposum, involutum in quo neque rostrum conspicitur, neque collum, aut orificium; in descensu vero uteri rostrum, collum, & orificium distinguuntur, verum prolapsum corpus levigatum firmum, & ovale apparet.

At satis est, quod adhuc dictum est, eoque mittimus lectorem ubi de partu discuturi erimus, si fusiozem descriptionem postulaverit.

## CAPUT XII.

*De Morbis, qui Ovaria, & Tubas infestant.*

## ARTICULUS PRIMUS.

*De Morbis, qui Ovaria ladunt.*

## §. I.

*Describuntur Ovaria, eorumque Morbi.*

**O**varia corpora duo sunt modice extensa, figura ovali donata, nonnihil depressa, dextrorsum, & sinistrorsum tribus circiter digitis ab utero distita, & circa uteri fundum membranaceis utrinque ligamentis connexa, ea peritonæi expansione suspensa, quæ cum limbis peritonæum necitur, ut ligamenta lata uteri producat.

Ambo ovaria ut & cetera viscera propria tunica involvuntur, ac propriis vasibus, arteriosis, venosis, lymphaticis, & nervis valde referta sunt, at frustra-  
neum est fusiozem hic eorum vasorum descriptionem asserre, quæ parum, vel nihil ad morborum eorum originem faciunt.

Potissi-

Potissimum tamen est ovaria animadvertere duplici substantia constari; altera superiorem partem, seu externam respicit, quæ ex fibrarum tendinearum contextu coagmentatur, minusque compactam substantiam, seu spungiosum corpus constituit; altera, quæ inferior pars est, seu intimior, pluribus exiguis cellulis interpersa videtur membranaceis, & distinctis, in quibus exigua spherica vesicula continetur limpidiori lymphâ repleta.

Singulæ vesiculæ proprio pediculo suis cellulis adhærent; ex confertissimæ, & inter se valde similes sunt quoad figuram attinet; at magnitudine differunt, nam aliæ pisum non superant, aliæ grano Miliaceo non exiguiore sunt.

Plures observationes docuerunt hujusmodi cellulas rima instrui valde arcta, & in statu naturali vix patenti, quæ tamen referatur dum vesicula pro conceptione inflatur, ut vesiculæ exitum sinat quæ tubas intrat; animadverterunt etiam diu post vesiculæ descensum ovarii semitam, per quam vesicula sibi pandit viam, nigram persistere, quam *cicatriculam* appellant; cicatricularum ergo numerus respondet in ovarii numero fœtuum in utero degentium.

Centum ab hinc annis & ultra, qui hanc materiam perscrutati sunt, & generationis mysteria intimius examinarunt, sancierunt, brutorum generationis analogia ducti inter Ovipara, & Vivipara animalia, hujusmodi vesiculas totidem ovula præstare generationi inservientia, modo virili semine secundata sint, qua de causa ea duo corpora ovaria appellantur.

II. Hujusmodi corpora præter morbos ceteris partibus communes, specialiter corripì possunt

1. Inflammatione quæ in resolutionem, abscessum, aut gangrænam degenerabit.

2. Syrrho interdum continuo, interdum in plures lobulos distinctos, quod præsertim attinet ad externam spungiosam ovarii substantiam; qui syrrhus quandoque in cancerum immutatur.

3. Inter ceteros morbos ovarii proprios recensentur (a) hydatides, aut vesiculæ diversæ magnitudine præditæ, externæ ovariorum faciei adhærentes, & lymphâ glanulosa, & translucida repletæ.

4. Verum (b) Hydrops saccata in qua aquæ intra sacculum membranaceum diverso volumine, & crassitudine pollentem detinentur.

5. Fœtus conceptio in ipso ovario, ubi ille interdum crescit, sacculum referens de quo plures ineluctabiles (c) observationes traduntur.

6. Tumores Cystici *steatomata* nempe, *atheromata*, aut *melicerites* (d), qui plerumque cellularem, aut intimiorem substantiam ovarii pervertunt; eorum volumen variat pro circumstantiarum diversitate; contenta etiam materies *caseosa*, febracea, puriformis, plus minusve spissa, aut diversis coloribus referta fulco, cinereo, aut luteo conficitur: at quod mirum est intra hos tumores interdum capil-

(a) Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, Ann. 1711. Adæ Berolinensis Vol. VII. pag. 76.

(b) J. Rhodanus, An. prog. Lib. II. Cap. 15. Fridr. Ruyschius Observ. anatomic. 17, J. E. Bismachi, de Generatione pag. 187. Hans Sloote, Transact. Phil. An. 1692, n. 123. art. 1. Henricus Sanderus ibid. An. 1678. n. 140. art. 1. Jacobus Douglas, Medicus ibid. An. 1706, n. 101. art. 2. Johannes Belchier, ibid. An. 1734. n. 443. art. 1. Johannes Haldricus Peyer, Im-off. in Theibus de senis Bassile. An. 1719. (c) Observatio intra in Diario Medico Abbatis de la Roque mens Januarii 1681. Latine versa in Bibliotheca anatomica Tom. I. pag. 623. Alexius Littrus Mémoires de l'Académie des Sciences An. 1701.

(d) Fridricus Ruyschius, Advers. anatomie. Decad. I. pag. 6.

capillorum glomos reperiri (e) a vulgaribus capillis haud abfimilium, fed subtiliorum.

## §. II.

### Causæ.

**P**ostquam generales causas examinavimus plerorumque morborum, qui uterum respiciunt, supervacaneum videtur, fusius eas reiterare, sufficere itaque eas breviter indicare.

1. Ovaria aequæ ac uterus easdem causas inflammationis cognoscunt, imo ovariorum inflammatio uteri inflammationi necessario succedit; ambo enim ovaria inflammabuntur, dum integer uterus phlogosi laborabit; alterutrum si alterutra uteri pars corripitur.

Consecutiones hujus inflammationis illæ sunt, quæ uterum inflammatum consequuntur; si hæc inflammatio per resolutionem evanuerit, ea pariter desinet; si in abscessum, aut gangranam degeneraverit, idem pariter de ovariorum inflammatione futurum erit.

2. Syrrhi qui ovaria deturpant a lymphæ mora procedunt intra eorum spongiosam substantiam retentæ; si lymphæ omnem ovarii substantiam fœdaverit unicuique tumorem; si in diversis distinctis cellulis induruerit plures tumores segregatos efformabit.

Præter causas *Cap. V. Lib. II.* superius indicatas, quæ valent tum in utero cum in ovarii lympham sistere, & syrrhos generare, speciales nonnullas ovaria recognoscunt. Inter ea recensetur primum amoris voluptas, quæ tum ovaria tum ceteras propinquas partes in motum ciet convulsivum, qui lymphæ cursum interciperet, vel saltem retardare potest erit, præsertim si contraria pathemata mororis, & verecundiæ superaddantur; hæc de causa filiz magis, aut viduæ, quam mulieres, huic morbo sunt obnoxie.

Post ea, quæ superius *Cap. VIII.* dicta sunt circa canceri uteri generationem, supervacaneum erit hic animadvertere, & in ovarii syrrhum indurescere, perfici, & in cancerum converti posse, iisdem de causis quæ in ceteris partibus hanc metamorphosin producant.

3. Etenim dum lymphæ spongiosam substantiam ovarii invadit, syrrhum gignit; at si lymphatica vasa extrinsecus distributa infarciat hydatides producit, quæ a dilatatione valvularum eorum vasorum originem agnoscit, ut in *Tractatu Tumorum Lib. III. Cap. II.* explicavimus; ideoque causæ omnes, quæ lymphæ refluxum impediunt, modo debiliores sint hydatides tantum ovarii superficiales; plus minusve uberrimæ, aut expansæ producent in ratione majoris, vel minoris earum causarum actionis.

Haud impossibile est ambo ovaria hydatidibus undique obtegi, at id raro evenit; plerumque enim vel alterutrum, vel eorum pars aliqua hoc morbo solet laborare.

Non

(e) J. Bauhinus apud Tenph. B. net'm Sepulchr. Lib. III. Sect. 33. Observ. IV. n. 6. Et apud J. Schenckium, Lib. IV. Observ. 1-6. C. Bauhinus, anatom. Lib. I. Cap. 31. & apud Hercul. Saxoniæ de Plica C. 12. Guillelmus Fabricius Hildanus, Observat. Chirurg. Cent. V. Observ. 46. Gregorius Hostius, Observat. Medic. Lib. IV. Observ. 33. Daniel Gennertus, Lib. IV. par. I. Sect. 1. Cap. 12. Johannes Rhodius, Observat. Cent. III. Observ. 44. Acad. de Science. An. 1741. pag. 82. H. Cornelius Stalpart-vander Vliet O. serv. variorum Centur. post. Observat. 6. S. Stephanus Blancardus, anat. præd. Centur. II. Observat. 47. Augustinus Buddeus, Miscellan. Berlin Contr. II. pag. 16. Martinus Naboth. in Dissertat. de Sterilitate Cap. 2. Jacques Yonge, Traité Philosoph. An. 1707. n. 309. art. 6. Polycarpus Cortlieb Schacher in Commenc. literario Norimbergensi. An. 1736. pag. 103 & in Dissertat. de Ovari tumore pisolio, Lipsiæ 1731. quæ præstat Tom. IV. Collect. Milleriana.



Non defuerunt auctores, qui crediderunt hydatides constari ex ovulis, aut vesiculis inflatis, in cellulis superius descriptis fluctuantibus; at haud facile hoc explicare poterimus, cum ovula illa tunica ovarii undique circumvestiatur.

4. Si hydatidis valde ingrandescat sacculus praeferebat serositate lymphatica repletum, seu melius hydropem ovarii, quam plures observationes confirmant; interdum huiusmodi sacculus insulatus apparet, interdum pluribus aliis exiguioribus hydatidibus refertus; has differentias faciunt positus obstaculi quod lympham in unico, aut pluribus vasculis retardat, vel dilatabilitas diversa vasorum lymphaticorum.

5. Merito sane mirati sunt, qui foetum in ovario detecti sunt, & conceptionem ibi longe ab utero perfici posse observarunt, id tamen certissimum est; vix enim percipitur qua ratione sperma usque illuc pertingat, at cum pluribus (a) observationibus id fulciatur, statuendum erit a densitate obtegentis tunicae, rimae angustia, aut crebrius a convulsiva crispatione partium oriri, quae in iis circumstantiis verecundiae, displicentiae, aut libidinis ergo mulieris vexat, quare huiusmodi fenomenon in filiarum emortuarum dissectione plerumque apparuit.

6. Cystici tumores ovaria aequae ac hydatides infestare possunt, docuimus jam in nostro *Traclatu de tumoribus* ab iisdem causis ipsos derivare, quae hydatides faciunt, & Ruyschius (b) observavit eandem naturam praeferre.

Praeter vulgares cysticos tumores singularissimae species in ovarii tumorum efformantur putrescentiae embionis ergo ibi corrupti; ii steatomatosam indolem praefereunt, & purulentam magis materiem effundunt, quam in steatomate, aut atheromate, abscessusque habitum æmulantur.

In iis tumorum speciebus ut jam admonuimus pilorum glommi reperiuntur, quos usque adhuc anatomici placarissimi explicare nescierunt; suspicor enim non abs re esse glommos illos ex capillis constari emortui foetus; verum si (c) Ruyschius fidentum sit, reperierunt racemum dentium, qui certo embrioni tribuuntur, qui augeri continuavit ut (d) Blancus putat, qui pariter credit majorem dentes augmentum adeptos fuisse quindecim menses post mortum foetum in utero superstitem.

### §. III.

#### *Symptomata.*

**G**enerice adhuc recensita calamitates haud facile est symptomatum apparitione determinare.

I. Tamen ovarii inflammatio calorem, atque dolorem hypogastri comitem habet, quae phenomena tamen, & febris ipsa uteri inflammationi tribuuntur, quae plerumque laesa ovaria praecedunt.

Ovarii abscessus morbi initio valde exiguus est ut vis persentiri queat, modo vero amplior fiat, alterutram partem tendit, obtuso dolore afficit, febrilem commotionem inducit, ut in ceteris internis abscessibus.

Gangraena vero eodem tempore, serius tamen fortasse ac uterum, ovaria aggreditur, eademque simul phenomena inducit, quae superius *Cap. II.* indicavimus.

II. Syrrhus hujus partis primum latitat, at volumine aucto incessum nonnihil impedit, sensumque tensionis inducit, interdum etiam tactu distinguitur.

#### III. Non

(a) Ruysch, *Theatrum*, P. n. 21, & *Advers.* Decad. I.

(b) *Ibidem de Patu.*, Cap. IV, Observat. 25.

(c) *Advers.* anstom. Decad. III, pagg. 6, & 20, *Mém. Acad.* An. 1743, p. 88.

(d) *De Generatione* pag. 142-143.

III. Non ita evenit de hydatidibus aut hydrope ovarii inquisitione; sero enim hydatides cognoscuntur, & hydropem tunc adesse fatemur quando ipsa maximum volumen adeptæ fuerit, quod circumscriptum ad alterutram partem hypogastri apparebit.

IV. Conceptionis ergo quæ in ovarii fit mulieres nullum indicium animadunt, imo fetus perit antequam de eo certiores fieri possint.

V. Totidem dicendum est de tumore cystico qui emortuo aut soluto embryoni succedit, raro enim ita increfcit, ut dolorem sensibilem pariat qui suam existentiam prænnunciet.

#### §. IV.

##### *Diagnosis, & Prognosis.*

I. EX iis consequitur ovaria inflammatione laborare suspicari posse, quando calor, & dolor hypogastrium infestet, verum ipsa febris addatur; supurationem vero aut gangrenam instantem fateri licebit, inflammationis progressus investigando; verum haud facile est huiusmodi morbos cognoscere nisi cum maximum gradum adepti sint, aut volumen ipsum aliquod præbeat indicium.

II. Prognosis vero respectu omnes ovariorum ægitudines teterrimæ sunt; si morbi initio recognosci possent facile nonnullis mederetur, at vix eas suspicari incipimus, quando jam ad summum gradum pertingerunt, & pene incurabiles factæ sunt; idcirco in nostro casu sat erit morbi progressus retardare, & si fas erit sæviora scenomena compescere.

#### §. V.

##### *Curatio.*

I. IN ovariorum inflammatione, aut scenomenis, quæ eam consequuntur, remedia impendi debent superius *Lib. II. Cap. I. & seqq.* adversus uteri inflammationem proposita.

II. In ceteris vero morbis qui ovaria deturpant applicari debet emplastrum Diabotani, aut mucilaginum, vel emplastrum Cicute, postquam tentatæ fuerint embrocationes olei chamæmellorum, aut lumbricorum terrestrium.

III. Circa interna remedia brachium incidere, & primas vias leviter expiare pluries necessum erit idoneum regimen præscribendo prout, tempestas postulerit, verum decoctiones amaras cum Tartaro Martiale solubile exhiberi poterit, tum Mctis semichalybeatum, aut asinum lac, vel aquæ ferruginæ, & semibalsea tepentia; boli denique usuveniunt, decoctiones, & phisane diuretice ad hydropem abdominis cavendam, quam sæpe huiusmodi morbi inducunt.

IV. Tandem in confirmata ovarii hydrope, periculosa valde, cum acutius triangulari paracentesis institui poterit, ut contenta aqua evacuetur; at sequenti articulo cum de tubarum hydrope disserturi erimus, inquireri licebit, quot incommoda conjuncta habeat huiusmodi operatio, etiam si potissima videatur.

## ARTICULUS II.

*De morbis qui Tubas lidunt.*

## §. I.

*Describuntur tube earumque morbi.*

I. **T**UBÆ Fallopianz canales referunt ab intestinulis haud abssimiles, qui ab uteri fundo utrinque ad ovaria usque protenduntur, non jam per rectam lineam sed hic illuc a recto tramite deflectendo, ut interdum grandiores evolutiones faciant.

Earum pars extrema, quæ in utero inseritur, omnes membranas perfodit, et tubarum lumen cum utero per angustissimum tatum orificium communicet, hinc versus ovaria reflectendo hujusmodi cavitas paulatim dilatatur ad oppositum usque foramen, ubi post novam levem tamen constrictionem canaliculus ampliatur valde, ut papilionis speciem referat, cujus margines in plures lacinias divisi fimbrias plures ostendunt, a quibus corpus *fimbriatum* pars illa solet nuncupari.

Hujusmodi tubæ peritonæi expansione, quæ mesenterioles vices gerit, in naturali positu detinentur, at foramen ovarium respiciens modo libere fluctuat, modo inferius nonnihil portione sua aliformi ovario laxè adhæret.

In utraque tuba duæ tunice conspiciuntur albæ externa, quæ membranacea est, altera interna membranacea sanè, sed interius pulposa, vilosa, & viscida oblinita lymphâ, quæ aliquam secretionem ibi patrari ostendit; hæc postrema tunica multiplici ratione complicatur, ut rugas, aut cellulas gignat intubarum cavitatem observatas.

Intra illas tunicas oculis sæpe subjiciuntur fibræ musculares longitudinales, circulares &c., quæ motum peristalticum, aut vermicularem harum partium excitant, dum opus est fecundatum ovum in utero devehere, quod ab ovario alarum suarum auxilio receperunt; observatione id a tubis perfici statuerunt, verisimile enim est lacinias alarum totidem musculos esse exilissimos, qui inferiorem ovarii partem conceptionis tempore amplectantur, usque dum fecundatum ovulum tubam intret.

II. Tubæ iisdem plerumque ac ovaria morbis laborant.

1. Possunt enim inflammari, & in abscessum, aut gangrænam converti.

2. Syrrhosis fieri possunt, vel per integram longitudinem, vel ad alterum extremorum foramen.

3. Hydatidibus tum extrinsecus cum intrinsecus innumeris interdum scatent, quarum nonnullæ si grandiores fiant, hydropem hujus speciei inducere valebunt.

4. Quandoque a maxima serosæ lymphæ congestionè hydrope afficiuntur tubæ, ut plures (a) observationes confirmarunt.

5. Interdum fecundatum ovum ibi detineri potest scetusque augeri, ut tubæ

*Astruc de Morbis Mulierum.*

S

bas

(a) Nicolaus Tulpus, Obierv. Medicar. Lib. IV. Obs. v. 45. Acta Eruditorum Lipsiensis Ann. 1701. Meni. Februarius. Ephemeridum Germanicar. Decur. II. An. 3. Obierv. 97. Joh. Baptista Bianchi de generatione pag. 187. ubi agitur de hydrope tubarum, quæ libras 10. pendebat. Johannes Monnickx in Bibliotheca anatomica Tumi. I. pag. 624. Quæstio habetur de simili hydrope quæ 12. libras æquabat.

bas disrumpat, & matrem necet; hujusmodi gestationis species haud rarè sunt, enunciabimus (b) interea veriores, atque magis obvias.

6. Intra tubas efformari poterunt cystici tumores, ut in ceteris corporis partibus, tum abscessus qui maximam affinitatem habent cum ovo fecundato intra tubas aut ovaria suppurato.

7. Crebrius observatum (c) est fimbrias utriusque tubæ interdum ovariis ne-cti, ut ex impares evadant fecundum recipere ovum; quod in abdominis cavitate decidet.

8. Tandem tubarum ostium uterum respiciens, quandoque obturatur (d) ut vix setam aprinam capiat; idem sed crebre minus altero tubæ (e) orificio evenit, ex eo tamen nulla consequitur functionum læsio, modo unica ægrotet tuba, incurabilem vero sterilitatem inducit ambarum tubarum obstructio.

## §. II.

### Causæ.

Post ea quæ dicta sunt circa causas, atque morbos ovariorum, pauca de tubis reliqua sunt, tamen.

I. Tubarum inflammatio tum abscessus aut gangræna subsequutura ab iisdem causis inflammationis, abscessus, aut gangræne uteri vel ovariorum procedunt.

II. Syrrhum vero Hydatides, aut hydropem quibus tubæ corripì possunt satis in Tractatu Tumorum &c. explicavimus.

III. Si vero utrumque tubarum ostium obstruatur lymphæ in iis secreta intra earum cavitatem cunulabitur, & hydropem generabit, quæ pro intumescencia vix tubas recognoscere sinet; idem a sola inferioris orificii obstructione oriri potest, at in hoc casu stagnans lymphæ parietes dilatando, tandem & supremum obturabit orificium ut similis hydrops producat.

IV. Ovum fecundatum pluribus de causis in iis detineri potest modo serius quam par est ab ovario erumpit, aut pro magnitudine impar evadit, tubas intrare; modo tubæ pro inferioris ostii angustia, aut obstructione vel debili earum peristaltico motu ovi progressui officiant; modo a rugis, aut cellulis tubarum ovi iter impeditur; in omnibus iis casibus ovum augebitur magnopere, ut gestationem inducat matri plerumque lethalem.

V. In iis tubis iisdem de causis, ac in ceteris partibus tumores cystici gigni possunt, circa quod tractatum nostrum *Tumorum &c. Lib. V. Cap. II.* consultato, præterquamquod a suppurato ovo abscessus efformabitur a steatomate, aut atheromate non absimilis, ut in ovario accidere posse ostendimus.

VI. Verisimile est adhesionem tubarum cum ovario ab inflammatione oriri in præcedenti ovarii fecundatione nata, quæ eorum externam lympham, tum  
cam

(b) Johannes Riolanus refert An. 1650. in sua Anthropographia Lib. II. Cap. 35. plures Observationes gestationum tubarum, unam præsertim, quam animadvertenter Medici Aula Regiæ Annæ Austriacæ in ejusdem Ancella; et Batolinus Anstom. Lib. I. Cap. 17. hujus observationi parum fideliter habendum esse ostendit, nam Gul. Pajus admonuit Riolanum ipsum de hæc observatione parum fecisse, verum indulsisse precibus cuiusdam Medici Aula Regiæ, Petri sequenti; atamen hujus rei veritas satis observatoribus elucit, qui plures tubarum gestationes conspexerunt, ex magno eorum numero duos postissimum indicabimus, omni debito exerceat, quarum alteram D. Lihrus affert, alteram D. Du Vernai in *Mémoires des Sciences An. 1702.*, quibus addi potest observatio Pauli Boeierii Medico-Chirurgi in Transactio. Philosoph. indicata An. 1694. n. 207. art. 2.

(c) Regnerus de Graaf. *Libro de genitalibus Mulierum Cap. 1.* Raysehius. *Adversar. anatom. Dec. II. Du Vernai. Mémoires des Sciences An. 1702. pag. 302.*

(d) Raysehius. *Observat. anatomicar. 83. Adversar. anatomicar. Decad. I. pag. 7.*

(e) VVeibrecht. *In Comment. Academ. Petropolitana Tom. IV. inter Physicas Dissertationes art. XIV.*

eam tubæ fimbriarum exsiccaverat, ut hac de causa facile simul coalescant, simili ratione ac pulmones cum pleura coeunt, si alterutrum inflammetur.

VII. Tandem tubarum ostium ocluditur vel quando uterus syrrhosis sit, vel phlogosi corripitur in laborioso partu ubi eo tubæ junguntur; similes causæ oppositum orificium, raro tamen, occludunt.

## §. III.

*Diagnosis, & Prognosis.*

**D***agnosis.* Excepta tubarum inflammatione, quæ propriis signis indicatur, ceteri tubarum morbi vix initio dignosci possunt; verum signa illa, quæ in progressum illos prænunciare deberent ita incerta sunt, ut ex iis nihil inferre possit; quare in cadaverum sectionibus crebre reperiuntur ea, quæ neutiquam excogitata sunt.

*Prognosis.* Ignorantiam nostram circa existentiam plerorumque morborum tubarum, vexationem ægris tollit, infausæ prognos, & Medicis intimius morbum perscrutari.

Theoretice tantum: 1. Noscimus inflammationem plerumque salutariter resolveri, abscessum vero & gangrænam funestum finem præferre.

2. Syrrhum, hydatides, & hydropem tubarum segnius procedere, easque ægras, excepta hydropæ quæ pro summo incremento disrupta ascitum inducit, diu posse perferre.

3. Gestationem tubarum plerumque mortem asserre vel quod fœtus putrescens lethalem abscessum inducat, vel quod tubas disrumpat, & in abdominis cavitatem decidat, ut vel a supervenienti hæmorrhagia, vel fœtus suppuratione ægra intereat; non desunt tamen exempla earum, quæ sensim exsiccata fœtum ibi diu gestant citra gravem noxam; at hujusmodi observationes rarissimæ sunt.

4. Tumores cystici cujusque generis serius incrementum, atque diu ægras perferre citra gravem molestiam, iique in cadaverum dissectionibus sæpissime reperiuntur, etiam si viventibus ægris numquam suspicati sint.

5. AdhæSIONem fimbriarum cum ovariis & obstructionem utriusque vel alterutrius orificii tubarum generationem nocere, nullam tamen molestiam inferre, aut grave periculum minari.

## §. IV.

*Curatio.*

**S**Upervacaneum videtur ea repetere quæ de ovariis ægrotantibus dicta sunt, si sit erit animadvertere eadem remedia penitus hic convenire, etiam si parum efficacia experiantur.

Duplex articulus habetur qui speciales animadversiones postulat, *primus* respicit duplicem hydropem tubarum; tunc idoneum esse apparet antequam disrumpantur, & ascitem aquæ producant, trochaterisope ipsas evacuari; constat enim utiliter hac methodo usum fuisse medicum quemdam Danum (a) ut Thomas (b) Bartolinus refert, certum enim est hujusmodi operationem valde utilem experiri posse si sacculus, ubi latex ille continetur, sit peritoneo injectus, ubi punctio

S 2

insti-

(a) Johan. Henric. Brechfeld.

(b) 13 Adis Medicis Hafniens. pag. 194.

institui debet, quo in casu Medicus Danus paracentesim iniiit; at si contrafaculus minime peritoneo adhæreat punctio funesta evadet, & exitura aqua in abdominis cavitatem irrumperet, alteram hydropis speciem induceret; idcirco cum abint hujus necessariz adhesionis signa tutiora, de felici, aut funesto paracentesis eventu valde accipites erimus, etiamsi interdum eam tentare liceat.

*Secundus* respicit tubarum gestationem; modo enim illam adeste cognoscamus Cæsaream operationem convenire suadent, eam partem versus, quæ foetum gerit, eoque facilius, cum minus periculi adsit in tubæ sectione, quam uteri; hujusmodi praxis tot fulcitur rationibus, ut modo ægrotantium conditio non obstit, tutius institui possit, præsertim cum subsequens celeberrimi viri exemplum (c) idem confirmet.

## C A P U T XIII.

### *De Passione hysterica, seu uteri suffocatione.*

#### §. I.

##### *Descriptio.*

**M**ORBUS de quo nunc sermonem inimus *hysterismus* vocatur, *suffocatio*, *epylepsia uterina* &c., verum non unicus est sed plures complectitur species diversas, quare auctores pene omnes, quide eo pertractarunt, speciali capite hystericum morbum perscrutati sunt, at cum ex diversæ species potissimum ab una causa, aut œconomiz animalis simili vicio dependeat unamque postulent medellam, singulas igitur uno articulo explicabimus.

Hystericus morbus per vices revertit, quæ paroxysmi dicuntur, plus minusve crebri diutini, aut vehementes, quos committantur plura, aut pauciora sænomena, quibus in diversis morbis circumstantiis ægræ fiunt obnoxiz.

Hujusmodi regressus anomali sunt nullamque periodum servant, in morbi statu periclitari videntur ægræ, at eo transacto perfectam tranquillitatem & sanitatem recuperant.

Eos prænunciant plerumque oscitationes, pandiculationes, singultus ventris, borborygmi, repentinus faciei rubor, atque sensibilis calor, cui succedit pallor, atque frigus, in eadem ratione.

Ii paroxysmi in profundam segnem, atque crebram respirationem desinunt, verum statum expulsiō succedit, effluitque tunc humor serosus lymphaticus, & cruentus ex vaginæ claustro.

In vehementiori paroxismo omnes pene œconomiz animalis functiones plerumque pervertuntur.

Quare sopore ægræ corpiuntur, sui compotes interdum non persistunt, sensus amittunt, inordinate audiunt, vident, neque de auditis, aut visis rationem reddere valent, furiosæ fiunt, vaga paralisi brachiorum, crurum, manuum aut digitorum afficiuntur, artuum convulsionibus, oculorum etiam, capitis aut trunci vexantur, ut interdum anterius, aut posterius se flectant, aut directo positu convellantur, tandem involuntarias fundunt lacrimas, aut citra rationem rident.

Vita-

(c) Ab-*ham* Cyprianus Anatem, & Chirur. Possessor in Academ. Ferneckensis illud refert in sua dissertatione, quæ sic inscribitur, *Epistola illustrata exhibens series humani post 21. menses ex utero suba, matre salua exsuperi e, casu, ad Thomam Millington, Equitem auratum, Medicum regium ordinariū, & Collegii Medicorum Londinensium Præsidem.* Lugd. Batav. 1700. in 8.

Vitalium vero functionum respectu deliquiis, & lipothymiis tunc temporis laborant ægræ, inordinate cor, & pulsi contrahuntur, respiratio pariter variat; interdu vero tum respiratio, cum cordis & arteriarum pulsi de repente abeunt.

Tandem quoad naturales functiones attinet, huiusmodi paroxysmos plerumque comitantur singultus, cardiagia, nausea, vomitus, & imi ventris borborygmi præsertim.

Præterquamquod conqueruntur ægræ de eccessivo æstu, quo per omnem corporis ambitum cruciantur ut culcitas aut vestes omnes removeant, huic tamen fenomeno universalis horror plerumque succedit; conqueruntur pariter de renum, coccygis, coxarum aut lateris dolore, qui sic caput aggrediatur, circumscriptam præsertim partem, ipse *ovum hystericum*, aut *clavus hystericus* solet nuncupari; huiusmodi dolores pulsatiles sunt, aut tensiles, utrumque tamen simul plerumque; modo vero frontem, tempora, aut occiput, modo verticem capitis occupant.

Facile vero est ea symptomata quamvis innumera non omnia uno eodemque tempore eandem vexare ægotam, sed diverso tempore, aut in diversis subiectis omnia interdum evenire, ut huius morbi partem constituent.

Inter ea diversa symptomata, quatuor præcipua sunt, quæ in omni hysterice passionis aggressu conspici solent, etiamsi diverso gradu, ut pathognomonica appellari mereantur; certum enim est,

1. Constante morbum incipere ab aliqua obtusa impressione, aut latitante uteri subfultu, quem ægræ satis persentiunt.
2. Id consequi præcocationem quamdam aqua jugulari sibi suadent ægotantes.
3. Toracem quasi circulo ferreo versus costulas spurias circumcingi.
4. Tandem ad abdomen quod attinet ægras globulum fluctuantem persentire, quæ hic illuc per imum ventrem se transfert; modo major, aut exiguus modo durus, aut mollis apparet.

Tres distinguuntur hysterici status, *primus* quatuor indicata symptomata etiamsi leviora complectitur, at ratio, sensus, respiratio, & cordis pulsus persistunt, vel parum perturbantur; huiusmodi gradus magis obviu est.

*Secundus* status præter ea pathognomonica symptomata, quæ scviora sunt, tum rationem cum sensum egrè amittunt, ac omnes corporis partes convulsivis subsultibus convelluntur; respiratio tamen, & pulsi etiamsi debiles subsistunt, inæquales tamen valde plerumque sunt; hic est secundus morbi gradus, rarior tamen.

Tandem *tertius* morbi status adest quando partium motus penitus abeunt, respiratio ipsa, & pulsi pene evanescent, egræ immobiles sunt, frigescent, sensum, rationem amittunt, & respiratio, aut cordis contractio deficiunt, uno verbo perfecte cadaver æmulantur; huiusmodi terribissimu status interdum diu perdurat, quandoque ad tertium diem protrahitur, & ita inortem emulatur, ut interdum egræ tumulate fuissent ante verum discessum, huiusmodi postremu status ceteris perniciosus est, at secunda fortuna rarissimo invadit.

## §. II.

### Causæ.

UT rite causas hysterice passionis fanciamus, necessum erit subsequencia principia offendere quibus fulciuntur.

1. Hystericus morbus est convulsionis species, id evidens est motuum convulsivorum respectu trunci, aut membrorum; patescunt pariter colli prælocatio & toracis coarctatio; idem indicat globuli sensus per abdomen fluctuantis, tan-

Astruc de Morbis Mulierum.

S 3

dem

dem huiusmodi prædicatum ceteris scænomenis convenit, infra sùsius explicandis.

II. Huiusmodi convulsiones, aut convulsivi motus, vel musculos, & musculares fibras totius corporis infestant; vel membranas, aut tendineas fibrillas. In primo casu convulsiones sunt, aut motus convulsivi proprie dicti; in secundo casu huiusmodi motus nisi crìspationis, aut erethismi nomen merentur.

III. Omnes hi motus vel ad musculares fibras, vel ad tendineas pertineant, quæ tamen ab uberrimo nimis, & repentino spirituum animalium influxu dependent.

IV. Huiusmodi ubertosis, aut celerrimis nimis influxus; vel ab *diopathica* causa oriri solet, quæ specialiter in cerebro sedem habet, quæque spiritus animales agitando hic illic inordinate impellit; vel a *sympathica* causa originem ducit, quæ etiamsi cerebrum non respiciat tamen *per consensum* ipsum concitando sympathico nempe mecanismo similem spirituum influxum gignit. Igitur alterutram earum causarum amplecti debemus, cum nulla alterius generis superfit ad morbi explicationem.

V. Certum enim est in hysterico morbo minime suspicari posse; diopathicas causas, quæ ea symptomata producere valeant; etenim dum quiescere videntur egre, de repente convulsivi motus superveniunt nulla præcedente causa, quæ cerebrum agitare potius fuissent, iidem motus statim quiescunt, & in naturali statu cerebri relinquunt, quare minime suspicari licebit tunc ullam adfuisse; diopathicam cerebri perturbationem.

VI. Consequitur enim causam earum commotionum, quæ in hysterice mulieribus observantur, sympathicam esse, extra cerebrum videlicet locatam in aliqua corporis parte, ubi sensationes, aut impressiones excitantur, quæ sympathicæ lege valeant illos inordinatos præternaturales motus suscitare; hac de causa si quis digitum comburat, mecanice manum removel, quia ustio involuntariam brachii, & radii contractionem excitat; simili ratione nicotianæ pugillus naribus appositus sternutationem excitat, quia pulvis ille subito musculos contrahendo toracis repentinam respirationem producit, quæ sternutatio appellatur.

VII. Nihil magis obvium est in humano corpore, quam huiusmodi sympathici subsultus tem infirmitatis cum sanitatis statu. (a) Hippocrates ipse idem cognovit cum animadvertat sub iis verbis; *Confluxio una, conspiratio una, consentientia omnia*; agitur enim de causæ inquisitione, at per longum foret episodium, cum ea ad alterum Tractatum pertineat: sat erit enim scænomena vera esse, totidemque morbi leges sancire, quæ ad optimam Diagnosim, Prognosim, aut medellam instituendam conducant.

VIII. Reliquum enim est sympathicam partem determinare, quæ semel excitata hystericum morbum inducat, & quasi causa primaria considerari possit, seu ut clarius me explicem *focus* appellari; eam enim uterum esse patet.

1. Ab utero igitur morbus incipit, nam egre matricem tunc dilatari, aperi, produci, atque hic illic per abdomen transferri perferunt, atque uno verbo certo quoddam peristaltico motu agitari.

2. Hysterismus plerumque prope menstrua, aut iis desinentibus aggredi solet, tum in mensium, lochiorum, aut albi fluoris suppressione, quod uterum complectitur.

3. Cum hysterice passionis paroxysmi nunquam desistant, nisi e vagina latex erumpat plus minusve uberrimus, atque acris, evidens enim est huiusmodi effluviolum nisi cum utero relationem habere.

4. Verum matrimonii usus qui cum remedium tutissimum sit adversus hystericeam

(a) Lib. De alimento.



stericam affectionem eamque frequenter sanet, ideo cum utero rationem & ipse habere constat.

5. Tandem observationibus sancitum est hanc sympathicam partem uterum esse, nam cadavera dissecando mulierum quæ violentioribus hysterice passionis insultibus fuerunt obnoxie, ovarii, tubarum, aut uteri vitium aliquod constanter reperiunt.

IX. Semel statuta parte, quæ focus morbi appellari poterit, reliquum est naturam impressionum sancire, quæ sympathiæ legibus omnes ceteras corporis partes in paroxysmo in motum ciet; ab effectibus iudicando, illæ impressiones validissimæ erunt, at ex una parte experientia contrarium suadet, nam etsi ægræ aliquam commotionem in utero perferant, ut supra admonuimus, minime tamen de vividiori dolore conqueruntur, quo neque in violentiori morbi statu nedum cruciantur; ex altera vero parte crebre evenit uterum maximo dolore, inflammatione, ulcere, aut cancro vexari citra ullum hysterice passionis indicium; statuendum enim erit huiusmodi impressionem, quæ hysterismum producit leviolem esse, speciemque titillationis, aut crispationis in utero excitare, aut propinquis partibus, quibus adhæret.

X. Non immerito autumabimus levem huiusmodi impressionem imparlem esse tot scenomena suscitare quæ in hysterice mulieribus observantur, contrarium tamen experientia evincit, nam unica aquæ guttula in tracheam irruens, violentissimam tussim movet; vinum emeticum, quod nullam impressionem linguæ aut oculorum albuginæ affert, stomachum ita commovet, ut eam contractionem gignat, quæ vomitum excitare potis est; tandem lucis radii, qui minime retinam læcescunt, pituitariam membranam convellunt, atque sternutationem movent.

XI. Frequenter huiusmodi etsi levissima commotio vividiores effectus præstat quam fortiores impressiones; hac de causa vomitus qui ab aceto non suscitatur ab oleo, aut aqua tepenti inducitur; pariter leviora circa axillas titilamenta grandiores contorsiones movent, quam vividissimus dolor; denique debilis nicotianæ stimulus sternutationem facit, quam vehementior narium irritatio impar erat concitare.

Iis explicitis sciendum erit, subsequentes impressiones potissimas esse hysterice morbum concitare, cum symptomatis omnibus concomitantibus, eoque animosius cum ea confirmet constans experientia; inter causas enim hysterice passionis recenseri debent.

1. Pulsu arteriarum uteri vividiores, præsertim cum vasa sanguine turgant ut in approximatione, cessatione, vel suppressione mensium, aut lochiorum.

2. Tensio atque intumescencia vasorum lacteorum uteri, quando lochia, aut lactei albi fluores de repente supprimuntur, dum uberius fluebant.

3. Irritamentum acris humoris, qui in uterum irruens in ejusdem cavitate colligitur, dum albi floris serofi, aut acris effluviū persistit, vel ulcere uterus sceleratur.

4. Intumescencia, quæ ovaria, aut tubas lædit in diversis morbis, quibus sunt huiusmodi partes obnoxie in (b) abortu, nempe hydatidibus, hydrope, steatomate, syrtho, aut abscessu.

(a) Veteres Medici animadvertunt tumores ovarii hysterice passionem inducere, at decepti sunt non ne quo huiusmodi partes tunc insignite erant, & usu, quem iis tribuebant; autumabant enim huiusmodi tumores collectiones esse spermatici humoris corrupti, quod complectitur in eorum classe causarum huiusmodi morbi. Vide circa hoc Jean-Nicolas Bionigerus *Observat. Cent. II. Observat. 90.* Iacobus Dickebreuck *Anatom. lib. I. Cap. 13.* Audit. Vesalius *de human. corp. fabrica lib. I. Cap. 13.* Lazarus Riverius *Cent. I. Observat. 60.* Qithon Heurnius. Hillior. 16. in fine Operum Fernelii editi; Utrecht. in 4. an. 1636.

5. Tandem titilatio, quam excitat spermaticus, uberrimus vel acris latex in mulieribus vividiori, atque luxurioso temperamento donatis, quæ invite abstinentur.

XIII. Nihilò secius fateri debemus hujusmodi explicationem maximam difficultatem contendere, videlicet omnes expositas causas, quibus hystericus morbus tribuitur constantes esse, idcirco impares, involuntarios, & repentinos, atque variabiles motus excitare, qui in hujus morbi aggressu conspici solent.

XIV. At modo paullisper cunctemur, duplicem subsequenter animadversionem perscrutando omnis evanuerit difficultas.

*Primo*, indicatas causas nuper sancitas in utero posse, atque debere positum immutare, ut diversa puncta matricis peragrandò sympathicas affinitates cum ceteris partibus valeant mutare; idcirco unica causa dum ventriculi fundum infestat, vomitum excitat, deliquium vero inducit, modo superiorem ventriculi orificium afficiat.

*Secundo*, animadvertendum est eas causas numquam unam vim præferre, ut minima gradus mutatio potius sit sympathicos consensus immutare; hac de causa certa quædam narium irritatio sternutationem movet, quam validior impar erat suscitare.

Infra apparebit ubi symptomata explicabimus quæ caput respiciunt, diversas alias adeste causas, quæ hanc varietatem motuum hystericorum inducere poterunt.

XV. Causæ, quæ adhuc enunciavimus, non æque omnes mulieres una vi laudunt; experientia enim ostendit magis periclitari

1. Mulieres emaciatas, graciles, temperamento melancholico, aut atrabiliari donatas, quia in illis nervi uteri, atque totius corporis tensi magis vibratiles sunt, ac magis dispositi minima de causa ad vividiorum commotionem suscipiendam.

2. Hinc illas, quæ graciliori temperamento, aut cachetica constitutione præditæ sunt, nam in iis humores vitiantur, uterum parum sui elaterii retinet, ut irrumpentes latices copiosius congerantur, & acriores fiant, tum ipsæ continent albo fluore laborent.

3. Mulieres deinde, quæ vigilis defatigantur, aut alimentorum saporum assumptione usu, Cossæ, aut liquorum spirituosorum calefaciuntur, in quibus uterus valde calet, & quasi phlogosi continuo laborat, quod nervorum maximam tensionem, & sensibilitatem facit.

4. Tandem illas, quæ luxuria flagrant, eamque venustulorum consuetudine aut lecturis excitant, vel continua amati obiecti cogitatione vexantur, quod secretionem, & virtutem spermatis augeat.

XVI. Itaque reliquum erit tantum causas recognoscere, quæ hystericos paroxysmos suscitant, vel ipsos sustinent, quam ob rem sat erit animadvertere duplicem hystericæ morbi speciem; altera a congerie dependet vitiorum humorum, qui in utero, aut vasis spermaticis coarcevantur; altera a turgentia vasorum sanguineorum originem ducit per uterum, aut ovaria reptantium.

1. In priori enim morbi specie hystericus insultus numquam superveniunt nisi deturpati humores certa quadam copia congerantur, vel certum activitatis gradum adepti sint; neque abeunt hystericismi symptomata, nisi hujusmodi humores per uterum expellantur, quod sapissime evenit.

2. Ad alteram morbi speciem quod attinet paroxysmi numquam aggrediuntur, nisi quando multiplici de causa vasorum sanguineorum infartus certum quendam gradum adeptus sit; numquam vero ipsi desinunt, nisi violentiores uteri contractiones detentum sanguinem respuerint, quo vasa turgabant.

3. Consequitur ex iis quod in priori morbi specie paroxysmi cessatio celebris

rius tatiſque quam in altera ſpecie fieri debeat, ut & experientia oſtendit; in primo caſu enim hyſterici inſultus de repente abeunt, & ægræ naturalem ſtatum ſanitatſ perfecte recuperant; in altero vero caſu ſerius paroxiſmi deſiſtunt, ut ægræ diu periclitari videantur.

4. In utraque vero hyſtericæ paſſionis ſpecie paroxiſmorum ſinem prænunciant oſcillationes plus minusve crebræ, aut grandiores pro diverſa morbi diuturnitate, aut vehementia, quæ perſiſtente paroxiſmo reſpiratio læſa fuerit, & pulmo ſanguine inſartus; idcirco modo revertat ſenſus oſcillationes neceſſario excitabuntur, quæ veſiculas pulmonales explicando ſanguinem inſarcentem expriment, quod ſanguinis quantitati, & diuturnitati, aut paroxiſmi vehementiæ reſpondere debet; hac de cauſa in aggreſſu febrium intermittentium ægræ pandiculationibus ſunt obnoxie, quibus exprimitur ſanguis, qui ſpiſſitudinis ergo in pluribus partibus cumulabatur, atque ita invite concitantur ægræ ab obtuſis impreſſionibus, quas ſanguis eas partes inſarciendo inducerat.

## §. III.

*Symptomata.*

Veteres medici in unum conveniebant ſcœnomena omnia, quæ in hyſtericis mulieribus obſervabantur, a ſpermatico humore derivare in utero corrupto, qui in vaporibus ſublimatus diverſas corporis partes invadebat, & ſuideleteriz indolis ergo ſymptomata illa in hoc morbo magis obvia ſuſcitabat: hodie tamen huiusmodi ſententiæ ſutilitate certiores facti ſunt, eamque prorsus contemnunt. Huic opinioni ſubſtituimus ſympathicam uteri cum ceteris corporis partibus aſſinitatem, quam neminem lætet.

Neque aliam ſuperſeſſe viam ea ſcœnomena explicandi putamus, omnemque hac ratione difficultatem tolli poſſe cenſemus, ut infra pro viribus demonſtrare tentabimus.

Mirabuntur forteſſe nonnulli de multiplici aſſinitate, quam utero tribuimus, at animadvertendum eſt hanc partem ceteris ſenſibiliorem eſſe ut omnes medici defendunt, eique nullam nos ſpeciatiim relationem tribuere, quæ effectibus, atque obſervationibus non fulciatur.

Cum numeroſiſſima ſint ſcœnomena in hyſterica paſſione obvia, quæ hic explicationem poſtulant, ideoque ipſa in quinque diſtinctos Articulos explicabimus, ſunt enim

I. Quatuor ſymptomata hyſtericæ paſſionis pathognomonica. II. Ea quæ abdomen reſpiciunt. III. Quæ pulmonem aſſiciunt. IV. Quæ caput aggrediuntur. V. Tandem quæ corpus univerſaliter infeſtant.

I. *Quatuor ſymptomata hyſtericæ paſſionis pathognomonica.*

1. Primæ impreſſiones, quæ in utero ſunt, aut propinquis partibus debiles ſunt, neque alium ſympathicum reflexum animalium ſpirituum indacunt, quam in miſcularibus uteri ipſius fibrillis quarum alterutræ ſeſe contrahendo varias commotiones excitant; modo enim uterus producit; aut abbreviatur, modo deſtroſum, aut ſiniſtroſum ſe transfert, prout fibræ longitudinales, circulares, aut illæ alterius lateris convelluntur; interdum coarctatur, atque occluditur uterus, tunc ejuſdem fibræ una conſtringuntur omnes.

2. Dum impreſſiones illæ in utero augentur ſpirituum tunc reſluxus muſculos Laringis, Pharingis, Oſſis Hyodis, atque linguæ quandoque adoritur, ut jugulari videantur ægræ, quæ interdum balbutiunt.

## 3. Re-

3. Refluxus ille sympathicus quandoque musculares fibras diaphragmatis invadit, quæ sese coarctando fortiter introrsum trahunt costulas spurias, ut difficilem respirationem inducant, & quasi chalybeo circulo agræ vinci credant.

4. Eodemque tempore simili de causa intestinorum fibræ musculares constringuntur; contractio enim longitudinalium fibrarum intestina abbreviat, & in glomum quasi congerunt circulares; vero intestina coarctando status retinet, qui inordinate volumen intestinorum augent, atque globuli illius sensum inducunt per abdomen fluctuantis, quem veteres medici pro utero ipso habuerunt, quasi adhesionem matricis hujusmodi commotiones sinere possent.

## II. Symptomata quæ inum ventrem respiciunt.

1. Cum plerumque in hysterici morbi statu menstruum cessatio, aut suppressio adsint, nil mirum enim est symptomata tunc apparere, quæ eos morbos solent comitari, qualia sunt imminutus, atque depravatus gustus, qui sub nomine *Piceæ*, aut *Malachæ* cognoscitur, incompleta digestio, eructatio, tormina, aut borborygmi &c. at hic frustraneum videtur ea fusius explicare, sat erit pervolvere quæ *Lib. I. Cap. IV. & VIII.* enunciata sunt cum de mensuum suppressione, chlorosi, aut pallore differimus.

2. Ventris contritiones, quæ hystericas mulieres perturbant ab incompleta digestionem oriri possunt, at plerumque in paroxismo arecti aut sphysteris contritione scimus derivare, refluxus sympathici ergo.

3. Eilem causæ urinx suppressio tribuitur in paroxysmi statu superveniens; eam enim convulsiva crispacio inducit sphysteris vesicæ ab illo refluxu sympathico excitata.

4. Circa paroxysmi finem lymphaticum eslivium stillat mucosum, album, fuscum ac cruentum interdum. Convulsiva contractio uteri hujusmodi humorem a vasis lacteis, aut glandulosis mucosis exprimit, quibus interna uteri facies scattet, aut latex ille a lacunis erumpit ibi innumeris. Album enim apparet si ipsam vasa vermicularia effundant; fuscus vero si glandulæ mucosæ, aut lacunæ illum suppeditent; cruentus vero apparet si contractiones uteri irregulares vasorum Capillarium nonnulla discerpant, aut ab extremitatibus appendicum venosarum aliquas sanguinis guttas exprimant.

5. In Paroxysmorum statu pauca quam excernunt urina clara est, & aquam emulatur; nam renium contextus compactus, & crispatus transitum impedit lotii per secretorios ductus, excretionem tantum tenuioris, & serosæ magis sanguinis partis permittendo.

6. At in paroxysmorum fine agræ copiosiores urinas effundunt spissiores, atque turbidas. Uberiores enim apparent, tum quia renum contextus minime crispatus earum uberrimum eslivium finit, tum quia facilius ex vesica erumpunt laxati jam sphysteris ergo; spissiores vero & turbidæ interdum apparent, tum quia in renibus crassiores cruoris moleculæ uberius separantur, cum humoris mucosi ergo qui tunc uterus suppeditat, & urinis permiscetur.

7. Nauseæ, vomitus, deliquia quæ in hysterica passione frequenter superveniunt interdum a collectione proveniunt sordium, quæ deleterix digestionis ergo in ventriculo colliguntur, quæque fundum, aut orificium succutiendo ea phenomena inducunt; crebrius tamen ea producit sympathicus refluxus, qui varias commotiones in iis partibus excitat.

## III. Sym-

III. *Symptomata quæ pulmonem ledunt.*

1. Præfocatio consequens necessarium videtur convulsivæ crispationis laringis, quæ aeris ingressum impedit, tum contractionis convulsivæ diaphragmatis; quæ dilatationi toracis obicit: hujusmodi dux causæ admodum variabiles sunt, interdum enim suffocatio continens est, interdum per intervalla recurrit, modo respiratio etiamsi læsa aliquo tamen modo persistit, interdum cum stertore, sibilo aut ululatu perficitur.

2. Cordis palpitatio ab anomala muscularium fibrarum contractione Principis musculi dependet, hujusmodi inæqualitas ab inordinato refluxu procedit sympathico uteri, eadē causā varietates omnes apparent in motu cordis, atque arteriarum obviæ, & hysterico morbo propriæ; modo enim pulsus debiles sunt, modo validiores, modo segnes, modo præcipites, quando rari, quando frequentes at plerumque duri, contracti reperiuntur, crispationis tunicarum arteriarum ergo, quam sympathicus ille refluxus induxerat.

3. Pulsus interdum intermittentes sunt quando cordis motus & ipse intermitat, quod evenit quotiescumque refluxus per intervalla recurrit fibræque cordis lacescat.

4. Frequenter in seviorebus hysterice passionis paroxysmis neque cordis motum neque respirationem animadvertimus, non quia penitus abeant ut Galenus autumabat, quod mors ipsa esset, sed quia debilitate valde hujusmodi motus exequuntur maxime tonicæ contractionis ergo, fibrarum cordis, musculorum laringis, & diaphragmatis, ut vis conspici queat; nihilo tamen minus etiamsi imbecilliter tamen ii motus sunt, quod sufficit ut etiamsi segnis aliqua tamen persistat sanguinis circulatio per pulmones, atque reliquum corpus ut vita super sit.

IV. *Symptomata quæ caput afficiunt.*

Explicatio scenomenorum, quæ ad hunc articulum pertinent, novas sympathicas affinitates uteri supponit; dura mater sympathicis constrictionibus succutitur, hujusmodi contractio, quæ ab utero procedit non una est per omnem meningis ambitum, sed ea diversimode variare solet; ipsa meningis itaque sese constringendo substantiam cerebri premit, idcirco ex una parte exprimit animales spiritus in propinquos nervos, ex altera fibrillas distendit. Spiritus illi dum nervos intrant convulsiones, aut motus convulsivos excitant partium earum per quas pereptant; cerebri vero fibræ ita distensæ impares evadunt impressiones recipere sensuum externorum, quare rationem ægrè & sensum amittunt, eademque de causâ fibrillæ illæ tonum mutant, ut plures quæ consonæ erant dissonæ evadant, & aliæ quæ dissonæ apparebant consonæ fiant, quod judicium plerumque rerum pervertit, & varias delirii species inducit.

Optimum consilium foret hic singillatim unamquamque hypothesim perscrutari, at hujusmodi perquisitio diutina nimis experiretur, & trans institutum nostrum abiret; sat erit enim fateri eas hypotheses possibiles esse omnes & rationi consonas; autumo enim earum hypothesium existentiam vel saltem necessitatem ostendere posse in futuro opere, quod publicis juris facere brevi sancivi, sub titulo *Animalicæ* quæ est mechanica functionum animalium quoad corpus pertinent; in præsentiarum sufficiet quod eos quasi totidem *postulata* mihi concedant, quæ symptomatum explanationi caput respicientium magnopere favent.

1. Etenim ægrè identidem rationem sensumque amittunt, quod raro vel crebrius plus minusve persistit, æ pro diversis circumstantiis magis vel minus æ-

gras vexat; interdum morbi aggressu etiam si sensu careant, audiunt tamen, vident at loquela orbatæ signis se exprimunt; tandem si morbus increseat, penitus sensus, atque ratio demuntur, atque patientes profundi lethargi specie laborant.

In iis in quibus cerebrum nullo labefactatur morbo, ea sœnomena nisi sympathico spirituum refluxu, quem uterus gignit, derivare possunt. Dura mater ea de causa contracta cerebrum comprimendo fibrasque distendendo hæc impares reddit impressionibus spirituum in cerebro latitantium, vel commotionibus eorum, qui ab externis sensibus procedunt.

Interdum omnis cerebri superficies a menynge æque comprimitur, & tunc sensuum amissio totalis fit; interdum compressio partialis est, neque origines parium ophthalmicorum aut acusticorum lædit, ut visus, atque auditus aliqua ratione supersint, etiam si in paroxismo nequeant id ostendere.

Huiusmodi accidentia crebrius vel serius revertunt, plus minusve diutina, aut sæva apparent pro repetitis duræ matris contractionibus, plus minusve diuturnis, aut intensis.

Tandem sœnomena illa in absolutam & totalem rationis cum sensus abolitionem degenerant, modo Menyngis contractio maxima fiat & universalis usque dum de repente dura matre resoluta statim ratio sensusque revertunt.

2. In hoc statu ægræ frequenter delirio corripiuntur plus minusve universali aut infenso. Id evenit quando cerebri fibræ distensæ tonum crebre immutant, quoad affinitates quas invicem habent, quod inter eas consonantias novæque dissonantias anomalas gignit, idcirco iudicium pervertitur, & delirium supervenit plus minusve intensum aut universale pro diversa majori, vel minori fibrarum succussione, aut spirituum animalium in cerebro agitatione.

3. Tunc sæpe accidit ægras tonica convulsione corpi, quæ *Tetanos* appellatur, corpus in hoc morbo rigidum fit, dentes constringuntur, oculi immobiles persistunt, membra indurefcunt, quod ab influxu procedit spirituum animalium, qui sympathici refluxus ergo aut tonicæ menyngis contractionis in eisdem musculis continenter irumpunt.

4. Quandoque ægræ vividioribus convulsivis motibus agitantur, modo enim truncum antèr flexunt, modo posterius, quare eæ convulsiones modo *Emprostotonos*, modo *Opisthotonos* appellantur; caput agitant artusque succutiunt ægræ, ululatus emittunt, quæ motus convulsivi musculorum respirationis excitant evidens enim est huiusmodi commotiones nedum variare posse nisi spirituum animalium influxus, qui ipsas producant, & ipsi variant: itaque hæc influxus diversitas nisi triplici de causa oriri potest, vel a gradu aut positu impressionum quæ in utero fiunt; vel a menyngis contractione, quæ in diversis ejusdem partibus fit; tandem a pulsu vario arteriarum, qui in diversis cerebri partibus varios effectus producit.

5. In hysterica passionis ingressu interdum ægræ sine causa manifesta lacrymas copiose effundunt, contra vero invite interdum rident; tandem, quandoque in eodem paroxismo risus lacrymis, & lacrymæ risui succedunt, de quo valde mirantur, quibus primum id observare contingit.

Certum enim est huiusmodi commotiones neque liberae esse, neque præceptas; igitur consequitur convulsivas esse, & ea quæ adhuc ostendimus satis declarant a sympathicis affinitatibus pendere, quæ intra uterum, & organa habentur; modo enim membranz, quæ lacrymales glandulas cooperiunt, aut tendinea, filamenta, quæ illas vinciunt crispantur, & lacrymas uberrimas expriment, quibus oculi madent, dum eadem de causa ceteræ partes convelluntur; modo musculi zigomatici ceterique ad labiorum motum destinati convulsione abrepti risum inconcinne movent; tandem motus ii risus nempe lacrymæ invicem succedunt.

cedunt prout in utero impressiones variant relate ad intensitatem, aut sedem earum.

6. Tandem hystericae mulieres sapissime acutiori dolori sunt obnoxiae, qui aliquam capitis externam partem laedit, frontem nempe, aut tempora, vel occiput; prout dolor plus minusve extenditur morbus *ovum hysericum*, aut *clavus hysericus* appellatur.

Procul dubio nuper descripta symptomata a convulsiva crispatione pericranii affectae partis originemducunt, ea vero constrictio sympathicae uteri affinitati tribuitur, tum dolor incipit, atque definit prout morbi aggressus perdurat, isque paroxysmi saevitati respondet.

#### V. Symptomata quae totum corpus respiciunt.

Explicatio posterioris symptomatis in articulo precedenti nuper indicati ostendit sympathicam uteri affinitatem fibras tendineas etiam invadere, & convulsivas crispationes inducere, quae pro diversa partium natura diversos effectus gignunt; symptomata, quae externum corporis habitum afficiunt infra enunciantia hanc veritatem magis patefacient.

1. In hysterico morbo urentem quemdam aestum aegreperferunt, qui vultus, atque caput de repente inflammat, & rubicundum facit; conqueruntur ipsae de excessivo calore, qui sudorem promovet, & culcitas removere cogit; paullo post pallor, frigus atque horror succedunt, quae pluries intra horae spatium invicem eveniunt.

Facile est cognoscere priorem morbi gradum a convulsiva constrictione tunicarum procedere, quae per extrinsecam capitis faciem repunt, ut redux sanguis retardatus ruborem, calorem, atque sudorem inducat; alter gradus crispationis tunicas arteriarum afficit per easdem partes reptantium, quod influxum impedit sanguinis, & pallorem, frigus, atque rigorem producit; tandem haec alternatim evenient in eo duplici morbi statu pro variationibus affinitatum sympathicarum, quae animales spiritus modo in venarum tunicas, modo arteriarum inconcinne impellunt.

2. Crebre accidit in hystericae passionis aggressu pulsum abire in alterutro brachio, quod frigidum, & stupidum sit, cum manus pallore, unguum praesertim, ut aegre artum emortuum credant; paullo post brachium ad naturalem statum revertit, eademque phaenomena alterum artum investit; observavi interdum hac molestia unus vel alter simul digitorum tantum affici, quod aegre paralyfim vocant; at huiusmodi spuria paralyptis incompleta, & momentanea est cum motus atque sensus persistant etiam si imbecilles.

Evidens enim est ea phaenomena omnia a convulsiva crispatione brachialis arteriae derivare, quae lumen coarctando copiam sanguinis imminuit, qui brachium irroraret; ex eo imminuitur, atque intercipitur pulsus, artus obstupescit, frigescit, manus vero atque ungues pallescunt; huiusmodi crispatio in affecta parte tamen cito definit, alterumque brachium infestat eadem phaenomena producendo, quae pluries alternatim succedunt pro diversis impressionibus, quae in utero fiunt, quae sunt variables, occasionales causae huiusmodi contractionis.

## §. IV.

*Diagnos.*

I. **H**ystericus morbus prioris & secundi gradus facile cognoscitur; plerumque antequam medicum poscant aegre plures paroxysmi reverterunt, de cetero facile morbus cognosci poterit naturam exacerbationum perpendendo, qui invicem æmulantur, & tutius quatuor pathognomonica symptomata observando, qualia sunt, uteri commotio, gutturi suffocatio, toracis coarctatio, & per abdomen fluctuans globulus, quæ, etiam si diverso gradu, in unoquoque tamen morbi aggreſſu se ostendunt.

Nihilo tamen minus animadvertendum est citius quam fieri potest veram morbi ideam nos sancire debere, nam plerumque aegre vapores hystericos appellare consueverunt, omnes molestias aut succussiones quas persentiunt, omnesque prave digestionis effectus, aut languores vel consumptiones quibus tunc temporis ipse sunt obnoxie; præsertim enim sedulo perſcrutari debemus ne vapores hystericos mulieribus proprios, quos pathognomonica signa comitantur cum hypochondriaco vapore confundamus, qui tum mulieribus cum hominibus communis est, neque pathognomonica illa symptomata concomitantia habet.

Semel cognita ægritudinis indole, causam affecti uteri detegere oportebit, quæ morbum produxerat, quod tum ad rectam prognosim, cum curationem instituendam potissimum conducit, si paroxysmi prompte, & perfecte desistant, id evincitur humoris cujusdam effluvio glanduloso, aut mensium eruptione; si per intervalla morbus recurrat, nullo superveniente nocuo hystérico vapore, conjecturari licebit a solo spermatico humore diu in utero retento, aut acriori humore, vel mensium suppressione morbum derivare; contra vero vitium persistens suspicari licebit ovaria deturpans, tubas, aut uteri corpus, quando paroxysmi sæpè desinant, vel citra effluviū, aut mensium eruptionem, desistant persistente vaporosa commotione pene continenti intra duos paroxysmos.

Morbi magnitudinis respectu eam pateſcit frequentia, aut perduratione paroxysmorum, vel illam ostendunt numerus, & violentia symptomatum concomitantium, de quibus facile est oculis certiores fieri.

II. Maxima difficultas quæ in hoc morbo diagnosim respicit ad tertium gradum attinet, quando aegre rationem, sensum atque motum, verum quod deterius est respirationem, atque pulsum amittunt, ut assidentes magnopere perturbentur, neve satis distinguere valeant vapores hystericos a syncope, apoplexia, epylepsia, aut ipso discessu.

In hoc casu duo animadverti debent, quæ haud leve lumen præbere possunt; primum hujusmodi sævissimus morbi status supponit plures præcedentes paroxysmos qui morbi indolem satis declaraverint; verum si hujusmodi morbi aggreſſus hystericus sint, ab initio quatuor symptomata pathognomonica apparebunt; complexus enim ambarum harum observationum tutum satis iudicium asserre præstaverint.

Nihilo tamen secius sanum erit consilium perſcrutari, quæ in nostro casu diagnosim declarare magis poterunt.

1. Vapores hystericus a syncope distinguere facile erit quia in hystérico morbo pulſus citius, & facilius quam in syncope abeunt, nulla enim datur syncops modo mortem ipsam non inferat, in qua cordis pulsationes perfecte desinant, ut in hystérico vapore accidere solet.

Verum pulſuum cessatio diuturnior est in hystérico vapore quam in syncope; hæc



hæc enim trans horam plerumque non perdurat, at vapores hysterici tertie speciei per integros dies persistunt, ut haud facile sit ipsos cum syncope confundere.

In syncope nulla abdominis fluctuatio sentitur; in hysterico tamen vapore modo maximus non sit plerumque circa uteri regionem succutitio quadam apparet, quæ melius cognoscitur vaginam digitis examinando.

2. Distingui enim facilius possunt hysterici vapores tertie speciei ab apoplexiæ aggressu ex eo quod apoplexiam numquam præcedant symptomata hysterice passionis pathognomonica, quæ eam tuto prænunciant.

Verum in apoplecticis pulsus atque respiratio nedum abeunt; in hysterismo tamen pene desistunt, modo tertii gradus experitur.

In apoplexia nulla convulsiva commotio tum imi ventris cum uteri supervenit; in hysterico tamen vapore illa conspicitur, modo paroxysmus extreme sequissimus appareat.

3. Vapores hysterici tertie speciei ab epylepsia simili ratione distinguitur, nam vapores propria signa indicant, quæ in epylepsia desunt.

Etenim respiratio, & pulsus in hysterismo cessant, & in epylepsia persistunt.

In hysterismo etiam si ad summum gradum pertingat, convulsivæ succussiones imi ventris, uteri præsertim, conspiciuntur, quæ numquam in epyleptici observantur.

Tandem in epylepsia ægræ spumam ex ore fundunt, quod raro vel nunquam quam etiam in sæviori hysterismi gradu apparet; nam respiratio pene abolitur & aer expressus a saliva foveri nequit, ut spuma oriatur, quod in epylepticis evenit, quia respiratio stertorosa fit, atque vehemens.

Vos tamen admonere censeo medicorum nonnullos huiusmodi morbum *Epylepsiam uterinam*, aut *hystericam* vocasse, quando præsertim ægra convulsionibus abreptæ rationem amittunt; idcirco huic denominationi etiam si improprie erit indulgendum, modo animadvertamus sympathicam epylepsiam tantum esse, a vero morbo Erculeo procul diversam.

4. Interdum proximorum vehementia intenditur ita ut functiones penitus sepe aboliantur; in hoc casu non ab Apoplexia, aut Epylepsia morbus distingui debet, sed a Morte ipsa quam æmulantur; nam si quibusdam observationibus fidendum sit satis docti medici decepti sunt viventes mulieres tumulando, quas obitas crediderunt; tunc inquirendum est an nulla respiratio superfit, nam quantumvis exigua apparuerit, ægram adhuc inter vivos esse fateberis.

Hæc de causa ovi opponuntur levissimi gossipii floculi qui indicabunt ne ullum reliquum sit respirationis signum; speculum quandoque applicant, quem per quam minima exspiratio adumbrabit; vel supra toracem cyathum ponunt aqua repletum, quæ costularum minimo de motu effunditur.

Verum iis signis nondum fident, membra perquirunt, ne flexibilia sint, oculos aperiunt inspicuntque si specie quadam araneorum telæ cornea obducatur, quæ mortem prænunciaret; pedes denique ignito ferro comburunt, ut doloris intensitas succutiat morientem; tandem cantharidum emplastrum coxis, aut cruribus applicant, quod si vesiculas elevet adhuc ægram vitam gerere indicat, & contra si nulla appareat vesica; at etiam si signa omnia mortem una prænuncient nedum sollicitos esse debemus ut cadavertumuletur, cunctando usque dum appareant putrefactionis indicia, secus enim facile erit nos poenitere præcipientes fuisse nimis tumulum precipiendo viventis creaturæ.

## §. V.

*Prognosis.*

**H**ystericæ passionis Prognosis duo præsertim complectitur an ne sanabilis morbus sit, verum ne periculum maximum conjunctum habeat.

1. Primum postulat nonnullas distinctiones antequam de eo nihil certi faciamus.

1. Etenim facile sanatur hystericus morbus modo a sola suppressione aut cessatione mensium, vel lochiorum procedat, vel ab acriori retento spermatico humore.

2. Ei difficilius medetur si a continenti albo fluore dependeat, qui uteri internam superficiem lædat, cujus effluvium difficulter sistitur, & anomaliis quamplurimis est obnoxius.

3. Minime convalescit morbus dummodo pro causa recognoscat tumorem aut vitium alterutrius ovarii, vel tubarum, vel uteri ulcus.

4. Numquam pene sanitatem recuperant senescentes mulieres, cacheticæ male affectæ, in quibus uteri labes sanguinis aut lymphæ vitio confirmatur.

5. Generice hujusmodi morbus inter pertinaciores ægitudines, & curatu difficiliores recenseri debet, qui minima de causa redintegratur dum proximam valetudinem speramus.

II. Ad secundum quod attinet distinguendum est periculum paroxysmorum a periculo totius ægitudinis complexim sumptæ.

1. Nihil est timendum in peculiari morbi aggressu modo respiratio, & cordis pulsus etiamsi imbecilliter persistant, periculum enim respicit earum functionum læsionem, nam etiamsi plerumque naturalem statum recuperent observationes tamen docuerunt ægras interdum succubisse, præsertim cum respiratio & cordis motus penitus interceptantur, atque syncopes lethalis fiat.

2. Aegitudinis respectu in se sumptæ etiamsi pertinacissima experietur, raro tamen maximum periculum conjunctum habet, præsertim si a suppressione aut cessatione catameniorum, aut lochiorum dependeat, vel a collecto spermatico latice.

Attamen periculosa maxime evadit quando ab albo fluore habituali procedat, qui irriteret, laniet, aut rodât uteri internam faciem, ut morbus crebre in ulcus simplex vel carcinomatofum uteri degeneret; periculosa pariter experietur modo pro causa tumorem, abscessum ovariorum, aut tubarum recognoscat, in hoc casu plerumque abscessum aut hydropem abdominis inducit, & in lentam febrem marasimum, aut consumptionem definit.

## §. VI.

*Curatio.*

**I**nduplici casu medici erit hystericum morbum pertractare, vel in paroxismo quando insultum violentiam moderare, & persistentiam imminuere tantum fas erit, vel extra paroxysmum quando regressus præoccupare, seu melius causam morbi oppugnare convenierit quantum fieri poterit.

Cum ii status proculdiversi sint tum propositi objecti respectu, cum methodi medendi, ideoque in duplici distincto articulo eos extricare oportebit, quibus tertium superaddam, qui specifica adversus hunc morbum remedia ostendet.

Me-

## Medendi ratio intra paroxysmum.

Ut indicationes impleamus in paroxismo proponendas tria remediorum genera impendi debent.

1. Ea videlicet remedia, quæ diversas partes laxare, atque extendere valent convulsionis ergo contractas.

2. Quæ sanguinis circulum segnem aut interceptum promovent in diversis partibus crispatis.

3. Quæ vividius succutiunt organa externa, rapidumque cerebrum versus spirituum refluxum excitant qui sympathico refluxui obstitit ab utero procedenti, vaporum hystericorum causa.

Quod nos maxime implicat in iis rebus peragendis sarrago potius est propositum remediorum quam inopia; generice enim, quæ infra proponemus præcipua sunt ad morbi impetum compescendum, atque plures indicationes satisfaciendas, quæ diversa morbi natura postulat.

I. Si hysterice passionis aggressio levior appareat, & ratio persistat, ægræ poterunt pro libitu magis idoneum positum seligere; at si minime sui compotes videantur, necessum erit ægras lectulo, aut bisellio ita locare, ut caput altius porrigatur, verum vestium solvere, vincula oportebit, cingula omnia removendo quæ thoracem constringere valent, monilia etiam discedendo ne collum vulnere infaturum.

II. Interdum optimum erit coxas per longum fricare vel, leves cucurbitulas in diuturniori paroxismo apponere, vincula tamen membrorum sunt proscribenda quæ olim medici commendabant decepti ab humore deleteriæ indolis, quem sistere autumabant ne caput aggrediretur.

III. Ægræ suscitabuntur prope nares fortes materies comburendo sale volatilii imbutas, quæ valeant validius pituitariam membranam lacerare, hujusmodi sunt Taniz Violacæ; Plumæ Perdicis, Soleæ detritæ, Succinum flavum, Gagas; vel naribus apponuntur folia rutæ, aut tanacetii; vel quod ceteris præcellit globus admoveatur ex æqualibus partibus confectus stercoris Diaboli Castorei aut Sagapeni.

IV. Sternutatio errhinis promovebitur, huic satisfacit nicotaniæ fumus naribus intromissus, aut ejusdem plantæ pulvis, floribus ephemerii remixtus, vel quod validius agit pulvis compositus ex sinapi, piretro, aut castoreo, interdum nares intus fricantur plumis oleo Ambari imbutis.

V. Deinde ut commoveantur efficacius ægræ proprio nomine elata voce advocantur vel succutiuntur, aut ipsi digiti contorquentur, capilli abraduntur, aut pilii interdum pudendorum.

VI. Clysteria diversi generis tandem uluveniunt primo purgantia ex decoctione confecta foliorum matricariæ, aut artemisiæ, in quibus solvantur tres vel quatuor drachmæ *Hiere-picre* Galeni, adita etiam uncia, vel uncia una & semis vini emetici saturatoris.

Postquam hujusmodi clysterii ope primas vias expiaverimus hysterica clisma-  
ta uluvenient ex decoctione

Foliorum Artemisiæ  
Matricariæ  
Pulegii  
Rutæ

} ad manipulum

*Astruch de Morbis Mulierum.*

T

Semi-

Seminum Chervi  
Cymini

Baccarum Lauri  
Fructuum Aristolochiae

seliguntur pro libitu ex iis duo, vel tria additis uncis duabus olei Rutæ, vel Galbani, aut Assæ-foetidæ drachma, aut drachma una, & semis.

Interdum simpliciora clysteria conveniunt ex semis sextario confecta vini rubri, & duabus, vel tribus uncis olei Rutæ, vel simplici Oxiracato cum tertio aquæ diluto; at animadvertendum est crebre difficillimum esse in mulieribus hysteris ullam clismatum speciem adhibere, nam contracta intestina illa respuunt.

VII. Applicatur plerumque umbilico emplastrum ex Galbano paratum, vel Galbano, & Assæ-foetida, aut Gummis, Caranna, & Tacamacha, oleo Succini, aut Tinctura Castorei subactis.

Mulierum pleræque consuecunt in paroxysmi tractatione centrum umbilici oblinire tribus, vel quatuor granis Moschi, aut Camphoræ, paucio oleo amigdalorum dulcium solutæ, vel cum oleo Succini, aut Gagatis superapponendo emplastrum aliquod ex indicatis.

In Occitania, & vicinis Provinciis Plebæ mulierculæ solent interiorem superficiem figulinæ patere alliofricare, quam in hoc morbo umbilico applicant, cui fortiter adhæret, modo allium calefiat.

Fortassis subtiliores hujus remedii moleculæ percutis hyarus sanguinem intrando ipsum valde commovebunt; autumotamen optimos effectus ab odore præsertim procedere qui nares afficit; verum quomodocumque res se habeat cum huic remedio fidant magnopere ægræ, neque ipsum nocuum experiatur, idcirco minime contemnendum videtur.

VIII. Iis adhibitis efficaciores experiuntur boli aut potiones hysteriæ, quæ patrantur sequenti methodo ex remediorum farragine seligendo magis idonea; ceteris tamen præcellunt.

Aquæ adversus hystericos vapores magis commendatæ, sunt illæ,

Melissæ simplicis, vel compositiæ  
Cardi  
Matricariæ  
Artemisiæ  
Peoniæ  
Nucum  
Cerasarum nigrarum  
Florum Tilliæ  
Aurantiorum

Earum singulæ ad duas, vel tres uncias adhibentur.  
Pulveres etiam sequentes adduntur quales sunt.

De Gutteta  
Radiciæ Valerianæ sylvestris  
Peoniæ masculi  
Florum Tilliæ

Castorei  
Assæ fœtidæ &c.

Dosis a septem, vel octo granis, ad quindecim, aut viginti extat pro diverso pulverum numero.

In aquis interdum diluuntur, sequentia electuaria.

Theriaca  
Confectio hyacinthina  
Confectio alkermes.

a drachma semis ad drachmam.

Tincturæ etiam usuveniunt, quales sunt

Tinctura Myrrhæ  
Castorei

a guttis decem ad viginti, aut vigintiquinque.

Tinctura annodyna &c. a guttis viginti ad triginta.

At ut earum dosim tutiori methodo fanciamus theriacæ quantitati ratio habenda est.

Tandem syrupi anthysterici præscribuntur

Artemisiæ  
Matricariæ  
Peoniarum ad  $\frac{3}{4}$  I., aut  $\frac{3}{4}$  I. & S. dosim

Ex iis diversis pharmacis potiones anthystericæ subiunguntur plus minusve saturatæ, quæ cocleatim duplici quoque horæ quadrante exhibentur, at coclearia grandiora primum, verum exiguiora propinquantur.

IX. Boli, aut opiata ex iisdem simplicibus, aquis distillatis exceptis, componuntur; efficaciores evadunt efficaciora seligendo pharmaca, vel largiori dosi ea propinando prout paroxysmi violentia poscet; boli de horæ dimidio reiterantur, modo tamen grandiori dosi primum indulgeamus.

Etiamsi huiusmodi boli, ex similibus substantiis consentunt ac anthystericæ potiones, rarius tamen præscribuntur tum quia haud facile est illos ægris exhibere coarctati gutturi ergo, cum etiam, quia necessum esset ipsos a ventriculo solvi posse secus remedii actio retardatur; quare in aliqua aquarum anthystericarum solvantur, & potionum more coclearum propinquantur.

X. Inter diversos bolos anthystericos duo præsertim commendant; *primus* coagmentatur ex duplici scrupulo sulphuris communis, & drachma nucis myristicæ cum syrupo Artemisiæ subactis; *secundus*, qui validior evadit ex Castoreo, & Assa-fœtida conficitur, ad drachmæ semis dosim, cui additur granum & semis, aut duplex granum Laudani; bolorum alteruter in tres partes dividitur, duplici quoque quadrante aut singula hora sejunctim exhibendus prout morbus urgeat.

Pro efficacissima commendant *misturam*, aut potionem simplicem superaffundendo tribus, vel quatuor uncis aquæ Artemisiæ, aut Matricariæ tres vel quatuor guttas olei Succini cum annatina parte olei Gagatis unico vel du-

plici hauſtu remedium exhibendo, quod efficacior evadet addendo viginti, aut viginti quinque guttas tincturæ annodynæ.

XI. Si vapores hyſterici vehementiores ſint, & remediis obſiſtant neceſſum erit brachium, aut pedem incidere, pedem tamen ſalubrius, reiterando venæ ſectiões etiamſi pulſi debiles, & exigui appareant, ut mos eſt in iis circumſtantiis, circulationis retardatæ ergo; vomitum etiam promovere fas erit tres, aut quatuor grana propinando Tartari ſtibiaci ſolubilis in duabus, vel tribus unciiis Aquæ diſtillatæ cardii benedicti, ut ventriculus ſuccutiatur, modo pulmonis conditiones id ſinant; de cetero etiam in hoc caſu Tartarum exhibetur majori copia aquæ ſolum, aſſatim ſolutionem hauriendo, ut de aquis mineralibus fieri ſolet.

XII. Communiter receptum eſt in vaginam intromittere Moſcum, aut Zibetum, qui lymphaticum eſſuvium promoveant, uterumque abſtergant, at Religio prohibet pollutiones ita excitare; nihilo tamen minus aſſidentes mulieres, invitæ medicis, hanc methodum pluries impendunt, quantumvis turpis eſſe poſſit.

*Ratio medendi extra paroxiſmum.*

Quando paroxiſmus diſceſſerit noſtramerit tantum reſreſſus præoccupare, quæ de cauſa neceſſum erit antecedentem cauſam detegere, ut eam neceſſariis remediis validius pugnemus.

I. Si morbus ab intermiſſione, aut ſuppreſſione menſum, lochiorum, aut albi ſuoris procedat, hæmenagoga præſcribuntur, ceteraque remedia pro iis morbis ſuperius deſcripta.

II. Si ſola albi ſuoris acrimonia morbum inducat diluentia, temperantia, atque dulcificantia locum habent ſuperius in albo ſuore propoſita.

III. Si acrimonia, & copia ſeminis in cauſa ſint vulgari, & obvio tutiori- que remedio, matrimonio videlicet, ei medetur, ſecus vero antiphrodiſiaca in furore uterino commendata uſuveniunt.

IV. Tandem ſi tumores, & obſtructiones uteri ovariorum, aut tubarum, vel partium proximarum hyſtericſmum moveant, aperientibus remediis illas reſolvuntur, aut progreſſus pluries indicatis remediis ſiſtuntur.

Generice idonea methodus vapores hyſtericoſ eradictive ſanandi eo collineat, ut præſcribantur.

1. Aperientia martialia mitiora qualia ſunt

Tartarum Martiale ſolubile	} a gr. x. ad xxv.
Sal Martis Riverii	
Crocus Martis aperitivus	
Ethiops Martialis	
Tinctura Martis a 3 II. ad 3. IV.	

2. Aperientia Mercurialia dulcia, quæ purgant debilitate, vel nihil cathartica ſunt ut

Ethiops Mineralis cum ſulphure, per deſſagationem aut triturationem paratus

Ethiops Mineralis per triturationem conſectus, & remixtus ſaccaro

Aſſa ſœtida  
Caſtoreo  
Myrrha &c.

ſingu-

singulorum a granis xv. ad xxy.

3. Resinz anthysterica quales sunt

Castoreum  
Myrrha  
Gummi Ammoniacum  
Galbanum

quæ a granis viii. ad xii. sumuntur, vel in bolos aut opiata rediguntur, ipsas propositis aperientibus remiscendo

4. Diluentia, & humectantia, quæ sanguinem emolliunt, atque refrigerant, ab æstu quem anthystericorum usus nimius excitaverat, qualia sunt.

Balnea tepentia  
Semi-balnea  
Apozemata, seu decocta refrigerantia  
Aquæ Minerales ferrugineæ, & acidulæ  
Lactis serum simplex, vel chalybeatum  
Lac Asellæ

5. Purgantia leviora sæpe reiterata, inter amarotica selectura talia sunt.

Rhabarbarum  
Infusio aut Syrupus florum perficorum  
Syrupus Cichorii compositus, qui amarior evadat sumitates infundendo.

Abfynthii  
Centaureæ  
Aristolochiæ.

6. Narcotica etiam exhibentur, modo suspicemur aliquam in utero impressionem adesse, aut nervorum labem, quæ hystericos vapores minuit; pro libita impendi possunt

Laudanum in substantia ad gr. j.  
Tinctura Annodina ad gutt. xx.  
Pillule Cynoglossi ad gr. iv.  
Pillule Starkeri a gr. iv. ad viij.  
Theriaca communis ad ʒ. ss.  
Theriaca celestis a gr. viij. ad x.

7. Tandem optimum regimen præcipere necessum erit tum quantitatibus cum qualitatibus alimentorum respectu, quod haud facile erit obtineri a mulieribus admodum inconstantibus, tamen id necessarium videtur.

Interdum evenit gravidas mulieres hysterice vaporibus, imo, fevioribus corripi; tunc enim coacti erimus proposita remedia impendere tum in paroxysmo cum extra paroxysmum proposita; cavendum tamen est ne fortasse ledamus effi-

*Afruch de Morbis Mulierum,*

T 3

cacio-

verbum (a) *Abracadabra* commendasse, ita pluries conscriptum, ut cuique lineæ demendo litteram eorum referret, qui collo apensus morbum profligare censebat.

Pari ratione judicare poterimus de amuletis, seu substantiis quibusdam quas partibus affectis applicitas ipsarum morbis mederi superstitiose favebantur.

Galenus testatur radicem (b) *Peoniae*, infantum collo suspensam epilepsiae insulsum compescere; Aetius suadet (c) *jaspidem* apprehendere ad scrobiculum usque descendentem, asseritque se ipsum eo pacto itomachi morbo convaluisse; *Tralianus* magis credulus pene certissimum remedium proponit pro febre tertiana subjuganda, olivarium folium ante solis ortum collectus, cui inscriptum sit verbum (d) *CA ROI*, & collo agrotantium appensum; at innumera exempla asserere possem hujusmodi, quæ perlegi poterunt apud (Augier Frier) medicum *Tolosanum Lib. II. Cap. 11. De methodo medendi.*

Eo tempore Romæ, & Italiae (e) *Plinio* teste tres invexerunt morbi species novissimæ, quæ valde perteruerunt, verum brevi evanuerunt.

Prior *lepra* fuit quam exportavit *Pompei* exercitus e Syria redux ubi cum *Egypto* Regno propinquo communis est, & *Endermia*, at morbus cito delituit, & hic quidem morbus, *Plinius* ait, in Italia celeriter exstinctus est.

Altera *Lichenis* species erat serpentis & epidemicæ, quæ mentum præsertim occupabat, & oculis, aut amplexibus facile communicabatur, veloci transitu oculi ex quo *Mentagra* appellata fuit. *Plinius* enarrat ipsam ab Asia Romæ transfuisse Equitem Romanum, quam ipsum nomine indicat.

Postremus morbus *Ambrae* erat, quem *Plinius* *Narbonensis* Provincia *Endermiam* fuisse tradit, ille Romæ transductum suo tempore adhuc vivebat.

*Plinius* tandem de colico dolore ibidem verba facit nocuo morbo quo primum *Tiberius* Imperator correptus fuit; tunc Romani valde mirati sunt, cum *Cæsar* annuntiaret novo nomine se colo laborare, magna enim Civitatis ambage cum edicto ejus excusantis valetudinem legeretur nomen inco-

gnitum,

(a) Inscribas cartæ quod dicitur *Abracadabra*,  
Sæpius, & subter repetas, sed detrahe summam,  
Et magis, atque magis desint elementa figuris  
Singula, quæ semper rapies, & cetera figas,  
Donec in angustum redigatur littera eorum.  
Mâ lino menis collum redimire memento

A B R A C A D A B R A  
A B R A C A D A B R  
A B R A C A D A B  
A B R A C A D A  
A B R A C A D  
A B R A C A  
A B R A C  
A B R A  
A B R  
A B  
A  
A

(b) De simplicium medicam. farunt. in voce *Glycyfida*. (c) *Lib. II. Cap. 11.*  
(d) *Lib. XII. Cap. 7.* (e) *Hist. natural. lib. XXVI. sect. 4.*



*gignit*, quare admirationem non ab ignorantia morbi insurrexisse credendum est, sed a novitate potius appellationis qua Imperator eum designavit.

Ant.  
C. N.  
Anno  
412.

**HYPOCRATES** veterum Medicorum antiquissimus cujus opera ad nos usque perventa sint, qua de causa quasi medicinae Patrem posteriores Medici omnes ipsam respexerunt; quem neminem latet, ut supervacaneum sit, hic cunctari in vitæ suæ historia, quæ ad paucas & incertas notiones reducit.

Sufficit animadvertere communiter receptum esse ipsum vixisse Anno Mundi 3538., Romæ vero 318. ante Christum Natum 432.; virum gignit Insula Coos in mare Ægeæ; verum praxim exercuit Thessalia præsertim, & apud Thraces.

Longiorem vitam duxit nam qui eam subducunt, ad annum usque 86. pertingisse dicunt, sed alii annos 190. perdurasse autumant, quod propriæ scientiæ, atque optimo vitæ regimini valde tribuendum videtur.

Inter opera quæ ei tribuuntur multa suspecta sunt; stili enim diversitas atque systematis principia ab Hyppocraticis non parum dissita suspicionem augent, eamque magis confirmat Galeni (a) opinio qui asserit Adriano imperante, duos Medicos Alexandrinos Artemidorum nempe Capito, & Dioscoridem eas elucubrationes collexisse quingentesimo anno ab Hyppocratis discessu; difficile enim videtur, quod post tot annorum spatium hujusmodi Codicem recto scrutinio perficere possent absque quo stilum atque ordinem mutarent.

Erotienus qui sub Imperio Neronis vivebat genuina Hyppocratis opera determinare satagit, ex quibus respuit Librum de *Natura Muliebri*, & alterum de *Virginibus*; amplexus est tamen illos de *Morbis Muliebribus*, & *Sterilibus*; at ejusdem pace, Hyppocratis editores conveniunt incertum esse finem primi Libri de *Morbis Muliebribus*, quod ambo suspectos reddit.

Me latet qui primus de hoc libro suspicatus sit, Mercurialis qui sedulus Hyppocratis opera inquisivit eorum tres classes constituit; Libros de *Natura Muliebri*, de *Morbis Muliebribus*, & de *Sterilibus* in tertia classe reponit, inter illa opera videlicet quæ minime ad Hyppocratem pertinere credit, sed ad alterutrum ejusdem discipulorum. Johannis Henricus Schultius Medicus (b) Professor Altorfi circa hoc Mercurialem prosequutus est idemque novis rationibus confirmat.

Erotieni enim sententiæ adhærebimus Hyppocrati Libros tribuendo de quibus questio est; tamen prætereundum non est multum in iis ambiguitates reperiri, præsertim cum deuteri aberratione locutus sit, ubi erroneas sententias tradit, etiam si ab Hyppocratis doctrina in suis Operibus alio suffultæ videantur; putat enim uterum positum sæpe mutare, & non solum stomachum versus, jecur, aut cor transferri, sed caput etiam aggredi, eaque de causa passionis hysterice phenomena omnia producere; mirum sane est, Hyppocratem hujusmodi motus utero tribuisse, quorum facilitatem satis patefcit, at magis admirandum est hanc erroneam sententiam plures Medicos, qui illum prosecuti sunt amplexos fuisse.

Ant.  
C. N.  
Anno  
96.

**ASCLEPIADES** Bithynus celebris Medicus Romæ ætate Pompei summa cum laude Medicinam exercuit anno ab Urbe condita 658. & ante Christum Natum 96. Cicero (c) ipsum Medicum, & amicum appellabat.

Ejus-

(a) Comment. I. in Librum Hyppocratis de natura humana. (b) In Historia Medicorum, in 4<sup>to</sup> Lipsiæ 1728. pag. 213. 218. & 244. (c) Lib. I. De Oratore, pag. 283.

Ejusdem labores numquam ad nos pervenerunt, at apud Aetium (a) de quo infra locuturi erimus remedia nonnulla reperiuntur ad ulcera uteri cicatrificanda idonea, quæ Asclepiadi cuidam tribuuntur, qui (b) Galeni etiam testimonio nostras esse videtur.

AURELIUS, aut AULUS CORNELIUS CELSUS Medicus Romanus, A.C.  
N.  
Ann.  
15. qui vixit sub Tiberii Imperio, illustris evasit, Tractatus Medicinæ ergo quem loculenter latine scripsit ut ceteris in linguæ puritate præcellere videretur; quæstio est si Celsus Medicus fuisset neve Medicinam professus sit vel vir quidam esset ingenio, & doctrina præditus, qui sponte de Medicina scripsisset, ut de Bello, & Agricultura scribere fategit; at id difficile est definire quod ad nos parum facit, sufficit enim animadvertere Tractatum composuisse, seu melius a Græcis Medicis, & Hippocrate præsertim materias excerptisse quas sine ordine digessit, & quasi *miscellanea*, aut specimina medicinæ considerari possunt.

Hujusmodi opus in VIII. libros distribuitur; in eorum IV. libello Caput reperitur XX. nempe, quod de hysterica passione agit, at inconcinne illam describit; ostenderunt enim recentiores Scriptores (c) manuscripta colligendo Celsi hoc Caput incompletum esse, & lacunam dari, quæ nobis demit finem Hujus Capituli; tum, alia tria subsequencia quæ agunt de *Vulva exulcerata*, de *Vesica*, & de *Calculus in Vesica*.

In VII. eorum Librorum duo alia Capita extant in quibus nonnulla de mulieribus agit; primum XXVIII. nempe de Filiabus imperforatis Græce *Αἰσχυρæ* pertractat, alterum XXIX. de extractione dissertit foetus mortui; nihil præbet Celsus circa mulierum morbos, quod alio non reperiatur & præstantior; idcirco ut Medicus quidam admonet non ad Medicinam discendam, sed potius linguæ puritatem adipiscendam ipsum pervolvere necessum erit, (d) *Illius*, ait ille, *Cote stylum subigenus*, & *pluris latinitatem ejus quam medicinam faciemus*.

CLAUDIUS GALENUS Pergamenus inter Medicos Græcos post Hippocratem celebratissimus. Ab ætate quam ipse habuisse narrat dum advocatus fuit ab Aurelio, & Lucio Verro dum Aquiliæ detinebatur, deducitur Anno circiter decimo Quinto Regni Adriani ortum habuisse, idcirco a Christo nato (e) vixisse 131. Plures Provincias Imperii Romani peragravit præsertim vero Egyptii, & Alexandria degit, ubi celebriores erant (f) Medicinæ Scholæ; vixit viventibus Antonino, Aurelio, Lucio Verro, Commodo, & Severo, qui illum magni existimant, & pluries eo usi sunt.

Suidas asserit Galenum 70. anno vixisse, quare cum natus esset decimo quinto Anno Adriani, tumulatus esset nono Anno Imperii Severi, qui Annus circiter incidit in 201. Æræ Christianæ; hujusmodi calculus magis rationi consonus videtur illius, quem Auctores nonnulli voluerunt diuturniorem vitam Galeno tribuendo; Pergami inter Patrios Lares mortuus est ubi paullo antea, qua de causa ignoramus, restitutus erat.

Plures ipse libros composuit, qui non omnes ad nos pervenerunt, ipse testa-

(a) Lib. XVI. Cap. 93.

(b) Lib. II. de Antidosis, & passim, ubi de compositione medicamentorum.

(c) Morgagni, *Epist. II & III. in Celsum*.

(d) Johannes Rhodius.

(e) Vide *Chronologum Galeni Elegium a Philippo Labbeo*.

(f) Ammianus Marcellinus, *Liv. XXII. In. la. fo.*

testatur plures combustos fuisse (a) in incendio Templi Pacis ubi dum Romæ degebat ipsos reponeret; plures tamen superiunt, qui satis Galeni indolem superius indicatam declarant.

Certum enim est Medicina non solum sed pluribus aliis scientiis edoctum fuisse, at ejusdem styli respektu, longus, prolixus, Asiaticus experiebatur, ut lectores magnopere tederet; verum si de animi qualitatibus verba facere liceret, vanus erat, gloriosus, ab aliis laudes non expectabat, ceteros Medicos contemnebat, pluriesque vituperabat.

Nihilo tamen minus præter eos defectus quos neque negare, neque excusare audeo, Galenus magni suo tempore existimabatur, multo magis tamen post ipsius mortem, quando suum systema ceteris palmam præripuit; nam primum multas contradictiones passus est, ut ipse assert dum narrat Quintum tunc temporis celeberrimum Medicum (b) irrasisse suum systema, defendendo (c) *Quod de calido, frigido, sicco, & humido ajunt, utique Palneatorum esse nomina.*

Haud cognovi qua de causa Galenum somnia magni fecisse, neque ejus credulitatem excusare possem; (d) hortatur enim somnia sedulo animadvertere, atque asserit (e) quod, duorum somniorum causa, ægrotantis pleuritide correpti indicis arteriam dissecuisse quam patulam reliquit usque dum sanguis sponte fluere desinere; nam ait ipse *somnium ita præceperat*, qua methodo eger perfecte convaleuit. Tandem assert Dei (f) Pergamentum ministrum eodem morbo affectum sanitatem recuperasse venam manus externam incidendo prout somnium admonuerat, *aggressus*, ait *Et ipse illud insomnii monita.*

Maxime in dubium revocamus inter innumera opera quæ ipse scripsit, intendum mentionem fecisse de mulierum morbis, nos tamen institutum præteritis paucas circa hoc notiones hic illuc excerptendo, sat erit igitur enuntiare nullum de hac re scriptum reliquisse, præter illud, quod a Galeno derivare omnes editores contendunt, sub titulo de *Gynæceis* inter ejusdem opera quandoque relatum, auctoris nomine sane indignum quare Braslavova in IX. Editione dell' *Junia*, & Renatus Chartier conveniunt quod *sejuna præjux* & angusta sit tractatio.

A. C. SORANUS. duo habentur Sorani Medici Ephesii alter Trajani, & Adriani tempore vixit, eique tribuitur vita Hyppocratis, quæ ad nos usque  
N. pervenita est; alter junior erat, atque Suidas asserit, ipsum quatuor li-  
A. 170. bros composuisse de *Mulierum Morbis*, eidemque tribuunt libellum de *utero*, & muliebri pudendo Parisiis Græce impressum Ann. 1554. Typis Adriani Turnæbe, & latine recussum Ann. 1556. apud Gulielmum Morel.

Hujusmodi Tractatus fragmentum esse videtur majoris operis; uteri structuram exhibet, quam cum imperfecte veteres cognoscerent opus prorsus inutile evadit.

A. C. ARETEUS Cappadocus inter veteres Medicos recensetur, ejusdem sup-  
N. perest Medicum opus Græce scriptum, & in octo libros distinctum, quo-  
A. 170. rum tamen non omnes ad nos pervenerunt.

Medicinæ Historici inter se valde discrepant circa ætatem qua vixerat, alii

(a) Lib. I. De comp. s. Medicamentorum per genera Cap. 1. Et de Libris propriis Cap. 2.

(b) Lib. de præcep. ad P. s. librum Cap. 1.

(c) Galenus, De sanitate tuenda Lib. IV. Cap. 11.

(d) In Lib. PI. 1127 De Hemorrhoidibus, Comment. II. Method. Medendi Lib. XIV. Cap. 2.

(e) De curandi ratione per sanguinis missionem Cap. 23. (f) Echinapius.

alii animose fatentur Romani Imperii initio id evenisse, hocce confirmant ostendendo Jonico dialecto ipsum scripsisse, quod post illud tempus obsolevisse asserunt, at Menagius objectionem (a) destruit plures Græcos Auctores enuntiando, qui sub Adriani, & Severi Imperio eo idiomate usi sunt.

Censerem enim hunc Medicum post Galenum locum habere, sed ante Aetium, qui Anno 380., & Paulum Æginetam, qui Anno 420. inter vivos erant, præsertim cum utrique ipsum in suis scriptis advocent.

Areteï stilus concisus erat, & Hippocratis more valde arctus, quem studuit, atque pluries in testimonium vocavit; ejusdem opera Galenum nihil prorsus redolent, quod confirmat hunc Auctorem, ipsum vel non legisse, vel contempnissse.

In Areteo prima (b) reperitur hydrops cum hydatidibus observatio, quam perbelle descripsit, etiamsi originem, & naturam ignoraret.

Inter octo libros quos ipse composuit quatuor causas, & signa morborum explicant, quorum duo acutos morbos; totidem cronicos explanant, quatuor reliqui pari ratione distribuuntur, duo nempe medendi rationem acutos morbos, reliqui duo cronicos respiciunt.

In secundo libro *causarum*, & *signorum morborum acutorum* in capite nono de Passione hysterica locutus est sub titulo, *De Vulvæ strangulatu*, & in secundo libro, *curationis morborum acutorum* capite nono de illius morbi curatione verba facit, sub titulo *De Curatione Vulvæ suffocationis*.

De *Morais uteri* pariter capite undecimo libri secundi de causis & signis cronicorum sermonem instituit, de eorundem curatione, capite undecimo libri secundi de curatione cronicorum differit, at ibi in originalia plura desunt.

ORIBASIVS Sardus quarto ævo vixit, Imperatori Juliano fuit apprime carus, quapropter, & honores, & opes adeptus est; at cum hujusmodi Imperator in bello contra Persas anno 363. occisus fuisset, non æquam Oribasius cum successoribus suis fortunam expertus est.

Oribasius ipse narrat Julianum Imperatorem ei præcepisse collectionem præstantiorum veterum Medicorum, jussumque implevit, ut in 70. libros opera omnia Medica antiquorum digessisset.

In posterum specimen hujus collectionis in novem libros distribuit ad usum Eustachii filii sui; paullo post quatuor libros vulgarium remedium congeffit quos Eunapio dicavit; tandem in speciali libello instrumenta, atque machinamenta chirurgica tunc temporis usitata ostendit.

Extant adhuc novem libri *Synopsi Medicinæ* pro Eustachio filio scripti; verum quatuor Eunapio dicati, tum *Tractatus de Laqueis*, & *Machinamentis*; at magni operis sub titulo *Collesanea artis Medicæ*, quod 70. libros complectebatur nisi decem & septem supersunt; Oribasii opera ex manuscriptis latine tradita fuerunt a Joanne Baptista Rafario Medico Novariensi, Basilæ Anno 1557. in triplici volumine in 8. impressa; nondum ea Græce typis mandata fuisse arbitror.

Ipse de Morbis Mulierum in duplici opere locutus est; in illo quod pro

(a) In *amematibus Turis*.

(b) De *Menis*, & *causis diuturnis*. *Morbor. Lib. II. Cap. 1.*

pro filio exaravit in nono videlicet libro quindecim capita reperiuntur, quæ de præcipuis Mulierum Morbis agunt; in altero vero opere Eunapio dicato, in quarto libro nempe septem capita extant quæ de eadem materia pertractant, verum utrinque parum utilitatis inveneris.

A C. AETIUS Mesopotamus post Oribasium vixit quem sæpe in suis scriptis  
N. (a) indicavit, ideoque circa finem quarti sæculi; perperam nonnulli con-  
Ann. fundunt Aetium Medicum cum Episcopo Aetio Semi-Ariano qui error a  
170. nomenclaturæ similitudine procedit.

Ipsæ reliquit totius Medicinæ codicem utiliore, & præstantiore illo Oribasii. In XVI. libros dividitur, quorum primi octo Græce impressi fuerunt Venetiis apud Aldum in fol. An. 1534. ceteri octo supersunt manuscripti in pluribus Bibliothecis, obvi in illa præsertim Regis Nostri, ubi plura extant exemplaria. Joannis Cornarius latinè tradidit ex Græco idiomate omne Aetii opus, quod Basileæ impressit apud Froben Anno 1547. in fol. sub Titulo *de contrahis ex veteribus Medicina*, postremus liber hujus operis qui continet 112. capita morbos mulierum explicat, & primus est tractatus, qui circa hanc materiam pervolveri mereatur.

Nil magis laude dignum est quam auctoris candidus animosus in enuntiandis scriptoribus ex quibus materiem deprompsit, pluries enim in auxilium vocat Galenum, Aspasiam quam credo Obstetricem fuisse, Philumenem, Leonidam, Archigenem, Rustum, Filagrium, Soranum, & Asclepiadem.

A C. PAULUS EGINETTA videlicet Eginæ Insulanus vixit, ut credunt sub  
N. Imperio Honorii, & Theodorii Junioris, anno circiter 420. a C. N.,  
Ann. 420. saltem post Oribasium, & Aetium locum habet, cum utrosque frequen-  
ter nominet.

Hic Medicus medicinæ institutionem nobis reliquit iis temporibus accommodatam sub titulo *de Re Medica*, & in septem libros distinctam; ipse admonet congeriem esse notionum selectarum Galeni, & Oribasii ceterorumque, qui eum præcesserunt.

Hujusmodi opus Græce primum Venetiis excussum fuit apud Aldum in fol. Ann. 1528., verum latine versum a pluribus medicis videlicet Albano Torino, Joanne Guintherio Andernaco, & Janno Cornario quæ versiones omnes pluries editæ sunt; in tertio libro hujus operis decem, & septem capita reperiuntur de Morbis Mulierum videlicet a 60. ad 76. caput pariter in sexto libro septem alia capita habentur a 69. ad 75. comprehensa in quibus præsertim de partu, deque ejusdem consecutionibus agitur.

A C. MOSCHIONUS, nos latet hujus Medici etiam, verum suspicari licebit  
N. inter vetustissimos Medicos non esse recensendum, extat de hoc auctore  
Ann. 170. Græce scriptum *nonnulli yonanius videtur idest Tractatus de Morbis Mulierum*, qui 163. Articulos complectitur, ipsum in Græco manuscripto innumeris scatur erroribus, etiamsi Gesnerus eum corrigere satagerit, tamen adhuc imperfectus persistit.

Inf-

Reperitur antiqua versio latina ejusdem operis, quæ nonnihil amplior est, & magnopere conducit ad exemplaris correctionem.

Inferuerunt versionem, & manuscriptum in duplici collectione Auctorum de Morbis Mulierum, altera VVolphiana, & altera Spachiana; verum cavendum est ne Moschionum hujusmodi cum vetustiori Moschione confundamus, cui duplicem tractatum Plinius tribuit, primum *de Raphano*, alterum *de Pessariis*.

CLEOPATRA Egyptii Regina; librum ei tribuunt *de Morbis Mulierum* latine scriptum, quem tamen ajunt a Græco idiomate traditum fuisse.

A. C.  
N.  
Ann.  
800.

Hujusmodi libellus in collectionibus duabus de Morbis Mulierum invenitur superius recensitis, altera nempe a Gasparo VVolphio Basilæ impressa Anno 1586. in 4., altera impressa Strasburgi ab Israelo Spachio Anno 1595. in fol.; facile est cognoscere hujusmodi opus tunc temporis ignorantia crassante apographum fuisse.

THEODORUS PRISCIANUS Medicus Latinus, quem antiquiorem Medici crediderunt quam revera est, ad VIII. potius, aut IX. sæculum referendum; at hic frustraneum est contentionem discutere.

A. C.  
N.  
Ann.  
800.

Eo nomine insignitus tractatus extat fratri Thimoteo dicatus in tres libros distinctus, quorum primus dicitur *Phænomenon Euporiston*, secundus *Logicus*, tertius *Gynæcea ad Salvinam*, in hoc postremo Auctor decem breviora capita habet de Morbis Mulierum; illud opus Basilæ fuit impressum apud Froben Anno 1532.

Idem eodem anno recussum fuit Strasburgi in fol. triplici libro addito Chirurgiæ Albusæsis, follicationibus Germani Comitis de Neuvénare, hoc tamen discrimine quod in editione Basiliensi opus *Theodoro Prisciano* tribuitur, in Strasburgensi vero *Octavio Horatiano*: verum in priori impressione tres tantum libri observantur, superallato titulo indicati, in postrema vero, quatuor Tractatus reperiuntur sequenti ordini digesti:

- I. *Logicus de curationibus omnium ferre morborum, corporis humani ad Euporiston.*
- II. *De acutis, & chronicis Passionibus ad eundem.*
- III. *Gynæcia de Mulierum accidentibus, & curis eorumdem, ad Victoriam.*
- IV. *De Physica scientia ad Eusebium filium.*

Tandem in Basiliensi editione Matrōna cui liber de Morbis Mulierum dicatur, Obstetrix videtur nomine *Salvina*, in Strasburgensi vero *Victoria* appellatur.

NONUS Medicus Græcus, Anno Christi 915. inter viros erat sub Imperio Constantini Porphyrogenetæ a quo præceptus fuit sequentem librum componere.

A. C.  
N.  
Ann.  
915.

*De Omnium particularium Morborum curatione*, Argent. in 12. 1568.

Hieronimus Martius Medicus Ausburgensis Manuscriptum in publica Bibliotheca reperit ejusdem Civitatis quod latine vertit & cum Græce cum Latine imprimere curavit.

*Astruch de Morbis Mulierum.*

V

Hu-

Hujusmodi opus de omnibus pene Morbis pertractat in 295. Capitibus, haud perlongis ut *brevissima Medicinæ Synopsis* videatur, clara tamen & exacta cum idonea praxi conjuncta, quæ brevitati operis respondet; mulierum morbi 13. Capita complectuntur, iique explicantur juxta sententias Pauli Eginetti, & Aetii.

Quamvis Nonus trans errores vitam duceret quos hujusmodi Epochæ adtribuit, hic tamen de eo mentionem facere autumavi methodi ergo quam prosecutus est, quæ Græcos Medicos valde æmulatur, & a Medicina Arabum procul distita videtur.

FINIS PRIMÆ EPOCHÆ.

## SECUNDA EPOCHA.

Sæculo IV. cum Imperium Occidentis obverteretur, & Provincia a Barbaris Nationibus invaderentur, quæ scientias parvi faciebant, & illud Orientis etiamsi adhuc subsisteret, in diem tamen periclitabatur, scientiæ pariter, quæ illuc florebant, sensim sensimque defecerunt, contra Arabes, qui armis celerimos progressus faciebant, atque dominium totius Orientis, maximam nempe Asiæ, Africæ, & Europæ partem tenebant, scientias pariter sui juris fecerunt.

Idcirco Artes, & Medicina præsertim, eandem Imperii sortem profecta est, ut dum apud Græcos, cum Imperii dejectione scientiæ desinebant, apud Arabes potentia augmento, & scientiæ ipsæ maximam gradum sublimitatis adeptæ sint; sub Imperio præsertim Califi *Almamon Abdalla*, qui anno 813. a Christo nato summum Jus tenebat suo jussu Græcorum opera omnia Arabice versa sunt, qua de causa omnes Græcorum notiones apud Saracenos exportatæ fuerunt, ut Geometræ, Astronomi, Mechanici, atque Medici passim reperirentur, quibus ceteræ Nationes, & Europa præsertim intra ignorantie latebras involuta orbantur.

Ea scientiarum conditio 400., aut 500. annos perduravit ab 800. nempe anno ad 1200. Tunc Europæ Nationes mercimonii ergo, quod cum Arabis habebant scientiarum elementa denuo exciperunt, hujusmodi commercium patet a vicinis Provinciis peractum fuisse; Italorum respectu, Neapolitani qui Arabis Siciliam imperantibus propinquiore erant, & nostratum Occidentis Ispaniæ proximiores primi fuerant qui ab iis scientificas notiones mutuati sunt.

Quamvis religionis discrepantia, & regionum longinquitas obstitere nihil fecius Christiani rerum suarum (a) commutationem iniebat, ut traditionibus (b) constat; at summum negotiationis onus Judæi utrinque

V 2

exer-

(a) Salerni Portus olim mercimonii causa celebratissimus fuit ubi Arabes qui Siciliam, Africam, & Ispaniam tenebant facile conveniebant. Trotula enim Obstetrix (1) Salernitana, quæ Obstetriciæ Artis libellum (2) scripsit Anno 1200, vel 1250. quædam Saracenarum (3) mulierum indicat, quæ adversus oris scroterem remedia nonnulla exhibebat, verum illa refert, quæ hujusmodi muliercula ad capillorum nutritionem fovendam suppeditabat; evidens enim est tunc temporis Salerni Arabes fuisse, qui medicinam exercebant.

(b) Monspelii vero respectu Gulliæmi filii Eremenegaldi Domini hujus Provincie legata Anno 1121. exarata, quibus Successoribus prohibet ne Judæis, aut Saracenis aliquam facultatem permittant, satis confirmant tunc Monspelii Saracenos habuisse, qui præcipuos honores, atque onera Civitatis implebant; ait enim ipse (4) *Haradibus præis prebibus, ne aliquam Bailiam, vel dominationem aliqui Judæi, vel Saraceni in Monspellulano doneant.*

Beniaminus de Tudela Judæus, qui Monspelii anno 1160. (5) transitum fecit de hac Civitate tradit ibi Saracenos, atque Christianos undique ex vicinis Provinciis negotiationis causa convenire. *Locus, ait, negotiationi accommodus . . . quo ex omni loco ad mercaturam conflunt Edom (Christiani) & Ismael (Saraceni) plurimi.* Verisimile est inter Saracenos plures medicos adfuisse.

Tandem Gulliæmus filius Ducissæ Mathildis Monspelii Dominus, & junior filius Gu-

(1) Vide infra articulo de Trotula.

(2) De *Passivibus Mulierum.*

(3) Cap. 61.

(4) Gabriel, *Series Præfatum Monspellensium*, in *vita Galleri*, Edit. 2. pag. 140.

(5) In principio *Itinerarii.*



exercebant, iique Medicinam Occitanis, & Neapolitanis communicarunt, a quibus vetustiores Europæ universitates tum Monspessulana, cum Salernitana originem duxerunt, ut in posterum sensim sensimque per totam Europam medicinæ studium ampliaretur, & plures resurgerent scientiarum Scholæ.

At cum omnia temporum vicissitudini subjiciantur, circa XI. aut XII. cym scisma atque intestinæ discentiones potentem Calisuum Imperium laniarunt, idque cum Scientiarum defectione evenit, quæ apud illos tum medicina ipsa labefactari inceperunt; at secunda fortuna nos satis edocti eramus, & medicinæ præsertim studium apud nos non solum perstitit, verum novus in diem progressus adeptum est, semitas tamen Arabum profequendo; a quibus illam didiceramus; in scholis tunc præ manibus erant versiones Arabum Medicorum (a), præsertim *Canones Avicennæ*, & nonus Liber *Rhazis de Almanfor*. ubi specimen medicinæ, aut summa capita lectionum reperiebantur; recensentur itaque triginta commentaria Rhazis, & plura Avicennæ ceterorumque Arabum.

Eorum sententiæ 30. ann. adhuc perstiterunt usque dum Bisantium Turcæ anno 1453. subegerunt, & illuc litteræ obversæ apud nos restitutæ sunt, quare Medici Hyppocratem & ceteros Græcos Medicos pervolvere fatagerunt, qui vividiorum humen afferebant, ut considerari possit hujusmodi tempus, quasi initium tertiæ Medicæ Epochæ.

Dum medica ars intra Arabes fuit, & Sectatores suos, videlicet ab anno 800. usque ad 1500., quod spatium Secundæ Epochæ tribuitur Galeni sistema persecuti sunt, etiam si parum inter Chlinicos usui veniret. Inter opera medica illius ævi leviter de natura, indole, & differentiis morborum pertractarunt; offerunt enim synopsice indicationes, vel ut tunc loqui solebant *intentiones*, & *ingenia* morborum indicabant, quæ prosequi necessum erat, atque magnopere curandi methodum inculcabant.

Simplicibus remediis, quæ Græcis innotescerant innumera nova remedia Arabes addiderunt, quæ apud illos crescebant, vel ex Indiis facile exportabant, quorum pleraque adhuc in pharmacopæis superfuunt.

Quantumvis ampla esset eorum remediorum farrago, nihilo tamen minus in medicina adhuc non exuberarent, nisi Medici invicem plura eorum subiegiissent ut innumeras compositiones patraissent. Nunquam tot clectuaria *Loboc Pillule*, *Sief*, aut *Colyrii ficei*, *Syrripi*, *Trocisci*, *Trisera Philonii*, *Rob*, *Hieræ* &c. medicinam infarcierunt, seu melius dicam nunquam polypharmacia maximum augmentum adepta fuit quam illis temporibus.

At dum materiam medicam excolebant alias medicinæ partes botanicam semper, & anatomiam magis necessarias neglexerunt; miror cur Arabes

Phi-

Gollielmi superius allati (6) solemniter anno 1196. Monspeliî commorantibus promissit, atque decrevit publicis edictis, quæ adhuc superfuunt minime, *prece aliqua, vel pretio, seu sollicitatione alicujus personæ commoveri*, ut solum Medicum Medicinam facere in publicis scholis sinneret, at cuique quavis regione nato permetteret legere, aut præcipere scientias, quod successoribus suis pariter commendat. Evidens enim est generaliores sese explicandi rationes *quicunque sint, & undecumque sint*, Judæos & Saracenos comprehendere, ut medicinam Monspeliî libere & ipsi exercere valerent.

(6) Gabriel, ubi *supra*, pag. 129.

(a) Prælegebatur Avicenna, qui Princeps totius artis habebatur ac appellabatur. Prælegebatur & Rhasis, & præsertim nonus illius ad Almanforem Liber, in quo absolutæ curandarum omnium morborum ratio proponi ferebatur. *Janus Cornarius, in præfat. Paulo Ægineta præfata.*

Phytologiae studium contemnerent, quod a Græcis magnopere excolebatur, quos tamen ipsi profecuti sunt; anatomiae vero respectu eam Mahumeti leges contenderint, quæ cadavera tangere sub pollutionis crimine interdicebant, at quod mirum est similem errorem sectatoribus suis Christianis communicaverunt, qui etiam si religio non obesset tamen cadavera secare respuerunt; nonnulli credunt primum Monspelii Anno 1376. humana corpora dissecuisse de licentia Ludovici Galli Ducis Andegavorum Occitaniam Præsidis; ipse enim facultatis doctoribus cadavera sumere permisit eorum qui cruce muldarentur, quod confirmavit Carolus V. Rex Galliarum 1396.

Quod Arabes implicabat ne anatomiam excolerent, emortuorum etiam corpora perferutari impendebat, ut causas morborum internas detegere valerent; eorum itaque opera pervolvendo huiusmodi observationes nedum reperiuntur, neque ex obviæ sunt inter scripta Medicorum qui post illos vixerunt, ut inter minus recentes apud Gordonum tantum, aut Valescum de Taranta nonnullæ reperiuntur;

Anatomiae Arabes novam scientiam colendam substituerunt Græcis ignotam; huiusmodi chemia fuit, cui præ ceteris incubuerunt etiam si suspicari liceat ipsam ab Ægyptiis deprompsisse, qui primi eam perferutati sunt; passim inter Medicorum Arabum reliquias fragmenta huius scientiæ reperiuntur, quæ eam non parum cognovisse ostendunt, verum eorum asectæ utiliter hac arte usi sunt, quod facile innotebit labores perlegendo Arnaldi Villeneuve, & Raymundi Lulli, qui ceteris præcellerunt.

Arabes Astrologiam pariter commendabant, eamque praxi applicabant; necessum enim erat sales, aut conjunctiones planetarum consulere, easque consecutionibus aptare, quas ipsi deducebant; ex hoc procedit distinctio dierum climactericorum, & criticorum, præsertim series Ægyptiacorum, cuius rei futilitas apud nos diu perduravit; diariis enim indicabant tempora purgandi, aut venas incidendi magis idonea, & medici ipsi ea magis faciebant, ut nunquam obfistere auderent.

Eorum credulitas imo dicam fraus in diem magis proficiscebatur, ideoque Talismanorum virtutem magnificiebant, modo tamen certa quadam ratione, aliqua salis planetarum occurrente, cum juramentis, Iconibus, & caracteribus specialibus perficerentur; putabant enim hac methodo sanitatem conservare, amissam recuperare, & fortunas, atque opes facile adipisci posse; innumera referre possem exempla, at sat erit eo lectorem mittere ubi Arnaldus de Villeneuve de sigillis, & physiciis ligaturis in suo Tractatu disferit, in quo duo subsequencia refert exempla. Gerfonus Cancellarius Universitatis Parisiensis mentionem facit in una sua Epistola (a) cuiusdam Jacopi Angeli Medici, insignis Villæ Montipessulani, eumque contemnit, quia superpositione abreptus dies climactericos observabat, de observatione ait ille dierum quantum ad opera; aspernitur pariter alterum Clinicum in alia sua Epistola, (b) qui adversus Nephritidem Talismanum præcipiebat collo suspensionem, & Leonis imagine paucis caracteribus additis incisum.

Eo tempore duo novi morbi, quæ usque illuc Græcis, & Romanis incogniti erant apparuerunt, qui non parum illius ævi Medicos implicarunt, ut novam familiam practicæ instituerent.

Primus fuit variolarum morbus; quidam comprobare tentarunt Medicos Græcos huiusmodi morbum non latuisse, & obvertendo sensum operum eo-

*Affruch de Morbis Mulierum.*

V 3

rum

(a) Tom. I. editionis postrema Antuerpiana.

(b) Tomo eodem, ad annum 1418.

rum id offendere fagebant, at illusio neque communis fuit, neque diuturna, hodie communiter receptum est hujusmodi egritudinem Arabis endemiam fuisse, atque apud eos commorasse usque dum circa septimum sæculum extra natali soli dominium ampliarent in Asia, Syriam, Ægyptum & Persiam invadendo, atque Asiam minorem, in Europa vero circa octavum ævum Siciliam, Neapolim, Ispaniam, & Narbonensem Provinciam occupando.

Ab Arabis ergo, aut Saracenis variolarum infectio ad nos usque pervenit, quam nos ceteris nationibus communicavimus quæ illam ignorabant. Hispani enim in Mexico (a) Angli in Terra Mariæ (b) & Battavi in Insulis quas in Indiis Orientalibus occupant, ubi maxime progressæ sunt variolas exportarunt, id apud nos mille ab hinc annis evenit eoque eadem vehementiam servant citra spem quod eas penitus pessundemus.

Alter morbus *lepra fuit* seu *Elephantiasis Arabum* in Ægypto, & Syria communis, quam Pompeus ipse apud Italos exportavit, ubi tamen cito desistit, ut superius observavimus in prima epocha; Galli vero in duplici Cruciatæ XI. & XII. sæculi hoc morbo correpti sunt, quem in Galliam transulerunt, ceterisque Europeis communicarunt, at post 500. annos circiter tandem abiit.

Quæ adhuc exposta sunt ostendunt apud nos morbos alienigenos similem effectum præbere ac animalia, aut arbores, quæ, e longinquis Regionibus apud nos transferuntur: Puli enim Indiæ in Europa facile cicurantur, at Putaci Americani pereunt, crescunt castanea non vero palmæ, & pistachia, quare concludi potest inter animalia, arbores, & venena exotica, quædam facile climati nostro assuescere, alia nunquam.

A C. AVICENNA Medicus Mahumetanus qui in Araba lingua appellatur  
N. *Abubali*, *Alboussain*, *Ebenbali*, *Ebensina*, idest Houssain pater Hali, fi-  
Ann. lius Hali, filius Sina. Ab hac postrema voce *Ebensina* illum Avicenna  
100. composuimus, quo hujusmodi Medicus insignitur.

In Persia natus est anno Hegiræ 370. & Æræ Christianæ 980. obiit anno Hegiræ 428., & a C. N. 1038. ideoque 58. annos vixit, cujus brevem ætatem tribuunt libidinose vitæ.

Ille etiam parum vixerit, multum tamen scripsit. Ejusdem duo volumina reliqua sunt in fol. Venetiis impressa apud Junia Ann. 1595., quorum pars Venetiis pariter edita fuit 1500. in 4.

Præcipuum Avicennæ opus *Canon Medicinæ* appellatur videlicet *Medicinæ regula*; in quinque Libros dividitur, qui integram medicinæ institutionem complectuntur, ibique in libro tertio de *Morbis Mulierum* partrahat, *Fen* seu Sectio XXI. tres tractatus continet, quorum ambo priores conceptionem, gestationem, & partum respiciunt, tertius ceteros Morbos Mulierum ostendit.

Mihi visum est Avicennam ceterorum Arabum Medicorum affectam fuisse, at haud facile est clare ipsius operis indolem perscrutari, nam versio illa Avicennæ, quæ apud me est a Gerardo Cremonensi peracta, & ab Andrea Alpago correctæ, tum a Joanne Costeo, & Joanne Paulo Mongio revisa, tandem a Fabio Paulino Urinenfi publicata, ita inconcinne elaborata fuit, & hinc illinc obscuris fragmentis, lacunis, arabis vocibus interperfa, ut vix intelligi queat.

JO-

(a) Bernard. Diaz de Castillo, Cap. 221. Francisco Lopez de Gómara, Cap. 102. Antonio de Herrera. Decad. II. Lib. X. Cap. 4.

(b) Martinus Lister, Entectationes VIII. De Variolis pag. 153.

JOHANNES SERAPIONUS Medicus Arabus, de quo pauca scimus, vixit A. C. N. Ann. 1060. probabiliter XI. sæculo circa Annum 1060. , aut 1070.

Ejusdem duo libri extant sub titulo alter

*De simplici medicina a Simone Januensi latine versus postquam a Judæo Dertose ex Arabo traditus fuit .*

alter erat

*Practica Johannis Serapionis dicta Breviarum ex Arabo latine versa a Gerardo Cremonensi*

Ambo ea volumina impressa fuerunt Venetiis in fol. per Bonetum Locatellum Bergomensem 17. Calendas Januariæ 1497.

In hoc postremo libro de omnibus corporis morbis agit in VII. Tractatus materiam distinguit; in IV. Tractatu capita decem postrema de Morbis mulierum pertractant juxta ceterorum Arabum sententiam; ea tamen capita non omnes mulierum ægrotudines complectuntur.

HALY ABBAS vel ut ille appellari consueverat in capite III. Operis infra enunciandi Haly filius Abbas, discipulus Abimeher filius Moylis vixit sæculo XI., & Arabo idiomate scripsit libellum sub titulo. A. C. N. Ann. 1066.

*Regalis dispositio* quæ morborum est Tractatus in duas partes distinctus, *Theoretica* una, quæ decem libros continet, *Practica* altera, quæ totidem libras complectitur.

De Morbis Mulierum seu melius de quibusdam eorum in libro IX., Capite 38. & 39. primæ partis agit, & in libro VIII. secundæ partis capita 20. consecutiva habentur, quæ ad illos morbos pertinent, at in utraque parte ad formulas nonnullas omnis reducitur labor, nunc jam obsoletas.

Haly opus latine vertit Antiochiæ anno 1127. Stephani quidam ut ad libri collum indicatur; hujusmodi versionem vero repurgavit Doctor Medicus Antonius Vitalis quam typis mandavit apud Jacobum Myr Lugduni in 4. anno 1523.

ABUBETER RHAZES vixit circa annum 1070. inter plures libros quos de Medicina composuit conspicuiore sunt decem illi Almanfori dicati Regi Cordubæ, IX. præsertim qui synopsis morborum omnium complectuntur innumeris aliorum auctorum commentis referti. A. C. N. Ann. 1070.

In hoc libro integer articulus reperitur qui in XI. capita de Morbis Mulierum pertractat; quamquam tamen magni faciant hunc libellum, nihilominus parvi pendet; in eo Avicennam sæpe in testimonium advocat, quod ostendit paullo post vixisse.

Hoc opus Rhazis cum addito libello ab editore exarato sub eo titulo *Libellus familiarium introductionum in artem parvam Galeni* impressum fuit in fol. Hagænoë 1533. sollicitationibus Doctoris Georgi Kraut.

CONSTANTINUS Medicus Orthodoxus Cartagenus qui etiam in ea Civitate Saraceni imperarent Arabam, Græcam, & Latinam linguam addidit in qui- A. C. N. Ann. 1070.

in quibus plures libros Arabum Medicorum tradidit; verum in Apulia se recepit apud Robertum Griscardum illius Provinciæ Dominum, ibi in monte Caslinensi Monasticam vitam duxit An. 1060. & cum Ablate Didier consuetudinem habuit, qui postea Pontifex creatus fuit appellatusque Victorius III., qui obiit Anno 1087., deinde cum Alphano necessitudinem inivit, qui primus fuit Salerni Archiepiscopus circa Annum 1070. cui dicavit libellum *De Stomachi affectionibus*, ideoque ipsum Anno 1060. 1070., aut 1080. vixisse constat.

Ejusdem operum collectio Basilæ excussa fuit in fol. Anno 1536. addito opusculo *De Passionibus mulierum*, & *matricis*; at hujusmodi Tractatus, qui tres paginas non superat, nihil animadvertione dignum præstat.

A. C. N. ALBUCASIS Medicus Mahumetanus Arabo nomine *About-Casem* vixit Anno circiter 1085. post se reliquit opera plura, quæ ad nos nondum pervenerunt, de illo superest Tractatus subsequens Chirurgicus

*Manualis Medicina*, impressa cum *Chirurgia Guidonis de Cauliaco* Venetiis 1500. in fol.

Hujusmodi opus ex Arabo latine vertit Gerardus Cremonensis, qui asserit trigefimam tantum partem complecti grandioris operis sub Titulo *Azaragi*.

At quomodocumque res se habeat Albucasis liber in III. partes dividitur; & in secunda parte a Capite LXXI. ad LXXXVIII. de Morbis Mulierum agitur, ibique Chirurgiam commendat in partu, foetus mortui, aut placente extractione, & in abscessu aut cancro uteri &c., octo hujusmodi Capita inferuntur in duplici collectione VVolphii, & Spachii.

A. C. N. AVENZOAR, seu Arabice (a) loquendo *Aben Zohr Alandlausi filius* Zohr Vandalici Medici celebris in Vandalicia nati religione Judæi. Averoes (b) ipsum laudat, & asserit 135. An. vixisse. Verum ni id credere magis concludi tamen poteris paulo antea inter vivos fuisse idcirco initio sæculi XII.

Extat Avenzoaris opus sub titulo *Taisir*, seu *Theisir* quod Arabice sonat

*Liber Theisir clahelmodana vahelsabir*, idest, *Refectio medicationis*, & *regiminis*. Venetiis 1496. in fol.

Hoc opus de omnibus Mulierum Morbis differit dividitur in XXVI. Tractatus, & in XXI. *de passionibus matricis* agitur in septem breviora capita distincto, quæ singula hic referam

- I. De matrice & defectu conceptionis
- II. De apostematibus matricis
- III. De corrosione matricis
- IV. De laxitudine, & dislocatione matricis
- V. De superfluitate fluxus menstrui
- VI. De retentione superflua menstruorum
- VII. De opilatione, & plenitudine carnis, & scissura in ore matricis.

AVER-

(a) D' Herbelot, *Bibliotheca Oriental.* sub voce *Zohr*.

(b) *Lib. IV. Colliger. Capitula de diebus criticis.*

AVERROES in Arabo idiomate *Eben-Rhore* Medicus Mahumetanus, qui A C.  
Cordubę medicinam exercebat circa Annum 1170. plures libros Artis reli- N.  
quit, inter quos celebrior fuit, qui sub nomine *Colliget* impressus fuit Ven- Ann.  
netiis inter Opera Abhomeron Aben Zoar apud Gregorium de Gregoriis 1170.  
1496. in fol. ; at post illud tempus pluribus aliis collectionibus ipsum ad-  
diderunt.

Hujusmodi *Colliget* synopsis brevissima est omnium morborum in VII.  
libros distincta; in III. libro Averroes, Capite XXIX. & Capite IX. libri IV.  
de Morbis Mulierum verba facit, & pauciora de iis morbis refert ut vix  
mereatur inter Tractatus de Morbis Mulierum recenferi.

NICOLAUS BERTRUTIUS Italus Bononiensis; vixit ut ajunt Anno A C.  
1250. Opus Medicum reliquit, cujus titulus N.  
Ann.  
1250.

*Collectorium Artis Medice tam practica, quam speculati-  
væ. Lugduni 1509. in 4.*

Illud opus vero sub diverso titulo pluries recussum reperitur, & in duos  
libros distinctum, quorum alter *De Morbis particularibus*, alter *de unversali-  
bus* agit; prior in 4. partes subdividitur

In tertia parte, Auctor de nonnullis mulierum ægritudinibus sermonem  
instituit, deque iis causas, & signa ostendit, omittendo tamen medendi  
rationem; Medicus qui hunc librum edidit Hagenoæ Ann. 1533. cum ipsum  
laudis extollere vellet in Præfatione editionis suadere tentat specimen esse  
tertiæ, & quarti libri *Canonis Avicennæ*, quod elogium nostris temporibus  
parvi pendet.

TROTULA. Hoc nomine insignitur Tractatus de Morbis Mulierum sub A C.  
titulo N.  
Ann.  
1250.  
vel  
1300.

*Gynaeciorum Liber, curandarum ægritudinum in, ante, &  
post partum.*

Hujusmodi opusculum quod 63. exigua capita complectitur Anno 1544.  
Argentinae impressum fuit cura Georgi Kraut, verum Parisiis Anno 1550.  
recussum, in duplici etiam collectione inseritur Auctorum, qui de hac re  
pertractarunt.

Hic libellus quamquam parvi faciendus, discrepantiæ tamen inter Medi-  
cos non levis causa fuit, cum nonnulli ipsum *Eros* cuidam tribuant Ju-  
liæ manumisso Augusti filiz; alii Obstetrici Salernitanæ ipsum referant,  
quæ *Trotula* appellabatur.

At questio facile solvi potest; Trotulæ enim in prima Argentina e-  
ditione opus tribuitur juxta manuscriptum ex quo fuit depromptum; ea-  
dem Trotula Capite 20. recensetur, quæ ægram sanavit ei commendatam,  
ergo ipsa opusculum exaravit de quo questio habetur; itaque qua ratione  
unquam Eros tribui potest, cum Capite 61. de Saracenis Medicis verba  
fiant, eodemque Capite remedia cosmetica proponantur, quibus Salernita-  
næ mulieres utebantur; verum Capite 17. Cophon recens Auctor in testi-  
monium advocetur, tandem Capite 61. Camphora præscribitur, quæ sub  
Augusti Imperio nedum innotebat.

Credidimus circa annum 1250, hunc laborem referre cum antea nondum  
Sera-

Saracene mulieres illuc medicinam exercerent ut Trotula *Capite 61.* narrat, & Cophon testatur *Capite 17.*; certiores fieri potuissimus de Trotulæ ævo si innotuisset ipsius Cophonis tempus, at ipse pariter latitat; ejusdem enim duo opuscula tantum supersunt, ad calcem Mæue impressa Lugduni Anno 1539. alterum *modus medendi* appellatur, alterum quod brevius est *De anatomia porci* agit, utrumque pervolvi, & reperi ipsum citare *Passonarium Galeni videlicet Gariopontum, & Constantinum*, qui utrique ad annum 1000. pertinent, quod tantum ostendit post illud tempus Cophon vixisse.

A. C. HENRICUS DE SAXONIA discipulus Alberti Magni qui vixerit sæ-  
N. culo XIII.  
Ann. 1190.

Ei tribuitur duplex Tractatus videlicet  
*De Secretis Mulierum.* Augultæ 1489. in 8.  
*De Secretis Naturæ.* Francfurti, 1615. in 8.

Ambo ii tractatus Mulierum Morbos respiciunt videlicet conceptionem, gestationem, partum, & puerperium; verum tot erroneis, & superstitiosis fabulis scatent, & quod veri complectuntur inconcinne ita proponitur, ut minime pervolvi mereantur.

Uterque Alberto Magno tribuitur Fratri Dominicano, & Episcopo Ratisbonensi quem sæculo XIII. magni faciebant. Petrus (a) Borussius ejusdem Ordinis Frater contendit Albertum hunc librum composuisse, quem potius cuidam Thomæ de Camiprè tribuere vult; fortassis veritatem defendit, at in editione, quæ apud me extat utrumque Henrico de Saxonía Alberti Magni discipulo referunt.

A. C. BERNARDUS GORDONUS celebris Medicus Monspeffulanus, qui  
N. docuit Anno 1185. decem, aut undecim post Annos videlicet ad Ann.  
Ann. 1296. Tractatum Therapeuticæ composuit sub titulo *De decem ingeniis seu indicationibus curandorum morborum*, & novem post Annos vigesimo nempe quo lecturam assumpserat circa 1305. grandiore tractatum exaravit, quem *Lilium medicinae* nuncupavit, ipse universalem omnium morborum pertractationem præstat; delectabantur tunc opera tumidis titulis insignire quales sunt, *Flos florum, Lumen luminum, Rosarium Philosophorum* &c. nil mirum ergo si eodem errore & Gordonus correptus sit; non abs re tamen etiam rationes referre, quæ ipsum induxerunt hoc titulo libellum decorare. *Hunc librum, ait, intitulo Lilium Medicinæ; In lilio enim sunt multi flores, & in quolibet flore sunt septem folia candida, & septem grana quasi aurea. Similiter liber iste continet septem partes, quarum prima erit aurea rutilans, & clara ..... alia autem sex partes erunt candidæ.*

In ejusdem operis libro septimo de Morbis Mulierum Gordonus agit a *Capite* nempe VIII. ad *Caput* XVIII.; Arabum methodum undique profectus est, quorum fuit affecta, at illis nitidus magis est, & methodicus, verum interdum rationes observationibus confirmat.

Prima editio hujus operis Venetiis impressa reperitur Anno 1494. *in fol.*

A. C. JOANNIS PLATEARIUS Medicus Salernitanus, qui a sæculo XIV.  
N. ritam ducebat varios Tractatus digessit alter eo titulo insignitus.  
Ann. 1530.

Li-

(a) In vita Alberti Magni Cap. XVII.

*Liber de simplicī medicīna, dīctus cīrca īnflans, materīam medicam complectens*

*Alter appellabatur*

*Practica brevis morborum curandorum, ubi de omnibus morbis pertractat.*

In hoc postremo libro Auctor de Morbis Mulieribus locutus est juxta Arabum sententiam.

Ambo Platearii opuscula cum Serapione Venetiis excusa sunt in fol. Anno 1497.

VALESCUS DE TARANTA Lusitanus Monspessuli medicinam exercere incepit Ann. 1382. & post triginta, & sex Annos incoacta praxis videlicet circa 1418. practicae opus concessit quod *Philonium* nuncupavit. A C.  
N.  
Ann.  
1418.

Illud in septem libros dividitur, at quibus rationibus tali pacto Valescus opus distinguit perspicito; *Rationabile mihi visum est*, ait, *bunc librum in septem particulas esse partiendum .... 1. Enim sunt septem verba quae Dominus noster Jesus Christus Salvator noster in Cruce pendens locutus fuit, septem sunt dona sancti Spiritus; septem sunt gaudia Virginis gloriose; septem Sacramenta Ecclesiae; septem petitiones in Dominica oratione; septem sunt virtutes &c.*

In septimo igitur libro duodecim Auctor capita ad Morbos Mulierum pertractandos destinavit; Stylus sane barbarus apparet, at medicina rationabilius explanatur quam in pertractationibus tum Arabum cum Scotorum suorum; observationes nonnullae in hoc opere reperiuntur, quin etiam in illo Gordoni, quae minime perleguntur in ceteris illius aevi Auctoribus; prima Philonii editio Lugdunensis est in fol. 1490.

MARCUS GATINARIA Medicus Papiensis saeculi XV., qui innotuit commentis ergo, quod in librum de Rhazis Almanfori dicatum exaravit Lugduni impressum Anno 1506. in 4. & Parisiis in 8. Anno 1540. titulo insignitum. A C.  
N.  
Ann.  
1440.

*Marci Gatinarie de curis egritudinum particulare, Noni Almanforis Practica uberrima.*

In hoc Tractatu sex capita reperiuntur, in quibus de nonnullis Mulierum Morbis interdum agitur, & eorum curatione ex. gr. *cura exitus matricis cura superflui fluxus menstruum, cura retentionis menstruum, cura profectionis matricis, cura rhagadiarum vulvae, & ejus apostematis, cura mole matricis.*

Nulla theoria de iis morbis ibi invenitur, at curandi potius methodus, vel ut melius dicam formularum farrago ab Arabis deprompta, quos continenter citat; nonnullos Medicos vetustiores etiam in testimonium vocat nempe Joannem Arculanum, Gerardum De Solo Professores Monspessulanos, tum Mattheum De Gradibus, & alios quamplurimos.

ANTONIUS GUAINERIUS Papiensis Professor, Mediolani medicinam fecit, ut Medicum fuisse Ducis Philippi Mariae Visconti videatur. A C.  
N.  
Ann.  
1440.

*Medicinae cursum elucubravit sub titulo*

*Pra-*



*Præfata celeberrimi Viri Antonii Guainerii, Papiensis Medicinæ Doctōris clarissimi, Papiæ impressa Anno 1518. in 4. verum Lugduni in 4. similiter Anno 1525.*

In hoc libro habetur longa pertractatio de *ægritudinibus matricis*, quæ complectitur 27. *Capita*, & dicatur Philippo Mariæ Mediolani ac totius Liguriæ Duci, ubi ipse tunc temporis imperabat.

Hujusmodi dicatio respicit proculdubio Philippum Mariam secundum filium Joannis Galeatii Visconti I., idcirco cum ille Princeps obitus sit Anno 1447., necessum erit, quod opus hunc annum præcedat; hujusmodi Dux legitimis filiis carebat etiam si magnopere optaret, quapropter paulo post Uxorem duxit ut ex Guainerii dicatione appareat *Dii boni!* ait, *quantas voluptas populos tuos Italiae invaderet, si eum audierint ex Duce clarissimo natam, Duci magnanimo copulatam, filium parenti, & viro persemilem enixam.*

Guainerii opus Principi dicatum eo collineat, ut illum foreat felicem eventum, nam conceptionem, gestationem, & partum respicit, conceptionem præsertim cujus obstacula explanat, & methodum sterilitatem præcavendi docet, at parvi pendet; Joannes tamen Faucon doctus Professor Monspeliensis tum hunc cum ceteros Guainerii libros commentatus est.

A. C. ANTONIUS CERMOSONUS Patavinus, qui unam e primariis cathedris hujus Universitatis occupabat, & Præceptor fuit Joannis Michaelis  
N. A. 10. Savanarolæ, obiitque anno 1458.

Ipse publici juris fecit 153. Consultationes Medicas circa morbos omnes, quas typis mandarunt successores sui Venetiis anno 1503. *in fol.*, quod opus postea alio pluries recussum fuit, plerumque tamen cum Consiliis Medicis simul Bartholomæi Montagna Medici Bononiensis.

Inter ea Cernesoni consilia 22. mulieres respiciunt videlicet a 112. ad 133.; tantum nisi farraginem præstant formularum inconcinne distributarum, eaque sane Polypharmaciam satis ostendunt Arabum, & Sæctorum suorum.

A. C. JOANNES MICHAELIS SAVANAROLA Professor Patavinus medicinæ Opusculum exaravit Papiæ impressum *in fol.* anno 1486. postea pluribus  
N. A. 10. in locis recussum in sex libros distinctum; eorum quinque priores circa  
1485. qualitates, & naturam alimentorum versantur, seu materiam medicam explanant.

In postremo tantum libro Auctor de Morbis pertractat, & in *Capite 24.* uteri morbos ostendit quos in 24. *rubricas* seu paragraphos explicat; at potius conceptionem, gestationem, & partum perscrutatur, quam genuinas, & magis obvias matricis ægritudines.

A. C. GALEATIUS DE SANTA SOPHIA Patavii natus Anno 1490. celeberrimus Medicus fuit, qui non parum laudis sibi promeritus est cum IX.  
N. A. 10. librum Rhazis interpretaret; hujusmodi commentarium reperitur in editione  
1499. Rhazis cura Kraut excussa, superius pag. 312. enunciata, per articulos ipsum distribuitur ad calcem utriusque capituli.

A. C. ALEXANDER BENEDICTUS Veronensis sua prima juventute in (a)  
N. A. 10. Græ-

(a) Medicinæ lib. 1. Cap. 1. lib. XXVI. Cap. 4.

Græciam apud Cretenses appulit ubi diu medicinam exercuit (a) Cydonii præsertim, & Methone in Peloponneso. Ab hoc itinere redux Venetiis Ann. 1495. moram gerere sibi suadebat, at præmio sollicitatus (b) onus sumpsit Medici Classis Veneræ, quæ adversus Carolum VIII. Galliarum Regem, eodem anno impellebatur. Deducitur vero ab (c) Epistola ad eum missa anno 1508. inter vivos fuisse; imò cum in suis operibus ipse ostendat (d) terramotum Anno 1511. Italiam concussisse, ideoque tunc temporis etiam adhuc vixisse credendum est.

Præcipuum opus ejusdem prostat sub titulo

*Omnium a vertice ad calcem morborum signa, causæ, indicationes, & remedium compositiones, utendique rationes generatim libri XXX. conscripta.*

Ii triginta libri Imperatori Maximiliano I. dicantur omnes, quare ante annum 1519. compositi fuerint, quia hoc anno princeps discessit.

Inter eos tres de Morbis Mulierum agunt XXV., XXVI., & XXVII. nempe; in priori libro in 39. capita digesto de conceptione, gestatione, & partu pertractat; in postremis duobus fufius absolvit alios Mulierum Morbos; videlicet catameniorum cessationem, hystericam passionem, & inflammationem, abscessum, ulcus, atque cancrum matricis ostendit, ac de uteri furore silet prorsus.

Ipsam Græcam Doctrinam novisse constat, cum in singulis capitibus sententia reperiantur Galeni, Eginette, Oribasii, Empedocli, atque Athenæi ut synopsim potius Medicinæ Græcorum referat.

(a) Anatomices Lib. I. Cap. 14. Lib. III. Cap. 9.

(b) Chiosus De illustribus Peroneis.

(c) Per Jacques Antiquarius. Elle est à la tête du Livre.

(d) Medicin. Libr. XXIII. Cap. 19.

FINIS SECUNDÆ EPOCHÆ.

TER-

## T E R T I A E P O C H A.

**S**cientiarum restauratio sub fine XV. zvi, & initio subsequēntis evenit, & medicina novam formam accepit; etenim a Turcis capto Bisantio Anno 1453. atque Orientis subverso Imperio litterarum cultores, qui a communi exilio superfuērunt, se in Galliam, & Italiam receperunt, secum libros, & scientificas notiones exportando, hincque certatim Græcæ linguae, & Græcorum Auctorum scrutinio se dicant omnes, quinnimo latinam linguam, atque latinos scriptores excoluerunt.

Hac ratione scientiis Medici valde profecerunt, & qui Græcos proferebantur, Hippocratis, & Galeni opera sedulo pervolverant, tum sectatorum suorum, quorum libros latine tradiderunt, ut omnes nationes facile Medicorum labores perscrutari valerent, quos typographiæ inventum obvios reddidit, brevi apparuit quanti existimarentur Græci, quantumque præcellerent methodo, & soliditate dicendi Arabis, quorum opera confusa, & arida experiebantur, ideoque omnem laborem impendere satagerunt Hippocratem, & Galenum perquirendo, dum Avicennam, & Rhazim respuebant, qui diu nimis medicinæ imperium subitinerint.

Galeni systemati præsertim incubuerunt difficultates explanando, contradictiones conciliando, consecutiones perscrutando, atque ejusdem etiam incertas quandoque, aut erroneas sententias defendendo, ut speciem veritatis, subtilitatibus darent, uno verbo tunc Galeno ipso intimius ipsius systema cognoscere fatebantur.

Græcorum enim Medicina restituta fuit summumque lumen in hac epocha accepit, quæ etiam diu non perduraverit, plures tamendoctos Medicos, optimosque libros subministravit; tunc enim primum integram medicinæ institutionem publici juris facere inceptum, quæ Græcorum observationibus, & nonnullis Arabum suffulta rectam artis sternebat viam; accuratius itaque indoles, species, causas, & differentias singulorum morborum distinguebant, signa in iis intimius inquirebant, ut tutiorem prognosim enunciare valerent, tandem indicationes melius sanciebant, quibus mederi necessum erat.

Cum in Italiam primum Græci appulerint, ibique etiam primum litteræ resurrexerunt; Franciscus I. vero litterarum Pater, litteratos homines in tutelam recipiebat, & præmiis, atque honoribus ipsos sollicitabat, ut apud eum moram gererent, suisque beneficiis fruerentur; nihilo secius Itali ceteris litterarum nomine præcellabant, idcirco Italorum Universitates, Patavina præsertim olim sæculo nempe XVI. scientias omnes, & medicinam potissimum summo cum decore omnibus præcipiebat.

Offendimus jam hujusmodi epocham breviorē fuisse; sæculi enim XVII. medium ipsa tantum attingit, quando sanguinis circulationis inventum, atque nova philosophandi methodus, ut infra exponemus, mutationes innumeras medicinæ attulerunt.

In hac epocha pharmacie incubuerunt, Arabis tamen accuratius atque ab eorum polypharmacis plura dempserunt, ut tamen hanc medicinæ partem innumeris inutilibus, & superstitiosis remediis adhuc scatentem reliquerint.

Botanicæ Arabis sedulo magis consuluerunt, & in hac epocha Tragus, Clusius, Columna, Lobellius, uterque Bahuinus, & innumeri alii naturæ historię cultores floruerunt, qui hujus scientiæ obscuritatem sustulerunt, & plan-

& plantarum species atque virtutes, quibus veteres usi erant utiliter declararunt.

Chemiā pariter excoluerunt ab Arabis depromptam cui magis quam par erat dicati sunt. Paracelsus medicina prorsus expertus, at chemicis remediis locupletatus, quibus satis imponere valebat magnum nomen adeptus est, novamque medicinā sectam instituit ratione denudatam, quæ diu tamen perstitit, & rationalem artem deturpavit.

Anatomia vero non parum progressa est; ea ætate enim innumeri floruerunt, anatomia celebres viri, videlicet Silvius, Vesalius, Columbus, Valverde, Fallopius, Eustachius, Spigelius, Andreas Laurent, Fabricius ab Aqua pendente, Gaspar Afelius &c. qui magnopere auxerunt antea factas notiones novaque magni momenti inventa suppeditarunt, tamen magis incubuerunt in describendis ossibus, musculis, vas, quam in viscerum structura detegenda, quod potissimam constituit anatomię partem, & medicinę magis necessariam.

Prout anatomia proficiebatur, cadaverum sectiones, & observationes anatomice frequentius instituebantur; potuissimus enim in hoc medicinę studio quamvis breviori eorum plures congerere, quorum pleraque utilissimę evaserint, & veram nonnullorum morborum sedem, atque causam determinaverint.

Verum Astrologiam judiciariam ut in præcedenti magni faciebant; huiusmodi amentia, radicitus animis inserta, & Auctoritate Scriptorum suffulta, haud facile (a) abradi poterat; additote ea delectari debiles ingenii, & creduli, quorum adhuc maximus est numerus, ut vix ab hoc morbo convalescere queamus.

Talismanorum respectu tunc temporis ea parvi faciebant, modo tamen apud Proceres non subsisterent, qui circa hanc rem plerumque magis cum vulgo, quam vulgus ipse sentiunt; celebre illud Talismanum tunc præsertim prædicabatur, quod Reginę (b) Catherine De Medicis tribuebant.

Tunc primum duo novi morbi invexerunt, lues nempe venerea, & scorbutus adhuc superstites.

Lues venerea enim morbus est advena, quem Hispani in Insula Haiti, seu Hispaniola contraxerunt, & tandem XV. sæculo dum armis Neapolim anno 1493. aggressi sunt, Neapolitanis, & Gallis communicarunt, ut ceteræ Nationes inquinarentur; hic supervacaneum censeo hanc morbi transfusionem reiterare, quam satis exposui in Tractatu De Morbis Venereis Lib. I. quem pervolvere fas erit.

Huiusmodi morbus initio vehementior erat, etiamsi nunc admodum subactus appareat, adhuc tamen inter sæviores egritudines locum habet; Medici, quibus primum ipsum observare contigit, novitate perterriti undique nova remedia investigarunt quibus tandem ipsum compercerunt; etenim post tentamina innumera, & contentiones invenerunt Mercurium adipe extinctum & frictionibus applicitum genuinum, atque tutissimum adversus hunc morbum evadere; in nullo enim morbo remedii virtus magis elucescit, aut prudentia Medicorum, qui hoc remedium invenerunt, eumque exhibent, magis commendatur quam in hoc, ubi medicinę certitudo potissimum refulget.

Scor-

(a) Nondum huius epochæ titulo Astrologia forma quod medicinam pertinebat destructa erat, ut iudicare liceat subiequentis Libelli ergo. Nova medicina Methodus curandi morbos, ex Mathematica Scientia deprompta Joh. Basilio Pirungo, Parisiis & Astralogia doctrinæ Antiquæ. Hageni 1733. in 4. (b) Mémoires de Trevoux. Décembre 1704.

Scorbutum olim innotuisse videtur; *Stomacace* enim & *Scelorybe* quibus Romana acies ab Aelio Gallo imperata (a) Strabone teste correpta est dum apud Arabes bellum gerebat, verum eosdem morbos qui ut (b) Plinius testatur Germanici milites infestant trans Renum missos Scorbutum fuisse autumant, modo descriptioni eorum morborum indulgeamus; censerem enim *Lienes*, *magnos, convulsulos sanguineos*, & *Ileos Hematites* de quibus Hippocrates pluries agit (c) & *Oscedum* contra quem (d) Marcellus remedia nonnulla proposuit, affectiones scorbuticas fuisse, aut ei valde affines, huiusmodi exempla demonstrant Scorbutum alias invexisse in quibusdam circumstantiis, non tamen communem morbum fuisse ut hodie centum ab hinc annis esse constat.

Ea ægritudo inter Incolas oræ Baltici endemia est, illam vernaculo idiomate *Scorbock*, seu *Scorback* appellant, quod significat *imi ventris morbus*, cum venter plerumque labefactetur; ex iis notionibus Scorbuti nomine huiusmodi morbum insignivimus; credunt ipsum in iis Regionibus endemium esse tum maritimi quem inspirant aeris ergo, cum alimentorum causa quibus vescuntur; Europa enim reliqua ubi mitior est aer, & cibi salubriores sunt eo, usque ad finem XV. sæculi, & subsequens initium exers fuit.

Diutius vero navigationes, quas auri, & mercimonii cupiditas impulit, tum Indias cum Americam versus, morbum universalem reddiderunt cum nautæ deleteriz indolis aeris, quem in itinere hauriebant, præsertim circa lineam, & infirmioris alimentorum qualitatis causa, tum laboris ratione eo facile corripenterentur; animadverterunt iisdem de causis in obscuris carceribus detenti, & male alti, dum ibi diutius detinentur eodem morbo facile inquinari, ut similiter ægri, qui in nosocomiis minus idoneis diu persistunt.

Generice scorbutus pauperum morbus est, qui sordibus vescuntur aut morantur male testæ domi, injuriis aeris expositi, præsertim cum aliquo languoris morbo vexantur, qui magis sanguinem depauperat; nihilo tamen minus & divites interdum hoc morbo affici possunt, cum extrema valde affinitas sint; at id oppositis de causis accidere solet; quia isti plerumque eluones sunt, succosum nimis cibum assument, aut minutalgulis delectantur, parum se exercent, ut sanguini acrimoniæ vitium facile communicent.

Desideratur adversus Scorbutum remedium pollicentium, ut adversus luem veneream Mercurium experti sumus; non desunt tamen nonnulla remedia, quæ modo cito exhibeantur, atque diu, huic ægitudini valide medentur.

Minime putarem inter novos hujus epocæ morbos recenserî posse febrem purpuream, ab Italis *petechiale* nuncupatam, quia ipsi *petechie* nuncupant rubras papulas, aut purpureas non elevatas, a pulicis morbis haud abfimiles; quæ in hoc morbo (f) e cute erumpunt; me non latet Alexandrum Trajanum Petronium asseruisse hujus morbi originem anno circiter 1530. Italiam invasisse, quod Hieronymus (g) Tracastoreus Anno 1505. aut 1528. evenisse defendit; at modo parum versati erimus in Auctores veteres Medicos, innotebit exantemata aut efflorescentias rubras vel violaceas, quæ

(a) *Geograph. lib. VI. c. de finem*, ~ ~ ~ *H. Non. Natural. Lib. XV. Cap. 3.*

(b) *Prædicatorum, Lib. II.* (d) *Lib. de internis afflictiis.*

(c) *De re medica Cap. II.* (f) *Populi Angulus, de Scorbutis.*

(g) *Tractat. de morbo Gallico, Lib. VI. Cap. 4.*

(h) *De morbis contagiosis Lib. II. Cap. 6.*

quæ Itatorum *petechiæ* constituunt, & Gallorum rubras maculas, obvium febrium continentium, malignarum, præsertim, symptoma fuisse, quod interdum in iis febribus tamen deest; idcirco videtur, utrumque intellexisse potius novam intensiorem hujus symptomatis annunciare, quam novum morbum, ut ex ipsi verbis Fracastorei deducitur, qui asserit hujusmodi febres Majoribus etiam nostris cognitâs fuisse.

LEONELLUS DE VICTORIIS Faventinus in Bononiensi Liceo Medicinæ Professor, celebris interpretis libri IX. Rhazis, qui discessit ut putant Anno 1530. (a)

A. C.  
N.  
Ann.  
1535.

*Practica medicinalis* Lugduni 1554. ad calcem hujus operis in quo pertractare satagit de morbis omnibus, in LXXVII. capita librum dividendo, reperitur subsequens libellus

*De matriculibus affectibus compendiolum saluberrimum*

Ipsæ complectitur sex subsequentiâ Capita.

- I. *De suppressâ muliebri purgatione.*
- II. *De nimia expurgatione muliebri.*
- III. *De cursu sive fluxu humiditatum albarum, sive de cursu matricis secundum Avicennam.*
- IV. *De præfocatione matricis.*
- V. *De apostemate matricis.*
- VI. *De præcipitatione seu descensu matricis.*

Hujusmodi Auctor nedum perlegerat Medicos Græcos, nam in hoc opere re nudam Arabum doctrinam reperies, & editor Joannis Kufner scholia addidit nonnulla ejusdem sensus.

JASON PRATENSIS Zelandus qui floruit circa annum 1531., & non parum laudis in hac arte adeptus est.

A. C.  
N.  
Ann.  
1536.

*Libri duo de Uteris, in quibus Lector candidus opulentissimam simul ac lautissimam naturalium rerum, & historiæ suppellectilem invenies Antwerpæ 1531. in 4.*  
*Liber de arcenda sterilitate, & progignendis libris, doctus, & elegans. Ibidem 1531. in 4.*

LUDOVICUS BONACCIOLUS Florentinus. Extant duo libelli ab hoc Medico de Morbis mulierum exarati, quorum prior,

A. C.  
N.  
Ann.  
1516.

*De uteri, partiumque ejus consuetudine. Ejusdem, quoniam usu in absentibus etiam Venus citetur? Quod quale, undique prolificum semen, unde menstrua? &c. Argentinæ 1537. in 8.*

Alter,

*De conceptionis indicii, necnon maris femineique partus significatione. Ejusdem, quæ utero gravidis accidunt, Astruc de Morbis Mulierum.*

X

& co-

(a) In Epistola nomenclaturâ Libro præfata.

eorum medicina prognostica, causaeque effluxionum  
& abortuum, & proceritatis improceritatisque par-  
vum causae. Argentinae 1538. in 8.

A C. DIONYSIUS FONTANONUS Monspessulanus in ea Civitate medicus  
N. Professor vixit anno 1556. obiit post annum 1544.  
Ann. 1540.

*Practica Medica, sive de Morborum interiorum curatione  
Libri IV. In lucem dati a Johanne Renerio, qui sin-  
gulis capitum initiis causas, & signa morborum ex  
veteribus Classicis appinxit. Lugduni in 8. 1550.*

Fontanonus enim in eorum tertio libro 15. Capita habet de Morbis Mu-  
lierum agentia. Theoria, & praxis hujusmodi Auctoris Arabum stilum  
emulatur eo magis Gordonii, & Valefci de Taranta

A C. NICOLAUS ROCHEUS Medicus Gallus.  
N.  
Ann. 1540.

*De Morbis Mulierum curandis Liber, partim ex veterum  
Graecorum, Latinorum & Arabum monumentis, par-  
tim experientia propria confectus. Parisiis 1542. in 12.*

A C. LEONHARDUS FUSCHIUS, Rhetus, natus VVemdinge in Rhætia,  
N. anno (a) 1501. ad Doctoratus gradum promotus est Ingolstadii an. 1521.  
Ann. 1548. ubi paullo post, nempe anno 1526. Professoris Medici munere functus est.  
Inde electus Archiatus Marchionis Brandeburgici anno 1528. Tandem Tu-  
bingam vocatus est anno 1585. ubi Medicinam publice docuit ad annum  
1566. qui vita ultimus fuit.

Ipse medicinae institutionem in lucem edidit anno 1548., sub titulo se-  
quenti.

*De curandi ratione Libri VIII. causarum, signorumque ca-  
talogum breviter continentes, partim olim conscripti,  
& nunc postremum recogniti, multisque locis aucti. Ba-  
sileae 1548. in 8.*

Fuschius in III. Libro hujus pertractationis 12. capita praebet, quae de  
nonnullis Morbis Mulierum agunt, ut in Cap.

- LIII. De suppressis mensibus.
- LIV. De redundantibus mensibus.
- LV. De fluore muliebri.
- LV. De uteri suffocatione.
- LVI. De uteri proidentia.
- LVII. De mola.
- LIX. De inflammatione uteri.
- LX. De inflatione uteri.
- LXI. De uteri exulceratione.
- LXII. De phimosis uteri.
- LXIII. De sterilitate removenda.
- LIV. De Difficili partus.

Au-

(a) Ex oratione funebri Leonhardi Fuschii, Operib. Fuschii praefixa in edit. Franc. ann. 1604.

Auctor in suis exarandis operibus nitido stilo usus est, & optima methodo, sed obvias tantum notiones refert, neque præcellit Medicis qui circa hanc rem post eum plures Tractatus digesserunt.

Afferit (a) ea volumina publici juris fecisse, ut Arabum & Sectarum suorum libri abriperentur, ex Alemanorum Medicorum manibus, qui continuo deturbabantur, mordicus Arabum sententias defendendo. Nul- li, ait, vel pauci per universam nostram Germaniam reperti sunt Medici, qui non constanter eam quam ab Arabibus, ac recentioribus quibusdam Bar- baris certe, & ineptis admodum hominibus præscripta est in curandis mor- bis rationem secuti sint, ac ita mordicus etiam teneant, ut ne latum qui- dem unguem ab illa discesserint.

### JACOBUS RUEFF Chirurgus Tigurinus.

A. C.  
N.  
Ann.  
1554.

De conceptu & generatione hominis, & iis quæ circa hæc potissimum considerantur, Libri IV. Inserit quoque sui figure varia fœtus, primo in utero sit, deinde in par- tu, mox etiam matricis, & instrumentorum ad par- tum promovendum & extrahendum pertinentium, nec non postremo variorum monstrorum insuper Tiguri 1554. in 4.

JACOBUS SYLVIUS DE LA BOE Ambianus medicinæ Doctor in fa- cultate Montispeffulii, & Baccalaureus in Parisiensi, celebris Medicus fuit, qui interiit anno 1555. ætatis suæ 77. A. C.  
N.  
Ann.  
1554.

Inter cetera opera, quæ Renatus Moreau Medicinæ Doctor Facultatis Pa- risiensis collegit in unicum volumen in fol. 1630. Tractatus ejusdem Au- ctoris perlegitur, qui antea apparuit sub titulo.

De Mensibus mulierum, & hominis generatione Commenta- rius. Basileæ 1556. in 8.

JOANNIS FERNELIUS Clarimontii circa Ambianum Bellovacorum na- tus, medicinæ lauream accepit in facultate Parisiensi Anno 1528.; scriptis & praxi celeberrimus fuit; ab Henrico II. in Archiatrum electus munus illud gloriose sustinuit, obiit Lutetiz Mense Martii anno 1558. ætatis suæ 72., ut G. Plantius testatur, etiamsi Fasti hujus Facultatis revisa a Gui Patin 52. annos vix tantum ipsi tribuat, quod ostendit etiam Epita- fium, quod nepotes Patruj Avi tumulo apofuerunt ab eodem Patino con- sectum. Fernelius specialem Pathologiam composuit, in cujus tertio Libro pertractat De morbis partium quæ sub diaphragmate sunt, ibique tria Capita extant de Morbis Mulierum sub titulo A. C.  
N.  
Ann.  
1554.

- XV. Uteri affectus, causa, signa & curatio.
- XVI. Uteri symptomata, horumque causæ, prognostica, curatio.
- XVII. Sterilitatis causæ, prægnantium signa, symptomata, ho- rumque casus, indicationes, prognostica, curatio.

Morbi Mulierum in iis Capicibus explicantur juxta doctrinam Fernelii tempore receptam, ac cum exigua sint capita potius indicantur quam ex- planen-



planentur hujusmodi morbi ; Quod magis interest est, Fernelium (a) Galenum profectum esse cum fateatur uterum positum mutare haud posse ; at testatur in hysterico morbo crebre observasse matricem stomachum versus globuli ad instar ascendisse ; patet enim se decessisse, globulum hystericum, aut glomum ab intestinorum convulsiua crispatione ortum pro utero prædicando.

A C. BALDUINUS RONSSÆUS Gandavensis Medicus Goudanus.

N.  
Ann.  
1559.

*De hominis primordiis, hystericiſque affectibus, & infantilibus aliquot centones Lovanii 1559. in 8.*

Post illius mortem nonnullorum ejusdem operum codicem ediderunt in quo pertractatio extat Morborum Mulierum.

*Opuscula Medica. I. Epistolæ Medicinales. II. De Morbis Mulieribus. III. De Venatione Medica. IV. De Scorbuto. Accesserunt quidam aliorum celeberrimorum Medicorum de Scorbuto Tractatus Lugdani Batavorum, 1618. in 8.*

A C. JOANNES BAPTISTA MONTANUS Veronensis celeberrimus Professor Patavinus,

N.  
Ann.  
1555.

*De uteri affectibus.*

Hujusmodi Tractatus extat in secundo Tomo collectionis nonnullorum operum Montani cura excussa Hieronymi Donzellini in duplici Volum. in 8. Basileæ Anno 1558, at hujusmodi opus jam Parisiis Anno 1556. fuerat impressum in 16.

Habentur etiam decem Consilia ejusdem Auctoris circa Mulierum Morbos in eo Tractatu

*Consultationes de variorum morborum curationibus, auctæ per Joannem Cratonum Craſtheim, & impressæ Basileæ Anno 1583. in fol.*

A C. PETRUS de BAYRO Taurinensis diu illuc medicinam præcepit ; Anno 1468. natus est ; obiit Anno 1558. ætatis suæ 90.

N.  
Ann.  
1558.

*De medendis humani corporis morbis Encbiridion, vulgo Veni mecum dictum, cum adjuncto ejusdem Tractatu de Peste. Lugdani 1561. in 12.*

Hujusmodi libellus post Auctoris mortem per Theodorum Zvinger Medicum Rauracum publici juris factus est, synopsis præstat brevissimam juxta Arabum Medicorum sententiam formulis locupletatam, quæ passim in veteribus reperiuntur, in eo pauca de Mulierum Morbis dicuntur, vel obvia admodum.

A C. VICTORIUS TRINCAVELLIUS Venetus publicus Professor Patavinus, qui Montano anno 1551. successit, interiit anno 1568. ætatis suæ 77.

N.  
Ann.  
1560.

Vitæ

*Valloris Trincavelli omnia Opera in duos tomos digesta* Lugduni 1586. in fol.

In priori tomo medicinæ institutiones perlegi queunt sub titulo

*Prælectiones de ratione curandi omnes humani corporis affectus* in XII. Libros distinctæ.

Liber ex illis decimus primus 25. priora capita complectitur, quæ plerumque mulieres respiciunt juxta methodum illius ævi.

In secundo volumine tres libri reperiuntur, consultationum Medicarum, inter quas tres Morbos Mulierum ostendunt, eæque in collectionibus VVolphi, & Spacchii inferuntur.

GULIELMUS RONDELETIUS Montepellanus, Anno 1507. in lucem A. C. editus medicinam adeptus est Montpelii, ubi laurea 1537. condecoratus fuit, N. cathedram ascendit 1545., & Universitatis Cancellarius creatus An. 1556. Ann. obiit Montisrealis ad Albim Anno 1566., 59. vitæ suæ.

Præter plures hujus Auctoris diversi generis labores superest subsequens pertractatio;

*Curandi morbos Methodus, quæ vulgo Pratica dicitur, in tres libros distincta.* Lugduni 1583. in 8., & postea impressa alibi plurics.

In tertio libro Auctor de Morbis Mulierum sermonem iniiit a Cap. LX. ad LXXV.; quæ ipse ostendit parvi pendent, quare si hujusmodi opusculum aut venenorum historiam perferutemur facile deduci poterit magis ipsum in naturali historia, quam in medicina versatum fuisse.

Laurentius Joubert animadvertit ad calcem vitæ Rondeletii quatuor pertractationes reliquisse, quas typis mandare in animum habebat, quarum nonnullæ ad Mulierum Morbos pertinebant.

*De impedimentis generationis.*

*De effectibus gravidæ, parturientis & puerperæ.*

*De effectibus infantium & puerorum.*

*De morbis hereditariis.*

At hæc nondum impressa sunt.

THADÆUS DUNUS de Locarno Civitas primaria ejus comitatus.

A. C.  
N.  
Ann.  
1565.

*Muliebrium Morborum omnis generis remedia ex Dioscoride, Galeno, Plinio, Barbarisque, & Arabibus, collecta & disposita.* Argentorati 1565. in 8.

JOANNES VVIER Gravinensis in Ducatu Brabantii natus circa annum A. C. 1515. originem habuit Parisiis, medicinam profecit Aurelio ubi gradum (a) N. Doctoris sumpsit, iter fecit Cætam versus, & in Africam appulit, donec an. 1550. in Patriam restitit Gullielmus (b) Dux Clivæ ipsum in tutelam Astruch de Morbis Mulierum. X 3 rece-

(a) Melchior Adamus. *De viis Germanic. Medicinæ*, (b) Eodem ibid.

recepit, replevitque hujusmodi onus per annos 38. verum anno 1588. occubuit (a) ætatis 73.

*Observationum Medicorum rararum Libri II.* Basileæ, apud Oporinum, in 4. 1567.

In primo libro VVierus aliquas observationes refert *De utero clauso. De Hyeme. De colli Matricis phymate, ejusque curatione. De curatione gangræne pudendi*, quæ periculi merentur.

A C. JOANNES GUNTHERIUS Andernachus ad Rhenum ortus anno 1497.  
N. Parisiis Medicinam adeptus est, ibique Doctoratus gradum sumpsit, & post-  
Ann. quam diu moratus est Metam se recepit ultra Strasburgum ubi praxim medicam honorificentissime docebat, occubuit 1574. primæ vitæ 77.

*Gynæciorum commentariolus, de gravidarum, parturientium, puerperarum, & infantium cura.* Argentorati 1606. in 8.

Hic liber impressus fuit, ut patet, diu post Auctoris obitum, nam manuscriptum, quod incompletum supererat, a Joanne Georgio Scheuckio perfectum fuit.

A C. GIOVANNI MARINELLO Veneto.

N.  
Ann.

1574

*Le Medicine pertinenti alle infermità delle Donne, divise in tre Libri. Seconda impressione,* in Venezia in 12. 1574.

Hoc opus offert pertractationem Morborum Mulierum, indigestam tamen, & facilibus remediis refertissimam; prior editio apparuit anno 1563.

A C. AMBROSIVS PAREVS Lavallensis Cenomunus natus anno 1510. Lutetiz Chirurgi operam dedit, & in facultatem Chirurgorum receptus fuit  
N. Sancti Comi, primarius Chirurgus fuit Francisci II., Caroli IX., & Enrici  
Ann. III., magnum volumen digessit Gallico idiomate impressum Parisiis anno  
1573. 1565., omnem chirurgicam Provinciam respicit, pluresque alios medicinæ Tractatus, a juvenibus Medicis exaratos quos sui juris faciebat.

Præ ceteris opusculum *de hominis generatione* extat, in quo simul *de partu, & nonnullis Mulierum Morbis* pertractat.

Parvi opera latine vertit Jacobus Gulielmus, & typis mandavit Parisiis anno 1582. in fol.

A C. JOANNES LE BON Heteropolitanus, videlicet *de Autreville* in Campania apud *Chaumont* in Agro Bassiniaco.

N.  
Ann.

1577.

Se jactavit medicum Regis, & Cardinalis *de Guise* quod intelligi debet ni fallor Ludovici *de Lorene* Cardinalis *de Guise*, & Archiepiscopi Senonensis, ipse occubuit anno 1528.

Libellum exaravit sub titulo

*Therapeia puerperarum*, quem dicavit Joanni Liebaut de quo infra pag. 327. locuturi erimus; Parisiis illum impressit an. 1572. cum *Thejauro sanitatis.*  
Idem

(a) Thuanus, ad ann. 1588.

Idem opus postea typis mandarunt Basileæ in collectione Spachii anno 1589. verum etiam ad calcem operum Jacobi Hollieri reperitur.

**LUDOVICUS MERCATUS** Vallisoletanus Patrium licentiarum plurimum annorum professione (a) nobilitavit, inde a Filippo II. ad regiam accessit Hispaniarum Rege, cum decore munus gessit; eo defuncto simili officio vacavit apud Philippum III. ejusdem filium; demum annum agens 86. suprapressa ex (b) calculo urina acerbissimorum cruciatuum causa obivit.

A. C.  
N.  
Ann.  
1580.

*Gynæciorum sive de mulierum, virginum, viduarum, sterilitum, pregnantium, puerperarum, & nutricum morbis communibus Libri IV. Matriti 1594. in fol.*

Hujusmodi Tractatus inter præstantiores recensetur, qui circa hanc rem editi sint, etiamvis mordicus in eo Arabum doctrinam prosequatur.

**JOANNES LIEBAUT** Diviensis in Sequana Doctor Medicus, qui in facultatem Parisiensem ann. 1559. receptus est, præter opera medica quæ Vanderlinden, & Mercklin ei tribuunt, opusculum de Morbis Mulierum latine (c) scripsit, quod nondum inspicere mihi licuit, illud tamen Gallicè versum a Liebaut ipso fortasse, & impressum fuit sub titulo

A. C.  
N.  
Ann.  
1582.

*Trois Livres de la Santé, Fecondité, & Maladies des Femmes. A Paris 1582. in 12.*

Hoc depromptum est ab illo Marinelli vel saltem ejus Auctoris laborem amulatur, quod minime animadvertit Liebaut, videbimus infra quid de eo censeat Lazarus Pè.

**HIERONYMUS MERCURIALIS** Forolivenfis natus anno 1530. in Gymnasio Patavino medicinæ Professor creatus fuit \* anno 1567., successor Antonii Fracantiani, & anno 1569. scamnum Victorii Trincavelli in eodem Liceo occupavit, donec 1573. in Bononienfem, & anno 1599. e Bononiensi in Pisanum (d) evocatus est, tandem Forolivii in Patria obiit anno 1606. ætatis suæ 76.

A. C.  
N.  
Ann.  
1582.

*De Morbis Mulieribus prælectiones a Casparo Baubino editæ. Basileæ 1582. in 8.*

Hujusmodi Tractatus præstantissimus est, a Professore enim progenitus fuit doctrina clarissimus, hujus ævi sane decus.

**MARTINUS AKAKIA** Parisinus filius alterius Martini Akakia Catalauni, facultatis medicæ, quæ Lutetiæ est an. 1569. Doctor, verum Collegii Rea-  
lis anno 1574. Professor creatus fuit, occubuit anno 1588., vitæ suæ 49.;  
opus exaravit titulo *De Morbis Muliebribus* a morte impressum anno 1597.  
in Collectione Israelii Spachii

A. C.  
N.  
Ann.  
1581.

**FELIX PLATERUS** Rauracus ab anno 1536. originemagnoscit, medicinam studuit Monspefulii ubi Doctor renunciatus anno 1557. in Patriam  
redux medicinam gloriose exercuit, & in ea Civitate publicus universi-  
tatis

A. C.  
N.  
Ann.  
1581.

X 4

(a) Nicolaus Antonio, in *Biblioth. Hispana*.

(b) Castellanus, in *Patris illustrium Medicorum*.

(c) Idem testatur Intro pertractationis de qua infra locuturi erimus, et dubito ne hujusmodi versio unquam apparuerit.

(d) Mercklinus in *Lindensio renovato*.

tatis Professor electus anno 1571. per 43. annos munus implevit donec anno 1614. occubuit ætatis 78.

*De mulierum partibus generationi dicatis, Tabula iconibus illustrata, structuram usumque explicantes. Additis observationibus, & curationibus aliquot harum partium affectuum.*

Ambo ex dissertationes ab Israëlo Spachio in frontem collectionis suæ expositæ fuerunt, prior decrepta est ab Anatomico opere, quod Platerus anno 1583. Basileæ edidit in fol. sub titulo sequenti,

*De partium corporis humani structura & usu*

Altera ab observationibus Plateri deprompta est, quæ nondum excussa erat anno 1597., quando Spachii collectio exiit, quæ tamen apparuit anno 1614. Basileæ in 8.

A. C. MAURITIUS CORDEUS Remus Doctor, & Præf. facultatis medicinæ Parisiensis anno 1559.  
N.  
Ann.  
1584.

*Hippocratis Cei, Medicorum Principis, Libri prioris, de Morbis Mulierum, interpretatio, & explicatio. Paris. 1585. in fol.*

In hoc opere Hippocratis doctrina in plures articulos dividitur, quorum singulos subsequitur Cordæi Commentarium, sedulo elaboratum; nulum tamen ordinem servat Auctor Hippocratis rubricam necessario prosequendo, quæ nullam methodum præferret.

In illo habetur loculenta (a) hydrops cum hydatidibus observatio, quæ prima est circa hunc morbum clara, & distincta; animadversione digna est admiratio Cordæi, & spectatorum suorum, quæ ipse narrat caput fuisse cum primum hujusmodi hydropem observaverit.

A. C. ALBERTINUS BOITONUS Patavinus in ea civitate medicinam docuit  
N. anno 1555. obiit anno 1596.  
Ann.  
1585.

*De Morbis Muliebribus Liber. Patavii 1585. in 4.*

*De Morbis Muliebribus Liber secundus. Venetiis 1588. in 4.*

A. C. GASPAR VVOLPHIUS Tigurinus a Corrado Gesnero jussus edidit collectionem Auctorum, qui de Morbis Mulierum pertractarunt, munus sumptus ipse, & implevit sub titulo sequenti postquam rudimenta collectionis ab ipso Gesnero accepit.

*Gynaecorum sive de Mulierum affectibus Commentarij, Græcorum, Latinorum, Barbarorum, tam olim, & nunc recens editorum, in tres tomos digesti, & necessariis passim imaginibus illustrati. Basileæ 1586. in 4.*

Primus Tomus continet

I. Fe-

- I. *Felin Platerus.*
- II. *Moschionus.*
- III. *Cleopatra, Moschionus Priscianus simul comparati.*
- IV. *Trotula, cui Editor Eros nomen tribuit superius recensiti.*
- V. *Nicolaus Rocheus.*
- VI. *Ludovicus Bonacciolus.*
- VII. *Jacobus Sylvius.*
- VIII. *Joannis Rueff.*

In secundo tomo inveniuntur.

- I. *Hieronymus Mercurialis.*
- II. *Joannes Baptista Montanus.*
- III. *Victor Trincavellus.*
- IV. *Albertinus Bottonus.*
- V. *Joannis Le Bon.*
- VI. *Ambrosius Pareus.*
- VII. *Albucasis Arabes.*
- VIII. *Franciscus Roussel quem Latine vertit Gaspar Baubinus Ravennatus.*
- IX. *Joannes Albofusus de Lithopedio Senonense.*

Tandem tertius tantum continet Commentarium Maurici Cordel in primum Librum Hippocratis de *Mulieribus*.

Idem VVolphius eddidit viginti ante annos prima sui ætate subsequenter libellum.

*Viaticum novum de omnium fere particularium morborum curatione, Liber Authoris innominati quidem, sed longe doctissimi, vere aureus & incomparabilis, nunc primum in lucem editus per Casparem VVolphiium, Medicum, Phisicum Tigurinum. Tigurii 1565. in 12.*

VVolphius in præfatione quæ hujusmodi opusculum antecedit narrat, quod celebriores Academiæ Europæ peragrande ad medicinam hac ratione ediscendam in vetustiori bibliotheca manuscriptum reperisse, quod postquam paullisper cunctatus sit, tamen publicis juris facere fancivit.

Hujusmodi opus morbos omnes in 68. Capita complectitur, quorum sex totidem *Mulierum Morbos* ostendunt, Auctor Arabum doctrinam profectus est, verum paullo magis quam incompletam refert formularum succellum confectionem; medicina minime frustrata esset, modo VVolphius editionem suppliceret.

**HIERONIMUS CAPIVACIUS** Patavinus praxis Professor anno 1552. A C. electus, verum theoreticam docuit anno 1651. donec 1589. occubuit. N. Ann. 1556.

*Medicina pratica, sive Methodus cognoscendorum, & curandorum omnium humani corporis affectionum. Job. Hartmanni Beyerii studio Lib. VII. interbina. Francfurti 1594. in 4.*

Ex

Ex septem libris, qui opusculum replent, quartus Mulierum Morbis dicitur, hic, ut operis reliquum Copivacius in Patavinis Scholiis in discipulorum gratia exaravit, ut constat etiam ab altera editione Lugdunensi anni 1595. in 8.

Prior cura Joannis Arthemani Beyerii excussus fuit post mortem Auctoris. Joannes Crato, a Crapheim Uratislaviensis Medicus Primarius Imperatorum Ferdinandi I. Maximiliani II. & Rodolphi II. asserit (a) praxim Copivacii pervolvendo detegisse ejusdem priorē partem ab Argentiero decerptam fuisse, quod ostendit hujus operis vetustiorē editionem adfuisse ea quā ostendimus, nam Crato obiit anno 1585., ut hanc perlegere minime posset.

De cetero, quod Crato Copivacio tribuit ceteris Professoribus valde commune est.

A C. PETRUS FORESTUS Alcmarianus natus (b) anno 1522. postquam Doctoratus gradus in Bononiensi Liceo insignitus fuit, medicinam exercuit per omnen Galliam Lutheticæ primum, verum Vastinii dein Pithivierii postea Alcmariæ venit, & Delphi, denique anno 1575. Lugduni Battavorum Medicinæ Professor advocatus fuit in ea puperrima Universitate, occubuit tandem Alcmariæ anno 1597., ætatis suæ. 75.

*Observationum & Curationum Medicinalium Libri XXXII.*  
in fol. Lugdni Batav.; diversis anni.

Liber XXVIII. hujus collectionis agit de *Mulierum Morbis & affectibus* in 82. Capita distinctus, qui etiam si inquinetur Arabum theoria, nonnullas tamen observationes præstat proficias.

A G. JOANNES GEORGIUS SCHENKIUS Friburgensis Medicus celebris; N. & laboriosus medicinam Tubingæ adeptus est ubi Doctoratus ordine insignitus anno 1554. postea Friburgi inter Patrios Lares in Brisgovix Ducatu restitutus est; discessit tandem anno 1598., vitæ suæ 38.

*Pinax Auctorum in re medica, Græcorum, Latinorum præscorum, Arabum, Latino-Barbarorum, Latinorum recentium, tum & peregrinis libris cluentium, extantium, manuscriptorum promissorum vel desideratorum, qui Gynæcia, sive muliebria pleno argumento, sive ex instituto scriptis excoluerunt & illustrarunt.*  
Argent. 1606. in 8.

A C. ALESSANDER MASSARIAS Vicentius (c) postquam medicinæ Patavii N. incubuit, ibique gradum Doctoris accepit in patriam redux artem exercuit, 1595. ubi moratus est 25. annos, verum Venetiis anno 1578. advocatus summo cum decore artem implevit per novem annorum spatium, tandem S. C. primarius Professor Patavinus anno 1587. declaratus (d) fuit, Hieronymi Mer-

(a) Epistola 118. inter Epistolas a Laurentio Scholijs collectas.

(b) Joan. Meurlius in *Athenis Batavorum Lib. XI.*

(c) Cymmenus Papadopoliti, in *Histor. Gymnasii Patavini.*

(d) Petrus Callicanus, in *Vitis illustrium Medicorum.*

Mercurialis vices gerens, qui Bononiæ professor erat, obiit (a) decima septima die Octobris anno 1598. trans 70. ætatis suæ.

Perlegit Patavi Opusculum sub titulo

*Prælectiones de Morbis Mulierum, conceptus, & partus, editæ in gratiam Medicorum Medicinæ, ut quasi prodromum haberent omnium totius corporis humanis morborum humanis edendæ.*

Opusculum a morte Auctoris Lipsiæ excussum fuit apud Abramum Lambertum in 8. anno 1600.

Eum pervolvere nedum mihi contigit, partem tamen praxis medicæ ejusdem Auctoris constituere censeo quæ edita fuit anno 1601. Francfurti in 4. apud Nicolaum Basileum, & post illud tempus alibi pluries recessa.

Hujus praxis in VII. libros distinguitur, quorum qui tertium subsequitur de Morbis Mulierum differt in tria Capita distinctus, ubi tres, & decem Mulierum Morbis explanantur.

Quam ipse docuit artem stricte Galenum redolebat, concinno tamen stillo, & dicendi claritate Mafsarías pollebat, ut tunc temporis inter selectiores Medicos recenseri merito deberet.

Nostrum erit animadvertere de hysterico morbo, aut uterino furore ipsum nec verbum fecisse.

ISRAEL SPACHIUS Argentinus Medicus, & Professor illius Civitatis A. C. novum edidit Auctorum codicem qui circa Morbos Mulierum scripserunt, vel melius dicam tieravit VVolphi collectionem sub titulo sequenti. N.  
Ann.  
1597.

*Gynæcorum, sive de mulierum tum communibus, tum gravidarum, parientium, & puerperarum affectibus, & morbis, Libri Græcorum, Arabum, Latinorum, veterum, & recentium, quotquot extant, partim nunc primum editi, partim denuo recogniti, emendati, necessariis imaginibus exornati, & optimorum Scriptorum auctoritatibus illustrati. Argentinæ, 1597. in fol.*

Hujusmodi collectio præter VVolphianos scriptores Martinum Akakia nondum impressum, & Ludovicum Mercatum superius indicatum ostendit.

GULIELMUS BALLONIUS Parisinus anno 1538. natus (b) postquam per aliquot temporis spatium Humanitatem & Philosophiam in universitate docuit quæ Lutetiæ est, medicinæ studio incubuit anno 1586. verum laurea decoratus fuit 1570. & postquam honorificentissime artem exercuit, occubuit anno 1616. ætatis 78. A. C.  
Ann.  
1600.

*De Virginum, & Mulierum Morbis Liber, in quo multa ad mentem Hippocratis explicantur, quæ & ad cognoscendum, & ad medendum pertinebunt, Parisiis 1643. in 4.*

Hujus

(a) Hist. Gymn. Patavini Tom. I. Lib. III. Sect. 2. Cap. 20. n. XCVII.

(b) Ex vita Ballonii a Renato Moreo scripta, & operibus Ballonii præfixa.



Hujusmodi Tractatus æque ac cetera Ballonii opera a morte Auctoris impressus fuit. XI Capita complectitur, quorum V. totidem Mulierum Morbos explanat, at diutina methodo usus est, nam ut mihi mos est hujusmodi auctor fufius materias pervolvit, ipse tamen inconcinno ordine scribit, suasque elucubrations Græcis verbis nimis infarcit, verum Arabum praxim valde æmuletur.

A. C. RODRICUS A CASTRO Lusitanus postquam medicinæ causa diu Salmancie moratus est, ab hac vita discessit Hamburgi Alemanorum, quare 1603. spicor fuisse Judæum; circa finem sæculi XVI. vitam gessit.

*De universa muliebrum morborum medicina, novo, & antea a nemine tentato ordine Opus absolutissimum. Hamburgi 1604. in fol.*

A. C. HERCULES SAXONIA Patavinus natus anno 1551. Doctor in Patriam renunciatus medicinam per annum publice docuit, at munere quo fungebatur Senatus Veneti decreto sublato Venetiis se recipit, ibique medicinam facitendo ad summam famæ gloriam grassatus est, usque dum Hieronymo Capiaccio successor post octo annos designatus fuit videlicet 1590., quod onus ad mortem usque gloriose sustinuit, quæ anno 1607. evenit ætatis 56.

Petrus Uffenboch Doctor Medicus ejusdem affecta Francofurti eddidit Saxonie Opera anno 1603. sub titulo

*Panthæum Medicinæ selectum, sive Medicinæ prædica templum*

Opus XI. Libros exponit quorum quartus Tractatum complectitur morborum in 30. Capita distinctus juxta Galeni Methodum eo tempore receptam.

Nonnulli Bibliographi specialem de *Morbis Mulierum*. pertrastationem ei tribuunt, at hujusmodi tractatus IV. Liber est sive *Panthæum* superius indicatum.

A. C. EMILIUS CAMPOLONGUS Patavinus anno 1550. natus in eo Gymnasio Theoreticam medicinam præcepit primum, verum praxim docuit, videlicet ab anno 1578. ad annum 1604. in quo (a) mortuus est, ætatis suæ 54.

*De Vermibus: De uteri affectibus: Deque morbis Cutaneis Tractatus præstantissimi. Extant cum Hieronymi Fabricii ab Aquapendente Medicina practica. Parisiis 1634. in 4.*

A. C. JOANNES HUCHER Bellovacus Professor Regius in facultate Monspeliensi anno 1574., Decanus anno 1580. Cancellarius 1583. obiit 1603.

*De sterilitate utriusque sexus, Opus in quatuor Libros distinctum. Genevæ, 1609. in 8.*

Opus prolixum est pluresque sententias complectitur obsoletas, at non parvi

---

(a) Comnenus Papadopoli, in *Historia Gymnasii Patavini*, Tom. II. pag. 340.

parvi faciendum videtur, ostenditque Auctoris doctrinam, & contemptum adversus maleficia, quæ tunc temporis usuveniebant.

JOANNES VARANDEUS Nemaucienſis, ad Doctorem gradum promotus anno 1587. in Academia Montepulana, Professor Regius ibidem renunciatus fuit anno 1597. Ad Decanatum pervenit anno 1609. Obiit anno 1617.

*De morbis mulierum Libri III., in lucem editi, opera Romani a Costa. Montepulsi 1620. in 8.*

At quod mirum est opusculum Lugduni in lucem apparuit anno 1619. sub titulo *Opera* &c. Petri Milei Doctoris Medici, quod ostendit ipsum publici juris factum fuisse a Discipulis Varandei, qui ex propriis manuscriptis illud sollicitè ediderunt.

Id claritate & methodo donatur, theoria ea est, quæ tunc temporis obvia erat, at praxis nimis quam par est Arabum polipharmacia inquinatur.

JOANNES HEURNIUS Ultrajectensis natus anno 1543. postquam humanas litteras a Battavis adeptus est, Parisiis medicinæ studuit per tres subsequentes annos sub disciplina celebris Ludovici Dureti, verum in Italiam appulsus postquam nonnihil Patavii moratus est Doctor Papiæ designatus fuit.

In battaviâ redux Ultrajecti aliquantisper cunctatus est, verum Professor advocatus Lugdunum Battav. profectus est an. 1581., ubi occubuit an. 1601.

Eiusdem opera cura Ottonis Heurnii filii Lugduni Battav. impressa sunt anno 1609. in 4. & Lugduni 1658. in fol. in hac collectione specialis tractatus habetur.

*De morbis mulierum*, quem filius sejunctim edidit pariter Lugd. Batt. anno 1607., at brevis est labor, & per pauca refert.

LAZARUS PE' Gallus, in Patrio idiomate Marinelli opus vertit, Italique auctorem laudibus extollit, eumque edidit sub titulo sequenti

*Les Maladies des Femmes, & remèdes d'yelles en trois Livres de M. Jean Marinello, docteur Medecin Italien, traduits en François par M. Jean Liebaux, Medecin à Paris, en cette dernière édition, revus, corrigés, & augmentés par Lazare Pe, à Paris 1609. in 12.*

In fine præfationis Lazarus Pè de Joanne Liebaux sermonem init, qui ediderat idem circiter opus 24. ante annos etenim " Joannis Liebaux hoc librum sibi tribuit, nihilominus utrumque simul comparando reperi materiam penitus a Marinello desumpsisse, ordinem tantum obvertendo, pauca proprio Marte addendo, quæ magis furtum adumbrarent, at insistit ipse, necessum est famam vero auctori restituere, commendando aliqua ex parte Liebaux; qui opus nonnihil amplificavit, & in nostra lingua tradidit " postrema hæc verba suadent Liebaux minime librum illud latine composuisse, ut nos superius supposuimus.

HERMANUS CORBEUS Francofurtinus

Gyna-

A. C.  
N.  
Ann.  
1616.

*Gynæceum, sive de cognoscendis, præcavendis, curandisque præcipuis mulierum affectibus Libri II. quorum prima affectus omnibus mulieribus communes; posterior qui cuique sorti sunt proprii, proponit. Francofurti 1620. in 8.*

A C. N. **GREGORIUS HORSTIUS** (a) Targovienfis natus anno 1578. postquam medicinz incubuit plures Academias Germanicas peragrans Basileæ Doctor renunciatus fuit 1606. & paullo post medicinz Professor electus fuit Gifse; verum a Republica Ulmiensi anno 1622. advocatus, ut medicinam faceret, Præses fuit Collegii Medicorum illius Civitatis, occubuit anno 1636. ætatis suæ 58.

Inter plures Libros quos Horstius publicavit libellum *Observationum medicinalium in 4. edidit.*

*Observationum Medicinalium singularium Libri IV. posteriores. I. De morbis mulierum, II. De Morbis contagiosis & malignis. III. De doloribus partium externalium. IV. De Chirurgicis quibusdam Casibus. Ulmæ 1628. in 4.*

Observationes quæ mulieres ægrotas respiciunt LL. sunt plures earum perlegi merentur, Auctor nonnullos Medicos Alemanos indicat, qui eas communicarunt, hujusmodi sunt Joannes Bilger Medicus Campodunus, Jacobus Eckcold Medicus Meminganus, & Joannes Cristophorus Eifemnenger Heilbrunus.

Extat ejusdem Auctoris Centuria problematum circa curationem diversorum morborum in Decades distributorum, quarum nona ad mulierum morbos pertinet, ubi præstantiores quæstiones perscrutantur, & satis doctè explanantur.

A C. N. **MELCHIOR SEBIZIUS** Argentinus natus an. 1578. plures Academias frequentavit postquam quod Basileæ Doctoris gradum accepit anno 1610., deinde Professor Argentinus renunciatus fuit anno 1612., quod onus per annos 62. sustinuit, obiit vero anno 1674. ætatis anno 95.

*Historia mirabilis de femina quadam Argentoratensi, quæ ventrem supra modum tumidum atque distentum ultra decennium gestavit; & tum hydropæ uterino, tum molis carnosæ septuaginta sex, tum ea hydropis specie confecta fuit, quæ Ascites dicitur, fideliter relata, variationibus explicata & commentario de hydropæ uterino, molarumque forma, materia, efficiente, atque fine, aucta. Argentinz, 1627. in 4.*

Suspicio sexcentum hujusmodi & ultra molas carneas, quas Sebizius observavit steatomata tantum uteri fuisse.

A C. N. **FRANCISCUS RANCHINUS** Monspeffulanus in ea facultate medicinz Doctor renunciatus circa annum 1592. Professore electus 1605., successit Jo-

(a) In cratione summi, qm Joh. Dan. Dietericus Gregorio Horstio parantur.

Joanni Saporta obito, & Cancellarius indefectus anno 1612. loco Andreæ du Laurent, obiit anno 1642.

*Opuscula medica, utili jucundaque verum varietate referta, publici juris facta cura & studio Henrici Gras Doctoris Medici Montpellienfis, Lugduni 1627. in 4.*

In ea collectione Tractatus adest

*De Morbis Virginum* in tres sectiones distinctus ubi Ranchinus plures questionibus agit quæ mulierum morbos respiciunt, nulla tamen novitatem redolet.

JOANNES PREVOSTUS natus an. 1585. in Dioecesi Basiliensi, gradum A. C. Doctoris accepit Patavii anno 1607, ibique Professor renunciatus fuit an. N. 1613. donec 1616. plantarum viridarium ei commendarunt, contagio obiit Ann. 1631.

*De morboſis uteri paſſionibus Tractatio Patavii 1669. in 8.*

Hujusmodi opusculum ut & cetera illius opera diu post Auctoris mortem excussa sunt.

MICHAEL DURINGIUS Uratislavienſis.

A. C.  
N.  
Ann.

*Epistola de nova, rara, & Admiranda Hernie uterine, atque hanc juſto tempore ſubſequentis partus Cæſarei Hiſtoria*

Ipſe hujusmodi Hiſtoriam communicavit Gullielmo Fabricio Hildano, qui eam in ſuis ſcriptis inferuit.

CLAUDIUS DEODATUS

A. C.  
N.  
Ann.  
1630.

*De admirabili quodam affectu uterino Obſervatio.*

Eidem Hildano ab Auctore communicata, & ab hoc in ſuis Obſervationibus inſerta, quem admirabilem morbum falſum fuiſſe ſyrrham fuiſſe, aut ſarcoma uteri hand dubito.

GULLIELMUS FABRICIUS Hildanus Helvetus ſub Hildani nomine A. C. præſertim cognoscitur, quod Patriam designat ubi Chirurgiam glorioſe N. 1560. natus eſt primum Luſanæ, verum Bernæ tranſiit fecit ubi ipſe fama increbuit, denique obiit 1634. ætatis ſue 74. 1630.

Succeſſive eddidit primo Centurias ſex Obſervationum, quas poſt mortem congeſſerunt & Lugduni typis mandarunt anno 1641. in 4., inter illas obſervationes plures de Morbis Mulierum agunt, videlicet de abortu, ſortu emortuo, partu, & ceteris præcipuis uteri morbis, eaſque legere non contemno.

Inter eas nonnullæ obſervationes reperiuntur quas ei communicarunt Medici ſuperius recenſiti.

DANIEL SENERTUS Uratislavienſis in Sileſia natus anno 1571. Doctoris gradum Vittberg aſſecutus eſt anno 1601. ibidem ſubſequenti anno Profeſſorium munus ſuſcepit, obiit anno 1637. ætatis 65.

A. C.  
N.  
Ann.  
1631.

Ejus-

Ejusdem opera post mortem collecta Venetiis in triplici volumine anno 1640. in fol. impressa sunt, verum pluries recussa cum additamentis, attamen præstantior est opus morborum localium sub titulo *De Praxi Medica* in V. Libros distributa, singulos in sectiones distinctos.

In quarto enim hujus operis libro fufius de omnibus Morbis Mulierum pertractat, concinne, solide, & methodice Galenum omnino profecutus est, idcirco incassum posteriores notiones quærenus; at præcipua medicinarum fulcimenta solide innixa sunt, & morbi, aut differentiarum exacte distribuntur cum practiciis indicationibus satis clare enunciatis; idem observatur in ceteris hujus medici operibus, quæ totidem codices sunt, quibus Medicus minime defici potest; plerumque enim, veræ medicinarum uberiores notiones complectitur, quam nuperrimi libelli qui tot jactant.

A C. N. Ann. 1594. ZACUTUS Lusitanus Ullisiponenfis natus est 1575-Philosophiæ, & medicinarum studuit in Academiis Salmaticensi, & Conimbricensi, ac anno 1594. Doctoratus gradum assecutus est Sagunziæ in nova Castilia.

Inde per annos triginta continuos medicinam cum laude secit Ullisiponæ; at circa annum 1624. cum Regis Edicto, qui tunc Lusitaniam ditione premebat, Hebræorum quotquot aderant stirpes incolatu regni fuerint interdicta, Zacutus, qui Judæus erat, in Belgium concedere coactus fuit, ubi Praxim Medicam exercuit, maxime Amstelædami & Hagæ Comitum. Obiit Amstelædami anno 1642. ætatis 67.

Scriptis Opus minime contemnendum

*De Medicorum Principum Historia* a Veteribus, & nuperrimis Scriptoribus excerpta duobus voluminibus in fol. comprehensa, & in Libros VI. distributa, quos notis illustravit.

Alter opus adest sub titulo

*Praxis Historiarum* &c. Synopsis est curationum cuique morbo idonearum, de quibus Zacutus in præcedenti opere locutus erat, ea in quinque Libros distribuitur.

Postremum opus appellatur *Praxis medica admiranda*, innumeras observationes speciales complectitur, tum circa morbos, cum remedia in III. Libros distinctas.

Zacutus de Morbis Mulierum in singulo opere agit in priori, in III. Libro 17. priores Observationes de hac re pertractant, in secundo, iis morbis omnem III. Librum dicat, qui 23. Capita complectitur, tandem in tertio 25. Observationes II. Libri eo pariter collineant.

Inter eas diversas observationes quas Zacutus refert, plures admiratione dignas esse fateor, verum doctrina, & eruditione locupletatas, dissertationum ergo, quæ eas comitantur, ut sane pervolvi mereantur; at, omnia credere cunctabor, ipsaque tueri renuam.

A C. N. Ann. 1640. NICOLAUS FONTANUS Amstelædamensis.

*Syntagma Medicum de Morbis Mulierum* in IV. Tomos distinctum. Amstelædami 1645. in 12.

A C. N. Ann. 1640. LAZARUS RIVERIUS Monspeffulanus Doctoris gradum sumpsit anno 1611.

1611. & in eâ Facultate, loco Laurentii Coudini Professor renunciatus fuit an. 1622. susceptumque onus summo cum decore implevit usque ad annum 1655. ætatis suæ 66. & ultimum.

Hujusmodi Professor institutiones medicas digessit, quæ tunc temporis magni existimabantur, at ejusdem præcipuum opus est morborum curriculum eo titulo insignitum *Praxis Medica*, quæ simplicem (a) praxim præstat theoria denudatam, quam in scholis dictavit, pluriesque edidit Gallia, & Belgio; cum experti sint Operis felicem eventum, addiderunt theoriam illius ævi notionibus accommodatam, ipsumque opus tali pacto Parisiis typis mandarunt in 8. anno 1640., quod postea crebre recusserunt.

In hoc opere de omnibus corporis morbis agitur in XVII. Libros, XV. omnis mulieribus ægrotantibus dicatur, ibique clare earum morbi explicentur, & pro iis saluberrima praxis proponitur, ut prudens Medicus hoc solo auxilio Medicinam facere valeat.

Non prætereundum tamen est Riverium Senerti plerumque apographum fuisse, ut integras paginas subdole interdum transcriberet.

De cetero certum est Bernardinum Christinum Corsum, qui Monspeffulii Riverii Discipulus fuit, verum Divi Francisci abitum sumpsit, sed a Medica praxi non destitit postquam nonnulla arcana Chémica compilavit, ea Venetiis imprimere aulus est Riverii nomine anno 1676. in 4., postquamquod operibus ejusdem Auctoris eadem addiderunt; at D. Joannes Chatelain qui obiit postea Decanus Facultatis Monspeffulii olim Riverii discipulus, asserit Christinum fraudolenter ea arcana Riverio tribuisse.

(a) In præfat. Editionis anni 1651. præfixa.

## FINIS TERTIÆ EPOCHÆ.

*Abusus de Morbis Mulierum.*

Y

QUAR.

## QUARTA EPOCHA.

Sanguinis circulatio quæ jam antea innotescere debuisset anno tantum 1628. Gullielmus Harveus Medicus Anglus, in suo tractatu *Europæis* ipsam annuntiavit sub eo titulo *Exercitatio anatomica de motu cordis, & sanguinis in animalibus*, Francofurti impresso in 4.; ea de causa auctori hujusmodi celeberrimum inventum tribuunt, at intimius rem percrutendo haud facile est ipsum revera inventorem fuisse defendere.

Etenim anno 1553. Michael Servetus Aragonensis de Villanueva Medicus celebris tum pro religionis erroribus quibus inquinabatur, cum pro supplicio quod hac de causa Januæ passus est, docuit in suo opere eodem anno (a) Viennæ Allobrogum impresso, sanguinem per venam arteriosam (nempe arteriam pulmonalem) dexteri ventriculi cordis in pulmonem irrumpere; verum ramificationes ejusdem venæ cruorem in ramos alterius arteriæ venosæ (venæ pulmonalis) effundere cum quibus communicant; tandem ab hac arteria impelli in sinistrum ventriculum diastolis tempore, a quo per omnes corporis arterias distribuebatur.

Paulo post Rehalus Columbus Cremonensis quæ Vessalius in Patavino Liceo successit; verum in Pisano Anatomiam docuit; tandem Romæ Medicinam exercuit, Venetiis Anatomiam opus anno 1559. edidit (b) in fol. ubi idem ostendit, atque Serveti Doctrinam (c) circa sanguinis circulationem profecutus est, imo eam ab Serveto ipsum desumpsisse Jacobus Douglas Anglus putavit; at eo præexcellit cum accuratius hæc partium usum ostendat, verum Valvulas sigmoideas arteriarum, & tricuspides venarum describat.

Novum inventum statim admirationis animos replevit; Petrus enim Monavius Uratislaviensis postea Medicus Imperatoris Rodolphi II. scripsit (d) anno 1576. Joanni Cratono tunc Maximiliani II. Imperatoris Archiatro, se Heilderbergæ commorantem intellexisse Italum quemdam Pigafettam dictum Falloppii discipulum qui publice ostendebat Hispanum (Servetum nempe) invenisse sanguinem ex dextero cordis ventriculo exeuntem per venam arteriosam in pulmonem irrumpere; atque ab eo in sinistram ventriculum revelli.

Anno vero 1574. Jeronimus Ab-aqua-pendente Falloppii successor in Chirurgiæ Cathedra Patavinæ Universitatis, qui postea ibidem Anatomiam docuit, reperit valvulas venarum quas in speciali tractatu *de venarum officio* Patavii impresso in fol. anno 1603. descripsit. Videbatur post hoc inventum gradum tantum deesse ad sanguinis circulationem plane cognoscendam, cum hujusmodi valvulæ ipsam satis indicarent, at id Aqua-pendente non obtinuit.

Primum decus enim Andreæ Celsipino reservabatur qui postquam diu Medicinam legit in Pisani Scholis, verum Archiater creatus fuit Clementis

(a) Sub titulo *Christianismi reformationis* cujus exemplaria cum ipso auctore combusta fuerant, ut unum vel duo sint reliqua tantum.

Verba Serveti ubi circulationem docet a Michaele Rotheo excerpta sunt in *Bibliothèque Anglaise* Tom. I. par . . . Vivron *Reflexions on ancient and modern learning*; & per Douglas in *Bibliographie in verbo Servetus* pag. 104.

(b) Sub titulo *de re Anatomia* Lib. XV.

(c) Lib. VIII. *de corde, & arteriis*.

(d) Hæc Epistola reperitur, inter *consilia & epistolas Petri Monavi* in collectione Laurentii Scholæ impressa Francofurti in fol. 1598.

tis VIII. ad trutinam revocavit jacta hujus juveni fundamenta quæ in continam formam digessit atque clare ostendit sanguinis circulationem in suo Opere (a) Venetiis impresso anno 1593. ubi asserit (b) sanguinem e ventriculo dextero per venosam arteriam in pulmonem vehi, atque per venam arteriosam in sinistram ventriculum revehi; verum ipsum per Aortam arteriam partibus distributum per venam Cavam in dexterum ventriculum refluxu, ideoque dari in utroque ventriculo venam ad asserendum, & arteriam ad repellendum sanguinem; qua de causa in dextero ventriculo Arteriam appellari quod veteres venam arteriosam nuncupabant; & venam in sinistro ventriculo quod illi arteriam venosam dicebant; Tandem ipse addidit accuratam valvularum arteriarum, atque venarum cordis descriptionem, usumque earum declaravit; uno verbo circulationem explicavit paritione, eademque verba adhibuit quæ recentioribus usitiora sunt; at quod mirum est indicat venas supra vinculum inflari, & hac observatione tuetur motum quem sanguini circulanti adtribuit.

His expositis haud dubito quem ancipitem herere posse Servetum, & Columbum primos, invenisse sanguinis circulationem; minime tamen contendere possumus Celsipinum accuratius iis illam descripsisse; eamque cadaverum, & animalium viventium sectionibus confirmasse ut sub iis verbis ostendit quæ & dissectione apparent; Celsipinus ergo potissimum hujus inventi honorem sibi promeritus est, eo magis cum verisimile sit Harveum qui initio sæculi XVII. Patavii quinque annos moratus est, ubi Doctoris gradum accepit, ibi hanc notionem addidisse, quam plures post annos publici juris fecit, quamvis penitus non ignoraretur.

Idcirco D. Douglas quamvis Anglus & Harvei contreraneus facietur (c) Celsipinum primum sanguinis circulationem invenisse quam Harveus primum publici juris fecit, at id contendit tum impressionis tempus, cum, eurate descriptio Celsipini; quiescunt tamen Harvejani si cum Celsipini saltem inventi honor dividatur, *par decus manet ajunt & illi qui primum invenit & qui postremum perfecit. Nescio enim addunt an præstat invenisse, an ditasse.* Quamquam evidens esset sanguinis circulatio, & ineluctabilibus rationibus comprobata, minime tamen eam statim amplexi sunt medici, ipsam negabant dum Columbus, Servetus, & Celsipinus docebant; Harveo adversabantur qui illam tueri tentabat; denique innumeras sanguinis circulationis contradictiones passa est, antequam undique patefceret; in quibusdam tamen Universitatibus nisi post annum 1650. invaluisse credendam est, imo serius quandoque.

Ab eo tempore initium sancivi quartæ Epochæ cum tunc primum fruerentur Medici utilitatibus quas circulatio præstiterat.

Paullo post Renatus Cartesius novum Philosophiæ systema proposuit; quod penitus destruebat Aristotelis dogma quo Galenica Medicina fulciebatur; ipsum statim, atque ejus doctrinam aggressi sunt, at dissentientes parum progressi sunt nam ea cito recepta undique fuit, ut ex medicinæ Scholis Parepaticismus prorsus proscriberetur.

Sane veterum scriptorum dominium in animos validissimum fuerit modo judicemus a nixu quo ipsos secuti sunt, numquam tamen animi obversio perfecta ita & celerrima fuit; Auctores enim quos antea magis commendabant atque defendebant de repente spernebant, eorumque libros resquebant;

Y 2

fate-

(a) Sub titulo *Questionum Peripateticarum libri IP.* & *Questionum Medicarum libro IV.* in 4.

(b) *Quest. novum Peripateticarum lib. IP. P. & PL. & Medicarum lib. II. questione XVII.* omnis quævis circulatio reperitur in Douglas ad pag. 165. 168. Exta Celsipini sententiam.

(c) Specimen Bibliographiæ Anatomicae pag. 167., 168.



fabebantur enim nihil veri adfuisse inter medicas notiones quas usque illuc docuerant; quasi nonnulla anatomiz inventa, aut nova Physicę argumenta obvertere valerent Medicinę fundamenta.

Huic tamen vicissitudini, inversio, & cogitandi luxuria successerunt novarum rerum obviz consecutiones, at cum nulla existeret consans methodus, quisque proprię imaginationi consulebat ut protinus quot medici totidem systemata haberentur.

Itaque Carthesii fautores subtiliori materiei omnia corporis scenomena tribuebant; eam pro naturę indigentis progredi, regredi, in vorticem circumvehi posse autumabant; tali pacto enim omnia explicabant quamvis hujusmodi rationes neque veriores, neque magis rationi consonę essent illis quas de qualitatibus asserbant & contemnebant.

Alii vero chemiz fautores in humano corpore sa'ia, sulphura, & acidas, vel Alkalinas substantias conspiciebant, tum omnes fermenti species, atque fermentationes, esserescencias vel explosiones, ut in eo Chemicum elaboratorium constituerent.

Nonnulli vero corpusculari Philosophia delectabantur *Gassendi* quę tunc temporis plurimi existimabatur; putabant ipsi sanguinem atque humores scaterere atomis innumeris, sive corpusculis sphericis, uncinatis, duris vel flexilibus, grandioribus vel exiguis, quibus omnes motus tribuebant; at parvi faciebant hujusmodi qualitates arbitrarías nulla veritatis specie fulciri.

Earum opinionum nonnullę in scholis adhuc vigeabant dum Medicum *Tyrocini* ipse proficuebat; at nostra fortuna secunda ex abierunt *Hypoteses* ut Medicina tutiorem, certioremq; nunc sternet viam; ea itaque amplectimur tantum quę cognita partium structura sponte procedat, aut functionibus earum; verum quę consequuntur certas leges circulationis sanguinis atque lymphę, aut cadaverum sectionibus confirmantur.

Anatomiz enim studio in hac Epocha sedulo incumbabant, at in precedenti anatomici tantum numerum detegere satagebant, figuram, atque nexus ossium; verum positus, adhesiones, & usus musculorum; denique distributionem artiarum, atque venarum quę omnia chirurgię potius quam Medicinę utilia evadunt. Hodierni tamen scriptores *Splanchnologiam*; seu viscerum conformationem utilius perscrutati sunt; inter quos celebriores fuerunt *Stenonius*, *Pacquetus*, *Malpighius*, *Ruyfchius*, *Morgagnus*, *Du Verneijus*, atque *VVinslovius*.

Ipsi enim glandularum atque ab his haud absimilium corporum indolem investigarunt, excretoriosque ductus; injectionum vero ope distributionem ramificationum artiarum, & venarum, anastomosium plexus, qui continuos canales gignunt, oculis patefecerunt; Lymphę denique existentiam ostenderunt quam nos latebat, ejusdemque circulum, atque speciales semitas invenerunt &c. ut ex iis notionibus facile naturales functiones explicarentur, harumque perturbationes prospicerentur quę morbos constituunt.

Tandem veram cognoscere superest structuram cerebri ejusque partium usus diversos; in eo sanguinis circulum, & lymphę potissimum; originem, contextum atque usus nervorum qui ab illo procedunt, ac per omnes distribuuntur partes; Physiologi enim de hoc solliciti quamquam ab osseo cranii cuniculo impediti multa utilia invenerunt; at multa adhuc reliqua sunt quę nisi latitarent aconomię animalis explanationi non parum luminis afferrent.

Cum anatomiz in hac Epocha magis incumbere ideoque & cadaverum sectiones crebrius instituebantur, & utilius cum magis investigarent viscerum lęsiones quę plerumque potissimę sunt Morborum causę; nihilo ta-

lo ta-

to tamen minus interdum morbi affectum pro causa habuerunt; si quis confirmari velit, observationes pervolvat *seculibreti* anatomici *Boneti*; numquam enim satis edocti erimus, atque solliciti, ut rectas observationes inire valeamus, cum plerumque observatores decipiantur.

Botanicam æquo fructu excoluerunt, ac anatonem perscrutati sunt; D. enim *Turnefortius*, *Rajus*, *Rivinus*, atque *Linnaeus* genera, & species plantarum determinarunt, ut novam botanicæ formam suppeditarent; utilior tamen hujusmodi perquisitio evasisset, modo experientiis virtutes, & proprietates plantarum potius, quam nomenclaturam perpendissent.

Chemia pariter progressa est; *Stablii* enim *Boerhavi*, *Freindi*, *Homburgi*, plerorumque aliorum exemplo, qui præstantiores fuerunt nostris temporibus composita corpora tantum disgregare conati sunt, ut principia elucescerent, vel notas subigere substantias, quæ nova præberent remedia; sane plura, & medicinæ valde proficua auxilia chemia suppeditavit, at quo efficaciora evadunt, eo cautius incedendum erit, nam similibus remediis errando, numquam errores leviores fiunt.

Pharmacia vero innumeris compositionibus veterum minime hodie infarcitur, eoque tantum retinentur, quæ salubriores, & magis necessariæ medicinæ exercitio videntur; præparantur diligentius, quia simplicium indoles magis innotebit, cum eorum farrago non implicet scrutinium; interest quod remedia simpliciora præscribantur, ut melius singulorum effectus distinguantur. Pænitus jam obsolevit Astrologiæ & Talismanorum inutilitas, cui veteres tantum fidebant, verum, etsi hujus superstitionis reliquæ supersint, vulgus potius, & mulierculæ quam medici inquinantur.

In hoc medicinæ stadio tria nova remedia ab America exportata adepti sumus, videlicet *Quinquina*, *Ipecacuanba*, & *Simarouba*.

Prior cortex est arboris cusiulam, quæ *Gannaperis* appellatur, crescit in montibus Peruvæ apud *Loxam* quæ sexaginta leucas a *Quito* distat.

Hujusmodi remedium Jesuitæ Hispani *Romæ* ex *Peruvia* transtulerunt; paullo post ejusdem virtus innotuit, dum eo uxorem pertractarunt comitis *Cinchon* vice-Regis Peruvæ; at cum Jesuitæ undique Pharmacum distribuerent, atque Cardinalis de Lugo eorumdem focius maximam copiam ægris *Romæ* suppeditaret, idcirco pulvis Jesuitarum, aut Cardinalis de Lugo statim fuit nuncupatus, ut adhuc interdum eo nomine insigniatur, at apud nos etiam si appellationis lateat (a) origo, *Quinquina* dicitur; suspicor tamen, id evenisse, quod pulvis *China* ea consuetudine appellaretur, qua incognitas regiones uno verbo *Chinam* nuncupant, at cum distingui debeat a *China radice*, vulgo *squine*, ideo nomen reperierunt *China China*, quæ de causa ipsam sub eo titulo diu recognoverunt, atque ab hujusmodi nomenclatura illam *Quinquina* fabrefecerunt.

At quidquid sentiendum sit de ipsius Ætiologia, cortex Peruvianus utilissimum remedium præstat, quod, modo prudenter, & generalioribus præmissis auxiliis adhibeatur, valde prodest; nullumque superest eo efficacius febrifugum, quare hujusmodi remediis inventio medicis, & ægris utilissima evaserit.

*Ipecacuanbæ* respectu, quæ ex *Brasilia* ad nos exportatur, ut nomen *radix Brasiliensis* indicat, quo a medicis insigniri solet, etiam si vernaculo nomine appelletur *Ipecacuanba*.

*Afruch de Morbis Mulierum.*

Y 3

Ge

(a) Crediderunt nonnulli *Quinquinam* appellari a Comitissa *Cinchon*, quæ primum eo remedio usa est vid. *Pauli Hermannii Cynosura materia medica* edit. 1736. pag. 209. Et Mich. Bernartus Valentini, *disser. de China China* c. 2. §. 1.

Guilielmus Pifonus de ea locutus est anno 1656. *(a)* *Hiflor. Natur. & Medic. Brasilia* ejusdem virtutem ostendit, tamen nos adhuc remedium latebat; Medicus enim Gallus nomine *(b)* *Le Gras*, qui iter fecerat Americam versus, maximam copiam hujus radicis in Patriam redux anno 1672, secum tulit, at eum paulo post occubuisse, parum vero de remedii effectibus disertus esset, ideoque ejusdem usus obsolevit; putant nonnulli mercatorem quemdam *Garnierum* dictum denuo anno 1686, hanc radicem exportasse, dissentiant tamen materię medicę Scriptores qua ratione *Adrianus (c)* *Helvetius Medicus Batavus Garnier*, Ipecacuanha usus sit, at certum est, ipsum primum remedium passasse, & inventoris nomen non parum remedium ipsum auxisse.

Ipecacuanha præstantissimum est remedium, & adversus dysenteriam revera specificum, modo inflammationem venę sectionibus præoccupemus, tum viscerum calorem coniescamus, humectantibus magis idoneis; ejusdem virtus ab eo præsertim procedit, quod saburas solvere valeat, ut dejectionis mutationes ostendunt.

Tertium vero nuperrimum remedium, quod America suppeditavit, cortex est arboris cujusdam *Simaroubæ* dictæ in *Gujane* obvix; *D. Pontchartrain* a secretis rerum Maritimarum anno 1713, hujusmodi Pharmacum ex novis Indiis accepit, at ipsum tunc parvifecerunt; verum 1718. Dominus *Antonius de Jusseu Doctor præfes facultatis Parisiensis, & Botanice Professor* remedium exhibuit utiliter in dysenterico fluxu, quo Parisienses tunc facile corripiebantur, incassum propinata Ipecacuanha; postquam pluribus experimentis certior factus est de præstantissimis remedii effectibus ipsum scientiarum Academię sociis communicavit.

Autumant enim *Simaroubam* specificum remedium adversus serofos fluxus evadere, id fortasse ab ejusdem diuretica virtute procedet, quæ serum quo intestina madent renes versus impellit; animadvertendum tamen est, hujusmodi remedium etiam in quibusdam occasionibus validissimum, crebro tamen frustraneum evasisse.

Variole, lues venerea, atque scorbutus adhuc persistunt; at Europa in hac Epocha nondum nuperrimos morbos experta est; nam minime censerem pro novo morbo haberi febrem, quæ Lipsiæ an. 1612. puerperas aggredi solebat sub nomine *friesel* cognita; paulo post hujusmodi morbus totam Germaniam, vicinasque Provincias invasit, imo Angliam aggressa est, ut apparet ab opusculo *Sydenami* sub titulo *Schedula munitoria de novæ Febbris ingressu*, tum ex libello *(d)* *de febre milliari Amalthonis*; inexit postea taurinorum *(e)* in Pedemontis, & in proxima Longobardia, imo nonnullas Gallię Provincias infestavit.

Hujusmodi febris plerumque a leviori rigore initium agnoscit, quem subsequitur modica febris secundo, vel tertio die auctura quam teterrima phenomena comitantur; erumpit tunc per omnem corporis ambitum papularum innumera congeries, quæ grana milliacea æmulantur, ut febris milliari appellatur; hujusmodi granula supra cutim elevantur, ut in sudaminibus accidere solet, plerumque rubra, interdum alba, ut duplex species *friesel* oriatu modo ruber, modo albus; postremus tamen insensu magis experiri solet.

Hic

*(a)* *Lih. IV. Cap. 51.* *(b)* *Lamery Traite universel des drog. ad verbum Ipecacuanha.*

*(c)* *Geoffroy materia medica Ton. II. Sect. 1. Cap. 2. Art. 22. Guill. Gothoff. Leibnitz, & non antedidit hanc. Germ. Diet. II. Anno III. in appendice.*

*(d)* *Impressus Londini ann. 1720. in 8.*

*(e)* *Allionius de febre milliari Taurin. in 8.*

Hic morbus vel puerperas tantum adoriebatur, vel easplerumque; hodie tamen & homines crebro aggreditur; initio enim nocuus magis evadebat, atque facilius comunicabatur, at nostris temporibus valde subactus apparet, difficiliusque propagatur.

Eruptionis miliaris species Græco nomine *Έρισμα* in pluribus febribus obvia fuerunt, & alibi pluries apparuerunt, ut ex observationibus medicorum celeberrimorum constat; quare minime ut de febris petecchiali admonuimus, ipsam novum morbum esse credendum est, quod & hujus morbi scriptores ostenderunt, duo reliqua sunt in hac Epocha proposita quæ ad medicinam facere crediderunt. Primum se prodit *Transfusio Sanguinis*; dum anatomen perferutabantur, injectiones vasorum instituerunt quæ ramificationes distinguerent; eo ducti exemplo autumarunt venas ægotantium liquidis remediis repleri posse ex genere præsertim purgantium, diaphoreticorum, solventium, eaque efficacius ita agere; hujusmodi methodum tanti existimabantur, ut *Chirurgiam Infusoriam* ipsam nuncuparent: extant de hac re duo tractatus alter (a) Joan-Danielis Major, seu Meyer, alter Joan. (b) Sigismondi Elshaltzii, at teterrimi effectus cito hujus methodi fallaciam ostenderunt.

Ea ratione igitur sanguinis transfusio invexit; primum undique recepta fuit, & commendata ut de novis rebus evenire solet; statim maxima spes concepta est sanitatem non solum sed *juventutem* restitui posse. Medicorum enim quisque (c) sibi inventum arrogabat, Ricardus Lovverus auctor tractatus cordis asserit se (d) primum exercuisse Oxonii ann. 1665., idque enunciasse in transactionibus anglicanis an. 1666, quod verum est animalium respectu; Joan-Denys Parisiensis similem honorem sibi vindicavit ann. 1667. & in *Diario Sapientum* inseruit animalis in hominem transfusionem; Claudius Tardy (e) Doctor Præses Facultatis Medicinæ Parisiorum, testatur se primum de homine in hominem sanguinem transfusisse; alii denique insurrexerunt, & Jeronymus Vehr in Thesi quam defendit Francforti ann. 1668. sub titulo *Disputatio de Metamachyma* eam Hofmano tribuit Altorffii Professor, at funestus eventus omnem tollit contentionem.

Secundum locum obtinet *Variolarum* Innoculatio, per quam earum fomes ex uno in alterum subjectum transducitur. Multiplex est inoculationis methodus; tutior tamen, & vulgatiores obtinetur artuum carnem, cutimque ad pollicis circiter longitudinem incidendo, verum teniam recenti pure imbutam vulnere apponendo, ex benignis variolis desumpto; modo deficiat recens optimæ crasis exsiccatas inspergitur quod, ad opus in phialla obturata servatur ne spirituosior pars in auras avollet; vulnus emplastro obtegatur & circa 7., aut 8. diem pustulæ erumpunt cum majori vel minori fœnomenum apparatu, verum ulcus suppurat fluitque pus.

Plures fatentur hujusmodi praxim apud Circassiæ, & Mingreliæ populos antiquiorem fuisse, a quibus Bisantium transducta fuit; ibi Medici duo primum inoculationem sustinuerunt. alter fuit D. Emanuel Timonus Bisantinus qui ad Londinensem academiam misit experimentorum speci-

Y 4

men

(a) *Chirurgia infusoria* Kilonii in 4. 1617.

(b) *Chyrmatica nova* Coloniz Brandeburgicæ in 8 1664.

(c) Certum est Joannem Celle professorem Patavinum hanc transfusionem descripsisse in medico tractatu Venetiis impresso anno. 1618. sub titulo *Methodus facili præparandi jaranda ista, & nova medicamenta cap. 7.* (d) *Tractat. de eodem.*

(e) *Tractat. de l'écoulement du sang d'un homme dans un autre & de ses suites, Paris 1667.*

men (a) in transactionibus Anglicanis inferunt an. 1714. n. 339. quod reperitur etiam in Ephemeridibus Curioforum Germaniae Centur. V. & VI. observat. 2. alter Doctor est Jacobus Pylarinus Cephalenus, qui circa hanc rem opusculum edidit Venetiis anno 1715. cujus specimen extat in transactionibus Anglicanis anno 1716. n. 347.

Auctoritates eorum Medicorum fuisse exemplo Miledy VVortheley Montagu, Legati Angli apud Turcas, qui unicum Filium anno 1718. Biantii inoculavit, verum in Patriam restitutus Filium eadem ratione inoculari finit, Medicos plures, Chirurgo & Pharmacopolas excitavit, ut eandem operationem tentarent invitis DD. (b) VVagstaffe, (c) Plackmore, (d) G Douglas & Freind (e) celeberrimis Medicis, qui contrarium sentiebant; certum enim est ad annum usque 1728. variolarum inoculationem communiter receptam fuisse, at causa latitante asserunt ipsam, (f) *fut suspendue & comme oubliée depuis cette année jus qu'en 1743.*, addunt tamen *s'y est relevé depuis, pour n'y plus essuyer aucun revers semblable.*

Tentarunt hujusmodi praxim per universam Europam propagare, eamque pluribus experimentis confirmare satagerunt, apud nos praesertim omni nisu studuerunt ut undique amplecteretur, at, quamvis sedulo predicarent felices eventus, nondum celerime progressa est.

Postquam inoculationis historiam exposuimus, judicium proferre nec essum esset, at questio nedom nitida apparuit, quare autumo tantum utrinque patronum & adversariorum rationes referre.

Inoculatores enim asserunt rationem eorum qui sponte variolis correptis pereunt esse ut 1: 14. vel 7: 100., verum qui supersunt plerumque deformes evadere, ut statuunt minime accipites esse debere, cum certi simus hac methodo mortem, & deformitatem eludere; hoc unicum est eorum argumentum, quod tamen magni facere oporteret, cum validissimum sit & vitam, atque pulchritudinem tueatur.

Anti-Inoculatores vero respondent 1. Ex una parte nimis extollere numerum eorum qui vulgaribus variolis obeunt, earum Regionum saltem respectu, quae Anglia ceteris paribus temperatior est, ubi ratio emortuorum est 1: 30. & minor interdum; addunt comparisonem minime æquam evadere, nam pro hoc scopo (g) juvenes feligere solent bene dispositos quibus minus detrimenti morbus astringat; verum in vulgari variolarum aggreffu subiecta cujusque generis, & ætatis corripuntur, deleteris indolis morbofis constitutionibus occurrentibus, ad ægritudinem sustinendam minus parata, quare nil mirum si majori numero pereant.

2. Ex altera parte detrimentum adumbrare inoculationis quo interdum invitis cautelis omnibus, multi sub inoculatione intereunt, etiam D. Jurin hujusce (h) methodi patronus & ipse testatur emortuorum rationem fuisse 2: aut 3: 100., & ultra quandoque.

### 3. Osten-

(a) *Aient alla l'esp. ann. 1714. pag. 382.* hujusmodi opus impressum fuisse Biantii anno 1713. quod via credendum est.

(b) Epistola Guillelmi VVagstaffe ad D. Joannem Freind, impressa Londini anno 1722.

(c) Collatio fragmentorum de inoculatione pag. 171. (d) *Ibid.* pag. 287.

(e) Freind *Histoire de la Médecine* Part. III. pag. 213. *de la Traduction d'histoire Contes imprimée de Leyde en 1727.* Postquam quæsi Agitum descripsit Joannem Gaddelden veterem medicum Anglum, & addit *s'il avoit vu en 1722 de nos jours, il ne doute pas qu'il n'eût été à la tête des inoculateurs*, quod offendit ipsos Anglos inoculatores parvi fecisse.

(f) Collectio de Inoculatione variolarum impressa Parisiis 1756. in 12. pag. 235.

(g) Vide quod D. Jurin commendat, *Recueil* pag. 92. & suivantes, verum quod proposuit D. Ramby Chirurgus *ibid.* pag. 224. & seqq.

(h) Historia eventuum inoculationum in Anglia in collectione super allata pag. 98. *ibid.* pagin. 234. 235. *Ibidem* Epistola D. Jurin ad D. Cotgrave pag. 50. *de Recueil.*

3. Ostendunt hujus detrimenti ambaginem sufficere, ut parentes, natos inoculationi minime exponant, quæ mortis periculo non vacat morbum evitandi causa incertum, quo hominum dimidium expers evadit, modo caute incedat.

4. At saltem, inquirunt, antequam inoculationi subjiciamur infantes necessum esset certiores fieri amplius hoc morbo corripi non posse; inoculatores id faterentur, at adversarii (a) contrarium sentiunt, circa quod ineluctabilia hi afferunt exempla; idcirco inoculatores animo deficiunt cum ipsis jam inoculati denuo inoculandi proponatur, & revera cum (b) pluries quandoque variolis laborent ægri citra inoculationem quo speciali favore inoculati semel tantum corripi poterunt.

5. Anti-Inoculatores testantur, variolas inferendo periculum adesse quod strumæ, herpes, scorbutus, aut lues venerea inferantur, modo ab infecto subjecto alterius morbi pus defumatur; si fomes variolarum vulnere intrinsecus variolas excitet, idcirco strumofus, herpeticus, scorbuticus, celticus similes morbos excitare poterunt; minime rationibus tantum hanc opinionem confirmant, verum clarissimis exemplis illam defendunt, in quibus pro variolis alterutrum eorum morborum excitantur.

6. Tandem referunt hujusmodi variolas, legitimas pustulas minime æmulari, sed a (c) scabie potius haud abimiles esse, verum papulas ulla numquam in suppurationem vergere, neque pus novam inoculationem excitare posse, quod ostendit minime eam materiam variolosam fuisse, aut a veris variolis processisse, ut tuto statui queat inoculatos nunquam, a variolis legitimis tueri posse.

Me latet si unquam hujusmodi animadversiones apud nos institutz sint, felicem tamen inoculationis eventum evenisse observavi, quod inoculatores sententiam magnopere substinuit, & fautores sui circumstantiarum utilitates non neglexerunt; at spes eorum cito evanuit infortunii ergo, quod ab inoculatione processerunt, quare modo rei novitas suffragiis omnibus non fulciatur, verum sententiam sedulo magis perpendamus hujus praxis consuetudo adhuc incerta, & nocua apparet.

JACOBUS PRIMEROSUS origine Scotus Burdigalensis.

A. C.  
N.  
Ann.  
1650.

*De Morbis Mulierum & Symptomatis Libri V. in quibus plurimum Veterum, tum Recentiorum errores breviter indicantur & explicantur. Roteradami, 1655. in 4.*

PETRUS MICHAEL DE HEREDIA Medicinæ Professor in Universitate Compluti per 25. an. consecutivos postquam a Philippo IV. Hispaniarum Rege in Archiatrum electus fuit; obiit anno 1663.; Petrus Barca Asturigenis medicinæ Professor, & discipulus Heredia ejusdem opera collegit anno 1665. & impressit Lugduni in fol. in unicum volumen in quatuor partes distinctum.

A. C.  
N.  
Ann.  
1660.

In quarta parte tractatus extat perlongus de muliebribus morbis, quem tamen parvi puto ut vix perlegi mereatur; Auditor Arabes prosequitur, ut vix fructus sit utilitatibus quibus medicina post Græcorum medicorum scho-

(a) D. Kirkpatrick, *The analysis of inoculation*, impressa Londini anno 1754. ipse affert sex exempla inoculatores qui variolis jam antea correpti fuerant, tres refutat, ceteros damnat. Vide *Recessit* citatam pag. 255.

(b) D. J. in assert D. Isaac Massi Pharmacopœia exemplum qui idem testatur pag. 84. de *Recessit*, & plura alia afferre possit.

(c) Sufficit perolvere ipsam descriptionem variolarum quam inoculatores ipsi afferunt.

scholam scatebat, quod ostendit eo tempore nondum nova medicinæ inventa Hispaniam invasisse.

A. C. ANTONIUS MENIOTUS Parisiensis Medicinæ incubuit Monspelii, ibique gradum Doctoris sumpsit; verum Lutetiæ medicinam exercuit ubi Regis medicus creatus fuit; obiit ante annum 1697. ætatis 80.

N.  
Ann.  
1667.

Plures fasciculos composuit pathologicos in quatuor partes distributos, quos Parisiis in 4. ediderunt pluries annis, nempe 1665. 1674. 1677.

Inter eos nonnulli reperiuntur qui de morbis mulierum agunt ut *De furore uterino* in prima parte, *De Pica* in secunda, & *De sterilitate* in tertia, at nisi animadversiones nonnullæ pathologicæ reperiuntur absque Diagnostici, Prognostici, aut Curatione.

A. C. FRANCISCUS DE LA BOE Sylvius Hannoverienfis natus anno 1614. Basileæ anno 1637. gradum Doctoris adeptus est, verum medicinam partim apud Hannoverienfes, partim Amstelredamenses exercuit; deinde apud Lugduno-Battavos advocatus Cathedram replevit obiti Alberti Kyperibique secundam vitam iniit anno 1672.

N.  
Ann.  
1667.

Hujusmodi Medicus vivens plurimi existimabatur, quem tamen ejusdem opera post mortem non substituerunt.

Ediderunt post obitum ejusdem quatuor volumina in 12. de omnibus Morbis, quorum tertium apparuit sub titulo.

*Præceps Medicæ Liber tertius, De affectionibus generationi hominis dicatas functiones lesas vel constituentibus, vel producentibus, vel consequentibus.* Amstelodami, in 12. 1674.

In hoc Tractatu decem Capita extant, de Morbis Mulierum, quæ conceptionem præsertim, gestationem, & partum respiciunt; ejusdem theoria involuta maxima apparet, praxis vero sane comburit, quia aromatis scætet innumeris, quæ convenirent in iis regionibus potius, ubi Sylvius praxim exercebat.

Hujusmodi opuscula in collectione inserta fuerunt operum suorum in fol. editorum, quorum præcipuam partem constituent.

A. C. THOMAS VVILLIS Medicus Anglus natus anno 1620. gradum Doctoris Medici sumpsit in Universitate Oxoniensi, ubi paullo post naturalis Philosophiæ Professor creatus fuit, verum Londini advocatus anno 1667. ibi fama maxime increbuit, obiitque anno 1677.

N.  
Ann.  
1667.

Villis Oxoniæ impressit anno 1667. Tractatum in 4. cujus titulum *Pathologia cerebri, & nervosi generis Specimen*, in quo agitur de Morbis Convulsivis, & de Scarbuto, in eo sancivit convulsiones omnes ab eterogeneis, & explosivis moleculis oriri animalibus spiritibus remixtis, quæ inæquales explosiones inducant in iis partibus, in quibus influunt, & convulsiones, aut convulsivos motus hinc excitare potis sunt.

Highmorus, qui jam antea de hac re disseruit huic theoriæ minus quiescebat; dissertatione enim anno 1670. impressa, de qua sequenti articulo locuturi erimus, sententiam oppugnare tentavit; huic tamen dissertationi Villis ipse respondit eodem anno subsequenti labore.

*Affectuum hysteriarum & hypochondriacarum Pathologia  
spasmodica vindicata contra Responsum epistolarem  
Nathanaelis Highmori. M. D. Lodini, 1670. in 8.*

Sequenti articulo discrepantiz eventus innotebit.

NATHANAEL HIGHMORUS Oxoniensis eddidit Oxonii anno 1666. A C.  
N.  
Ann.  
1670.  
pisculum in 12. sub titulo.

*Exercitationes duæ, quarum prior de Passione Hysterica,  
altera de Affectione Hypochondriaca.*

Quæ ipsum excitarent ut Villisii sententias refutaret, circa hujusmodi  
morbum, & sequentem laborem anno 1667. exararet.

*De Passione Hysterica & Affectione Hypochondriaca, Re-  
sponso epistolari ad D. Villisium. Londini, 1670.  
in 4.*

In hac dissertatione Highmorus Villisio adversaturquia, in sua Patholo-  
gia circa causas affectionis hystericae, & hypochondriacæ multa erronea  
dixisse autumavit; juxta Villisii enim sententiam horum morborum causa in  
cerebro erat, qui supeditat, & in nervis qui deferunt animales spiritus etero-  
geneis particulis imbutos, ut convulsivas commotiones morbis iis obvias  
valeant excitare: contra hanc hypothesin Highmorus epistolam super allata-  
tam publici juris fecit, in qua ostendit, hujusmodi morbos a subtiliori  
elastico, & facile dilatabili sanguine oriri, qui pulmones & cordis ven-  
triculos infarciendo suffocationes, & oppressiones excitet; eorum morbo-  
rum potissima symptomata; quæstionem parvi puto, cum a causa procul  
diversa has ægitudines originem ducere autumem.

MARIA MEURDRAC.

A C.  
N.  
Ann.  
1674.

*Mitleidende und leichte Chimie vor das Frauenzweitsen,  
aus dem Französischen ins Teutsche übersetzt von I.  
L. M. C. Franckfurt, 1676. in 12.*

Videlicet, Chimie *Synopsis loculenta pro matronis, eo-  
rumque morbis; ex Gallic. Latine versa, par I. L. M.  
C. Francofurt, 1676. in 12.*

Titulum hujus libelli tantum novi, ut etiam cæterorum librorum Ale-  
mano idiomate conscriptorum, de quibus infra mentionem faciam, quare  
de his pauca dicere poterō.

HENRICUS CELLARIUS

A C.  
N.  
Ann.  
1674.

*Vermeinte Mutter-Beschreibung. Halberstad. 1677. in 12.*

Videlicet, *Putatum uteri ulcus. Halberstad. 1677. in 12.*

PAULUS DE SORBAIT Hanoviensis Medicinæ incubuit Vindebonæ  
Austriæ per 24. annorum curriculum; Archiater fuit Imperatricis Eleonoræ  
A C.  
N.  
Ann.  
1678.  
Gon-



Gonzagæ Viduæ Imperatoris Ferdinandi III. ; novam (a) vitam iniiit anno 1691.

*Praxis Medica septem Tractatibus comprehensa*. Viennæ Austriæ, 1680. in fol.

In priori Tractatu capita 86. reperiuntur inter quæ XIII. posteriora de Morbis Mulierum agunt.

A. C.  
N.  
Ann.  
1680.

PHILIPPUS GEORGIUS GRULINGIUS.

*Von Vveibers Krankheiten*, Franckf. 1680. in 4.  
Videlicet, *De Morbis Mulierum*. Francofurti, 1680. in 4.

A. C.  
N.  
Ann.  
1683.

MICHAEL ETTMULERUS Lypsiensis in patrio Liceo Doctor, & Professor Medicus, vixit annos 39. natus 1644., obiitque anno 1683.

Georgius Francus ejusdem universitatis Professor, opera ejusdem confectus, & edidit Francofurti in duplici volumine in fol. anno 1638. Petrus Chauvin Medicus Londinensis, eadem impressit Lugduni anno 1690.  
In ea collectione opusculum reperitur sub titulo

*Collegium prædicum speciale de Morbis Virorum, Mulierum & Infantum.*

quod Mulierum morbos respicit, X. Capita complectitur, quæ potissimum ad conceptionem, gestationem, & partum attinent.

A. C.  
N.  
Ann.  
1682.

THOMAS SYNDENHAMUS Comitatus Dorseti in Anglia, natus anno 1642. Cantabrigiæ Doctor; moram gessit Londini anno 1661. ibique medicinam summo cum decore exercuit; æternam vitam sumpsit anno 1686.

Inter ejusdem opera pluries impressa dissertatio quædam reperitur epistolarum more conscripta, & Gulielmo Colæ medicinæ Doctori dicata.

*De Observationibus nuperis circa curationem variolarum confluentium, necnon de Affectione Hysterica.*

In posteriori parte hujus dissertationis 1. miscet VVillis more affectionem hystericam mulierum, cum hyppocondriaca virorum, 2. autumat vero, hyppothesein VVillis amplectendo, ambo hos morbos a spirituum animalium defectu oriri, quem *Ataxiam* vocat, cujus vocabuli neque indolem, neque causam explanat, ut *Ataxia* Paripateticorum qualitas occultata videatur 3. pro hystericæ passionis curatione valde commendat Martialis, aquas minerales ferrugineas, quinquina, opium, vinum Hispanicum, aut vinosum infusum radicis gentianæ, angelicæ, corticum aurantiarum, & equisitationem potissimum, spernit magnopere purgantium usum, de cetero vulgaria anthysterica commendat.

Quod mirum est putat tumorem, hydropem, & steatomata ovariorum, aut hydatides, quæ in iis partibus efformantur & a morte, observantur consecutiones potius esse humoris cujusdam, qui illa organa infarciat, quam causas eorum morborum.

Quam-

Quamvis hujusmodi opus solidam theoriam minime præferat, tamen Auctoris fama ipsum pervolvere cogit.

JOANNES GARMER Medicus Hamburgensis.

A. C.  
N.  
Ann.  
1684.

*Diatriba seu controversa cum Beckio de uteri procidentia, curis secundis auctor. Hamburgi, 1684. in 4.*

JOANNES DOLEUS natus Geisman in Hassia Medicus Landgravi Hassie-Cassel, & Academiæ Curiosorum socius obiit anno 1722. juxta Catalogum ejusdem societatis, quem reperies initio primi Voluminis anno 1627., etiam si Kalendæ desint.

A. C.  
N.  
Ann.  
1722.

*Encyclopædia Medicinæ Theoretico-practicæ, quæ tam veterum, quam recentiorum, Paracelsistarum nempe, Helmontianorum, Villisianorum, Sylvianorum, Cartesiorum, de causis & curationibus Morborum sententiæ exhibentur. Addita simul Auctoris de his opinione. Una cum medicamentis Galenico-chymicis, ut plurimum ab ipso Auctore experientia comprobatis, Francofurti, 1684. in 4.*

Hujus encyclopædiæ liber V. decem capita præfert, quæ de Morbis Mulierum agunt, synopsis præstant plurimorum auctorum, & quod mirum est eorum qui invicem contrarias sententiâs tenebant, videlicet Paracelsistarum, Helmontianorum, Villisianorum, Cartesiorum, & sectatorum Sylvii de la Boe.

Demum hujusmodi tractatus id singularis habet quod undique scatet Hebraicis, & Græcis vocabulis, idcirco cerebrum *Microcosmetor* appellant, cor *Cardimete*, stomachum *Gasteranax*, orificium matricis, *Spiritus plasticus*, aut *janitor uteri*, quæ sunt futilia eruditionis jactationes.

Tandem admirationis dignum est opus latinis versibus adornari in laudem Dolei partim a Michaele, & Ettmullero; partim a Michaele, & Sydenhamio exaratis.

NATHANAEL SPRYE.

A. C.  
N.  
Ann.  
1685.

*Tractatus de Fluxu menstruo. Patavii, in 8. 1685.*

Hic conatus est explicare periodicum mensium regressum solo augmento copiæ, & motus sanguinis, tamen ostendit, uteri structuram spongiosam esse, quod sovet statim sanguinis in matricis anfractus ex quibus tandem plures sibi pandit vias, antumat simul ab hac hypotesi omnes deduci posse catameniorum aberrationes.

GUALTIERUS CHARLETONUS, Medicus Londinensis.

A. C.  
N.  
Ann.  
1686.

*Inquisitiones Medico-physicæ de causis Catameniorum, sive fluxus menstrui; & uteri rheumatismo sive fluore albe. Londini, 1684. in 8.*

JOAN-

A. C.  
N.  
Ann.  
1691.

## JOANNES NICOLAUS PHISER

*Von oler VVeiber Nature, wie auch deren Gebrechen und Krankheiten.* Altdorf, 1691. in 8.

Videlicet, *De natura, mulierum earumque infirmitatibus atque morbis.* Altdorf, 1691. in 8.

A. C.  
N.  
Ann.  
1691.

## JOANNES GEORGIUS SOMMERS

*VVeiberg Pfleg-Buchlein, anzeihet deren bekannnen Schule.* Rudelstätt, 1691. in 12.

Videlicet, *Synopsis Morborum Mulierum cui additur praxi artis obstetriciæ.* Rudelstätt, 1691. in 12.

A. C.  
N.  
Ann.  
1694.

FRANCISCUS MAURICEUS Parisiensis Chirurgus, & obstetricans magni nominis, qui obiit anno 1709.; de arte Obstetricia nonnulla opera exaravit.

*Traité des maladies des femmes grosses & de celles qui sont accouchées.* A Paris, 1694. in 4.

Postea duplicem Tractatum composuit sub titulo *Observations sur la grossesse & l'accouchement des femmes*, ambo Parisiis in 4. alter anno 1694., alter anno 1708.

Ipse nullum ordinem nullamque methodum in iis conscribendis observavit, & dum rationes reddere satagit infidelis experitur magister; at cum experientia non deficeret inter legendum nonnullas præstat utiles notiones.

A. C.  
N.  
Ann.  
1693.

BERNARDUS CONNOR Anglus, sive Irlandus (a) Monspeisuli medicinæ incubuit circa annum 1690. ubi fortassis Doctoris gradum sumpsit, verum Parisios se transtulit ubi Regiæ societati ipsum addiderunt, quare specioso titulo nuncupari consueverat *Regia Camera Parisiensis societati*; tunc fortuito animadvertendum (b) sibi præbuit Sceleton humanum ex vertebriis, costis, ossi sacro, innominatis &c. in unicum corpus coalitum; observavit pariter maximum (c) Sarcoma qui omnem pene uteri cavitatem replebat, quod expulsit mulier quædam post receptum in hypogastrio pedis ictum. Verum In Italiam proficiscens criptam *del Cane*, & Vesuvii eruptionem anni 1694. observavit; in patriam tandem redux dissertationes congerit, quæ circa ea composuerat, quas unico volumine edidit sub titulo sequenti.

*Dissertationes Medico-Physicæ,  
De Antris lethiferis.  
De montis Vesuvii incendio.  
De stupendo ossium conlitu.  
De inhumani Uteri Sarcomate.* Oxonii, 1695.

Alte-

(a) De antris lethiferis pag. 19.

(b) Dissert. de stupendo conlitu pag. 4.

(c) Dissert. De inhumani uteri sarcomate pag. 38. 39.

Alterum opus ejusdem Auctoris superest sub titulo *Evangelium Medici, sive Medicina Mystica*, *De suspensis naturæ legibus, sive de miraculis*, reliquisque in eâ editis, memoratis, quæ medica indagine subjici possunt Londini 1697. in 8.

PHILIPPUS FRAVENDORFFER natus (a) in Austria superiori Medicus provincialis Moraviæ, Brini residebat, & Academiæ Curiosorum socius creatus, obiit (b) anno 1697.

A. C.  
N.  
Ann.  
1696.

*De morbis mulierum.* Noribergæ 1696. in 12.

CHRISTOPHORUS HELLVVIGS

A. C.  
N.  
Ann.  
1700.

*Frauensimmer Apothekegen.* Leipzig. 1700. in 12.

Videlicet, *exigua Pharmacia muliebris.* Lyptiz, 1700. in 4.

CHRISTIANUS-IOANNES LANGIUS Pegavensis Saxonus natus anno 1655. Doctor & Professor medicinz in facultate Lyptiensi; interijt anno 1701.; ejusdem opera collegerunt, & publicarunt Lyptiz anno 1704. in duplici volumine in fol. cura Augusti Quirini, Professoris Pathologiæ, & Botanici in eadem facultate;

A. C.  
N.  
Ann.  
1700.

Hujusmodi collectio extat sub titulo sequenti

*Christianni Johannis Langi . . . . . Opera omnia medica theoretico-practica.*

In ea Tractatus invenitur sub titulo *Praxis medica Langiana* in quo Auctor in XXIV. Capitulo pertractat de morbis sequiori sæculi tantum familiaribus; quindecim in eo exiguos Paragraphos asserit qui brevitatiscrgo inutilis evadunt.

Huic collectioni theses academicas addiderunt ejusdem auctoris, quæ tertiam partem operis constituunt; nonnullæ de sterilitate, mensium suppressione; virginum morbis, & gestatione fusius agunt.

IOANNES FREIND Medicus Londinensis & Regiæ Scientiarum academiæ socius qui obiit an. 1729. plures libros composuit quibus fama inclaudit, hic tamen de sequenti tantum verba faciemus.

A. C.  
N.  
Ann.  
1703.

*Emmenologia, in qua fluxus muliebris, menstrui phenomenæ, periodi, vitia cum medendi methodo ad rationes mechanicas exiguntur.* Oxoniæ, 1703. in 8.

Ipse pro catameniorum causa plethoræ sanguinis agnovit, qui singulis mensibus in utero cumulat, & specialis magnitudo arteriarum per utero reptantium, eaque sufficere autumat, ut catamenia periodice eveniant.

IOANNES DOMINICUS SANTORINUS Professor medicinz & Anatomiz Vientiis.

A. C.  
N.  
Ann.  
1705.

Opu-

(a) In Catalogo græfico Palæm. I. Alterum Acad. Natur. Curios. (b) Ibidem.

*Opuscula Medica de structura & motu fibræ, De nutritione animalis, De hæmorrhoidibus. De Catamenis. Venetiis, 1705. in 8.*

De postrema tantum earum dissertationum hic verba faciemus; Auctor postquam animadvertit §. 1. haud facilem esse catamenia explicare, ostendit a triplici causa §. VII. illa oriri, a plethora vera aut apparenti, a speciali uteri, & vaginæ distributione vasorum, a spermatis actione in omne spirituum systemate *per totam spirituum syllasim*, quam postremam causam minus laudat auctor Gallus.

Hujusmodi opus Rotterodami recusum fuit anno 1719. *in 8.*

A. C. HERMANUS BOERRHAVIUS Vianensis Batavus medicinæ Professor in Universitate Lugduni, & socius Academiarum scientiarum, & Londinensis, magni nominis vir, & scriptis major obiit anno 1438.

*Aphorismi de cognoscendis & curandis morbis. Lugduni Batavorum, 1708. in 8.*

Hujusmodi opus brevis est medicinæ synopsis quæ nonnullas tantum ægritudines ostendit, at Boerhaaviana synopsis semper maxima fuerit; IV. capita de Morbis Mulierum agunt sub titulo sequenti, *Morbi Virginum, morbi gravidarum, Partus difficilis, morbi Puerperii*, quæ Boerhaavius aphorifice indicat, fusius tamen discipulis suis explicabat.

A. C. N. JOANNES GABRIEL RUDOLPHUS.  
Ann. 1703.

*De iis, quæ sunt observanda in mulieribus largiter menstruatis. Lugduni Batavorum, in 8. 1708.*

A. C. N. PETRUS FRESART Leodienfis Auctor sequentis Tractatus.  
Ann. 1713.

*Emmenologia, in qua fluxus muliebris mensui phenomenon, periodi, vitia, cum medendi methodo ad rationes Medico-Physicas eviguntur. Leodii, in 12. 1712.*

Auctor causam perpendit menstruationis, verum mensium aberrationem explicat, & quasi totidem morbos constituit, adversus quos remedia magis idonea suppedat.

Juxta ejusdem sententiam menses gignit, fermentum quoddam uteri in matrice collectum, quod singulis mensibus rarefciendo eruptionem provocat, credo auctorem hyppothesim didicisse Monspelii, ubi medicinæ incubuit sub D. Chirac disciplina, quid idem docebat, quemque summis laudis extollit, (a)

A. C. N. ANONYMUS.  
Ann. 1713.

*Nouveaux secrets . . . pour guérir plusieurs sortes de Maladies des Dames, tirez des Mémoires de M. Digby. 1715. in 8.*

Tiar—

Titulus fatis indicat opus parvi faciendum esse

JOANNES ANTONIUS TERENCEZONI Professor medicinae Pisanus.

A G.  
N.  
Ann.  
1715.

*De Morbis Uteri.* Lucz, 1715. in 4.

JOANNES GOLDHAMMERS

A G.  
N.  
Ann.  
1717.

*Compendioser VVeiber und Kinder Arzt.* Muhlhausen, 1717.  
in 12.

Videlicet, *Medicina contraria Mulierum, & infantum,*  
Muhlhausen, 1717. in 12.

GASPAR SCHROTTERS

A G.  
N.  
Ann.  
1721.

*Junysern. VVeiber und Kinder Apotheken.* Franckf. 1721.  
in 8.

Videlicet, *Exigua Pharmacopea filiarum, mulierum, &*  
*infantum.* Francofurt, 1721. in 8.

HENRICUS VAN SANDEN

A G.  
N.  
Ann.  
1722.

*Observatio de prolapsu uteri universi.* Regiomonti. in 4.  
1722.

GEORGIUS-ERNESTUS STAHL de Halla natus an. 1660. Consiliarius Aulicus, & Medicus primarius Friderici Regis Borussiae, Accademiae Curiosorum socius, & Professor medicinae in universitate quae Hallae est, obiit anno 1734. 75. aetatis suae. (a)

Theses nonnullas ejusdem auctoris reperi quae de Morbis Mulierum pertractant, quas auctoris nomen me indicare cogito, etiamsi nullam referre putarem.

*Dissertatio inauguralis Medica, De mensium Mulierum fluxu secundum naturam, & suppressione praeter naturam.*

Respondente Joh. Georgio Brebizi, Curi-Varisco. Hallae Magdeburgicae, 1694. in 4.

Schalius pariter Germanico Idiome Tequentem tractatum edidit.

*Propempticum inaugurale, De fluxu muliebri, quatenus menstrui, causa.* Hallae Magdeburgicae, in 4. 1702.

*Disputatio inauguralis Medica, De mensium insolitis viis.*

Respondente Georg. Frideric. Jasebctke, Stroppa Silesio.  
Hallae, 1702. in 4.

*Dissertatio Medica inauguralis, de Puerperarum affectibus.*

*Astruch de Morbis Mulierum.*

Z

Re-

(a) in Catalogo Academicorum, defunctorum, praefixum Volumen IV. Ephemerid. Germanicarum.

*Respondente Joachim Cober, Pritzvalcens-Marchico. Hallæ 1704. in 4.*

*- Dissertatio Medica inauguralis, De affectibus gravidarum. Resp. David Dittman, Vilna-Lituanico. Hallæ, in 4. 1708.*

*Dissertatio inauguralis Medica, De sterilitate feminarum. Resp. Gottfried Vilbelmi, Huvelb-Marchio. Hallæ, 1711. in 4.*

Stalius pariter Germanico idiomate sequentem tractatum edidit.

*Von den Zuffalen und Kranckheiten des Frauenzimmers. Lyptiz, 1724. in 8.*

*Videlicet, De sanonem, & morbis mulierum, Lyptiz, 1724. in 8.*

.... LE TELLIER filius.

*Reflexions critiques sur l'Emmenologie de M. Freind. Paris, 1730. in 8.*

Ecce vobis quot extant emmenologiæ tractatus; at animadvertendum est menstruorum explicationem includere explanationem morborum omnium ad mulieres pertinentium, ut incassum conemur iis mederi modo causa catameniorum non elucescat, quæ in omni mensium aberratione uteri statum potissimum manifestaret solet.

A C.  
N.  
Ann.  
1732.

ANTONIUS CELESTINUS COCCHIUS in Urbe Botanice Professor.

*De immani hysterico affectu, inter Epistolas Physico-Medicæ, Parisius, 1732. in 4.*

A C.  
N.  
Ann.  
1734.

JOANNES AUGUSTUS OEHEMENS.

*Erforte Geheimnisse der natur und ihr eims Malad es Frauenzimmers. Leipg, 1734. in 4.*

*Videlicet, Nature arcanum ægram pertractando detectum. Lyptiz, 1734. in 4.*

A C.  
N.  
Ann.  
1735.

GEORGIUS PHILIPPUS NENTER Medicus Argentinus.

*Fundamenta Medicinæ theoretico-practica, secundum celeberrimi D. D. Stahlii potissimum, aliorumque celeberrimorum Medicorum placita conscripta, & propria experientia confirmata, in forma Tabularum. Venetiis, in fol. 1735.*

In ea parte hujus operis, quæ sub titulo extat *Praxis specialis* in VIII. libris distincta, duplex locus reperitur ubi auctor de Morbis Mulierum agit. 1. In priori libro ad Caput VIII., IX., X., & XI. verba fiunt menstruum, lochiorum, eorumque aberrationum, 2. In libro VII. vero quinque sectiones habentur, quæ pertractant *De Morbis imprægnandarum. De affectibus imprægnandarum, De affectibus parturientium, De affectibus puerperarum*

*rarum*. De *laesantium affectibus*. At huiusmodi methodus per classes sive tabulas morbos pertractandi laborem valde superficiale redit, qui vix necessarias notiones lambit.

FRIDERICUS HOFFMANUS natus Hallæ circa Magdurgum anno 1666. medicinæ studuit in Universitate Jenæ ubi gradu Doctoris sumpto anno 1681. Professor inde Medicinæ creatus fuit anno 1691. in ea Universitate, quam Hallæ instituit eodem anno Fridericus III. Elector Brandenburgi, & I. Rex Borussiae, quod onus summo cum decore implevit ad mortem usque quæ anno 1742. evenit.

A. G.  
N.  
Ann.  
1742.

Frater de *Tournes* Typographi Genevenses completam Hoffmani operum editionem confici curarunt, cum partim Francofurti, Venetiis, & alio impresse fuerint: ad Hoffmannum enim litteras miserunt, qui sumptum laudavit, pluresque Tractatus ipsis subministravit, quos in hac prima collectione ab Hoffmanno ipso comprobata an. 1640. inseruerunt, tria grandiora volumina in *fol.* ipsa collectio constituere in VI. Tomos divisa, quam ipsi *Tournes* recusserunt anno 1748.

Ea codicem quam maximum constituit institutionum medicarum, attramen incompletum, qui post auctoris mortem valde increbuit, tria enim volumina anno 1754. addiderunt ex Theisibus academicis consultationibus, & miscellaneis congesta, quas verosimiliter sua prima juventute Hoffmannus collegit, at inuente ætate ipse respueret, sed editores in iis peragendis magis Typographi utilitati, quam auctoris nomini consuluerunt.

Certum enim est utilissimas in Hoffmanni scriptis notiones reperiri; secus enim ad summum nominis columen non attigisset, at fateri oportet, ejusdem styli laqueum, perlongum nimis experiri, & obvia sæpe narrare, crambæ etiam recoquere in ipsis operibus, quæ ipsius auctoritate fulciuntur; nam ejusdem postumi labores magis defectivi evadunt.

Nihilo tamen minus Hoffmannus inter præstantiores medicinæ auctores recenseretur meretur, verum si cum Græcis Auctoribus ipsum comparemus, non Hippocratem, sed Galenum potius amulatur.

Ipse hinc inde de morbis mulierum in sua ampla confectione differuit at cum morborum distributio specialis auctoris sit, idcirco hic illuc de hac re notiones piscare necessum erit.

Etenim I. in Tom. IV. tres centuriæ consultationum inveniuntur, inter quas plures de mulieribus, & remediis in iis circumstantiis idoneis agunt, specialibus tamen hypothesibus referuntur non generaliiori thesi, quæ casus omnes complectatur.

II. In Tom. III. Hoffmannus locutus est pag. 50. De *Mala Hysserico*. Pag. 176. De *convulsione uteri, sive abortu*. Pag. 311. De *cachexia, & chlorosi*. Pag. 348. De *cachexia uterina sive fluore albo, quæ dogmaticæ ostendit*.

III. Tandem in secundo supplemento Part. II. pag. 389. Thesis academica reperitur, De *Genuina chlorosis indole, origine, & curatione*.

Minime fatagerem ea exponere, quæ in plerisque articulis Hoffmannus circa hanc rem ostendit, cum nihil novi aut singularis præferat, sat erit animadvertere ipsum respuere opiniones Higbmorri, Sylvii, & Sydenhami, qui morbi sedem in stomacho, pancreate, mesenterio, aut venarum constituebant, verum Pisoni sententiam, qui in cerebro, aut nervorum origine ipsam ponebat. Hoffmannus enim cum veteribus in utero morbi causam adeste putat eamque triplici ratione oriri, a mensibus retardatis, lochiis suppressis, aut spermatidis acrimonia; at pro muliebri semine nisi ovula recognovit, quibus cogitur corruptionem explicare eorum ovulorum



in hysterico morbo ; tandem autumat deleteriæ indolis vapores ab utero elevari , qui per omnem corporis ambitum distribuuntur , & omnia terribilia phenomena producant .

A. C. J. R. —n Londinensis, Medicinæ Doctor.

N.  
Ann.  
1555.

*A Treatise on all the Diseases incident to Women, by John Astruc, Physician to his present Majesty, &c. and Author of a Treatise on the Venereal Diseases, translated from manuscript copy of the Author's Lectures read at Paris. London. in 8. 1743.*

De hoc Tractatu in Præfatione hujus operis jam mentionem fecimus.

A. C. RICARDUS MEADIUS natus an. 1673. Stephey prope Londinum, postquam Ultrajecti, & Lugduni Batavorum medicinæ consuluit, in Italianam professus est, ubi Patavii Doctoris gradum sumpsit ; in Patriam vero rediit summa cum laude medicinam exercuit ; tandem obiit anno 1754.

Meadius varia opuscula exaravit a medica republica lubenter accepta, quæ tamen etiam si plurimi faciendæ videantur, minime tamen rem nostram respiciunt, idcirco postremum ejusdem opus tantum indicabimus videlicet.

*Monita & Præcepta Medica. Londini, 1751. in 8.*

Hujusmodi tractatus magnopere instruit, & XXI. Capita tantum complectitur, eorum tamen XIX. de nonnullis Mulierum Morbis agit in quinque Sectionibus distinctum.

- I. De menstruorum suppressione,
- II. De immodico mensium fluxu,
- III. De floribus albis mulierum,
- IV. De morbo hysterico,
- V. De partu difficili.

De singulis nonnulla monita practica suppeditat citra theorias, breviterque remedia magistuta indicat, idcirco testatur eleborum nigrum validissimum evasisse ad menstrua provocanda, verum bis in die proponit coquear-tincturæ Melampodii juxta pharmacoceam Londinensem paratæ, & in citho. aquæ propinatæ.

A. C. JACOBUS LAZERME Doctor, & Professor Facultatis medicæ Montpelien-sis, qui paullo antea occubuit, edidit Montpelii anno 1751. specimen  
N. Ann. 1558. medicinæ sub titulo.

*Curationes Morborum ex scriptis Jacobi Lazerme, Regis Consiliarii & Professoris Medici Montpelien-sis excerptæ. Montpelii, 1750. in 12. Tom. I. pagin. 357. Tom. II. pag. 303.*

Opus hujusmodi tradiderunt paullo post, & excussurunt Parisiis in du-plici volumine sub titulo sequenti.

Me-

*Méthode pour guérir les Maladies, traduit du Latin de M.  
Lazerte. Paris, 1753. in 12.*

Egritudines arctissimo ordine in hoc tractatu pertractantur, nam ipse omnes morbos complecti maluit præter celticam luem, & podagram; in eo futilis tantum invenitur formularum vulgarium congeries, absque ulla theoria, quæ morborum sedem, aut causam indicet, vel differentia, quæ species designet, aut symptomatum concomitantium discreptione, aut signis denique, quæ prognosim recte doceant, atque indicationes statuunt.

Hujusmodi defectus præsertim animadvertuntur in tractatu de Morbis Mulierum in quo deest tum menstruationis, cum periodorum explicatio, verum de mensibus nimis, ac suppressis in illo verba sunt absque quo patefcat causa fluxus methodici; deinde formulas auctor ostendit adversus chlorosim difficillimum morbum, silet tamen causam, quæ illum producat: ipse autumat uteri descensum a laxitudine ligamentorum procedere, quod falsum esse super demonstravimus, tandem rationem reddere satagit quæ pertractari debeant hujusmodi morbi, tamen nullam vel uteri, vel ejusdem functionum descriptionem exhibet.

Si hac ratione tyrones instruerentur medicinæ cito ad empiricam reverteret, ut in secunda Epocha evenisse ostenditur; igitur tali pacto Gordonus, Valescus de Tarenta, Gerardus de Solo medicinam Montpelii docebant.

Uno verbo medicinæ Elenchos respuere debemus qui doctis inutiles tyronibus nocui evadunt; hujusmodi enim pervolvendo libellos aliquid adfuisse sibi suadent, etiamsi revera nihilum prorsus adepti sint; excipiantur ab hac censura excerpta concinno ordine elaborata, quæ una celeberrimas quæstiones congerunt, & totidem summa capita constituunt fusius a præceptoribus explananda; hujus indolis sunt Aphorismi Boeravii *de cognoscendis & curandis Morbis*, tum ejusdem Physiologia.

Damnando Elenchos tamen non laudo ea medicinæ farcimina in quibus pauca utilia, & necessaria inter multa exotica, & futilia natant; hujusmodi errores alio satis pluries contempni, at qui medium tenent eruditi nempe medici summa laude digni videntur. *Est modus in rebus &c.*

GERARDUS TITZ-GERALD origine Irlandus, Doctor, & Professor Medicus in facultate Montepessulana, qui interiit anno 1748.

Ejusdem post obitum pertractationem de Morbis Mulierum sequenti titulo insignitam ediderunt.

*Traité des malades des femmes, traduit du latin de M.  
Fitz-Gerald, Professeur de Médecine en l'Université de  
Montpellier, à Paris (à Avignon) in 12. 1758.*

Me latet indolem hujus operis, neve revera versus sit ut titulo designat; in duas sectiones tractatus dividitur, altera *des Maladies chroniques des Femmes*, quæ VIII. Capita complectitur, altera *des maladies aigues des Femmes*, quæ totidem exhibet.

In hoc opere fusius nonnihil quam in præcedenti de his morbis agitur, at eadem principia, eandemque praxim Auctor prosecutus est; faterer enim medicinam centum ab hinc annis parum profecisse cum hujusmodi opuscula Montpelii anno 1750. perfecta sint, quæ nihil iis præcellunt quæ Riverius in eadem Facultate anno 1640. præcepit.

*Abruch de Morbis Mulierum.*

Z 3

CON-

## C O N C L U S I O.

**S**atis ostendit adhuc exposita brevis Medicinæ hystoria, hujus scientiæ sulcimenta continentem similia fuisse, videlicet cognoscere, & distinguere morborum species, certas aut verisimiles causas eorum scire, indicationes proponere quibus mederi oportuerit, tandem mitiora, & magis idonea seligere remedia, quæ objectum medicinæ constanter constituunt.

Nemo tamen negabit nostris temporibus partium structuram melius detexisse anatomicos, sedem & causam singulorum morborum melius determinasse, imo pleraque immediatas invenisse, ut hac de causa novis inventis adornata magis physica eluceret; theoria vero certior, tutiorque fieret; rationes innotescerent plurimorum fenomenorum prius latitantium; at tamen quoad praxim spectat parum ipsa progressa est, una constanter persistit.

Nonnulli contenderint nova remedia inventa fuisse, atque nova in diem innotescere, verum novas proprietates in obviis detectas fuisse, ut vires sunt antinecrotica & antispasmodica in quinquina. At hujusmodi quæstio etiam nisi praxim respiciat, parvi pendet.

Eorum enim pleraque quorum ad astra virtutes extollunt, a vanitate haud infrequenter, aut mercimonio medici cujusdam originem recognoscunt, vel argitarum audaciæ, aut inopinatae proceris personæ valetudini, vel Mesalinæ patrocinio, aut solæ novitati tantum tribuuntur; primum sane jactantur hujusmodi remedia, at illusione abeunte inventoris dedecus tantum superest.

Si nonnulla tamen valida reperiantur auxilia qualia sunt quinquina, & Ipecacuanha pluribus experimentis sulcita, libenter illa amplectimur, & inter salubriores pharmacos reponimus; hujusmodi pariter sunt novæ medendi rationes, vel novi quos sternimus stramites, ut tutius sanctitas jam, & vulgares impleamus indicationes; neque ex eo medicinam pervagam esse censuimus, sed dum sua servat veterrima præcepta novis frui non respue auxiliis.

Mihi itaque, cogitatum explicare liceat exemplum ab aliqua physica parte desumendo; arborum enim fructiferarum cultura, non exiguam rei agrariæ partem constituit; olim jam innotebat circa plantas, terram scindere necessum esse, eamque emollire atque idoneo impinguare sedimento, a noxiis ipsas tueri insectis, tum ab aeris intemperie defendere, ramos steriles secare, ut fructuosi magis ingrandescerent.

Quid proinde utilitatis attulerunt circa rem rusticam nuperrima inventa? indagarunt structuram fibrarum lignearum, tracheas ipsis remixtas, humorum circulationem, medullæ, atque corticis usus, verum insectorum naturam, quæ arbores rodunt; fructusque corrumpunt ea sane vegetationem plantarum declararunt, at nihil culturam, quod maxime interest, immutare valuerunt.

At longius procedamus, pinguedines, aut fimi reperti sunt idonei magis, & utiles; insectorum venena detexerunt; spurios ramos a fructuosis facilius distinguere docuerunt; hæc omnia cultorem dirigunt, ut propositas indicationes facilius impleat, at nihil hujusmodi notiones veteres culturæ leges pervertunt.

Idem de arte nostra solet evenire, nam modo quæstiones scindamus, quæ cum medicinæ essentia nullam rationem habent, apparebit hujusmodi artis fundamenta eadem constanter fuisse.

Plinius enim si melius perscrutatus esset minime judicavisset medicinam ceteris artibus inconstantiorem esse: ait ille, *nullam artium inconstantiorem esse (a)*. Tunc temporis enim Medicorum variationes quarum teterrima ipse affert exempla a voluptate procedebant quæ corripiebantur Medici, ut novis rebus famam potius abriperent, quam ægris nocuis remediis fanitatem ledere abstinere, *(b) nec dubium, asserit, omnes istos famam novitate aliqua occupantes, animas statim nostras negociari, at id medicis potius, quam medicinæ erat tribuendum; nam, (c) non esse artis ista, sed hominum Plinius testatur.*

Plinii enim redargutiones agyras potius respiciebant, qui turpi ratione subdolis auspiciis, aut mercimonio Romæ ægris illudere tentabant, simili ratione, ut Parisiis nova remedia sed futilia, & nocua plerumque defendere conati sunt; hujus sensus enim Medicos Plinius merito aspernitur, qui nostras vitas prostrant, *(e) animas nostras negociari.*

---

(a) Hist. Natural. Lib. XXIX. §. I. edit. Il. Harduin.

(b) Ibid. §. VII. p. 5. 497.

(c) Ibid. §. VI. pag. 495.

(d) Ibid. §. VII. pag. 497.

## FINIS TOTIUS OPERIS.

# I N D E X

## ALPHABETICUS AUCTORUM

*Qui speciales Tractatus de Morbis Mulierum ediderunt, vel de iis Morbis in institutionibus mentionem fecerunt.*

## A

- A** *Etius* quando inter vivos erat. pag. 304.; Eiusdem Tractatus de Morbis Mulierum primus est qui pervolvi mereatur. *ibid.*
- Akaki** ( Martinus ) Professor Collegii Regis anno 1574. composuit opusculum de Morbis Mulierum post ejusdem obitum in collectione Spachii impressum. 327.
- Albucaſis** Medicus Mahumetanus ( Aboulcaſem ). 312.; agebat de Morbis mulierum qui chirurgiam postulant. *ibid.*
- Alexander Benediſtus** Veronenſis Medicus ſæculi XVI. Græcorum doctrina valde inſtructus. 316.; egit de omnibus Mulierum Morbis, excepto furore uterino. 317.
- Anonymus.** 352.
- Areteus** Cappadocus; cum vixerit ejus ſtylus. 302.; primus obſervationem ostendit hydropis cum hydatidibus. 303.; quales perſcrutatus ſit Mulierum Morbos. *ibid.*
- Aſclepiades** Medicus, & amicus Ciceronis de ulceribus uteri mentionem fecit. 300.
- Avenzoar** Medicus Arabus religione Judæus, quid de Morbis Mulierum ſcripſerit. 312.
- Averroes** Medicus Arabus ſæculi XII. arte locutus eſt de Mulierum Morbis. 313.
- Avicenna** Medicus Mahumetanus ſæculi X. ejusdem opera. 310.; ipſum diffi- cillime perſcrutatur. *ibid.*

## B

- B** *Allonius* Gullielmus Doctör Pariſienſis auctor Tractatus de Morbis Virginum, & Mulierum juxta doctrinam Hippocratis. 331.; valde prolixus, & inconcinne digeſtus. 332.
- Bayro** ( Petrus de ) Pedemontanus nonnulla de Morbis Mulierum aſſert. 324.
- Bertrucius** ( Nicolaus ) Medicus Italus ſæculi XII., de nonnullis Mulierum Morbis egit. 313.
- Boerrhavius** ( Hermanus ) Profeſſor Lugdono-Battavus, ejusdem Aphoriſmorum judicium circa Morbos Mulierum. 352.
- Bon** ( Joannes le ) Medicus Regius, & Cardinalis de Guiſia Auctor Tractatus ſpecialis de Morbis Mulierum, cujus plures editiones exiſtant. 326.
- Bonacciolus** ( Ludovicus ) Medicus Florentinus ſæculi XVI. duplicem tractatum digeſſit de Morbis Mulierum. 321.
- Bottanus** ( Albertinus ) Profeſſor Patavinus Auctor ſpecialis Tractatus circa Mulierum Morbos. 328.

## C

- C** *Ampolungus* ( Emilius ) Profeſſor Patavinus egit de Morbis uteri. 322.
- Capivaccius** ( Hieronymus ) Profeſſor Patavinus ſæculi XVI. 329. Auctor de Morbis Mulierum. *ibid.*
- Cellarius** ( Henricus ) ſcripſit de ſuppoſita exulceratione matricis. 347.
- Ceſſus** Medicus Romanus ſub Imperio Tiberii. 301.; cenſura ejusdem operis de Morbis Mulierum pertractant. *ib.*

Crr-

- Cermeſonus* ( Antonius ) Profeſſor Patavinus ſæculi XV. 316.; ejuſdem conſilia circa Morbos Mulierum. 316.
- Ceſalpinus* ( Andreas ) exacte deſcripſit circulationem ſanguinis ante Harveum. ibid.
- Charleton* ( Gualtierus ) Medicus Londinenſis ſcripſit de uteri effluviis. 349.
- Cleopatra* Aegyptii Reginz tribuunt Tractatum de Mulierum Morbis. 305.
- Cocchi* ( Antonius Cæleſtinus ) Romæ Botanicæ Profeſſor de hyſterico morbo locutus eſt. ibid.
- Columbus* ( Realdus ) Anatomiz Profeſſor Patavinus, verum Piſanus, Romæ medicinam exercuit, docuitque ſanguinis circulationem ante Harveum. ibid.
- Connor* ( Bernardus ) Medicus Anglus, aut Irlandus Pariſis moram geſſit. 350.; in ſuis operibus deſcripſit Sarcoma uteri, quod conſecutus eſt hypogaſtri idum. ibid.
- Conſtantinus* Medicus Chriſtianus ſæculi XI. libellum ſcripſit de Morbis Mulierum, & matricis qui tres pagina, æquat. 311.
- Corbeus* ( Hermanus ) ejuſdem Tractatus de Morbis Mulierum. 333.
- Cordeus* ( Mauritius ) Doct̃or, & Medicus facultatis Pariſienſis primus interpres Libri de Morbis Mulierum Hippocratis. 328.; oſtendit obſervationem hydropiſ hydatidicę uteri. ib.

## D

- D***E la Boe* ( Franciſcus ) *Sylvius* Medicus Lugduno Batavus de Morbis Mulierum egit. 346.; ejuſdem opera poſt obitum obſoluerunt. ibid.
- De la Boe* ( Jacopus ) *Sylvius* compoſuit opus de Catameniis, & generatione. 323.
- Deodatus* ( Claudius ) obſervationem præſtitit valde utilem circa uteri ſarcoma. 335.
- Digby* arcana remedia adverſus plures Mulierum Morbos, ſutilia tamen exhibuit. 352.
- Doleus* ( Joannes ) Medicus Landegravi Haſſiz. 349.; Auct̃or Encyclope-

diz Medicę; ubi pertractat de Morbis Mulierum, opus tamen parvum. ibid.

- Doringius* ( Michael ) Medicus Uratſilavienſis; ejuſdem epiſtola de uteri hernia, & operatione Cæſariana, quam perperam tentavit in relato caſu. 335.
- Dunnus* ( Thaddæus ) Locamenſis collectionem publicavit remedium contra Mulierum Morbos, quæ a veteribus deprompſit. 325.

## E

- E***tmullerus* ( Michael ) Profeſſor Lyſienſis. 348.; egit de conceptione, geſtatione, & partu; obiit an. 1683. ætatis ſuę 39. ibid.

## F

- F***abricius* ( Gulielmus ) *Hildanus* Chirurgiæ celeberrimus Profeſſor ſex ſecularum obſervationum digeſſit, quarum nonnullæ utiliter reſpiciunt partum, abortum, ſectum mortuum, ceteroſque præcipuos uteri morbos. 335.
- Fabricius* ( Hieronymus ) *ab-aqua-pendente*, Profeſſor Anatomię in Patavino lycæo, invenit an. 1574. valvulas venarum. ibid.
- Fernelius* ( Joannes ) Primus Medicus Henrici II. 323.; tria capita ejuſdem operis morbos muliebres reſpiciunt. ib. ipſe deceptus eſt, cum bulla hyſterica, quam per imum ventrem nat̃are ægre perſentiant, pro utero habuiſſet. 324.
- Fitz-Gerald* ( Gerardus ) Profeſſor Monſpeſſulanus obiit an. 1748. poſtquam in concinnæ de Morbis Mulierum ſcripſit. 357.
- Fontanus* ( Nicolaus ) Medicus Amſtelodamenſis auct̃or tractatus Mulierum. 336.
- Fontanonus* ( Dyonifiſius ) Profeſſor Monſpellienſis locutus eſt de Morbis Mulierum. 322.
- Foreſtus* ( Petrus ) in Lugduno-Batava univerſitate primus Profeſſor circa recentiores morbos utiles obſervationes exhibuit. 330.

Fræ

*Fravendorffius* (Philippus) Medicus A-  
lemanus tractatus edidit de Morbis  
Mulierum. 331.

*Freind* (Joannes) celebris Medicus An-  
glus. 351.; ejusdem systhema circa  
causam menstruationis. ibid.

*Frejart* (Petrus) Medicus Leodiensis  
auctor emmenologiae: hujus operis  
judicium. 352.

*Fuchsius* (Leonardus) Medicus Bava-  
rus, Ingolstadt Professor, quid scri-  
perit circa Mulierum Morbos. 322.

## G

*Galleatius de S. Sophia* Medicus Pa-  
tavinus saeculi XV. celebris inter-  
pres operum Rhazis. 316.

*Galenus* doctus Medicus, qua aetate flo-  
ruit. 301.; ejusdem stylus, character,  
& operum judicium. 302.; ex Pro-  
fesso de Morbis Mulierum minime  
egit. ibid.

*Garmer* (Joannes) Diatriba de utero pro-  
cidentia. 349.

*Gatinaria* (Marcus) Medicus Italus se-  
culi XV. locutus est de Morbis Mu-  
lierum. 315.

*Gordonus* (Bernardus) Professor Mon-  
spessulanus saeculi XIV. 314. Morbos  
Mulierum pertractavit juxta Arabum  
sententiam, quam propriis observa-  
tionibus confirmavit. ibid.

*Grutlingius* (Philippus Georgius) Ger-  
manico idiomate de Morbis Mu-  
lierum scripsit. 348.

*Gualinerius* (Antonius) Medicus Me-  
diolanensis. 315.; auctor tractatus con-  
ceptionis, qui eo collinear, ut opta-  
tus partus Ducissae Mediolanensis opi-  
tularetur. ibid.

*Goldhammers* (Joannes) Auctor Syno-  
psis Medicae de Mulierum, & infan-  
tum Morbis germanice conscriptae. 353

*Gunterius* (Joannes) Andernacus Me-  
dicus saeculi XVI. auctor specialis  
tractatus de Morbis gravidarum, par-  
turiendum, & infantum. 326.

## H

*Hally Abbatis* opera de Morbis Mu-  
lierum. 311.

*Hellwigs* (Christophorus) Auctor brevis  
pharmacopoeae Mulierum germanice  
scriptae. 351.

*Herricus de Saxonia* Auctor saeculi XIII.  
discipulus Alberti Magni; ejusdem o-  
pera vix pervolvi merentur. 314.

*Hercules Saxonia* Professor Patavinus; e-  
jusdem tractatus de Morbis Mu-  
lierum. 332.

*Heredia* (Petrus Michael de) Medicus  
Hispanus suum tractatum de Morbis  
Mulierum ab Arabis excerptit. 345.

*Hernius* (Joannes) Medicus Batavus  
Auctor exigui libelli de Morbis Mu-  
lierum. 333.

*Higbmorus* (Nathanael) Medicus Oxo-  
niensis, ejusdem opera de hysterico  
morbo, & hypochondriaco. 347.

*Hippocrates* vetustissimus Medicus; quan-  
ti pendeat ejusdem opera inquiritur  
quae Mulierum Morbos respiciunt. 300.

*Hoffmannus* (Fridericus) Auctor nuper-  
rimus, Hallae Professor, cum primum  
universitatem instituisset 355 hujus  
celeberrimi Medici amplicodici cen-  
sura ibid. ejusdem stylus Asiaticus, &  
infirmitas ib. nihil specialis habet cir-  
ca Mulierum Morbos. 356

*Horstius* (Gregorius) Medicus Ulmen-  
sis observationes perraras circa Mu-  
lierum Morbos exaravit. 334

*Hucher* (Joannes) Professor Monspessu-  
lanus, Auctor tractatus de sterilitate,  
qui magni pendet. 332.

## I

*Jason Pratenfis* Zelandus magni nomi-  
nis vir, Medicus saeculi XVI., ejus-  
dem opera de Morbis Mulierum ad  
sterilitatem accendam, & conceptionem  
fovendam pertinent. 321.

## L

*Langius* (Christianus-Joannes) Pro-  
fessor Lyplicensis. 351., ejusdem o-  
pera

per de Morbis Mulierum parvi pendent. *ibid.*

**Lazerte** (Jacobus) Professor Monspeffullanus; brevem vitam duxit; censura ejusdem operis quod medendi rationem complectitur 356 errores nonnulli hujus medici circa Mulierum Morbos. 357 redarguuntur ii qui Lazermi methodo tyrones instruunt. *ibid.*

**Leonellus Faventinus** Medicus Bononiensis sæculi XVI. 321.; ejusdem opera de Morbis Mulierum. *ibid.*

**Liebaux** (Joannes) Medicus Facultatis Parisiensis. 327.; quod edidit opus circa Mulierum Morbos, ab eo Marinelli depromptum est. *ibid.*

## M

**Marinello** (Joannes) Auctor tractatus Italici delle Malattie delle donne. 326.

**Massari** (Alexandri) sectiones circa Mulierum Morbos in Patavino liceo habitæ. 330.

**Mauriceus** (Franciscus) Chirurgus Parisiensis & in obstetricia arte peritissimus; in suo tractatu de Mulierum Morbis utilissimas observationes præbet quæ sunt maximæ praxis fructus. 350.

**Meadius** (Richardus) Medicus Anglus cujus opera valde docent. 356 ejusdem remedium ad catamenia revocanda. *ibid.*

**Meniotus** (Antonius) Medicus Regius, Auctor nonnullarum dissertationum circa Mulieres. 346.

**Mercatus** (Ludovicus) Medicus Hispanus. 327.; Auctor aurei libelli circa illos Morbos. *ibid.*

**Mercurialis** (Hieronymus) Foroliviensis subsecutivæ Professor Patavinus, Boniensis, & Pisanus, auctor Eximii tractatus de Morbis Mulierum. *ibid.*

**Meurdrac** (Maria) Auctor tractatus Chemiz germanice conscripti pro Mulieribus, earumque Morbis. 347.

**Montanus** (Joannis Baptista) Celebris Professor Veronensis; specialem tractatum scripsit de Morbis Mulierum. 324.

**Moschionus** Medicus Græcus, sæculi VI. peculiarem de Morbis Mulierum Libellum scripsit. 304.

## N

**Nenter** (Georg-Philippus) Medicus Argentinus, ejusdem opera de Morbis Mulierum. 356

**Nonus** Medicus Græcus X. ævi sub imperio Constantini Porphyrogenetæ; explanavit Mulierum Morbos juxta sententias Æginetæ, & Actii. 305.

## O

**Oehemens** (Joannes-Augustus) Auctor tractatus Germanici qui sub eo titulo extat, *Natura Arcanum, ægram Mulierem pertrahendo detestum.* 356

**Oribasius** Imperatoris Juliani amicus. 303.; ejusdem opera in quibus de Morbis Mulierum locutus est. 304.

## P

**Pareus** (Ambrosius) celebris Chirurgus XVI. ævi; in suo Tractatu de generatione de partu agit, & nonnullis Mulierum Morbis. 326.; ejusdem opera latine versa a *Guillemeau.* *ibid.*

**Paulus Egineta** quando inter vivos erat; 304.; editiones, & versiones ejusdem operum; *ibid.* ubi locutus sit de Morbis Mulierum. *ibid.*

**Pæ** (Lazarus) Joannis Marinello opusculum de Morbis Mulierum latine vertit. 333.

**Pfiser** (Joannis Nicolaus) Auctor tractatus quem de Morbis Mulierum germanice conscripsit. 350.

**Platearius** (Joannes) Medicus Salernitanus sæculi XIV. 314.; opus in quo de Mulierum Morbis diseruit. 315.

**Platerus** (Felix) Icones delineavit quæ ad structuram pertinent genitalium Muliebrium, & earum partium Morbos. 327.

**Prævestus** (Joannes) Professor Patavinus de Morbis Mulierum egit. 335.

**Primerosus** (Jacobus) Medicus XVII.



evi, Auctor tractatus de Morbis Mulierum. 345.

## R

**R** *Anchinus* (Franciscus) Professor, & Cancellarius Facultatis Monspessulanae; Auctor tractatus de Morbis filiarum. 334.

*Rhazes* Medicus Arabus seculi XI. parvifaciendus circa ea quae scripsit de Morbis Mulierum. 311.

*Riverius* (Lazarus) celeberrimus Professor Monspessulanus; ejusdem opera. 336. explicant nitide Mulierum Morbos. 337. fuit Sennerti Afsecta. ibid.

*Rodericus a Castro* Medicus Lusitanus religione Judaeus Hamburgum profugus opusculum edidit anno 1604. de Mulieribus Morbis. 332.

*Rocheus* (Nicolaus) Auctor specialis tractatus de Morbis Mulierum Avicennae doctrina & propria experientia fultus. 322.

*Rondeletius* (Gulielmus) Cancellarius Facultatis Monspessulensis magis naturae Historia quam medicina instructus. 325; Auctor tractatus nondum impressi de Morbis Mulierum. ibid.

*Ronseus* (Balduinus) Medicus Battavus ejusdem opera de Morbis Mulierum. 319.

*Rudolphus* (Joannis Gabriel) dissertationem composuit in qua nonnullas observationes ostendit quae ad mulieres pertinent mensibus nimis laborantes. 352.

*Ruef* (Jacobus) Chirurgus Tigurinus Auctor latini opusculi circa generationem, conceptum, & partum. 323.

## S

**S** *Anden* (Henricus Van) observavit uterum in descensu obversum. 353

*Santorini* (Joannis Dominicus) Venetijs Anatomiae professor, quid sentiret de Catameniorum origine. 351.

*Savonarola* (Joannes Michael) Professor Patavinus de gestatione, & partu egit. 316.

*Schenkius* (J. G.) Medicus Allema-

nus, Editor Catalogi tractatum de de Morbis Mulierum. 350.

*Schrotters* (Caspar) brevem Pharmacopeam impressit circa virgines, mulieres, & infantes Germanico idiomate conscriptam. 373.

*Sebizius* (Melchior) professor Argentinus, Auctor observationis circa Molam carneam uteri. 334; Suspicatur tamen hujusmodi Molam Steatomatrica fuisse. ibid.

*Sennertus* (Daniel) Professor VVitembergensis. 335; egit de omnibus Mulierum Morbis solidissima, & admiranda methodo. ibid.

*Setapionus* (Joannes) Medicus Arabus XI. seculi. 311; ipsius opera. ibid.

*Servetus* (Michael) cognovit sanguinis circulationem. 338.

*Sommers* (Joannes-Georgius) Auctor opusculi Germanice exarati sub titulo . . . *Usuel des Femmes, avec l'ecole des accouchement.* 350.

*Soranus* in suo tractatu de Morbis Mulierum loculentissimam exhibuit uteri descriptionem. 302.

*Sorbaix* (Paulus de) Austriacus Medicinæ professor, egit de morbis mulierum. 347.

*Spachius* (Israel) professor Argentinus Auctores collegit, qui de recensitis morbis scripserant. 331.

*Sprye* (Nathanael) Auctor tractatus fluxus menstrui; ejusdem doctrina exponitur. 349.

*Stballius* (Georg - Ernestus) primus Medicus Regis Borussiae, Auctor plurimum dissertationum de mulierum morbis. ibid.

*Sydenhamius* (Thomas) Medicus Anglicus, magni nominis vir. 348; scripsit de Affectione Hysterica; opus quanti pendat. 348.

## T

**T** *Erenzoni* (Joan-Antonius) professor Pisanus; Auctor libellide morbis uteri. 353.

*Teillier* (Le) filius; Animadversiones criticæ circa Emmenalogiam Freydy. 353.

Thea-

*Theodorius Priscianus* Medicus Latinus  
VIII. aut IX. sæculi. [305.](#) Auctor  
opusculi de Morbis Mulierum cujus  
plures Editiones existunt. *ibid.*  
*Trincavellus* ( *Victor* ) Venetus profes-  
sor Patavinus sæculi XVI. ; Auctor  
consulationum medicarum circa mor-  
bos Muliebres. [324.](#)  
*Trotula* Obstetrix XIII. ævi. Quæstio est  
de ejusdem opere. [313.](#)

## V

*Valescus de Taranta* Lusitanus Mon-  
spessulii Medicinam exercuit sæ-  
culo XIV. ; [315.](#) de iis morbis præ-  
cessoribus suis melius egit. *ibid.*  
*Varandus* ( *Joan* ) professor Monspes-  
sulanus, clare, & loculenter de Mor-

bis Mulierum pertractavit. [333.](#)  
*Vvier* Medicus Ducis Cliviæ Auctor ob-  
servationum de Morbis genitalium  
Muliebrium. [325.](#)  
*Villis* ( *Thomas* ) Medicus Anglus qui  
plurimi existimabatur. [346.](#) ; ejusdem  
Apologia adversus Highmorum circa  
Affectiones Hystericam, & Hyppo-  
chondriacam. [347.](#)  
*Vvolpius* ( *Caspar* ) Medicus Tiguri-  
nus alteram collectionem edidit aucto-  
rum qui de iis morbis scripserunt. [328.](#)

## Z.

*Zacutus Lusitanus*, ejusdem operum  
censura. [336.](#) ; ipsius observatio-  
nes quæ Morbos Mulierum respiciunt;  
caute tamen perlegi debent. *ibid.*



# I N D E X

## R E R U M L O C U P L E T I S S I M U S .

## A

**A** *Abcessus uteri*, innotescit per signa indicata. Pag. 192

distinguitur in phlegmonosum, & tuberculofum. ibid. Differentiæ. ib. & seq. Cause. 193. Inflammatorii. ibidem Tuberculosi ( Vid. *tubercul.* ) Theoria generalior. 194. Symptoma. 195. Pus diversas sibi pandit vias. ib. Diagnofis generalior. 197. specierum. ibid. caufarum phlegmonofi & tuberculofi. ibid. Curatio dum ipse gignitur. 198. jam fupuratione perfecta. ibid. quomodo scalpello aperiat pro diverfo ejusdem politu. 199. anomalus. 225

*Abfentii* planta ftomachica eft, eaque in decoctionibus ufuevit. 83. infufum vinofum. ibid. quinta-eflentia. ibid. Syrupus. ibid.

*Acetofæ* radix refrigerans. 104. Syrupi ufus. 105

*Acetum* in uteri fuphumigiis utile quomodo adhibeatur. ibid.

*Agæ eruditorum Lypfienf.* oftendunt rubram fanguinis partem exiguam efle. 74

*Adftringentia remedia* potiffima evadunt adverfus Menorrhagiam. 97. quomodo adhibeantur. ibid. in uteri hæmorrhagiis extrinfecus applicantur. 99. nonnulla ex vegetabilibus defumuntur: 101. videlicet ex radicibus foliis. ib. floribus. ib. fructibus. ibid. fuccis. 102. lignis. ib. refinis. ibid. nonnulla ex animalibus. 102. nonnulla ex mineralibus. ibid. *vulneraria* vasorum elaterium reftituunt, impediuntque albos fluores, quos eorum laxitudo producerat. 126. funt radices. 127. folia. ibid. fucci. ibid. ligna. ibid. & refinæ. ibid. fimpliciora ex vegetabilium tantum radicibus. 128. foliis. ibid. floribus, fructibus, fuccis. ibid. lignis, & corticibus de-

fumuntur. ibid. fimpliciora nonnulla ex animalibus. 129. *alia* ex mineralibus fumuntur. ibid. intrant præparationes Galenicæ adftringentes. 103. & ceteras officinales, fyrupos nempe, & aquas deftillatas. 129. crebro adhibita nimis uterum lædunt. 107. externe fufpecta funt in uteri morbis. ibid. quibus cautelis tute exhibeantur. ibid. commendantur adverfus vaginæ defcenfum. 267

*Aeris* magnus æftus caufa fluxus immo- dici, aut menorrhagiæ. 89

*Affinitas* humorum uteri cum iis mammarum, eorum fymphathicæ relationis explicatio. 4

*Agnus caftus* in fuore uterino commendatur. 164

*Agrefæ* ( fyruppi ) ufus. 105

*Alberti* ( D. ) difsertatio de *Bella donna* cancerum adverfus. 237

*Aleis* ungula fpecifica fua virtute, hysterico vapori adverfatur. 294

*Alchimilla* planta vulneraria. 104

*Aloes* Medicus ufus in catameniis fuppreffis. 45

*Alimenta* potiffimum præftant fanguinis materiam: 74. qua de caufa refpant *agæ* chlorofi affectæ. 76

*Alibæ* radix remedium præftat dulcificans, ejusdemque ufus. 104

*Alumen* valde adftringens. 102. credunt fpecificum remedium adverfus menorrhagiam. 109

*Annotatio uteri*, quando institui poffit. 190. 263. qualia damna in gangrenofa prolafu afferat. 259

*Amuleta* veteres magnificabant. 299

*Anafarca* ( vid. *Oedema.* )

*Anafthomofes* five communicationes laterales arteriarum, & venarum uteri. 3. appendices fuppeditant, quæ intimam uteri tunicam perfodiendo ibi patulæ fe oftendunt. ibid.

*Anatomiam* Græci ignorarunt. 298. Arabes neglexerunt. 308. Monfpellulani primum excoluerunt anno 1376. & cada-

cadavera dissecuerunt de licentia Ludovici Andegavorum Ducis, & Occitantæ Præsidis. **309.** cum scientiarum restauratione Horuiffi constat, ac proinde magni nominis Anatomici infurrexiffe. **319.** utilem evadere ad investigandam sedem, & causam plerorumque morborum. *ibid.* magno cum fructu excolebant postquam circulationem sanguinis invenerunt. **340** (circa) notiones necessariæ, ut rite instituantur observationes, quæ morborum indolem patefaciunt. *ibid.*

*Aneurismatica*, uteri *vasa* Menorrhagiam inducunt. **89**

*Angelica* radix specifica sua virtute chlorosum compefcit. **84**

*Animi affectus* interdum fluentes sistunt menses. **28.** *deliquium* in menorrhagia quale auxilium postulet. **98**

*Anodyna* in hysterico morbo usitatoria. **292**

*Antibrachii* origo. **299**

*Antihysterica* qualia sint. **292.** diluentibus, & humectantibus copulantur, ut calor imminuatur, quem ipsa excitant. **293**

*Antiphlogistica* remedia eorumque virtutes, atque usus in uteri inflammatione. **178**

*Aperientia* mitiora stomachicis debent copulari in chlorosis curatione. **83.** idonea sunt in ea Chlorosis specie quæ ab obstructione procedit. **292.** martialia eorumque præparationes, & doses. *ib.* mercurialia dulcia. *ib.*

*Apium* prodest in albo fluore. **126.**

*Apoplexiam* interdum gignit mensum suppressio. **34.** æmulator vapor hystericus. **287.** qua ratione ipsam distinguant medici ab hysterico morbo. *ibid.*

*Appendices venosæ* uteri, ex arteriarum cum venis connubio prodeunt, & interna facie matricis perfosa patulæ ibi sunt. **3.** placentam cum utero neclunt. *ibid.* & **16.** citra gestationem oculos effugiunt. **3.** menstruum sanguinem effundunt. *ib.* & **10.** viatæ catameniorum suppressionem faciunt. **28.** dilatatæ nimis menorrhagiam inducunt. **88.** concisæ, vel ex-

coriatæ dulcificantia, atque aglutinantia postulant. **103**

*Appetitus* in chlorosi prostratur. **76.** paloris curationem implicat. **80.** amissus, aut depravatus, qua de causa in menorrhagiis reperitur. **91**

*Aqua castitatis* (Senerti) commendatur in furore uterino. **165.** camellitarum. **83.** clavorum potum aperientem suppeditat in virginum palore. **84.** aut essentia Rhabeli in menorrhagiis utilissima. **100.** valde adstringit. **103.** ejusdem compositio. **109** quomodo exhibeatur. *ibid.*

*Aque anibysterice.* **190**

*Aque minerales* menses provocant, **24** ferrugineæ quando convenient in mensium suppressione. **37.** in palore profunt cum cautelis in earum exhibitione necessariis. **84.** elaterium restitunt appendicum venosarum. **106** thermale aduersus chlorosum utiles evadunt. **84.** tum intrinsecus cum extrinsecus conveniunt in albo laticinoso fluore a vasorum laxitudine procedente. **126.** pro injectionibus usuveniunt, quæ uteri elaterium restituere valent. **220.** roborant matricis fundum in ejusdem descensum labefactum. **261**

*Aquarum* (de Barege) utilitates generales, & speciales ad solvendos uteri syrthos. **221**

*Arabes* medicinæ incubuerunt Sæculo IX. **307**

*Aristolochia* usus in menstruorum suppressione. **45**

*Artemisicæ* similis usus. *ibid.*

*Arteriæ spermaticæ* partem supremam uteri aggrediuntur. **2.** hypogastricæ medium tenent. *ibid.* hæmorrhoidales per infernam reptant. *ibid.* quomodo distribuuntur intra uteri tunicas. *ibid.*

*Asari* usus aduersus album fluorem. **126.**

*Afinini summi* succus expressus contra menorrhagiam valde commendatur. **109.** syrappus album fluorem compingit. **114**

*Astrologia* a Medicis Arabis exculta. **298.** ab ipsis pluribus tentaminibus investigata. **309.** judiciaria post scientia-

tiarum reſtaurationem parvi exiſti-  
mabatur. 319

*Aſhma* conſequens eſt haud infrequen-  
ter ſuppreſſe menſtruationis. 34

*Aurantia acia* & *viridia*, eorumque  
preparationes quas *Septalius* patrabat  
adverſus Menorrhagiam. 110, corti-  
cem habent adſtringentem. 102

*Atheroma* ſpecies eſt tumoris ciſtici. 222

## B

*B* *Agilvius plagivius* fuit, ejuſdemque  
ſententiam circa diſtinctionem albi  
fluoris, a gonorrhœa virulenta erro-  
neam eſſe oſtendimus. 122

*Balaſta* remedium adſtringens. 128

*Balnea*, & *ſemibalnea* utilia evadunt,

adverſus uteri denſitatem, quæ pri-  
mam menſum eruptionem retardat.

24. eorum uſus in menſium ſuppreſ-  
ſione. 37. ex decoctionibus parantur

plantarum emmenagogarum. 43. *cali-*  
*da* nimis Menorrhagiam inducunt.

89. *frigida* maxime in furore uteri-  
no commendantur. 163. utilia eva-  
dunt in uteri ulceribus. 211. ſyrrho

218. cancro. 234. quales animadver-  
ſiones poſtulant in uteri inflammatione.

180

*Balaſtica* remedia adverſus ulcera ma-  
tricis commendantur. 208

*Balaſtum Canaſenſe* remedium adſtrin-  
gens quomodo adhibeatur. 102. de

*Coppay* eamdem indicationem implet.

ibid. utrumque appendices venoſas  
conſtringit. 106.

*Belladonna* ſpecificè laudant ad ſubi-  
giendum cancrum. 237. circa id per-  
ſcrutata a D. Lambergem. 238

*Betonica* planta adſtringens, ejuſdem-  
que exhibendi ratio. 101

*Bezardicum orientale* laudes quas a non-  
nullis promeritum eſt adverſus chlo-  
roſum. 84

*Bilis uſus* in œconomia animali, in di-  
geſtionis præſertim negotio. 74

*Biſſorta* planta adſtringens. 101

*Boli anthyſterici*, eorumque compositio  
& uſus. 291

*Bolus armena* remedium adſtringens. 102

*Botanica* progreſſus poſt ſcientiarum re-

ſtaurationem. 218. incubuerunt re-  
centiores magnopere. 344

*Bovile carnis* ſumo induratz pulvis al-  
bos fluores ſiſtit. 134

*Buchnerus* (D.) theſes defendit de mer-  
curialium uſu adverſus cancrum, hu-  
juſmodi ſententiam perſcrutamur. 236

*Bugula* planta vulneraria. 104

*Burſa-Paſtoris* planta adſtringens. 101

(ex) diſtillata aqua quomodo uſuve-  
niat. 103

*Braſilienſes mulieres* pauciora habent ca-  
tamenia. 17

*Bryonia* remedium minus tutum in men-  
ſium ſuppreſſione. 49

*Brunella* planta adſtringens. 101

*Brutorum femelle* menſibus gaudet. 17

## C

*C* *Achexia* in filiabus effectus eſt re-  
mediorum emmenagogorum, quæ  
nimium induxerint menſium produ-  
vium. 21. Quid ſit; & qua de cauſa  
ſubſequatur Menorrhagiam. 92

Symptoma eſt fluoris albi. 119

*Camphora* ſuſpecta eſt in albo fluore.

135. ejuſdem uſus in furore uterino.

164. in vapore hyſterico. 295

*Cancer uteri* conſequens eſt albi fluoris  
in menſium ſuppreſſione obvi. 34

ejuſdem deſcriptio. 230. Differentiæ.

231. Cauſæ. ib. Symptomata. 232. Dia-  
gnofis. 233. Prognofis teterrima eſt

ibid. Curatio palliativa quatuor in-  
dicationes poſtulat. 234. ipſum ad-  
verſus propoſita remedia. 236

*Cantharides* intus ſumptæ in albo fluore,  
ladunt. 139

*Capitis gravedo* in Chloroſi, qua de  
cauſa habitualis fiat. 77. morbi in men-  
ſium ſuppreſſione obvi ſunt. 31. af-  
fectio qua de cauſa in febre appareat,  
quæ comitatur uteri inflammationem.

172

*Carantia* uſuveniunt in menſium ſup-  
preſſione. 45

*Cardamonum* remedium ſtomachicum. 82

*Cardiagglia*, ſive cordis affectus comi-  
tatur uteri inflammationem. 173

*Caryophyllata* planta vulneraria quomo-  
do exhibeatur. 104

Ca-

*Caryophylli* remedium stomachicum. 82  
*Cartbesii* systhema philosophicum illud  
 Aristotelis a medicina proscripsit. 339  
*Cascharilla* in uteri ulceribus adhibetur. 207  
*Cassa lignea* remedium stomachicum. 82  
*Castoreum* in mensium suppressione proficuum. 48  
*Cataplasmata* adstringentia in Menorrhagiis usum habent. 99. annodyna in uteri inflammatione. 177. adversus matricis gangrenam. 189  
*Catechu* remedium adstringens. 102. ejusdem tinctura. 103  
*Cauterium* utile in palliativa curatione albi fluoris. 133. tum in uteri ulcere. 206  
*Cerebrum* cedematofum sit in Chlorosi, hujus phaenomeni effectus. 78  
*Celtica lues* fugigitur usu interno sublimati corrosivi. 236  
*Chalybi* in catameniorum suppressione exhibetur. 47  
*Chamaemeli* usus in mensium suppressione. 45. Aperientia usitatoria in Chlorosi supeditat. 83  
*Chemie* origo apud Arabes, 309. progressus post scientiarum restaurationem veteram medicinam deturpabant 319. ad æqua principia redacta recentiorum cura. 341  
*Chine* radices Decoctio elaterium restituit appendicum uteri venosarum. 106  
*Chirurgia* infusoria quid sit. 243  
*Chlorosis* ethymologia. 72. 73. Vid. *Palor virginum*.  
*Cibus* liquor lacticinosus ab alimentis digestionis ope depromitur. 74. multiplex ratio, qua perficitur antequam sanguinis indolem sumat. ibid. Observationes Microscopiorum, quæ ipsum globulis constare ostendunt. 75. imperfectus pravum sanguinem gignit. ibid.  
*Chymus* pulmentum refert ex cibis congestum. 74  
*Cicatrices*, quæ jungunt vaginæ parietes. 53. a præcedentibus exulcerationibus aut scissuris originem habent. ibidem superficiales vaginæ quomodo cultro destruantur. 59. profundiores quomodo emolliantur. ibid. operationes Chirurgicæ quomodo in-  
*Astruch de Morbis Mulierum.*

stituuntur. ibid. ab his operationibus quando abstinere debeat. ibid., & 60  
*Cicer* in mensium suppressione usuvenit. 47  
*Cicuta* commendatur vel sub cataplasmatum forma, vel infusa, & intrus exigua dosi sumpta adversus uteri furorem. 165. adversus cancerum specificè proponitur. 219  
*Clysteria* stimulantia in mensium suppressione adhibentur. 43. qualia conveniant in laboriosa menstruatione. 66. utilia evadunt in appetitus deprivatione. 181. anthysterica pharmaca, quæ hæc intrant. 289  
*Cinamomi* usus stomachicus. 82  
*Collica* uteri a menstruo tempore obvia. 16. filiabus præsertim, quæ mensibus carent. 22. Quid prænunciet. 23  
 Quomodo a mensium suppressione originem agnoscat. 30. Morbus erat, cujus nomen sub Tiberiis Imperio latebat. 299  
*Colon* in Chlorosi statu tumet. 77  
*Color faciei*, 2 quo procedat, qua de causa abeat. 73. totius corporis vividus a quo procedat, & causæ quæ eum deturpant in Chloroticiis mulieribus. 76  
*Conatus ventris* validiores in diarrheis Menorrhagiam induunt. 90  
*Conceptio* intra ovaria. 269  
*Confectio Alchermes* remedium stomachicum. 83. *hyacinthina* idem præstat. ibid.  
*Conformatio vitata uteri*, & partium vicinarum menses implicat. 50  
*Consolida major* planta vulneraria. 104  
 Syrupum præbet adstringentem. 105  
*Consumptio* effectus albi fluoris in mensium suppressione. 34  
*Convulsio* uteri excitatur a grumis sanguinis in ejusdem cavitate detentis. 92  
*Convulsivi motus* quomodo speciali positionis formula compescantur. 36  
*Contractio convulsiva* uteri recentiam suppressionem facit. 28. in laborioso partu uteri obversionem producit. 268  
*Coralia* inter remedia adstringentia locum habent. 102. eorumdem tinctura, & syrupus. 103  
*Cordialia* jure adhibentur in pulsum lan-

languore, obuium symptoma uteri inflammationis, usuueniunt [178](#). contra uteri gangranam. [105](#)  
*Coriandria* remedium stomachicum. [83](#)  
*Cornu Cervi* remedium adstringens. [104](#)  
*Cortex, & capsula quercus* valde adstringunt. [101](#)  
*Cotoneorum flores*, 101. syrampus valde adstringunt. [ibid.](#)  
*Creta Brianconia* remedium adstringens. [102](#)  
*Crocus Orientalis* in mensium suppressione valde confert. [47](#). remedium stomachicum [82](#). *Martis* aperientis usus, & dosi *Martis* adstringens. [93](#)  
*Cruditates* primatum viarum confirmant Menorrhagias. [104](#)  
*Cucumis sythensis* remedium suspectum in mensium suppressione. [49](#)  
*Cucurbitule* coxis appensæ in menstruorum retentione inutiles evadunt. [43](#) pariter frastanea in uteri hæmorrhagiis. [111](#). scarificatæ quandoque in uteri inflammatione, venæ sectionibus substituantur. [176](#)  
*Culcita* lanæ repleta nocent in sanguine uteri fluxu, straminibus potius, aut crinibus repleri debent. [96](#)

## D

**D** *Eclamatio* elata voce increpata, uteri hæmorrhagiam inducit. [90](#)  
*Decussiones refrigerantes* in mensium suppressione quando convenient. [37](#). *aperientes* qua methodo parentur. [42](#) quomodo adhibeantur in difficili menstruatione. [66](#). *refrigerantes* emulionibus remixtæ exhibentur in uteri hæmorrhagia. [98](#)  
*Decoctum refrigerans* in uteri inflammatione locum habet. [ib.](#)  
*Dejectiones* supprimuntur, aut dolorem inducunt modo uterus inflammatione laboret. [172](#)  
*Delirium* symptoma inflammationis matricis. [ibid.](#)  
*Descensus uteri*, huiusque morbi descriptio. [256](#). vel incompletus est: [ibid.](#) vel completus. [ibid.](#) causæ huius mor-

bi. [ibid.](#) ejusdem symptomata. [258](#)  
*Diagnosis*. [259](#). Prognosis incompleti descensus. [ibid.](#) completi. [ibid.](#) quando amputari debeat. [259](#). *vid. amputatio* detrimenta completi descensus uteri, qui restitui nequeat, [ib.](#) Curatio completi descensus. [260](#)  
*injectiones* adstringentes in descensu incipienti. [ibid.](#) methodus restituendi uterum in descensu incompleto. [261](#). quid faveat restitutioni completi descensus. [262](#). medendi ratio modo restituito non obineatur. [263](#). amputationis methodus in præcipiti casu. [ibid.](#) Descensus vaginæ, [vid. vagina](#). [ibid.](#)  
*Desidia* in filiabus obvia chlorosi laborantibus. [78](#)  
*Deobstruentia* quæ conveniunt in obstructionibus uteri. [130](#)  
*Diæta* in uteri inflammatione strictissima esse debet. [ib.](#)  
*Diapedesis*, seu cruoris trans porros vasorum uteri diaphoresis minime locum habet in menstruo fluxu. [11](#)  
*Diaphoretica* remedia quando adhibeantur in uteri inflammatione. [178](#)  
*Diaphragma* dum sympathiz lege contrahitur, hyppocondriorum intumescencia gignitur. [77](#)  
*Digestio* depravata qualia remedia poscat. [25](#). alimenta in chylum convertit. [74](#). cum optima fiat bonæ crasis sanguinem gignit. [75](#). difficillime, & imperfecte in chlorosi perficitur. [76](#) incompleta obuium est albi fluoris symptoma. [77](#)  
*Diluentia, & refrigerantia* in ulcerematricis usuueniunt. [206](#). qualia validiora sint ad lympham cruescensque abluendum. [ibid.](#) in hysterico morbo usitatoria. [293](#)  
*Diminutio mensium* triplici ratione oriri potest. [27](#). [28](#). vel quia catamenia minus uberrima sint. [28](#). vel minus perdurent. [ibidem](#) vel serius revertantur. [29](#)  
*Dissimulatio* ex parte ægrotantium circa causas circumstantiarum uteri ante primam mensium eruptionem inutilis evadit. [22](#)  
*Dissolutio sanguinis*, pthisanam postulat

lat a nobis descriptam quę valde prodest. 93

*Diuretica* quotidie, vel crebro hauriri debent in menstruum cessatione. 46. qualia convenient in uteri inflammatione. 178. in hydropse matricis. 245. series eorum medicamentorum, & exhibendi ratio. 246

*Dolores capitis* quę de causa ægras infestent prope menses. 16. uteri valde nocui sunt post mensem suppressionem. 34

*Dysuria* seu *urine ardor* quę de causa producatur in uteri inflammatione. 172

## E

*Ebur* combustum adstringit. 122. raspatum sæpiissime adhibetur. 104

*Effluvium lymphaticum* præcedit, & subsequitur menstruationem. 6

*Elixir proprietatis* simplex, remedium est stomachicum. 81. destillatur, seu *Garrus*. ibid.

*Embrocatio* in uteri inflammatione proficua. 177

*Emetica* in suppressione mensium exhibentur. 43. quando convenient in Menorrhagiis. 108. qualia usitatiora sint, & quę dosi propinentur. 109

*Emmenagoga* remedia menstruum fluxum provocant, sunt vel aperientia vel solventia. 24. in eorum administratione necessariz cautelę. 25. quando convenient. 38. eorum diversę species, & doses vulgatiores. 39. & seq. eorum abusus qualia detrimenta afferat. 21. 90. suspecta sunt in mensem suppressione. 147

*Emplastrum* adstringentia inefficacia in uteri hæmorrhagia. 99. anthysterica umbilico apponuntur. 290

*Epidermis* subtilissima & diaphana est vividumque idcirco cutis colorem ostendit. 73

*Epilepsia* hysterica quomodo distinguitur a morbo herculeo. 287

*Equisetum* planta adstringens. 101. uisus aquę distillatę ex eadem planta. 103

*Erpes oris* sive *Mentagra* quando invenitur. 299

*Escharotica* in uteri gangręna utilia evadant. 189. ab iis tamen interdum destititur ibid. foveant casum escharę uteri gangręnę. ibid.

*Ethiops martiale* remedium aperiens ejusque dosis. 83

*Excresecientia vagina* 53. neque escharoticis consummi, neque cultro abradidi deberent, sed forbice secari. 58. ib. in iis operationibus cautelę necessariz. 79

*Exercitia corporis* varia in mensem suppressione idonea. 44. augent in chloroticis respirandi difficultatem. 77. augentque capitis gravedines in illo morbo obvias. 78. violentiora hæmorrhagiam uteri inducunt. 89

*Exsiccantia* in uteri ulceribus usum habent. 209

## F

*Fbris lenta* effectus albi fluoris in mensem suppressione occurrentis. 34. 39. amatoria interdum appellatur chlorosis. 72. alba interdum. ib.

vespere revertens in chlorosi valde nocua. 84. remittens nimios menses inducit. 89. *Lypria* symptomata, lerumque grandioris viscerum inflammationis. 173. lenta evadit in uteri abscessu. 196. character in ulcus matricis occurrentis. 202. *milliarius* origo, & progressus. 343. *purpurea*, seu petechialis minime novus morbus putatur. 320

*Ferrum* asuvenit in mensem suppressione, usitatiora præstat aperientia in albo fluore idonea. 83

*Pillioendula* planta adstringens. 101. ejusdem pulvis in albo fluore commendatur. 285

*Fimi asinini* succus expressus laudatur ad injectiones conficiendas contra uteri hæmorrhagias. 100

*Fluores albi* in filiabus occurrunt menstruis orbatis. 21. conditio earum quę iis sunt obnoxiz. ibid. mensem suppressione inducunt. 28. vel a suppressis mensibus procedunt. 29. qualia scenomena tunc superveniant. 34. fluores albi in difficili, aut laborio-



fa menstruatione facile occurrunt . 62. quare menses nimios faciant . 87. *Flores albi* describuntur . 113. eorundem differentiz a laticis natura desumptæ . 114. a colore . ibid. a qualitate . ibid. ipsi vel *lactei* apparent , vel *lymphatici* . ibid. causæ fluoris albi laticinosi explanantur . ib. causæ lymphatici 116. omnium differentiarum hujus morbi descriptio . 177. ipsi vel suppressionem comitem habent vel non . ibid. vel continentes sunt , vel intermittentes . ibid. incontinenti albi fluoris fluxu materies , vel una est vel variabilis quantitatis respectu . ibidem augmentum hujus morbi vel periodum servat vel nullam . ibid. regressus albi fluoris intermittens , vel periodicus est vel non . ibid. flores albi diversos colores præferunt . 118. modo acrimonioli sunt , modo graveolentes . ib. eorum symptomata describuntur . ib. albi fluoris acris in solida effectus enumerantur . 119. *albi* fluoris Diagnosim generalior . 120. quomodo distinguantur a purulento uteri fluxu . ibid. a gonorrhæico effluvio . ibid. error illorum qui albos fluores gonorrhææ methodo pertractant . 122. Diagnosim specierum . ibid. Diagnosim causarum . 123. morbi prognosim . 124. fluores albi lactei lymphaticis quæ de causa mitiores . ibid. quando incurabiles utrique fiant . 125. curatio albi fluoris ab ubertate lactis uterini procedentis . ibid. curatio dietetica . ibidem incedendi ratio venæ sectionum ope , clysterium , catharsis diureticorum , diaforeticorum solventium , aut aperientium auxilio . 126. curatio albi fluoris laticinosi qui a maxima procedit fluiditate lactis uterini incrassantibus instituta . ibid. de lactis , pthisanarum incrassantium , narcoticorum , & absorbentium usu verba sunt . ibid. indicationes curativæ albi fluoris quem gignit vasorum atonia . ibid. usus balneorum , injectionum , & porus aquarum thermalium . ibid. adstringentia vulneraria in hoc statu conveniunt . ibid. fluores lym-

phatici , eorum curatio . 129. triplicis causæ respectu . 130. vel quando ab uteri prolapsu procedunt . ibid. vel ab obstructione , aut tuberculis uteri . ib. remedia idonea in hoc postremo casu . 130. fluores albi lymphatici a scissuris matricis procedentes remedia postulant agglutinantia nutritientia farinacea , & incrassantia . 131. curatio palliativa hujus speciei , regiminis ope quod morbi violentiam compescit & effectus retardat . 132. læviori catharsi . 133. vel diluentibus , humectantibus , & dulcificantibus remediis . ib. cautelæ necessariæ in albi fluoris curatione . ib. remedia specifica adversus hunc morbum commendata quibus uti potest citra detrimenti metum . 134. remedia proposita nocua tamen vel suspecta . 136

*Fluores albi* subsequuntur uteri syrrhum . 215. vapores hystericos excitant , quibus medetur remediis indicatis . 292

*Fluxus menstruus* . 5. ejusdem periodicus regressus , & perduratio . ibid. tria stadia menstrui fluxus . ibid. copiam ejusdem . 6. indoles menstrui sanguinis . ibid. signa quæ mensurruptionem prænunciant . ibid. gestationis tempore plerumque deest . ibid. quamdiu hujusmodi fluxus perduret . ibid. ex quo loco stillet sanguis . ibid. rationes , quæ confirmant ipsam ab uteri cavitate procedere . 7. interdum ex vaginæ parietibus erumpit . ibid. in quibus circumstantiis id potestimum eveniat . ibid. quandoque hujusmodi sanguinis effusio per totum gestationis tempus persistit . ib. menstruus sanguis ab arteriis procedit aut venis . 8. ipse ab universali vasorum , aut locali uteri plethora dependet . 9. rationes , quæ localem vasorum matricis repletionem defendunt . ibid. quomodo menstrua eveniant ratione plenitudinis vasorum lacteorum matricis . 11. menstruus fluxus quomodo periodice desinat . ib. causæ prioris eruptionis . 12. causæ periodicæ regressus qui mense brevior sit . ibid. copia ejusdem fluxus ab

Hip-

Hippocrate, & a nobis dimetita. **13**  
quare desinit ingravescente etate. **14**. idem fluxus partum fovet. **17**  
generationi juvat. ibid. quo in casu  
pedum venæ sectio ipsum evocet. **25**  
quando hæc noceat ib. *vid. Menfes.*

*Fomenta emollientia* in mensium sup-  
pressionē adhibentur. **38**. dulciscan-  
tia in uteri inflammatione locum habent. **117**

*Forellus* arcanum remedium adversus uteri hæmorrhagias prædicabat. **110**

*Fragraria* radix refrigerans Menorrhagiam sistit. **101**. **104**

*Frictiones* circa coxas caldis linteis institutæ utiles evadunt in repentina mensium suppressione. **35**. inutiles experiuntur in sanguinis jactura. **96**

*Mercuriales* quando conveniant in uteri ulceribus. **210**. quamdiu produci debeant. ibid. regimen in hoc statu necessarium. ib. juvant in quibusdam uteri cancri, modo caute adhibeantur. **235**. in cancro profunt a lue celtica nato. **236**. earum usus adversus ejusdem partis syrrhos. **221**

*Frigus* repentinum qua ratione menses interceptat. **28**. modo repente agat, uteri hæmorrhagias inducit. **89**

*Fungus* uteri idem producit. ibid.

*Furor uterinus* describitur. **148**. nobiles filias infestat ib. hujus morbi causæ.

**150**. Differentiæ. **154**. Symptomata. ibid. Diagnos. **156**. Prognosis. **157**

Curatio primi gradus. **158**. remedia generaliora. ibid. venæ sectiones decocta, & apozemata refrigerantia.

**159**. serum lactis, lac asinum, & emulsiones. ibid. Curatio aquarum mineralium ope. **160**. vel regimine humectante, temperante, diluente, refrigerante. ibid. verum balneis, aut fœmibaneis. **161**. aut clysteribus, & injectionibus refrigerantibus. ibid. usus pessarium in hujus morbi curatione. ibid. quando hirudines conveniant. ibid. adversus uterinum furorem turpe auxilium. **162**. hujus morbi curatio in secundo stadio. ib. in tertio stadio quando ægræ maniacæ sunt. **163**. remedia in hoc morbo commendata. ibid. aqua quæ spon-

*Astruc de Morbis Mulierum.*

te stillat ex tenellis salicis ramis *ma-*  
gnopere laudatur. **164**. decoctio tamen  
liorum ejusdem plantæ incassum pro-  
pinatur. ib. titilamenta quibus cre-  
dunt exuberantia humoris effluvia  
provocare, qui furorem uterinum  
inducere potius intendit, quam  
compefcit morbum. **166**

## G

**G**alenus putabat chlorosim tantum  
symptoma esse mensui suppressa  
aut imminuti. **2**

*Gangræna* consequens teterrimum in-  
flammationis matricis quando adho-  
riatur. **175**. uteri gangræna describitur. **181**. distinguitur in humidam,  
& siccam. ibid. quando occurrat. **182**. inflammationem subsequitur.  
ibid. aut grandio rem descensum vel  
ulcus phagedenicum matricis. ibid.  
ipsa vel universalis est, vel partialis.  
ib. gangræna theoria generalior pan-  
ditur. ibid. ejusdem theoria pecu-  
liaris. **183**. differentiarum explicatio.  
ibid. ipsa vel incipiens est, vel con-  
firmata. ibid. omnem uteri ambitum  
infestat, vel partem aliquam. ibid.  
sicca est vel humida. **184**. Symptomata  
hujus morbi, & caloris imminutio. ib.  
sensus abolitio. ib. hujus partis tensio.  
ibid. ejusdem aucta mollietis. ibid.  
livor. ib. pulsuum parvitas, frequen-  
tia, & durities. **185**. Lypothimix,  
& rigores spasmodici. ibid. hujus pos-  
tremi phenomeni explicatio. ib. ef-  
fectus est acrioris serositatis, & cor-  
rodentis, quæ sanguinem inquinat.  
ib. morbi diagnosi. **186**. signa illius  
gangræna quæ inflammationem uteri  
subsequitur. ib. quæ ulcus. ib. quæ uteri  
descensus. ib. diagnosi vaginæ, aut  
vulvæ gangræna affectæ. ibid. signa  
diagnostica differentiarum hujusmodi  
speciei. ibid. Diagnosis causarum. **187**. Prognosis generalior gangræna.  
ibid. periculum in hoc morbo ma-  
ximum. ibid. periculum gangræna  
vaginæ. ib. gangræna uteri prolapsi  
nullam spem valetudinis relinquit.  
ibid. curatio uteri gangræna. ibid.

Aa 2

prior

prior indicatio postulat vim compescere causarum morbi. 188. quod obtinetur vulnerariis, & spirituosius remediis in confirmata uteri gangræna. ibid. catarrhatis magis idoneis. 189. & escharoticis. ibid. quando Quinquina in hoc morbo locum habeat. 190

*Geranium sanguineum* planta est vulneraria. 104

*Gestationem* qualia signa prænuncient, quæ persequari oportet ne mensium suppressionem quam comitem habet cum suppressione prænaturali confundamus. 32. ipsam suspicamur in omni mensium retentione. 35

*Gestatio tubarum.* 273. 274. causæ huius morbi. 274. plerumque lethalis est. 275. operationem cæsarianam postulat. 276

*Glandes* earumque calices valde adstringunt. 102

*Glandule & glandulosæ partes* syrrhis magis sunt obnoxie. 212

*Globulus martis* aperiens quomodo exhibeatur. 84

*Glutinantia vulneraria* in appendicem venosarum laceratione conveniunt. 103. qualia ex vegetabilibus defumantur 104. qualia ex animalibus. 105

*Gmelin* (D) medicinæ professor; ejusdem cancerum curandi methodus examinatur. 213

*Gnaphalium montanum* planta adstringens. 103

*Gonorea* quomodo distinguatur ab albo fluore. 120

*Granata* inter remedia adstringentia. 102

*Granatorum cortex* exsiccatus valde adstringit. 101. eorumdem syrupus. 102

*Groelandiæ* mulieres paucioribus donantur catameniiis. 17

*Gummi Tragacantha*, vel *Arabicum*, edulcorantia remedia præstant. 104. quomodo usuferviant in uteri hæmorrhagia. 110. uteri obstructions pariter solvunt. 131

*Gummi* aperiencia in uteri syrrhis adhibentur. 219

*Gustus* depravatio chloroticas infestat. 78

*Gutæ* (Ducis La mot) quid sint atque præsent. 190

## H

*Helloborus niger* remedium adversus suppressionem minus tutum. 49  
*Hæmorrhagia periodica* in mensium suppressione. 31. uteri valde infensa. 86. in uteri ulcere superveniens quomodo stringentibus internis aut injectionibus compescatur. 211. maxima evadit in uteri syrrho. 215. ratio mendendi eam quæ uteri syrrhum consequitur. 215

*Hæmorrhoides internæ & externæ* menses prænunciant. 6. ipsas interdum gignit uteri plenitudo. 15

*Hæmorrhii* observati anatomica circa hujusmodi fluxum. 11

*Hippocrates* ex professo de chlorosi minime locutus est. 72

*Hircinus sanguis* induratus in suppressione usufervit. 46

*Hirudines* in furore uterino adhibentur. 161

*Humor* uteri lactiginosus ab illo mammarum haud absimilis. 4

*Hydatides ovariorum.* 269. *tubarum.* 273

*Hydrops* albi floris in suppressione occurrentis consequens est. 34. uteri describitur. 240. causæ hydropis asciticæ matricis. ibid. causæ hydropis hydatidicæ. 242. hujusmodi hydropis symptomata. 244. Diagnofis. ibidem Prognofis. 245. Curatio. ibid. methodus aquas excernendi per uteri orificium. 248. tum uteri cum imi ventri hydrops consequi possunt syrrhum uteri. 215. *ovarium.* 269 *tubarum.* 273. morbus est pertinax quomodo definat. 275. quando parentensis conveniat. 276

*Hymenis existentiam* quales auctores descendunt. 51. quales contendunt. ib. hujus membranæ anatomica descriptio. 72. ejusdem structuræ varietates. ibid.

*Hypocondria* qua de causa in chlorofii tendantur. 77

## I

**I**mporforatio vaginæ quomodo chirurgiæ auxilio, & quando scindatur. 58. cautelæ necessariæ in membranis profundioribus incidendis. ibid. observationes necessariæ in iis operationibus peragendis. 60  
*Indigestiones* quibus filiz sunt obnoxie ante primam mensium eruptionem. 19  
*Infarctus* diversarum partium ante primam eruptionem. 19  
*Inflammatio uteri* mensium suppressionem inducit. 27  
*Inflammatio uteri* Ved. *matricis inflammatio*; causæ generales omnium inflammationum tria stadia respiciunt. 168 in primo stadio *phlogosis* appellatur. ibid. in postremo inflammatio *systrophica* dicitur. ibid. in medio casu inflammatio tantum nuncupatur. ib. ovariorum inflammatio. 259. tubarum. 273. hujus postremæ ægritudinis diagnosi. 275  
*Injectiones uteri* in mensium suppressione. 38. adstringentes. 99. in hujus partis inflammatione quales. 176. peritia necessaria ne damnum inferant. 177  
*Vesicæ* in uteri inflammatione proponuntur. 180. efficaciores in uterigangræna. 189. in uteri ulcere. 208. injectionum formulæ. ibid. injectiones deterisivæ. ibid. dulcificantes. 221  
 226. in cancerosa matrice conveniunt. 235. in vagina ad laxandum uteri orificium hydropæ affectum. 250  
 ad uterum roborandum. 249. adstringentes ad firmandum vaginæ fundum in uteri descensu incipienti. 260. infirmiores tamen evadunt spongia applicata. 261  
*Inoculatio variolarum* synopsis historica originis, & progressus hujusmodi praxis. 343. circa ejusdem utilitates ambagines exponuntur. 344  
*Insonus* remedium quod proposuit adversus uteri inflammationem quando proficit. 181  
*Ipecacuanha* verum remedium antidertericum, ejusdem inventi historia. 341  
*Isteria* quare cutis superficies in hoc morbo foedetur. 73

*Juniperi* baccæ stomachicum præstant remedium. 80. ex iis compositus extractus, ejusdemque usus. 83

## K

**K** *Arabe* seu ambra lutea remedium est adstringens ex quo trochisci præparantur. 102. 103

## L

**L** *Abscessatio virium* in albo fluore a gras adoritur. 119  
*Lac* æmulatur humor specialis indolis quem peculiaria uteri vasa fecerunt: 4. quid præstet. ibid. quomodo hujusmodi latex sensum in mammis, & utero a conceptione gignatur. 5. *brutorum* hæmorrhagias impedit. 106. in albo fluore usuvenit. 116. succo nasturci copulatum in eodem morbo prodest. 135. caprinum, & asinicum in uteri ulcere adhibetur. 206. 207. *asinum* præsertim sanguinis acrimoniam otundit. 218. in uteri cancro propinatur. 235  
*Lactuca* planta dulcificans. 104. ejusdem semina emulsionem intrant. ibid.  
*Ladanum* remedium vulnerarium. ib.  
*Lapis Hematites* remedium adstringens. 102  
*Lavendula* in mensium suppressione præscribitur. 45  
*Laxitudo* quare chloroticas mulieres vexet. 72  
*Lesio* elata voce instituta menorrhagias producit. 89  
*Lentico* (lignum de) remedium adstringens. 102. & vulnerarium. 104  
*Lepræ* origo. Illam Arabes europeis communicarunt dum Galli eas regiones religionis causa sæculo XI. & XII. armis aggressi sunt. 310. abiit tandem 500. post annos. ibid.  
*Lethargia* effectus est mensium suppressionis. 34  
*Leucophlegmatia* effectus est albi floris in suppressionis aggressu occurrentis. ibid. chlorosis symptoma: 78  
*Leuwenboeckius* plures microscopiorum A a 4 ope

ope circa sanguinis globulos observationes instituit. 74

*Ligamenta lata & terretia uteri.* 2

*Limatura chalybis modice aperit, ejusdem usus, atque dosis.* 83

*Limoni*, syrupus quid præstet, & quomodo adhibeatur. 105

*Linguae* ariditas in inflammatione uteri observatur. 172. a quo procedat linguae fabura qua obtegatur. ibid.

*Litrii* (D.) opinio circa catameniorum scaturigines. 7. ejusdem circa id observationes. 7. 8

*Lochia* qualia vasa suppeditent. 7  
suppressa inflammationem uteri gi-  
gnunt. 168

*Lumbrici terrestris* in mensium suppressione exhibentur. 49

*Luna Phases* nihil influunt in catameniorum regressum. 12

*Lympha* mammaria, & uterina similes sunt. 4. *Lactea* secernitur ab uteri glandulis pubertatis tempore: 41. hujusmodi secretio periodicam evacuationem gignit. ibid. modo deficiat desunt menses. 27. ejusdem in utero inopie causa. ibid. ea sanguinis distinguitur in gelatinosam crassionem, in lympham spissioorem, ea in gelatinosam subtiliorem, aut lympham tenuiorem. 74. proprietates quæ indicant duplicem hanc lymphæ speciem. ibid. qua de causa inspersetur in uteri tuberculis. 194

## M

**M** *Acies* effectus est hæmorrhagiz. 91

*Macis* remedium stomachicum. 82

*Malacia* seu gustus depravatio ante primam menstruationem supervenit. 19  
a mensium suppressione producitur. 30. aut eorum retentione. 55. appetitum delit. 72. hujus phænomeni explicatio. 76

*Mammarum inflatio*, atque tensio prope menses in juvenibus mulieribus præsertim apparent. 16. vel in mensium suppressione. 30

*Maritima remedia* syrrhos uteri solvunt

post diluentes & emollientes adhibitos. 219

*Marubium album* in mensium suppressione locum habent. 47

*Matrix* remedium stomachicum. 83. adstringens. 102

*Matrimonii usus* pene certissimum est remedium filibus catamenii deficiantibus. 26. exercitium vaginæ vitia impedit. 34. menstruum fluxum tute revocat. 70

*Matricis* descriptio generalior. 1. positus intra rectum, & vesicam. ibid. ejusdem figura diversa in filiabus, & mulieribus. ibid. partes & ligamenta. 2. orificium. ibid. vasa arteriosa, venosa, & lymphatica, nervi, tunica triplex. ibid. ejus crassitudo a tunica carne præsertim procedit. ib. vasa lactea & vernicularia uteri. 3. morbos quos vasorum committuntumescencia inducit. 15. nimie uteri substantiæ densitatis quæ primæ eruptionem retardat, quomodo medeatur. 23. *repentina* uteri convulsiva contractio statim menses intercepti: 28 quibus morbis in mensium suppressione uterus sit obnoxius: 34. matricis status diversos phenomenorum varietates in suppressione ostendunt. 77. ejusdem exulceratio menses nimios facit. 87. ulcera & scissuræ, quæ in laborioso partu eveniunt menorrhagiam inducunt. 89. doloris in utero positus sedem ostendit morbi. 91. matrix fistulicis contractionibus sit obnoxia in transitu grummosi sanguinis. 92. dolet in albo fluore. 119  
*matricis inflammatio*. 167. diversi inflammationis gradus. ibid. signa, quæ illam prænunciant. ibid. ea vel universalis est vel partialis. 168. causas generaliores inflammationis matricis. ib. causas peculiares primæ classis. 169. secundæ classis. ibid. tertiæ classis. 170. *explicatio* differentiarum hujusmodi inflammationis. ibid. morbi symptomata. 171. sympathiæ relaxationes uteri cum ceteris partibus. 172. hujus inflammationis diagnosi. 173. signa specialia, quæ singulas species inflammationis designant. ibid. quomodo

modo a positu atque dolore amplitudo, & sedes inflammationis cognoscantur. ib. morbi prognosis. 174. quatuor definitæ inflammationis. 175 per resolutionem. ibid. gangrænam. ibid. suppurationem. ibid. & indurationem. ibid. inflammationis uteri curatio juxta tres præcipuas indicationes. 176. venæ sectio priorem potissimamque implet. ibid. falsæ sunt contra-indicationes hujus auxilii. ib. cautelæ generiores in uteri inflammationis curatione necessariæ. 177 quietis respectu, & positus ægræ. ibid. regiminis respectu. 178. diureticorum, aut cordialium ulus. ibid. praxis hærronea, aut suspecta in uteri inflammatione a nonnullis proposita. 179. matricis gangræna. 181. *vid. gangræna*: uteri descensus hujus visceris gangrænam inducit. 182. *usus* venæ sectionum in gangrænosa dispositione. 188. topica spirituosa & irritantia in uteri gangræna. ib. quando conveniat gangrænam abrasio. 190. *vid. amputatio*: uteri ulcus. 199. *vid. ulcus*: syrrhus matricis. 212. *vid. syrrhus*: cancer matricis. 230. *vid. cancer* uterus tumens crassitudinis parietum ergo partum plerumque consequitur. 255. descensus matricis. 256. *vid. descensus*: hydrops uteri. 240. *vid. hydrops*: quando fas sit conatibus operationem uteri hydropici promoveri. 248. uterus in tympanitide a sole haud absimilis est. 254. *vid. tympanitis*: amputatio corporis uteri. 259. *vid. amputatio*: descipiuntur ii qui negant uteri descensum. 263. signa pathognomonica hujus morbi. ib. amputatio interdum citra noxam patrata fuit. ibid. uteri obversio morbus est a descensu valde absimilis. 268. quando hujusmodi ægritudo occurrat. ibid. placenta violenter abrasa uterum obvertit. ibid.

*Medicæ historia* in quatuor Epochas distinguitur. 297. *prima Epochæ* abortis origine ad annum circiter 800 a C. N. ibid. pathologiæ conditio in hac Epochæ. ibid. pharmacia valde exculsa fuit. 298. anatomia negle-

cta: ibid. *secunda Epochæ* medicinæ conditio post Imperii Occidentis destructionem. 307. decretum Ducis Monspessulani anni 1196. qui permisit indiscriminatim omnibus nationibus in ea Civitate medicinam docere. 308. origo facultatis Monspessulane. 309. *tertia Epochæ* medicinæ conditio post scientiarum restorationem captumque Byfantium. 318. *quarta Epochæ* medicinæ conditio post inventam sanguinis circulationem. 318. & seq. hujusmodi artem perperam inconstantiæ accusarunt. 359. ejusdem fundamenta præcipua eadem constanter fuerunt. ibid.

*Meliceris* species tumoris est cystici. 222. *Meliloti* florum decoctio in albo fluore usui venit. 135.

*Melissæ* aqua destillata præstantissimum est stomachicum remedium. 82.

*Membrana*, quæ vaginam intercludit menses intercipit. 56.

*Menses* quare perdurationis respectu variant. 12. tria stadia præferunt, augmentum, statum, & decrementum. 13. quando alternatim plus, minusve uberrimi appareant: ibid. brutorum femellæ catamenii donantur suis indigentis accomodatis. 17. ubertas mensium obvia minime a primitiva naturæ institutione fortasse dependet. ibid. descriptio filiarum primæ mensium eruptioni obnoxiarum. 18. *causæ*, & symptomata mensium nimiorum, & crebrorum in juvenibus filiabus. 20. *quando* stomachi elaterium tantum restituere conveniat, dum mensium restituti desideratur: 25. remedia usitiora, quæ primam eruptionem promovent: 26. *difficiles*, & *laboriosi* menses qualia phenomena inducant. 61. *causæ* difficilis menstruationis. ibid. sunt vitium sanguinis. 62. vitium appendicum venosarum. ibid. vel utraque causa una agens. ibid. differentiæ indicantur. ibid. menses difficiles filias magis quam mulieres infestat. 63. signa diversarum causarum mensium laboriosorum. 64. *eorum* prognosis. ibid. quomodo iis medeatur. 65. *cau-*

65. cautellæ necessariæ. *ibid.* *menfes alio devoluti* describuntur. 66. devolutionis causæ explicantur. 67. *menfes devoluti irregulares* sunt, & nisi vasorum ruptura eveniunt. 68. eorum symptomata. *ib.* Diagnofis. 69. *Prognofis*. *ibid.* difficillime pertractantur ratione habita mensium suppressioni per loca confertia. 70. *danuna* quæ afferunt partibus, quæ sanguinis transitum morbofe faciunt. *ibidem* Curatio mensium devolutorum. *ibidem* prior indicatio postulat restitutionem naturalis fluxus. *ibid.* altera est imminuere eorum effusionem, quomodo id obtineatur. *ibid.* tertia indicatio ad acrimoniam sanguinis corrigendam attinet. 71. postrema indicatio respicit imminutionem mensium nimiorum alio devolutorum. *ibid.* *vid.* *fluxus menstrualis*, & *menstruatio*: *menfes* retinentur vitio conformationis. 50. *vide imminutio mensium*: *menfes* suppressi, *vide suppressi*: mensium vitia chlorosum potissimum inducunt. 72. *menfes nimii* quid sint. 86. differentia hujus status ab uteri menorrhagia: *ibid.* *menfes nimii* evadunt vel crebrium regressum ergo, vel fluxus diutini, vel fluxus copiae ratione. *ibidem* vel dum ex circumstantiis invicem copulantur. *ib.* quando morbum referant difficillime determinatur. *ib.* eorum causæ generales. 87. causæ eorum qui crebre revertunt. *ib.* eorum qui diu perdurant, atque eorum, qui nimis uberrimi effluunt. *ibid.* explicatio differentiarum inter *menfes* immodicos, & sanguinis jacturam. 90. prognofis mensium nimiorum: 95. illorum curatio. *ibid.* *menfes* tandem cessant, & phenomena nonnulla inducunt. 139. quæ de causa abeant. 140. symptomata diversa quæ mensium cessationem subsequuntur. *ibid.* hujus morbi Diagnofis. 143. quomodo distinguatur mensium cessatio a morbofa suppressione *ib.* quomodo a suppressione gravidarum. 144. Diagnofis differentiarum conditionis uteri, ejusdemque vasorum in menstru-

rum cessatione. *ibid.* Prognofis. 145. eo collineat ut phenomena cuique speciei suppressionis propria rite distinguamus. *ibid.* Curatio in mensium cessatione. 146. cautellæ necessariæ in hujusmodi morbi pertractatione. 147. *menfes* in quibus circumstantiis persistant, aut desistant utero syrrho affecto. 215. in tympanitide supprimuntur. 257

*Menorrhagia* sive uteri hæmorrhagia futurum abortum prænunciat. 7. *menorrhagia* quid sit. 86. effectus est aborti. *ibid.* modo abundans sit, *hemorrhagia* uteri vocatur. *ibid.* si modica, uteri *fillicidium*, aut *ploratus*. *ibid.* hujus morbi causæ. 88. quomodo distinguatur hæmorrhagia a nimio mensium profluvio. 90. hæmorrhagiæ symptomata. 91. Diagnofis generalior, quæ naturam morbi respicit. 92. quæ species. *ibid.* quæ causæ. *ibid.* atque diversum positum. 94. Prognofis. 95. in vetustiori affectione magis terribilis. *ibid.* anibus magis infesta. *ibid.* indicationes curatiæ quæ ad varios casus attingunt. *ib.* Curatio efficacior uberioris sanguinis jacturæ. 96. hæc postulat remedia adstringentia. 97. quomodo exhibeantur. *ibid.* narcotica ufveniunt. 98. quomodo agant in iis circumstantiis. *ibid.* vitæ regimen in hoc morbo magis idoneum. *ibid.* potus quotidianus. *ibid.* pituita quæ magis convenit, in solutione, aut rarefcentia sanguinis. 98. 100. modica sanguinis jactura, aut uteri *fillicidium* 100. ex se morbum constituit aut symptoma. *ib.* in hoc morbo venæ sectionis, aut catharsis usus. *ib.* *vid.* *fillicidium*, methodus præcavendi menorrhagiæ regressum. 106. cautellæ in hoc morbo magis necessariæ. 107. detrimenta quæ in lucunt cito nimis hæmorrhagiæ silentia. *ib.* Saturni præparationes tum pro injectionibus cum usu interno valde suspecta sunt in uteri hæmorrhagia. *ib.* circa hoc remedium Boerravi judicium. 108. quando emetica sint purgantibus anteposenda, & contra *ibid.* compositio cataplasma.

plasmatis cujusdam adversus sanguinis jacturam a nonnullis auctoribus commendata: 110. remedia minus tuta a nonnullis proposita. 111. in uteri inflammatione minime sibi debet.

179. vid. *hemorrhagia*.

*Menstrua* Freindi sententia circa ea redarguitur. 10

*Menstruationis* leges. 9. symptomata: 15. usus: 16. hic impeditur vaginæ adhesionē: 54. vid. *fluxus mensstruus*, & *menfes*.

*Menstruus sanguis* a venosis uteri appendicibus procedit. 3. hujusmodi appendices describuntur. ibid.

*Mentha* planta stomachica. 83

*Mercurialis* in mensium suppressione adhibetur. 47

*Mercurialis* remedia syrticos uteri solvunt præmissis præmittendis. 219

*Mercurium* nocet in ulceribus internis: 210. quomodo exhibeatur ut in uteri ulcere hujusmodi detrimentum cavemus. ibid.

*Metromania* seu furor uterinus. 148

*Millesfolium* Planta adstringens. 101. ejusdem syrussi. 103. aut aquæ distillatæ usus. 124

*Millii* decoctio in albo fluore commendatur. 135

*Millepedes* remedium solvens & aserens. 130

*Minorativa* in uteri inflammatione usum habent. 178

*Moscur* in vapore hysterico utiliter exhibetur. 294

*Morgagnus* nonnulla observavit circa originem catameniorum. 7. 8

*Mors* in quo consistat, seu partium maceratio. 182. vid. *gangrena adparens* in tertio gradu hysterici vaporis frequens. 273. 283. qualia signa distinguant mortem certam ab adparenti. 287

*Mulier* & *filie* suspectæ sunt circa ea quæ de mensium suppressione narrant. 79. desides fiunt immodicis mensibus obnoxiz. 87. ætate consistentes secundum naturæ leges mensibus deficiunt: 26. quam patiuntur suppressionem mulieres gestantes non naturalis est. ib. quæ nunquam conceperunt magis laborio-

sis corripuntur mensibus, quam eæ; quæ pepererunt: 64. *sylvestres* paucis vel nullis mensibus gaudent. 17 rusticæ, & defatigatæ quare minus menstruo fluxui obnoxiz sint: 14. quomodo menstruantur. 17

*Muscatanus* remedium stomachicum. 83

*Myrrha* in suppressione adhibetur. 42 remedium stomachicum. 83. & vulnerarium: 104. tinctura myrrhæ commendatur in albo fluore. 135

*Myrthi* folia adeo adstringunt. 101. baccæ idem præstant. 102. ex iis syrappus conficitur. 103

## N

**N**aboth Medicus Lypsiensis vesiculas sphericas tunicarum uteri pro ovulis habuit. 2

*Narcotica* quando in mensium suppressione specificè agant: 38. eorum in mensibus laboriosis usus: 66. quid præstent in uteri hæmorrhagia: 98 quid in albo fluore laticinoso tenuiori humore donato. 126. quid in palliativa curatione albi fluoris. 133 ipsa exhibentur in uteri inflammatione. 177. in syrtico depletionē. 221. in palliativa canceri curatione. 235. in Hysterico morbo. 293

*Narium hæmorrhagia* periodica symptomata est mensio devolutorum. 67

*Nationes cultæ* mulieres habent uberimis, & laboriosis magis mensibus donatas, quam sylvestres. 17

*Naturæ Historici* errant de leteriz indolis qualitates menstruo sanguini tribuendo. 14

*Nuces cupressi* adstringunt. 102. gallarum idem. ibid.

*Nucum flores* in pulverem redacti adversus sanguinis jacturam exhibentur. 110

*Nucum juglandium* decoctio proponitur ad abluenda ulcera matricis. 211

*Numularia* planta adstringens. 101

*Nutrices* mensibus carent: 6. quare: 14 mensium suppressionem patiuntur, quæ non naturalis vocatur, ut a morbosa suppressione distinguatur: 26. quæ ab opere lactationis desistunt mensibus nimis sunt obnoxiz. 87

Nym-



*Nutrientia farinacea, & incrassantia valde profunt.* 132

*Nymphæa remedium dulcificans:* 104

## O

**O**bscuratio uteri syrrhosa ejusdem in filiabus dispositio. 20. menses intercipit: 27. vel suppressionem consequitur. 34. *viscerum* qua de causa producat: 77. qua ratione abdominis viscera menorrhagiæ causa obstruantur. 92. consequitur albos fluores. 119. in uteri obstructionibus remedia magis idonea. 130

*Odores gravescentes in menstruum suppressione utiles evadunt.* 35

*Oedema crurum in uteri hæmorrhagia quomodo producat.* 92. in chlorosi a quo procedat. 78. faciei noctu præsertim adurit, crura vero in die deturpat, harum differentiarum explicatio: ibid. remedium præstans adversus anasarcam in albo fluore supervenientem. 85. vultus oedema albos fluore comitatur. 119. *pedum*, & crurum Oedema pallorem comitatur. 72. vultus intumescencia noctu apparet. 92

*Oleum amigdalorum dulcium in uteri inflammatione potissimum evadit.* 176

*Operatio Cæsarea in tubarum gestatione usuvenit.* 276

*Opiata hemmenagoga qua ratione conficiantur.* 42

*Opiatum Salomonis remedium stomachicum.* 83

*Ossa humana calcinata proponuntur in uteri hæmorrhagiis, sed frustranea evadunt.* 111

*Os Sepiæ remedium adstringens.* 102

*Ostiales Siberiæ populi qui adversus luem Veneream sublimatum commendunt.* 236

*Ovarum testa calcinata remedium adstringens.* 102. *luteum* in uteri hæmorrhagiis valde prodest. 109

*Ovariorum structura.* 268. *morbi.* ibid. ovaria inflammatione, abscessu, & gangræna corripui possunt. 259. syrrho, & cancro. ibid. vel hydatidibus. ibid. aut hydropi sacatæ sunt

obnoxia. ib. conceptio interdum embryoni locum præstant. ib. tumores cystici efformant. ib. causæ explicantur inflammationis eorum: 270. syrrhi. ib. hydatidum, hydropis sacatæ, & præter naturalis conceptionis. 271. qualem morbum inducat in hac parte fetus corruptio. ibid. difficillime morbus dignoscitur. 272. Prognosis. ibidem Curatio. ibid. remedia in hoc casu indicata. ibid. remedia interna: ibid. potio in ovariorum hydropre utilissima. ibid.

*Ovum in utero fecundatum naturaliter menstruum fluxum intercipit.* 28

## P

**P**allidi colores primam mensium eruptionem precedunt. 22. hujus status Prognosis. 23. iis stomachicis medetur: 25. consequuntur mensium suppressionem. 34

*Pallidi colores consequuntur uteri tympanitidem.* 253

*Pallidi colores alias chlorosis.* 71. hujus morbi descriptio: 72. 200. ab hinc annis inter speciales mulierum morbos recensentur. ibid. eorumdem causæ. 73. ab amisso sanguinis colore procedunt. ibid. causæ quæ producant vultus pallorem in suppressione, segnitie, aut imminutione catameniorum. 75. symptomata. 76. diagnosis. 79. pleraque eorum symptomata æmulantur passionem hysterica ibidem; ii gestationem comitantur, sedulo enim distinguere oportet hujusmodi morbum a præternaturali suppressione. ibid. eorum Prognosis. ib. recentes plerumque detrimento expertes sunt. 80. ægrarum innobedientia plerumque difficiliorem reddit valetudinem. ibid. quando pallores maximum damnum inferant. ib. Curatio. ib. ii pallidi colores qui gestationem subsecuntur, nullum remedium postulant. ibid. cautelæ in hoc casu necessaria. ibid. Curatio palliativa. 82. quando morbus catharism exigat. ibid. in eo aperientium usus. 83. *ma-*  
*tri-*

- trinionium efficacissimum remedium. 85. quare opus sit interdu in hoc morbo remedia mutare. ib.
- Palor faciei* a quo dependeat. 73. macies simul & palor sunt symptomata albi floris. 118
- Palpitatio* in chlorosi occurrit. 72
- Pancreaticus succus* quid præstet in chyli formatione. 74
- Pareus* Ambrosius celebris Chirurgus saculi XVI. in suo Tractatu de hominis generatione de partu; & nonnullis mulierum morbis egit. 326. ejusdem observationes circa uteri amputationem. 263
- Partus* laboriosus sit vaginæ constrictionis ergo. 57. primus partus in mulieribus omnia uteri vasa referat. 26 quando id proficit. ibid.
- Partus*, & *abortus* quomodo menorrhagiam inducant. 90. crebri partus vaginæ descensum faciunt. 264
- Passio hysterica* a mensium suppressione originem ducit. 31
- Passio hysterica* perbelle describitur. 276 irregulariter revertitur. ibid. phenomena quæ ipsa producit. ibid. quatuor potissima phenomena. 277. causæ passionis hystericae. ibid. tripliciter consideratur. ibid. modo convulsiva est. 278. modo ab animalibus spiritibus dependet. ibid. modo uteris morbi sedes est. ibid. hujusmodi principia demonstrantur. ibid. verum ostenditur diversas partes sympathiæ uteri legibus agitari. 279. causæ constantes hujus morbi. ib. quomodo variables commotiones producat. 280. præ ceteris mulieres hysterico morbo sunt obnoxie. ibid. causæ quæ inducunt, & quæ sistunt hystericos vapores. ib. symptomata passionis hystericae magis obvia. 281 dependent a sympathica uteri affinitate. ibid. quatuor symptomata pathognomonica describuntur. ibid. ea enunciantur quæ abdomen respiciunt. 282. quæ stomachum. ibid. quæ caput. 283. & quæ totum corpus respiciunt. 285. diagnosi hystericae passionis 286. difficillima cum morbus tertium gradum attigerit. ib. prognosis. 288.
- distinguitur in illam quæ citra damnum curationem amittit. ibid. in alteram speciem valde interdu periculofam. ibid. curatio generalior. ibid. intra paroxysmum. 289. extra paroxysmum. 292. auxilia externa ex parte uteri adversus vapores hystericos. 290. praxis obvia muliercularum asperniture. 292
- Pediluvium* in suppressione utilia. 35 vix profunt in cronica mensium suppressione. 43. in chlorosi quomodo agant. 82. frigida in uteri hæmorrhagiis adhibentur. 100
- Pedum ædema* uteri fyrrho laborantes infestat. 215
- Peritoneum* externam uteri tunicam suppeditat. 2
- Perle* inter media adstringentia recensentur. 102
- Pervigilium* inflammationis uteri effectus. 172
- Pervinca planta adstringens*. 101
- Pessaria* medicamentosa a genuina praxi adversus mensium suppressionem proscibuntur. 38. peculiaris generis filiarum vulvæ appolita, cur *nascalia* dicantur. 44
- Pessaria* adstringentia in uteri hæmorrhagia conveniunt, qualia damna interdu inferant. 99. quomodo fabrefiant. ibid.
- Pessaria* seu uterina orbicula quid sint, & quomodo patrentur. 261. quomodo applicentur. ibid. qualia detrimenta afferant modo incomplete costruantur. 262. ex pulpa plantarum emollientium confecta in uteri inflammatione adhibentur. 177
- Peyerus* quid cogitaret circa mensium scaturigines. 6
- Pharmacia* a recentioribus valde exculta. 341
- Phlogosis* primus gradus inflammationis est. 168
- Phthisis* teterrimum est paloris phenomenon. 84. signa quæ illam prænunciant. ibid. curandi methodus. ibid. venerea mercurialibus frictionibus compescitur. *Vid. fridiones*.
- Phytolaca* specificè proponunt adversus cancerum. 238

*Pica*, seu gustus depravatio prima eruptionem præcedit. 19. vel mensium suppressionem, aut deficientiam menstrui fluxus consequitur. 30. 55. appetitus depravatus idem sonat. 72. quid hoc phenomenon inducat. 76  
*Pileosella* planta adstringens. 101  
*Pillule* antihystericæ. 36. *Elvetii* adversus hæmorrhagium quomodo præparentur. 109. *Höfmanii* utiliter usantur in hydrope affectis. 148  
*Pimpinella* planta adstringens. 101  
*Pineola* decocta in albo fluore conveniunt. 134  
*Plantago* planta adstringens. 101. ex ea aqua destillata. 103. syrampus. *ibid.*  
*Plenitudo* uteri localis potissima est fluxus menstrui causa. 9. quomodo autumasset hujusmodi plethoram gigni. *ibid.* rationes, quæ vulgarem vasorum sanguineorum uteri descriptionem oppugnant. *ibid.*  
*Plethora* localis quæ in utero fit ab universalis plenitudine non dependet. 10. terribilia phenomena quæ consequi possunt universalem plethoram a mensium suppressione natum. 34. maxima plethora mensium devolutionem interdum inducit. 68. vera, & spuria producant menses nimios. 87  
*Plumbi* præparationes intus sumptæ suspectæ evadunt. 112  
*Polypharmacæ* abusus. 308  
*Polygonum* planta adstringens. 101. ex ea aqua destillata. 103  
*Portulaca* planta dulcificans. 104. ejusdem semina emulciones intrant. *ib.*  
*Porrus* planta quæ adversus mensium suppressionem commendatur. 47  
*Potiones* emenagogæ quæ ratione conficiantur 42. antihystericæ 290. cathartice conveniunt in hysterico morbo. 293  
*Potus* in sanguinis hæmorrhagiis magis idoneus. 98  
*Præcis* superstitiosa ad sanguinis jacturam sistendam. 113  
*Præparationes martiales* deobstruentes sunt mercuriales, non cathartice; idem præstant in uteri syrrho. *ibid.*  
*Prolapsus uteri* est albi fluoris symptoma. 124  
*Ribisana* sudorifera, & cathartica in

albo fluore magnopere commendata. 144  
*Pubertas* quid tunc temporis natura agat intra uteri, & mammarum vasa in filiabus. 4  
*Pulmones* in chlorosi infarciuntur. 77  
*Pulmonaria* planta adstringens. 93  
*Pulmonia* vide *phthisis*.  
*Pulsus* quare exigui, & frequentes in chlorosi appareant. 77  
*Pulveres emenagogæ* quæ methodo exhibentur. 42  
*Pulsus aperiens* in chlorosi laudatur. 84. *cornachinus* hydragogus putatur. *ibid.*  
*Purgantia stimulantia* quando in suppressione conveniant. 43. in depravato appetitu exhibentur. 81. horum remedium in chlorosi delectus. 82. usus in quibusdam menorrhagiis. 108. in hoc necessariz cautela. *ibid.* qualia vero in menorrhagiis seligantur. 108. *hydragoga* in uteri hydrope. 248  
*Purgare* frustraneum est plerumque in uteri hæmorrhagiis. 97. quando id conveniat. *ibid.* necessum erit in uteri ulcere. 206. vel dum solventia exhibentur remedia. 220  
*Pyrula* planta adstringens, quomodo exhibeatur. 101

Q

*Quercus* folia tenella adstringentia sunt. 101. 103  
*Quies* necessaria evadit in uteri hæmorrhagiis; quare ægræ continenter lectulo detineri debent. 96. 106  
*Quinquefolium* planta adstringens radix. 101. & folia usveniunt. *ibid.*  
*Quinquina*, animadversiones circa ejusdem usum gangrenam adversus. 203 exhibendi ratio. 191. novum remedium, ejus brevis hystoria. 341

R

*Radices aperientes* quando adhibeantur. 130  
*Rææ* exsiccata, & combusta pro fusumigis in uteri stillicidio proponuntur. 105  
*Remedia* usitatiora quæ primam mensium

hum eruptionem promovent. 26  
*Renum dolores* quomodo inducat uteri  
 plethora. 15  
*Regimen vite* chloroticis idoneum. 82  
 quale conveniat in uteri hæmorrhagia. 98. quale in mensium cessatione. 122  
*Repercutientia* frigida in uteri inflammatione valde nocua evadunt. 189  
*Resina* quid præstant ad solvendas uteri obstructions. 131  
*Respiratio difficilis* in plethoricis mulieribus prope menses qua de re causa appareat. 16. crebra ante primam sanguinem eruptionem. 19  
*Respiratio difficilis* in chlorosi. 72. qua de causa. 77. exercitio corporis nimio augetur. ibid.  
*Resolventia remedia* in inflammatione adhibentur. 178. hujus generis cataplasmata in uteri syrrho præscribuntur. 220  
*Resolutionem* ( in ) definit fortuna secunda uteri inflammatio, quando id contingat : 125. quid fieri oporteat in uteri inflammatione incipiente, vel confirmata. 178. quomodo in tumoribus resolutio obtineatur. 217  
*Reticularis membrana* diaphanis scætet valis. 73  
*Ribetorum* syrupi usus. 105  
*Riverius* quando ipsæ præscribat venæ sectionem ex brachio potius quam ex pede mensium revocandorum causa. 26  
*Rosa rubra* adstringentes sunt. 101. ex iis aqua destillata 103. *tinctura* & syrupus. ibid.  
*Rosmarinus* in mensium suppressione commendatur. 45  
*Retentio* menstruorum morbus est a suppressione prorsus diversus. 56. ejusdem symptomata describuntur. 55  
*Rosula cordiales* & aperientes primam eruptionem promovent. 26. aperientes & cathartice idem præstant. ib. qua ratione conficiantur. 42  
*Ruschovius* ( D ) Chirurgus in Northampton primus qui adversus granam quinquanam exhibuit. 190

S

*Sabina* remedium suspectum adversus mensium suppressionem. 48  
*Sagou* pulpa incrassans arboris cujusdam exotice. 132  
*Sanchez* ( D ) Medicus Lusitanus ejusdem observationes ad luem veneream compescendam sublimati corrosivi ope. 236  
*Sanguificatio*, aut chyli in sanguinem methamorphosis, quomodo fiat. 75  
*Sanguis* in chlorosi decolor fit. 73. quomodo ejusdem naturalis color deturpetur. ibid. cruoris analysis. ibid. ex quatuor substantiis conflato. 74 qua de causa rubrus appareat : ibid. pars ejusdem colorata decima aut duodecima est totius massæ. ibidem cruoris globuli quomodo efformentur. ibidem eorum numerus atque tenuitas a quo dependeat. 75. perfecta sanguinis circulatio chyli, aut novi sanguinis completam reproductionem fovet. ibid. cruoris densitas, & phenomena hic superventura. 77. ejusdem rarefcentia, quæ compescitur speciali indicata decoctione. 98. remedia magis idonea, quæ sanguinem solvunt. ib.  
*Sanguinis* historia sive ejusdem circulationis inventum. 338  
*Sanguis* Draconis remedium adstringens. 102  
*Sanguis menstruus* qua natura polleat. 6. ab arteriis prodit, aut a venis. 8. lymphæ lactea remiscetur. 11. ex vasculis sanguineis in lymphaticas minime irrupit. ibidem neque illum scissuræ vasorum effundunt. ibid. copia variat. ibid. plerumque inter octo, & sexdecim uncias consistit. 13. erronea eorum sententia, qui credunt deleteriæ indolis qualitatibus ipsum pollere. 14. eruptionem præcedit, & subsequitur lymphaticum effluviū. ibid. hujusmodi sanguis fecrum alit. 16. idem ex menstruata muliere desumptus adversus mensium suppressionem remedium præstare autumant. 50

Sa-

*Sanicula* planta vulneraria. 104  
*Santala* idem præstant. 102  
*Salſe perille* decoctio appendicum venofarum elaterium reſtituunt. 106  
*Saponaria* remedium in albo fluore commendatum. 135  
*Sal de duobus* remedium diureticum in albo fluore. 126. *Gualberi* idem. ib. Martis *Riverii* remedium *aperiens*. 33  
*Salia ſolventia* in uteri ſyrrho præſcribuntur. 219  
*Sarcoma vagina* cauftico abraditur. 230  
*Scabioſa* planta vulneraria. 104  
*Scarificationes* quando convenient in uteri gangrana. 188  
*Schurygii* opinio circa menſum ſcaturigines. 7  
*Scilla* remedium diureticum. 126  
*Scorbutus* minime novus eſt morbus. Germanici acies trans Rhenum miſſa eo correpta fuit. 320. ad littora Baltici Endemius eſt interdum comitatus paupertatem, & ſordiciem. ib.  
*Scorzonera* decoctio in palido colore commendatur. 84  
*Semina frigida* qua doſi emulſiones in-trent. 104  
*Serpentaria virginiana* in menſum ſuppreſſione remedium ſuſpectum. 26  
*Singultus* uteri inflammationis ſymptoma. 173  
*Simarouba* novum remedium, ejus in-venti hiſtoria, & utilitates. 342  
*Syrrhus uteri* ſuppreſſionem gignit. 27  
*menorrhagiam* inducit. 89  
*Syrrhus matricis* cum ſuis differentiis deſcribitur. 212. ſyrrhus in genere qua-tuor characteres potiſſimum oſtendit. ibid. cauſæ. 213. rationes, quæ demonſtrant ipſum a ſanguinis congeſ-tione minime ori poſſe. ibid. lym-phæ congeries, aut humoris laticinoſi duplicem ſyrrhi ſpeciem producit, modo lymphaticum, modo laticinoſum. ibid. cauſæ generales ſyrrhi efficientes. ibid. cauſæ occaſionales, ſeu locales: ibid. ſunt vitium vene-reum. ibid. uſus nimius inſectionum adſtringentium. ibid. frigoris nimium fluente menſtruo, aut lochio de re-pente ſupervenienti. ibid. uteri ob-ſtructio. ibid. explicatio differentia-

rum. 214. inter eas differentias ſunt ſyrrhus lymphatico laticinoſus. ibid. totalis, vel partialis. ibid. perfectus, & legitimus. ibid. ſpurus, ſeu im-perfectus: ib. œdematoſus, & ſleu-gmonoſus. ib. hujus morbi ſympto-mata. 215. Diagnofis. 216. rite diſtingui debet ab hydropo, geſtatio-ne, aut mola. ibid. ſigna diagnof-tica diverſarum ſpecierum. ibid. Pro-gnoſis generalior. ibid. ſpecialior va-ginæ, atque vulvæ. 217. curatio ge-neralior. ibid. quatuor potiſſimè in-dicationes. ibid. duplex indicatio quam implere debemus in palliativa ſyrrhi curatione. 220. methodum quam proſequi fas erit, ne ſyrrhus in cancerum degeneret. 221. remedia ſpecifica ad uteri ſyrrhum reſolventium ſpecificæ præſcripta. ibid.  
*Syrrhus ovariorum*. 269  
*Smaragdia* remedium in uteri hæmor-rhagiis valde incertum. 113  
*Solventia externa*. 220. interna quid præ-ſtent, & quando convenient. 219  
*Somno* quare chlorotica valde obnoxia fiant. 78  
*Sopor* quare prope menſes aggrediatur. 16. a ſuppreſſione lethargum æmulatur ipſum adverſus remedia magis ido-neæ. 16. in palore obviuſ eſt phe-nomenon: 72. effectus eſt febris ſym-ptomaticæ in uteri inflammatione ſu-pervenientis. 172  
*Souci* quid præſtet in menſum ſuppreſſione. 95  
*Sperma ranarum* & ejuſdem aqua deſtillata remedium præſtat adſtringen-ti facultate donatum. 103  
*Specillum* quando intromitti debeat ad inquirendum uteri ſtatum. 249  
*Sphacellum uteri*. 181. vide *gangrana*.  
*Spica Nardus* remedium cujus virtus in uteri hemorrhagia admodum ſuſpe-cta eſt. 111  
*Spigelii* obſervationes circa catamenio-rum ſcaturigines. 7. 8  
*Splen Bovis* in menſum ſuppreſſione u-ſuvenit. 47  
*Splen* in ægrozantibus mulieribus chlo-roſi affectus tumet. 72  
*Spongia* adſtringenti decoctione imbu-  
ta

ta vaginam roborat in incipienti de-  
scensu. 261  
*Stannum* calcinatum adhibetur in san-  
guinis amissione. 111  
*Sterilitas* effectus mensium suppressio-  
nis. 35. effectus veterum chlorosis.  
80. albi fluoris symptoma. 119. ob-  
structionem tubarum consequitur. 177  
*Sternutatoria* in suppressione conveni-  
unt. 43. in uteri abscessu rupturam  
fovet. 199  
*Steatoma* species est tumoris cisticis. 222  
*Stillicidium* uteri ab atonia aut laxitu-  
dine appendicis venosarum depen-  
det. 100. remedia adstringentia tunc  
magis idonea. 101. in hoc casu vi-  
tæ regimen. 106  
*Stomachica* dulcia digestionem foveant;  
simpliciora, & composita magis ex-  
ponuntur, eorumque doses. 82  
*Stomachus* qualia remedia ipsum robo-  
rent. 25. symptomata quibus sit ob-  
noxius in chlorosi. 76. Qua de cau-  
sa in hoc morbo tumeat. ibid.  
*Stoerck* (D.) Opus circa cicutæ exhibi-  
tionem cancerum adversus. 230  
*Stranguria*, aut mingendi difficultas in  
inflammatione uteri obvia. 269  
*Sublimatum* corrosivum limatura ferri pp.  
adversus albos fluores specificè com-  
mendant. 137. Qualia damna infer-  
rat. ibid. Mercurio vivo, & Scamo-  
nio copulatum in albo fluore suspen-  
sum evadit. ib. Idem pro injectioni-  
bus præstat. 138  
*Succi* depurati plantarum apozematis an-  
teponuntur. 97  
*Sudores* nocturni in chlorosi, & in o-  
mni morbo malum prænunciant. 84  
*Sudorifera* in curatione fluoris albi la-  
ticinosi conveniunt. 126  
*Suffocatio* hysterica. 276  
*Vide Passio hysterica.*  
*Summigia* humida in mensium suppressio-  
ne conveniunt. 38. 43. Formulæ  
decoctionum pro hoc scopo. 43. qualia  
eorum in uteri stillicidio conveniant.  
106. sicca adversus uteri morbos quo-  
modo parentur. ibid. Ad uteri ela-  
terium restituendum qualia parentur.  
107. humida in uteri ulceribus. 208  
resolventia in uteri syrrho. 220. 221  
*Afruch de Morbis Mulierum.*

in uterum intromittuntur. 226. intra  
vaginam. 248. sicca commendantur  
adversus incipientem uteri descen-  
sum. 260  
*Sumach* planta coriaria, remedium ad-  
stringens. 102  
*Suppositoria.* 199  
*Suppressio* mensium distinguitur in na-  
turalem, non naturalem, & præ-  
ternaturalem. 26. tres diversas cau-  
sas respicit. 27. videlicet uteri  
morbos. ibidem vitium lymphæ la-  
cticinosæ. ibid. quia huiusmodi lym-  
pha ex vasis vermicularibus effugit,  
fluoresque albos producit. 28. vel de-  
fectum appendicis venosarum. ibid.  
aut convulsivam uteri contractionem.  
ibid. denique suppressiones animi pa-  
themata pro causa recognoscunt. ib.  
lentum sanguinis circulum, aut va-  
sorum laxitudinem. ibid. suppressio  
vel de repente. 29. vel paulatim ag-  
greditur. ibid. interdum in mensium  
suppressione albi fluores naturæ offi-  
cium implent. ibid. suppressio huius-  
modi fluore orbata. ibid. quæ dolo-  
re, & tensione uteri expers est, quæ-  
que utrumque comitem habet. 30  
differentiarum explicatio. ib. sym-  
ptomata diversa, quæ huiusmodi sup-  
pressionis speciem comitantur. ibid.  
symptomata repentina suppressionis.  
31. signa quæ indicant gestationis sup-  
pressionem. 32. cautellæ necessariae in  
iis suppressionibus pertractandis, quæ  
suspectas mulieres adoriuntur. ibid.  
quam methodum medicus prosequi  
debet dum mulieres pertractat ætate  
constitutas. 33. diversæ suppressionis  
species, & peculiare causæ. ibidem  
utriusque speciei prognosis. 34. teteri-  
ma phenomena in repentina sup-  
pressionis occurrence: ib. ratio me-  
dendi hanc suppressionis speciem dum  
fluente sanguine occurrit. 35. men-  
sium suppressio, quæ extra tempus su-  
pervenit, quæque quatuor casus com-  
peditur. 36. tres potissimas indica-  
tiones, quas medicus in mensium sup-  
pressionis implere debet. 37. remedia  
quæ densum uteri contextum relaxat.  
ib. cautellæ in hoc morbo ne-  
cessariæ.

cessariæ . 44. remedia minus tuta in hoc morbo commendata . 48. mensum suppressio interdum sanguinis jacturas inducit . 89  
*Suppuratio* uteri in quibus circumstantiis appareat . 175. mechanicæ in utero suppurationis leges . 193  
*Sympathia* leges inter mammas & uterum conferentes . 4. illa uteri cum diversis corporis partibus in matricis præsertim inflammatione locum habet . 172  
*Syncope* frequentes sunt in uteri hæmorrhagia . 84. hysterica signa . 276

## T

**T***abula* chronologica auctorum qui de morbis mulierum scripserunt . 297  
*Talismana* superstitionis ergo usuveniebant . 298  
*Tartarum* martiale solubile remedium aperiens . 84  
*Teneismus* hæmorrhagiam uteri inducit . 90  
*Terebinthina* remedium adstringens . 102  
 in albo fluore quomodo adhibeatur . 134  
*Terra* sigillata remedium adstringens . 102  
*Theriaca* remedium stomachicum . 83  
*Tindura* Martis remedium aperiens . 84  
*Topinambous* mulieres nullis , vel paucis mensibus laborant . 17  
*Tormentilla* planta adstringens . 101  
*Transfusionis sanguinis* historia , origo , & proscriptio . 143  
*Trillerii* disertatio adversus inveterati canceri amputationem . 238  
*Trochisci* Catechu remedium adstringens . 103. Gordoni idem . ibid. de Carabe idem . ibid.  
*Tube Falopiane* ovaria attingunt . 2. describuntur . 273. ovariorum morbis sunt obnoxii . ibid. similibus de causis . 274. diagnosis nisi incerta præbent indicia . 275. tubarum ægritudinum curatio . ibid.  
*Tubercula* seu abscessus tuberculosi uteri . 194. eorum natura . ibid. diversus positus . ibid. triplex species tuberculorum uteri . ib. quomodo lymphæ , & lac uterinum id producant .

ibid. quomodo suppuratio in iis circumstantiis producatur . 195  
*Tumores* cystici uteri , & vaginæ . 222  
 causæ . 223. symptomata . 224. diagnosis . ibid. quomodo distinguantur ab hydropo , aut gestatione . ibidem  
 prognosis . 225. curatio . 226  
*Turtur* qua ratione in pulverem redigatur , & adversus menorrhagiam adhibeatur . 110  
*Tussis* frequens molestum chlorosis symptoma . 84. quomodo compescatur . 85  
*Tympanitis* uteri describitur . 249. causæ tympanitidis veræ , aut permanentis . 250. symptomata . 251. ea vel sicca est . ib. vel humida . ibid. hujus morbi diagnosis . 252. prognosis . ib. curatio eo collineat , ut aer per uteri orificium exeat . 253. specilli intromissio valde prodest . ibid. cautelæ necessariæ . 254. tympanitis pervaga in mulieribus , quos pudent morbum fateri , communis est ægritudo . ibid. prognosis , & curatio ejusmodi morbi . ibid.

## V

**U***lcera uteri* albos fluores consequuntur post mensum suppressionem occurrentes . 14. menses sistunt . 27. menorrhagiam inducunt . 89. quæ signa illa prænunciant in albo fluore . 124  
*Ulcus uteri* describitur . 199. hujus morbi causæ . 200. Differentiæ causæ immediatæ ergo . 201. causæ antecedentis respectu . ibid. positus causa . ib. qualitatis ratione . ib. extensionis respectu . ibid. propinquitatis partium vicinarum ergo . ib. ulceris symptomata . ib. causæ doloris levioris , aut intensioris in uteri ulcere . 202. quando ulcus syrrhosum fiat . ib. quomodo innotescat ulcri sedes . ib. phenomena quæ rationem habent diverso positi ulcerum matricis . ibidem morbi diagnosis . 203. signa pathognomonica . ibid. indicia causæ proximæ ulceris . ib. diagnosis causæ remotæ . ib. signa diversarum qualitatum ulcerum . ib. prognosis . ib. curatio . 205  
 reme-

remedia generaliora quæ in omni ulcero-  
rum specie conveniunt. ib. methodus  
curativa in ulcere incipiente. 207  
methodus tutior, & efficacior in ul-  
cere confirmato sed simpliciori. 228  
ratio medendi ulcera venerea. 209  
methodus curativa ulcerum incurabi-  
lium. 210. usus narcoticorum in iis  
circumstantiis. ib. remedia specifica  
adversus uteri ulcera a nonnullis pro-  
posita. 211

*Ululatus* vehementiores uteri hæmorrha-  
gias inducunt. 89

*Urina* ardor qua de causa ægras infe-  
stet prope menses. 15. turbida, &  
spissiores sunt in hoc casu. ib. exi-  
tus implicatur a morbis qui vaginam  
deturpant. 55. vitia in iis mulieribus  
quæ albo fluore corripuntur. 214

*Urtica* alba planta adstringens. 101.  
emortuæ Symplicis adstringens. 103.  
eiusdem conserva & infusum com-  
mendantur in albo fluore. 229. hu-  
jus plantæ succus infantum urina ad-  
mixtum in injectionum ope adversus ute-  
ri ulcus commendatur. 211

*Uterus* in uteri menorrhagia specifica  
proponitur. 112

*Vagina* membranis, excrecentiis, aut ci-  
catricibus occlusa menses impedit. 50.  
contra naturæ ordinem obducta quin-  
que functiones implicat. 54. *vagina*  
sarcoma. 263. *descensus* describitur.  
264. nisi productiones sint membranae  
internæ vaginæ. ibid. harum produ-  
ctionum differentie distinguuntur in  
sarcomata, fungos, & plicarum trans-  
versalium productiones. ibid. indo-  
lis eorum respectu moles sunt flaci-  
dæ, frungiosæ, varicosæ, lymphati-  
cæ, callosæ, & syrrhosæ. ibid. differ-  
entia crassitudinis & longitudinis.  
ibid. differentie adhesionum. ibid.  
causæ vaginæ descensus. ibid. causæ  
& sedes sarcomatis. ibid. causæ fun-  
gi. ibid. causæ simplicis productionis.  
ibid. rationes differentiarum di-  
versorum morborum, quæ descensus  
vaginæ audiunt. ibid. hujus morbi  
symptomata. 265. diagnosi. ibid.  
qua ratione ab uteri descensu diffi-  
rat. ib. prognosis. 266. curatio. ib.

methodus curativa pro diversa mor-  
bi indole varia. ibid. in excrecentia  
vaginæ curatione amputatione causticis  
anteponitur. ibid. vincula obfolue-  
runt qua ratione. ib. methodus hu-  
jus amputationis. ib. chirurgicæ ani-  
madversiones, quæ hanc consequun-  
tur operationem. 267. excrecentia  
vaginæ venereæ mercuriales frictio-  
nes postulant. ibid.

*Vapores emollientes* per fellam familiari-  
cam occurrente mensium suppressione  
usuveniunt. 18. 43. *hysterici* ante pri-  
mam eruptionem apparent. 20. re-  
media quæ ipsos compescunt. 147. di-  
stinguuntur ab hypochondriacis. 286. re-  
media specifica adversus hunc morbum  
commendata. 294. *Vid. Passio hysterica.*  
*Varices* vasorum uteri concisæ sangui-  
nem effundunt. 89

*Variola* sanguinis effusionem induunt.  
ibid. variolarum origo quas Arabes  
sæculo VIII. exportant. 303

*Vasa lymphatica* in utero innumera  
sunt. 2. sanguinea uteri speciali me-  
thodo describuntur. ibid. lactea, &  
vermicularia describuntur. 3. quomo-  
do inspicere queant in utero mulieris  
postremo gestationis mense difecte.  
4. horum vasorum distributio. ibid.  
organa quæ lympham lactinosam  
secernunt. ibid. hypophyses circa di-  
tributionem vasorum sanguineorum  
uteri. 9. vermicularia uteri, quare  
singulis mensibus periodice insistentur.  
11. quomodo hujusmodi tamescentia  
menstruum fluxum signat. ibid. eo-  
rum usus ante pubertatem. 12. ipso-  
rum inanitio menses impedit. 27. *cau-  
sæ* hujus inanitionis in mensium sup-  
pressionem. ibid.

*Vene spermaticæ*, hypogastricæ, & hæ-  
morroidales internæ ab utero sangui-  
nem recipiunt. 2. earum intra uteri  
tunicas distributio. 3. per hæmorroi-  
dales interdum menses alio defle-  
runt. 67

*Vena sectiones* in hysterica passione usu-  
veniunt. 292

*Verbascum* planta refrigerans emulsiões  
intrat, quæ in uteri hæmorrhagia es-  
hibentur. 98

Vc-









GIARDI CAFLC  
- P. 10157 -  
- P. 10158 -



005659297

Digitized by Google

